

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien


Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



50 2



FEAN GOODSELS ITAMES EMIND


V)"

UCH

MEDICAL LIBRARY

TEAN COOLERS TANK ENNING







LEHRBUCH

DER

ANATOMIE DES MENSCHEN,

MIT RÜCKSICHT

AUF

PHYSIOLOGISCHE BEGRÜNDUNG UND PRAKTISCHE ANWENDUNG,

* YOS -- --

JOSEPH HYRTL,

Doctor der Medicin und Chirurgiu, Professor der Anatomia an der Wiener Universität, Ritter des Laisert.
Observeichischen Franz-Joseph-Ordens, und des Ordens der Ifanzös. Ehrenbezion, Ehrenbezion, Ehrenbezion der Leipziger Universität, ordentlichem Angelisch der Kalsert. Academia der Wissenschaften im Wien, der Academia Laesares Leopoldo-Carolina naturae euriosorien, und der Lonigl, böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Ehrenmitglied der med, chirurg, Academia in St. Patersharg, des Vereins deutscher aucht einer Academie der hitblenden Künste in Prag, corresponditendem Mitgliede der Academie der mediches, der Academie und der Sociate de Binlogie zu Paris, der Academie Mitgliede der Academie Mitgliede der Academie of Natural Sciences zu Philadelphia, der Laisert. Lönigt, gentogischen Reichsanstalt, des Atenes au Vermellur, so wie der gelehrten westennischen und naturwissenschaftlichen Gesellschaften zu Amsterdam, Bonn, Brestar, Brussel, Brosden, Krlaugen, Freiburg, Walle, Leipzig, Lemberg, Pestit, und Stockholim.

FÜNFTE AUFLAGE.

WIEN, 1857.
WILHELM BRAUMÜLLER,

Bei Wilhelm Braumüller, k. k. Hofbuchhändler in Wien ist erschienen, von demselben Herrn Verfasser:

HANDBUCH DER TOPOGRAPHISCHEN ANATOMIE

UND THRER

PRAKTISCH MEDICINISCH-CHIRURGISCHEN ANWENDUNGEN.

Dritto verbesserte und bedeutend vermebeto Auflage.

2 Bände. 1857. fl. 10 - 6 Rthlr. 20 Ngr.

Ferner:

LEHRBUCH DER PATHOLOGISCHEN ANATOMIE

VON

CARL ROKITANSKY.

Med. Dr. K. E. Professor an der Universität zu Wien etc. etc. Deitte umgearbeitete Buffage.

ERSTER BAND:

ALLGEMEINE PATHOLOGISCHE ANATOMIE UND ANOMALIEN DES BLUTES.
Mit 130 Holzschnitten. 1855. ft. 5. 40—4 Rthlr.

ZWEITER BAND:

SPECIELLE PATHOLOGISCHE ANATOMIE. ERSTER THEIL.

Mit 46 Holzschnitten. fl. 6. 40 — 4 Rthlr. 20 Ngr.

Der dritte Band (Schluss des Werkes) ist unter der Presse.

LEHRBUCH DER PHARMACOLOGIE

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN PHARMACOPOE VOM JAHRE 1855.

Dr. CARL D. SCHROFF,

K. K. Professor an der Universität zu Wien.
1856. fl. 6. 40 kr. CM. — 4 Rthlr. 15 Ngr.

LEHRBUCH DER PHARMACOGNOSIE

VON

Dr. CARL D. SCHROFF.

k. k. Professor an der Universität zu Wien.

1853. 5 fl. 30 kr. CM — 3 Rthlr. 20 Ngr.

LRHRBUCH

DER

ANATOMIE DES MENSCHEN,

MIT RÜCKSICHT

AUF

PHYSIOLOGISCHE BEGRÜNDUNG UND PRAKTISCHE ... ANWENDING.

VON

JOSEPH HYRTL,

Doctor der Medicin und Chirurgie, Professor der Anatomie an der Wiener Universität, Ritter des kaiserl. Gesterreichischen Franz-Joseph-Ordens, und des Ordens der französ. Ehrenlegion, Ehrendoctor der Leipziger Universität, ordentlichem Mitgliede der kaiserl. Academie der Wissenschaften in Wien, der Academia Caesarea Leopoldo-Carolina naturae curiosorum, und der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Ehrenmitglied der med, chirurg, Academie in St. Petersburg, des Vereins deutscher Aerzie und Naturforscher in Paris, und der Academie der bildenden Kunste in Prag, correspondirendem Mit-gliede der Academie impériale de médecine, der Société anatomique und der Sociéte de Biologie zu Paris, der Academy of Notural Sciences zu Philadelphia, der Laiserl, Lönigl, geologischen Reichsanstalt, des Ateneo zu Veneilig, so wie der gelehrten medicinischen und naturwissenschaftlichen Gesellschaften zu Amsterdam, Bonn, Breslau, Brussel, Dresden, Erlangen, Freiburg, Halle, Leipzig, Lemberg, Pesth, und Stockholm.

FÜNFTE AUFLAGE.



k. L. Hofbuchhandler.

so vorgenommen, wie sie sich unter dem Messer entwickeln, und deshalb die Muskellehre mit der topographischen Anatomie der Regionen verbunden. Organe, um welche das praktische Bedürfniss wenig frägt, werden so compendiös als möglich abgehandelt; dagegen Regionen, welche das Interesse des Praktikers mehr anregen, ausführlicher besprochen. Man wird deshalb den Leisten- und Schenkelkanal, den Situs viscerum, das Mittelfleisch, und andere Gegenden, an welchen häufig operirt wird, mit grösserer Umständlichkeit behandelt finden, als die Faserung des Gehirns, oder den Bau des Gehörorgans. Durch diese Behandlungsweise dürfte sich das Werk vielleicht zu seinem Vortheile von anderen Schriften dieser Art unterscheiden. Von Literaturquellen werden nur jene angegeben, welche sich auf den Text direct beziehen, und welche ich aus eigener Erfahrung für die weitere Ausbildung im Fache als empfehlenswerth kennen lernte.

Es war meine Absicht, das Buch mit Tafeln auszustatten, da ich sehr wohl einsehe, wie sehr die bildliche Anschauung den Begriffen zu Statten kommt, und zugleich weiss, mit welchem Beifalle die illustrirten Ausgaben englischer Handbücher auch in Deutschland aufgenommen wurden. Die dadurch nothwendig gewordene Vertheuerung des Buches bestimmte mich jedoch, diesen Plan vor der Hand aufzugeben. Ich pflege in meinen Vorlesungen, wo es angeht, den Bau und die räumlichen Verhältnisse der Organe durch Zeichnungen von Durchschnitten, und ihr Nebeneinandersein durch skizzirte Entwürfe zu versinnlichen. Werden diese vom Zuhörer copirt, so kann er sich dadurch einen anatomischen Atlas bilden, der ihm beim Studium des Textes wesentliche Dienste leisten wird. - Von der Entwicklungsgeschichte habe ich nur so viel aufgenommen, als mir erforderlich schien, um die späteren Zustände des schwangeren Uterus und seines Inhaltes verständlich zu machen, dagegen die in Form und Lage der Organe austretenden Varietäten, auf deren Vorkommen der Chirurg gefasst sein soll, oder die sich auf interessante Weise aus der vergleichenden Anatomie interpretiren lassen, am betreffenden Orte zusammengestellt. Die allgemeine Anatomie wurde, nach üblichem Gebrauche, der speciellen vorangeschickt, obgleich ich weiss, dass das Studium der ersteren nur durch die Kenntniss der letzteren möglich wird. — Da ich mir wohl denke, dass für den angehenden Arzt praktische Bemerkungen, sofern sie ohne specielle Kenntniss der Krankheiten verständlich sind, nicht ohne Nutzen auch in einem anatomischen Handbuche Platz finden können, so habe ich solche, wo es thunlich war, beigefügt; wenigstens weiss ich aus eigener Erfahrung,

dass es mir als Student sehr willkommen gewesen wäre. zu erfahren, warum man Anatomie lernt. Sollte diese Abweichung von der streng zuatomischen Aufgabe Jemandem schädlich vorkommen, so steht es ihm ja frei, die betreffenden Paragraphe zu überschlagen.

Vollständigkeit und Kürze zu vereinigen, war der Zweck, den ich erreichen wollte; — Deutlichkeit ist nicht immer das Ergebniss vieler Worte, — und wenn die allzu compendiöse Form dieses Buches dem kritischen Vorwurf unterliegt, so wird sie wahrscheinlich in den Augen derer, für welche es geschrieben wurde, nicht die tadelnswertbeste Eigenschaft desselben sein.

HyrtL

VORREDE ZUR VIERTEN AUFLAGE.

Ich habe in der vierten Auflage dieses Lehrbuches mehrere Veränderungen und Zusätze angebracht. Sie wurden durch die anerkennenswerthen Fortschritte der Anatomie, mit welchen dieses Buch gleichen Schritt halten soll, nothwendig. Eine genaue Revision entledigte den älteren Text jener Unrichtigkeiten, die sich in ihm noch erhalten haben. Die Form ist dieselbe geblieben, — möge es auch die Ansicht bleiben, welche meine Fachgenossen sowohl, als meine Schüler, über den Werth dieses Buches hegten. Ich hoffe wenigstens, dass seine Nützlichkeit, durch die in dieser Auflage vorkommenden Aenderungen, nicht abgenommen hat.

Hyrtl

VORWORT ZUR FÜNFTEN AUFLAGE.

Die vierte Auslage dieses Buches wurde schneller vergrissen, als es nach den bisherigen Erfahrungen über die Lebensdauer der stüheren zu erwarten stand. Die Aussorderung des Verlegers zur Veranstaltung einer neuen Auslage überraschte mich in einer für mich zu sehr bewegten Zeit, um die zur Bestellung einer veränderten und vermehrten Herausgabe nettige Musse zu sinden. Die sünste Auslage erscheint deshalb als ein unveränderter Abdruck der vierten, und ich glaube hossen zu dürsen, dass meine Zuhörer den Abgang jener wenigen Zusätze, welche die Fortschrift der deskriptiven Anatomie in den letzten anderthalb Jahren hier anzubingen gestattet hätten, nicht sür einen wesentlichen Mangel der neuen Auslage erklären werden, da ihm durch den mündlichen Vortrag abzuhelsen ist.

Hyrtl.

INHALT.

	Einleitung und nothwendige	Vorbegriffe.	
• •			Seite
§ . 1.	Organisches und Anorganisches	• • • • • • • • •	3
§. 2.	Organisation. Organ. Organismus		•
§ . 3.	Lebensverrichtungen	• • • • • • • • •	
§ . 4.	Begriff und Eintheilung der Anatomie		8
§ . 5.	Verhältniss der Anatomie zur Physiologie		13
§. 6.	Verhältniss der Anatomie zur Medicin		
§. 7.	Verhältniss der Anstomie zur Chirurgie	• • • • • • • • •	
§ . 8.	Lehr- und Lernmethode der Anatomie		18
§ . 9.	Terminologie der Anatomie		21
§ . 10.	Besondere Nutzanwendungen der Anstomie		
§ . 11.	Geschichtliche Bemerkungen über die Entwicklung		
§. 12.	Zweite Periode der Geschichte		
§ . 13.	Allgemeine Literatur der Anatomie	· · · · · · · · · · ·	32
	Erstes Buch.		
	Gewebslehre und allgemeine A	nalomie.	
5. 14.	Bestandtheile des menschlichen Leibes		43
§ . 15.	Die thierische Zelle		46
5 . 16.	Vermehrung der Zellen	<i>.</i>	47
5 . 17.	Metamorphosen der Zellen		48
. 18.	Bindegewebsystem		50
. 19.	Physikalische, chemische, und Lebenseigenschaften	des Bindegewebes	51
20.	Formen des Bindegewebes		53
. 21.	Elastisches Gewehe		55
§ . 22.	Fett	· · · · · · · · · · · ·	56
§. 23.	Physiologische Bedeutung des Fettes		58
§ . 24.	Pigment		60
§. 2 5.	Horngewebe. Allgemeine Eigenschaften desselben		62
§ . 2 6.	Epithelium. Arten desselben		64
§. 27.	Physiologische Bemerkungen über die Epithelien		68
§. 2 8.	Muskelgewebe. Anatomische Eigenschaften desselbe	en	70
§ . 2 9.	Chemische und physiologische Eigenschaften des M		73
§ . 30.	Verhältniss der Muskeln zu ihren Sehnen		78
§. 31.	Benennung und Eintheilung der Muskeln		79
§ . 32.	Allgemeine mechanische Verhältnisse der Muskeln		82
6 . 23.			

viii Inhalt.

_		Seite
5 . 34.	Sehnen- oder fibroses Gewebe	86
35.	Formen des fibrosen Gewebes	87
5 . 36.	Praktische Bemerkungen über das Sehnengewebe	89
5 . 37.	Serose Haute	91
. 38.	Praktische Bemerkungen über die serösen Häute	94
3 9.	Gefässsystem. Begriff des Kreislaufes und Eintheilung des Gefässsystems .	96
§ . 40.	Arterien. Bau derselben	98
41.	Allgemeine Verlauss- und Verästlungsgesetze der Arterien	99
. 42.	Physiologische Eigenschaften der Arterien	102
§. 43.	Praktische Anwendungen	104
j. 44.	Capillargestasse. Anatomische Eigenschasten derselben	108
45.	Physiologische Eigenschasten der Capillargesasse	110
. 46.	Venen. Anatomische Eigenschaften derselben	113
47.	Verlaufs- und Verästlungsgesetze der Venen	113
§ . 48.	Physiologische Eigenschasten der Venen	115
5 . 4 9.	Lymph- und Chylusgefässe. Anatomische Eigenschaften derselben	
5 . 50.	Verlaussgesetze der Lymph- und Chylusgesässe	
5 . 51.	Physiologische und praktische Bemerkungen	
5. 52.	Blut. Mikroskopische Analyse desselben	
53.	Gerinnung des Blutes	124
§ . 54.	Weitere Augaben über chemisches und mikroskopisches Verhalten des Blutes	125
5. 55.	Physiologische Bemerkungen über das Blut	127
5 . 56.	Lymphe und Chylus	130
§ . 57.	Nervensystem. Eintheilung des Nervensystems	132
5 . 5 8.	Mikroskopische Elemente des Nervensystems	133
5 . 59.	Verhältniss des vegetativen Nervensystems zum animalischen	136
§ . 60.	Ursprung der Nerven	13F
61.	Peripherisches Ende der Nerven	139
§ . 62.	Pacini'sche Körperchen und Wagner's (Meissner's) Tastkörperchen	141
§ . 63.	Verlaussweise der Nerven	143
§ . 64.	Physiologische Eigenschasten des animalen Nervensystems	145
§ . 65.	Physiologische Eigenschasten des vegetativen Nervensystems	149
§. 66.	Praktische Anwendungen	15 t
§ . 67.	Knorpelsystem. Anatomische Eigenschaften desselben	155
§ . 68.	Physiologische Eigenschasten der Knorpel	157
§ . 69.	Knochensystem. Allgemeine Eigenschaften der Knochen	159
š . 70.	Eintheilung der Knochen	161
§ . 71.	Knochensubstanzen	163
§ . 72.	Beinhaut und Knochenmark	164
§ . 73.	Verbindung der Gelenkenden der Knochen mit den Knorpeln	
§ . 74.	Verbindungen der Knochen unter sich	166
§ . 75.	Structur der Knochen	
§ . 76.	Physiologische Eigenschaften der Knochen	
§ . 77.		173
§ . 78.	Praktische Bemerkungen	175
§ . 79.	Schleimhäute. Anatomische Eigenschaften derseiben	177
§ . 80.	Physiologische Eigenschasten der Schleimhänte	179
§ . 81.	Drüsensystem. Anstomische Eigenschaften desselben	182
§ . 82.	Eintheilung der Drüsen	194
ģ . 83.	Physiologische Eigenschasten der Drüsen	186
§ . 84.	Gesetze der Absonderungen	189

Zweites Buch.

		Vereinigte Knochen- und Bänderlehre.	
ş.	85.	Object der Knochen- und Bänderlehre	Sein 19
	•	A. Kopfknochen.	·
§ .	86.	Eintheilung der Kopfknochen	190
•		a) Schädelknochen.	
ş .	87.	Allgemeine Eigenschaften der Schädelknochen	104
Ţ.	88.	Des Grundbein. A. Keilstück. B. Hinterhauptstück	191
Ş.	89.	Stirnbein	
Š.		Siebbein	20
ğ.	91.	Seitenwand- oder Scheitelbeine	210
į.		Schläfebeine	211
Š.		Verbindung der Schädelknochen. Fontanellen	214
Š.		Ueberzählige Schädelknochen	
ş.		Schädelhöble	21
•	•	b) Gesichtsknochen.	
:	٠.	·	-
į.		Allgemeine Bemerkungen über die Gesichtsknochen	220
ş.		Oberkieferbein	
į.		Jochbein	
į.		Nasenbein	
	100.	Gaumenbein	
	101.	Untere Nasenmuschel	
	10 2 . 103.	Pflugscharbein	
	103.	Unterkieser	
	105.	Kinnbackengelenk	
	106.	Zungenbein	
	107.	Höhlen des Gesichts	23
•	108.	Verhältniss der Hirnschale zum Gesicht	23
•	109.	Altersverschiedenheiten des Kopfes	
•	110.	Entwicklung der Kopfknochen	
•			
		B. Knochen des Stammes.	
		a) Urknochen oder Wirbel.	
§.	111.	Begriff und Eintheilung der Wirbel	24
	112.	Halswirbel	24
	113.	Brustwirbel	24
ş.	114.	Lendenwirbel	24
§.	115.	Kreuzbein	
Ş.	116.	Steissbein	
§.	117.	Bänder der Wirhelsäule	24
•	118.	Betrachtung der Wirbelsäule als Ganzes	
ğ.	119.	Beweglichkeit der Wirbelsäule	
		b) Nebenknochen des Stammes.	
\$.	120.	Brustbein	25
•	121.	Rippen	
	122.	Verbindungen der Rippen	
_	123.	Allgemeine Betrachtung des Brustkorbes	

*	Inhalt.
·	C. Knochen der oberen Extremitäten.
§. 124.	Eintheilung der oberen Extremitäten
§. 125.	Knochen der Schulter
§. 126.	Verbindungen der Schulterknochen
6 . 127.	Oberarmbein
§ . 128.	Schultergelenk
§ . 129.	Knochen des Vorderarms
§ . 130.	Ellbogengelenk
§ . 131.	Knochen der Hand
§ . 132.	Bänder der Hand
§. 133.	Allgemeine Bemerkungen über die Hand
	D. Knochen der unteren Extremitäten.
§. 134.	Eintheilung der unteren Extremitäten
§. 135.	Hüftbein
§ . 136.	Verbindungen der Hüftbeine
§. 137.	Das Becken als Ganzes
§ . 138.	Unterschiede des männlichen und weiblichen Beckens
§ . 139.	Oberschenkelbein
§ . 140.	Hüftgelenk
§. 141.	Knochen des Unterschenkels
§ . 142.	Kniegelenk
§ . 143.	Knochen des Fusses
§ . 144.	Bänder des Fusses
§ . 145.	Allgemeine Bemerkungen über den Fuss
§. 146.	Literatur der Knochen- und Bänderlehre
	Drittes Buch.
	Muskellehre und topographische Anatomie.
	A. Kopfmuskeln.
• • • •	•
§ . 147.	
§ . 148.	• ,
§. 149.	Muskeln des Unterkiefers
	B. Muskeln des Halses.
8 . 150.	Form, Eintheilung und Zusammensetzung des Halses 319
§. 151.	
24	kiefer bewegen
§ . 152.	Muskeln des Zungenbeins und der Zunge
§ . 153.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
§. 154.	
§ . 155.	_ · · · · ·
•	C. Muskeln der Brust.
§. 156.	Acussere Ansicht der vorderen und seitlichen Brustgegend 329
§ . 157.	Muskeln an der Brust 330

Inhait.	XX

	D. Muskeln des Bauches.	, .
		Seite
§ . 158.	Allgemeines über die Bauchwand	338
§ . 159.	Specielle Beschreibung der Bauchmuskeln	
§. 160.	Fascia transversa. Scheide des Rectus, und weisse Bauchlinie	
§. 161.	9	
§. 162.	Einiges zur Anatomie der Leistenbrüche	343
§ . 163.	Zwerchsell	346
	E. Muskeln des Rückens.	•
§. 164.	Allgemeine Betrachtung des Rückens, und Eintheilung seiner Muskeln	348
§ . 165.	Breite Rückenmuskeln	
§. 166.	Lange Rückenmuskeln	352
§. 167.	Kurze Rückenmuskein	
O	•	
	F. Muskeln der oberen Extremität.	
§ . 168.	Allgemeine Betrachtung der oberen Extremität	357
§. 169.	Muskeln an der Schulter	359
§ . 170.	Muskeln am Oberarme	361
§ . 171.	Muskeln am Vorderarme	364
§. 172.	Muskeln an der Hand	372
§ . 173.	Aponeurose der oberen Extremität	373
	G. Muskeln der unteren Extremität.	
§ . 174.	Allgemeine Betrachtung der unteren Extremität	376
§. 175.	Muskeln an der Hüfte	
§. 176.	Muskeln an der vorderen Peripherie des Oberschenkels	
§. 177.	Topographisches Verhältniss der Muskeln und Gefässe am vorderen Umfange	
3	des Oberschenkels	
§ , 178.	Muskeln an der hinteren Peripherie des Oberschenkels	
§ . 179.	Topographie der Kniekehle	390
§ . 180.	Muskeln an der vorderen und äusseren Seite des Unterschenkels	391
§ . 181.	Muskeln an der hinteren Seite des Unterschenkels	394
§. 182.	Muskeln am Fusse	398
§ . 183.		400
§. 184.	Schenkelbinde und Schenkelkanal	400
§ . 185.	Einiges zur Anatomie der Schenkelbrüche	
§ . 186.	Binde des Unterschenkels und des Fusses	405
§. 187.	Literatur der Muskellehre	
	and the second s	
	Viertes Buch.	
	viertes bucn.	
	Sinnenlehre.	
§ . 188.	Begriff der Sinneswerkzeuge und Eintheilung derselben	411
-	A. Tastorgan.	
6 . 189.		413
§. 190.	Structur der Haut. Tastwärzehen	412
§. 191.	Drüsen der Haut	416
§. 191.		418
A. 124.	Oberhaut	-110

94. Hasre. Anatomie derselben 95. Physikalische und physiologische Eigenschaften der Hasre 96. Unterhautzellgewebe und Fetthaut B. Geruchorgan. 97. Aeussere Nase 88. Innere Nase C. Schorgan. 1. Schutz- und Hiffnapparate. 98. Augenlider und Augenbrauen 10. Augenmunkeln 11. Augenfühl 22. Allgemeines über den Augspfel 33. Sklerotica und Cornea 44. Choroidea und Iris 44. Gefässe und Nerren der Choroidea und Iris 45. Gefässe und Nerren der Choroidea und Iris 46. Retina 77. Kern des Auges. Glaskörper 45. Linse 99. Augenkammern 10. Eintheilung des Gehörorgans 11. Ohrmuschel 12. Aeussere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 45. Gehörknöchelchen 16. Vorhof 17. Begengänge 46. Gehörknöchelchen 18. Schnecke 19. Häutiges Labyrinth 16. Vorhof 17. Begengänge 46. Gehörknöchelchen Fünfte s Buch. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre A. Eingeweidelehre 1. Verdauungsargan. 22. Begriff und Eintheilung der Verdauungsorgans 478 22. Begriff und Eintheilung der Verdauungsorgans 478		Seit
95. Physikalische und physiologische Eigenschaften der Haare 96. Unterbautzeligewebe und Fetthaut B. Geruchorgan. 97. Acussere Nase C. Schorgan. 1. Schutz- und Mitthapparate. 98. Augenlider und Augenbrauen C. Schorgan. 1. Schutz- und Mitthapparate. 99. Augenmunkeln H. Augaptel. 20. Allgemeines über den Augapfel 30. Sklerotica und Cornea 440. Choroidea und Iris 450. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 461. Kerina 70. Kern des Auges. Glaskörper 452. Linse 452. Augenkammern D. Gehörorgan. 16. Eintheilung des Gehörorgans 17. Acussere Sphäre. 18. Augsere Sphäre. 19. Augsenkammern D. Gehörorgan. 19. Häutstlere Sphäre. 11. Ohrmuschel 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell H. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 Gehörknöchelchen 15. Schnecke 460 Häll Immere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorbof Häll Linser F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre A. Eingeweidelehre A. Eingeweidelehre 1. Verdauungsargan. 21. Begriff und Eintheilung der Verdauungsargans 478 22. Begriff und Eintheilung der Verdauungsargans 478	193.	
### B. Geruchorgan. ### B. Geruchorgan. ### B. Geruchorgan. ### C. Sehorgan. C. Sehorgan.	194.	
B. Geruchorgan. 97. Aeussere Nase	195.	
97. Acussere Nase 428 98. Innere Nase 229 C. Schorgan. 1. Schutz- und Hiffsapparate. 99. Augenlider und Augenbrauen 432 00. Thränenorgene 433 01. Augenmunkeln 437 02. Allgemeines über den Augapfel 439 03. Sklerotica und Cornea 440 04. Choroidea und Iris 443 05. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 443 06. Retina 443 07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Acussere Sphäre. 11. Ohrmuschel 455 12. Acusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mittelere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literstur der gesammten Sinnenlehre 469 F ünftes Buch. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre. A. Eingeweidelehre. 1. Verdauungsorgan. 478	196.	Unterhautzeilgewebe und Fetthaut
C. Schorgan. 1. Schutz- und Hiffsapparate. 1. Schutz- und Hiffsapparate. 1. Augenlider und Augenbrauen 432 99. Augenlider und Augenbrauen 435 01. Augenmuskeln 437 EL Augenpack. 22. Allgemeines über den Augapfel 439 23. Sklerotica und Cornea 440 440. Choroidea und Iris 446 451. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 446 66. Retina 448 Chern des Auges. Glaskörper 451 81. Linse 452 99. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Aoussere Sphäre. 11. Ohrmuschel 457 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mitstlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Innere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 Fünfte s Buch. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478		B. Geruchorgan.
C. Schorgan. 1. Schutn- und Hiftsapparate. 99. Augenlider und Augenbrauen 432 90. Thränenorgane 433 91. Augenmunkeln 437 III. Augangtel. 92. Allgemeines über den Augapfel 439 93. Skjerotica und Cornea 440 94. Choroidea und Iris 443 95. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 446 96. Retina 448 97. Kern des Auges. Glaskörper 451 98. Linse 452 99. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Acussere Sphäre. 11. Ohrmuschel 458 12. Acusserer Gehörgang 457 13. Trommeifell 458 III. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478	197.	Acussere Nase
C. Schorgan. 1. Schutz- und Hiffsapparate. 99. Augenlider und Augenbrauen	198.	Innere Nase
1. Schwis- und Hiffsapparate. 432		
99. Augenlider und Augenbrauen 432 00. Thränenorgame 433 01. Augenmunkeln 437 III. Augenfel. 439 02. Allgemeines über den Augapfel 439 03. Sklerotica und Cornea 440 04. Choroidea und Iris 443 05. Gelässe und Nerven der Choroidea und Iris 446 06. Retina 448 07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 455 I. Acussere Sphäre. 455 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 II. Mittlere Sphäre. 459 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Immere Sphäre eder Lubyrinth. 462 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 463 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 463 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 477 I. Verdauungsorgan. 478 22. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 478 I. Verdauungsorgan. 478		G
100 Thränenorgame 435 101 Augenmuskeln 437 102 Allgemeines über den Augspfel 439 103 Sklerotica und Cornen 440 104 Choroidea und Iris 443 105 Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 446 105 Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 448 107 Kern des Auges Glaskörper 451 108 Linse 452 109 Augenkammern 454 109 D. Gehörorgan 455 110 D. Gehörorgan 455 121 Acussere Sphäre 458 122 Acusserer Gehörgang 457 133 Trommelfell 458 144 Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 155 Gehörknöchelchen 460 166 Vorhof 462 167 Häutiges Labyrinth 466 168 Vorhof 462 169 Häutiges Labyrinth 466 170 Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 180 F ü n f t e s B u c h 180 Eingeweidelehre 463 181 Füngeweidelehre 463 182 Füngeweidelehre 463 183 Füngeweidelehre 463 184 Füngeweidelehre 465 185 Füngeweidelehre 465 186 Füngeweidelehre 465 186 Füngeweidelehre 465 187 Füngeweidelehre 465 188 Füngeweidelehre 465 188 Füngeweidelehre 465 188 Füngeweidelehre 465 188 Füngeweidelehre 465 189 Füngeweidelehre 465 180	199.	
II. Augenptel. 437		
### Augaptel. 12. Allgemeines über den Augapfel		
02. Allgemeines über den Augspfel 439 03. Sklerotica und Cornea 440 04. Choroidea und Iris 443 05. Gefässe und Nerren der Choroidea und Iris 448 06. Reina 448 07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Acussere Sphäre. 457 13. Trommelfell 458 II. Mittlere Sphäre. 459 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Innere Sphäre oder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
03. Sklerotica und Cornea 440 04. Choroidea und Iris 443 05. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 446 06. Retina 448 07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 455 I. Acussere Sphäre. 455 11. Ohrmyschel 455 12. Acusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III Mittelere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Innere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 463 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 478 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478	 9	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
04. Choroidea und Iris 443 05. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris 446 06. Retina 448 07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Acussere Sphäre. 11. Ohrmyschel 455 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Immere Sphäre eder Labyrinth 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 463 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 468 F ü n f t e s B u c h. Füngeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans<		Shippation and Corner
10 Selfasse und Nerven der Choroidea und Iris 446		Chaptida and Inc
06. Retina 448 07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Aeussere Sphäre. 11. Ohrmuschel 455 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Immere Sphäre oder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. F ünf t e s B u c h. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 478		
07. Kern des Auges. Glaskörper 451 08. Linse 452 09. Augenkammern 454 D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans 455 I. Acusseere Sphäre. 11. Ohrmyschel 455 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Innere Sphäre oder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 468 F ü n f t e s B u c h. Ringeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweldelehre 477 I. Verdauungsorgan. 478		
10.		None des Ausse Clarksman
D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans		
D. Gehörorgan. 10. Eintheilung des Gehörorgans		
10. Eintheilung des Gehörorgans 15. 15. 16. 16. 17. 18.	U¥.	Augenkammern
I. Acuseere Sphäre. 11. Ohrmuschel		D. Gehörorgan.
11. Ohrmpschel 455 12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Innere Sphäre oder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 468 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478	lØ.	Eintheilung des Gehörorgans
12. Aeusserer Gehörgang 457 13. Trommelfell 458 III. Mittlere Sphäre 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknöchelchen 460 III. Innere Sphäre oder Labyrinth 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweldelehre 477 I. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478		
II. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete	11.	
II. Mittlere Sphäre. 14. Paukenhöhle und Ohrtrompete	12.	Aeusserer Gehörgang
14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknochelchen 460 III. Innere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478	13.	Trommelfell
14. Paukenhöhle und Ohrtrompete 459 15. Gehörknochelchen 460 III. Innere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorhof 462 17. Bogengänge 463 18. Schnecke 464 19. Häutiges Labyrinth 466 20. Literatur der gesammten Sinnenlehre 469 F ü n f t e s B u c h. Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre 477 I. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478		II. Wittlere Subire
III. Innere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorhof 17. Bogengänge	14	
HI. Innere Sphäre eder Labyrinth. 16. Vorhof		Cehörknöckelchen
16. Vorhof	w.	
17. Bogengänge		• •
18. Schnecke		
19. Häutiges Labyrinth		Bogengange
Fünftes Buch. Fünftes Buch. Bingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre. 1. Verdauungsorgan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans. 478		
Fünftes Buch. Bingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweldelehre	119.	
Bingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 21. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre	2 0.	Literatur der gesammten Sinnenlehre
Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 1. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre		
Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 1. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre		
Bingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte. A. Eingeweidelehre. 1. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre		Fünftes Buch
A. Eingeweidelehre. 1. Begriff und Eintheilung der Eingeweldelehre	-	•
21. Begriff und Eintheilung der Eingeweldelehre	K	mgeweidelenre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte.
I. Verdauungsergan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans		A. Eingeweidelehre.
I. Verdauungsergan. 22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans	22 1.	Begriff und Eintheilung der Eingeweldelehre
22. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans 478		
	199	
23. Mundhoble, weicher Gaumen, und Isthmus faucium 479		96 11 91 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

	Inhal t.	XIII
. 224 .	Zähne. Anstomie derselben	Seite 483
. 225.	Lebenseigenschaften der Zähne	485
. 226.	Speicheldrüsen	489
. 227.	Zunge	492
. 228.	Rachenhöhle	494
. 229.	Speiseröhre	497
. 230.	Uebersicht der Lage und Zusammensetzung des Verdauungskanals in der	
	Bauchhöhle	498
. 231.	Magen	500
. 232.	Düundarm	503
. 233.	Dickdarm	508
234.	Muskeln des Afters	509
235.	Leber. Aeussere Verhältnisse derselben	511
236.	Ban der Leber	514
237.	Bauchspeicheldrüse	519
238.	Milz	520
239.	Bauchfell	522
2000		
	II. Respirationsorgan,	
24 0.	Begriff und Eintheilung des Respirationsorgans	526
241.	Kehlkopf	527
242.	Luströhre	533
243.	Lungen	534
244.	Nebendrüsen der Respirationsorgane ,	537
245.	Brustfelle	539
246.	Lage der Eingeweide in der Brusthöhle	54 l
	III. Harn- und Geschlechtsorgane,	
247.	Eintheilung der Harn- und Geschlechtsorgane	543
	A. Harnwerkzeuge.	
248.	Nieren und Harnleiter	544
249.	Näheres über die Structur der Nieren	546
25 0.	Nebennieren	548
251.	Harnblase	549
252.	Harnröhre	551
	B. Geschlechtswerkzeuge.	
253.	Eintheilung der Geschlechtswerkzeuge	554
200.	Fintingiant act occurrencementstrade	904
	I, Männliche Geschlechtsergane.	
254.	Hode. Nebenhode	554
255.	Verbältniss des Hoden zum Peritoneum	557
256.		559
257.	Hodensack und Tunica dartos	560
258.	Samenbläschen und Ausspritzungskanäle. Vorsteherdrüse und Cowper'sche	
	Drüsen	561
25 9.	Mānnliches Glied	564
	•	-72
	II. Weibliche Geschlechtsergane.	
	Anatomischer und physiologischer Charakter der weiblichen Geschlechtsorgane	567
	Eierstöcke	568
2 62.		571
263	Multarechaida	574

xiv Inhait.

•			Seite
•	264.	Acussere Scham	576
	265.	Brüste	
₽,			
		III. Mittelfleisch.	
ş.	266.	Ausdehnung und Grenzen des Mittelfleisches	580
Š.	267.	Beckenbinde	580
§.	26 8.	Mittelsleischbinden, und topographische Anatomie des Mittelsleisches	582
Š.	269.	Muskeln des Mittelseisches und der Aftergegend	584
Š.	270.	Praktische Behandlung des Mittelsleisches	587
		B. Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte.	
4.	271.	Veränderungen des Eies im Eileiter bis zum Auftreten der Keimhaut	590
	272.	Veranderungen des Eies im Uterus. Erscheinen des Embryo	593
-	273.	Weitere Fortschritte der Entwicklung des Embryo	595
•	274.	Menschliche Eier aus der frühesten Schwangerschaftsperiode. Membranae	
3.	2.7.	deciduse	599
	275.	Menschliche Eier aus dem zweiten Schwangerschaftsmonate	601
•	276.	Zur Geburt reises Ei. Schashaut	
•			603
•	277.	Fruchtwasser	604
•	278.	Gefässhaut	
•	279.	Mutterkuchen	605
•	280.	Nabelstrang	608
•	281.	Veränderungen der Gebärmutter während der Schwangerschaft	
•	282.	Lage des Embryo in der Gebärmutter	612
ş.	2 83.	Literatur der Eingeweidelehre	613
		Sechstes Buch.	
		Gehirn - und Nervenlehre.	
,	A. Ce		rk.
		ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma	
§ .	284.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623
ş. Ş.	284. 285.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628
ş. ş. ş.	284. 285. 286.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630
ş. ş. ş.	284. 285. 286. 287.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630 636
ş. ş. ş. ş.	284. 285. 286. 287. 288.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630 636 639
***	284. 285. 286. 287. 288. 289.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630 636 639 642
***	284. 285. 286. 287. 288. 289.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630 636 639 642 645
***	284. 285. 286. 287. 288. 289.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630 636 639 642 645
***	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks	623 628 630 636 639 642 645
***	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks Nerven.	623 628 630 636 639 642 645
***	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven.	623 628 630 636 639 642 645
***	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben antersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. Erstes Paar	623 628 630 636 639 642 645 647
****	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. F	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar	623 628 630 636 639 642 645 647
****	284. 285. 286. 287. 288. 290. 291. I	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar	623 628 630 636 639 642 645 647
****	284. 285. 286. 287. 288. 290. 291. If 292. 293. 294. 295.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar	623 628 630 636 639 642 645 647
	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. F 292. 293. 294. 295. 296.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar Ganglien am fünften Paare	623 628 630 636 639 642 645 647 653 654 655 657 664
****	284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. F 292. 293. 294. 295. 296. 297.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar Ganglien am fünften Paare Siebentes Paar	623 628 630 636 639 642 645 647 653 654 655 657 664
	284. 285. 286. 287. 288. 299. 290. 291. F 292. 293. 294. 295. 296. 297.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar Ganglien am fünften Paare Siebentes Paar Achtes Paar	623 628 630 636 642 645 647 653 654 655 657 664 670
	284. 285. 286. 287. 288. 299. 291. F 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar Ganglien am fünften Paare Siebentes Paar Achtes Paar	623 628 630 636 639 642 645 647 653 654 657 664 670 672 673
	284. 285. 286. 287. 288. 299. 290. 291. F 292. 293. 294. 295. 296. 297.	ntraler Theil des animalen Nervensystems. Gehirn und Rückenma Hüllen des Gehirns und Rückenmarks Eintheilung des Gehirns Grosses Gehirn von oben untersucht Grosses Gehirn von unten untersucht Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer Rückenmark Faserung des Gehirns und Rückenmarks B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems. Nerven. I. Gehirnnerven. Erstes Paar Zweites Paar Drittes, viertes, und sechstes Paar Ganglien am fünften Paare Siebentes Paar Achtes Paar	623 628 630 636 642 645 647 653 654 656 657 664 670

	Inhalt.
	Silites Paar
§. 301.	
§. 302.	
_	II. Rückenmarksnerven.
§. 303.	
§ . 304.	Die vier oberen Halanerven
§ . 3 05.	
§ . 306.	
§ . 307.	
§ . 308.	
	C. Vegetatives Nervensystem.
§ . 309.	Halstheil des Sympathious
§ . 310.	• •
§ . 311.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ . 312.	
§. 313.	
§. 314.	· ·
§. 315.	•
§ . 316.	· ·
§ . 317.	Literatur des gesammten Nervensystems
	Gefässlehre. A. Herz.
§ . 318.	·
§ . 318. § . 319.	A. Herz.
•	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
§. 319.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
§. 319. §. 320.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
§. 319. §. 320. §. 321.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
§. 319. §. 320. §. 321.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel
§. 319. §. 320. §. 321. §. 322.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
§. 319. §. 320. §. 321. §. 322.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
 319. 320. 321. 322. 323. 324. 	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens
§. 319. §. 320. §. 321. §. 322. §. 323. §. 324. §. 325.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa
§. 319. §. 320. §. 321. §. 322. §. 323. §. 324. §. 325. §. 326.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 329.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 329. \$. 330. \$. 331.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 329. \$. 330. \$. 331. \$. 332.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der absteigenden Brustaorta
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 329. \$. 330. \$. 331. \$. 332. \$. 333.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der absteigenden Brustaorta Aeste der Bauchaorta
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 330. \$. 331. \$. 332. \$. 333. \$. 334.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der absteigenden Brustaorta Aeste der Bauchaorta Verästlung der Beckenarterie
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 330. \$. 331. \$. 332. \$. 333. \$. 334. \$. 335.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der absteigenden Brustaorta Aeste der Bauchaorta Verästlung der Schenkelarterie Verästlung der Beckenarterie Verästlung der Beckenarterie
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 330. \$. 331. \$. 332. \$. 333. \$. 334.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der absteigenden Brustaorta Aeste der Bauchaorta Verästlung der Beckenarterie
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 330. \$. 331. \$. 332. \$. 333. \$. 334. \$. 335.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der absteigenden Brustaorta Aeste der Bauchaorta Verästlung der Schenkelarterie Verästlung der Beckenarterie Verästlung der Beckenarterie
\$. 319. \$. 320. \$. 321. \$. 322. \$. 323. \$. 324. \$. 325. \$. 326. \$. 327. \$. 328. \$. 330. \$. 331. \$. 332. \$. 333. \$. 334. \$. 335.	A. Herz. Allgemeine Beschreibung des Herzens Bau des Herzens Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens Mechanismus der Herzpumpe Herzbeutel B. Arterien. Aorta und deren primitive Aeste Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern Verästlung der Carotis externa Verästlung der Schlüsselbeinarterie Verästlung der Achselarterie Verästlung der Armarterie Verästlung der Vorderarmarterien Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien Aeste der Bauchaorta Aeste der Bauchaorta Verästlung der Schenkelarterie Verästlung der Schenkelarterie Verästlung der Schenkelarterie Verästlung der Schenkelarterie

XAI		Inhal

.

·

XAI	Inhalt.	
	-	Seite
§ . 339.	Gemeinschastliche Gesichtsvene	77 L
4 . 340.	Oberstächliche und tiefe Halsvenen	773
§. 341.	Venen der oberen Extremität	775
§ . 342.	Venen des Brustkastens	776
§ . 343.	Untere Hohlvene	777
§. 344.		
6 . 345.	_	
§ . 346.	·	
3 . 020.	Fibitauci	101
	D. Lymphgesässe oder Saugadern.	
§ . 347.	Hauptstamm des Lymphgefässsystems	783
§ . 349.	Saugadern des Kopfes und Halses	784
4 . 349.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	786
§ . 350.	•	787
§ . 351.	•	788
•		
•	Saugadern der Bauchhöhle	
9 . 353.	Literatur des gesammten Gefässsystems	791
	·	

EINLEITUNG UND VORBEGRIFFE.

·		•	٠	
		·		
	•			
	·			

§. 1. Organisches und Anorganisches.

Die Körper der Sinnenwelt, welche Gegenstand unserer Anschauung und Beobachtung sind, zerfallen in zwei Hauptgruppen. — in das organische und anorganische Naturreich. Die Wissenschaft, welche sich die Aufgabe stellt, die Kräfte und Thätigkeitsnormen beider Körperreihen auszumitteln, ist die Naturlehre im weitesten Sinne des Wortes. Man ist übereingekommen, die Naturlehre der anorganischen Körper Physik, und jene der organischen Physiologie (oder auch Biologie) zu nennen. Das Ideale, welches nie zur sinnlichen Anschauung kommt, ist das Object der Philosophie.

Eine endliche Reihe von Thätigkeiten, welche jeder organische Körper, so lange er als solcher besteht. äussert, bildet den Begriff des Lebens, ohne mit diesem Worte mehr als die Form der Erscheinung ausdrücken zu wollen. — die Natur und letzte Ursache derselben liegt jenseits der Grenze, über welche der menschliche Geist vorzudringen nie vermögen wird.

Die organischen Körper unterliegen, so wie die anorganischen, den allgemeinen Gesetzen der Materie. Schwere, Cohasion, Trägheit, u. a. m. machen ihre Rechte in beiden Naturreichen geltend, und die Grundstoffe, aus welchen die organischen Körper bestehen, finden sich als solche auch in der anorganischen Natur. Thiere und Pflanzen geben als letzte chemische Zersetzungsproducte die einfachen Stoffe (Elemente) anorganischer Körper. Allein die Verbindung der Grundstoffe ist in beiden Naturreichen eine verschiedene. Während die Elemente anorganischer Körper entweder mechanisch gemengt sind, oder chemisch zu binären Verbindungen und deren Combinationen zusammentreten, enthalten die organischen Körper, nebst einem Antheile binärer chemischer Verbindungen, vorzugsweise ternäre und quaternäre Combinationen von Grundstoffen, welche als solche in anorganischen Naturreiche nicht vorkommen, und deshalb vorzugsweise organische Substanzen genannt werden. So ist z. B. der phosphorsaure Kalk, der sich in den Knochen der Wirbelthiere vorfindet. dieselbe binare Verbindung von Phosphorsaure und Calciumoxyd. welche als solche auch im Mineralreiche bekannt ist, während der Zucker, die Stärke, das Fett, ternäre Verbindungen von Wasserstoff. Sauerstoff und Kohlenstoff sind,

und das Fibrin, das Casein, das Albumin, quaternäre Verbindungen von Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und Stickstoff (mit Phosphor und Schwefel) darstellen. — Die aus binären Verbindungen von Elementen entstandenen anorganischen Körper, lassen sich auf chemischem Wege in ihre Bestandtheile zersetzen, und durch die Wiedervereinigung derselben neu herstellen; — über die organischen Substanzen besitzt die Chemie weit geringere Macht, da sie dieselben zwar zerlegen, aber nur wenige von ihnen erzeugen kann.

In den anorganischen Körpern hängen die letzten Theilchen derselben entweder durch Attractionskraft (wie in den Gemengen), oder durch chemische Verwandtschaft (wie in den binären Combinationen) zusammen. Letztere ist ein so krästiges Verbindungsprincip, dass zwei Elemente, zwischen welchen chemische Verwandtschaft stattsindet, sich rasch zu einem zusammengesetzten Körper verbinden, wenn sie sich im freien Zustande begegnen. Warum thun sie dieses nicht im organischen Körper? -- Es muss in diesem der chemischen Verwandtschaft ein stärkeres Agens entgegenwirken, durch welches sie gezwungen werden, ihrer Neigung zu binären Verbindungen so lange zu entsagen, und anderen Verbindungsnormen so lange zu folgen, als jenes Agens die Oberhand behält. Stellt dieses seine Herrschaft ein, so streben die einfachen Grundstoffe des organischen Leibes jene binären Verbindungen einzugehen, für welche sie so viel Vorliebe äussern; es bilden sich, unter dem günstigen Einflusse von Wärme, Luft, und Feuchtigkeit, die chemischen Zersetzungsproducte der Fäulniss. Dieses Agens nun, welches die Verbindungsverhältnisse der Grundstoffe im organischen Körper erzwingt, und für eine gewisse Zeit aufrecht erhält, ist, seiner Erscheinung nach, eine von den im anorganischen Naturreiche waltenden Krästen wesentlich verschiedene Thätigkeit, und kann als organische Kraft den chemischen oder physikalischen Krästen entgegengesetzt werden, wobei jedoch zu erinnern ist, dass das Wort Kraft immer nur die gedachte, nicht die wirkliche Ursache von Erscheinungen bezeichnet.

Die organische Krast beschränkt ihre Thätigkeit nicht blos auf das Resultat des ruhigen Nebeneinanderseins der neuen Verbindungen. Jeder Theil eines organischen Körpers ist, so lange das Leben dauert, in einem ununterbrochenen Wechsel seiner Stoffe begriffen. Die Intensität dieses Wechsels steht, mit der Grösse der lebendigen Thätigkeit in geradem Verhältnisse. Die Verluste, welche das Materiale der lebenden Maschine durch Abnutzung und Verbrauch erleidet, bedingen das Bedürsniss eines äquivalenten Ersatzes. Aufnahme neuer Stoffe von aussen her, Verarbeitung, Umwandlung und Substitution derselben an die Stelle der abgenutzten und ausgeschiedenen, ist eine weitere fundamentale Aeusserung der organischen Krast. Sie ist zugleich das charakteristische Merkmal lebendiger Organismen, im Gegensatze von todten Mechanismen, und wird als Assimilation oder Stoffwechsel bezeichnet. Kein anorganischer Körper zeigt das Phänomen des Stoffwechsels. Er kann sich zwar durch Anschliessen gleichartiger Theilchen an

seiner Oberfläche vergrössern; aber was in ihm einmal verbunden ist und zusammenhält, bleibt in diesem Zustande: er giebt nichts aus und minut dafür nichts ein; er hat keine innere Bewegung, die den Austausch seiner letzten Moleküle vermittelte, und verharrt, wie er ist, his er durch elementare oder chemische Kräfte seine Daseinsform vorliert. Er kann, bei eleichbleibender Gestalt, an Volumen und Gewicht zunehmen, selbst innerhalb der Grenzen des Systems, welchem er angehört, gewisse Veränderungen seiner Dimensionen darbieten, allein der einmal fertige Krystall bleibt was er ist, und die Bewegung seiner kleinsten Theilchen, durch deren Gruppirung er zu Stande kam, wurde nur einmal gemacht. Der Stoffwechsel setzt dagegen den organischen Körper in eine nothwendige Verbindung mit der ihn umgebenden Welt, da er nur aus ihr entlehnen kann, was ihm gebricht. Für ihn werden dieselben chemischen und physischen Potenzen, welche den Ruin des Anorganischen - sein Zerfallen und Verwittern - langsam vorbereiten, zu nothwendigen Bedingungen seiner Existenz, und wurden unter der Rubrik der Lebensreize von der älteren Physiologie zusammengefasst, welchen Namen sie wohl nicht verdienen, da die fortgesetzte Einwirkung dieser sogenannten Lebensreize den Verfall des organischen Körpers auf die Dauer nicht aufhalten kann.

Die organische Krast ist ein Erbtheil, den die belebte organische Materie des Keimes von dem mütterlichen Stammorganismus erhält. einem ihr eingeborenen Plane, entwickelt sie den Organismus, entborgt der Aussenwelt den Stoff, aus welchem sie ihn aufbaut, und giebt ihr ihn verändert wieder zurück. Sie vervielfältigt und theilt sich in dem Masse, als das Materiale zunimmt, in welchem sie wirkt, und mit welchem sie Eins ist. Von dem ersten Impulse zur Keimbildung bis zu jenem Momente, wo das Lebendige den unabwendbaren Gesetzen der Auslüsung anheimfallt, ist sie ohne Unterbrechung thätig, und zeigt nur eine mit dem vorrückenden Alter übereinstimmende Abnahme ihrer Thätigkeit. Der Vergleich, den man zwischen einer Maschine und einem lebenden Organismus anstellt, ist nur insofern zulässlich, als in beiden ein zweckmässiges Zasammenwirken untergeordneter Theile zur Realisirung einer dem Ganzen zu Grunde liegenden Idee beobachtet wird. Sonst giebt es keine Aehnlichkeit zwischen beiden, und die Rohheit des Vergleiches wird um so augenfalliger, wenn man bedenkt, dass die bewegende Krast der Maschine nicht in ihr, sondern ausser ihr, erzeugt wird, und Stillstand eintritt, wenn der aussere Impuls nicht mehr auf sie wirkt, während die Thätigkeiten des Lebendigen ihren letzten Grund in ihm selbst haben, in ihm und durch ihn bestehen, und von ihm getrennt nicht einmal gedacht werden können. Der Verbrauch an Stoff und Krast wird auch in der Maschine durch Speisung von aussen her ausgeglichen, und wenn ihr Gang in Unordnung geräth, lässt man das Räderwerk ablausen, um nachzubessern, wo es sehlt. Im lebenden Triebwerke darf keine Pause eintreten; - es gilt das rollende Rad während aeines Umschwunges auszutauschen; -- jedes Atom des organischen Stoffes

reparirt sich selbst; — die organische Krast lässt es nie zu einem höheren Grade von Abnutzung kommen, und was in einem Momente verloren geht, giebt der nächste wieder. Ist es einmal zum Stillstande gekommen, so hat der Organismus seine Rolle ausgespielt; das Band ist gelöst, welches die Theile zum lebenssähigen Ganzen sinnreich vereinte; die chemische Assinität tritt in ihre durch das Leben bestrittenen Rechte, und führt die organischen Stoffe in jenen Zustand zurück, in welchem sie waren, als sie der todten Natur angehörten.

Die organische oder Lebenskrast macht uns keine einzige Lebenserscheinung klar; sie ist, so lange uns die Einsicht in das Wesen des Lebens fehlt, nichts mehr als hypothetische Annahme, eine wesenlose Abstraction, — ein vielgebrauchtes, unverständliches Wort, das müssigen Geistern Alles, dem wahren Forscher Nichts erklärt. Die Physiologie hätte wahrlich sehr wenig zu thun, wenn sie sich begnügte, in dem Worte "Lebenskrast" den letzten Grund der Lebensthätigkeiten zu verehren. Der Physiker giebt sich zufrieden, und hält eine Erscheinung für erklärt, wenn er als ihren letzten Grund die Schwere oder die Elektricität erkannt hat, weil die Aeusserungen dieser Kräste und die Gesetze, nach welchen sie sich richten, ihm bekannt sind. Dem Physiologen dagegen ist die Lebenskrast nur ein Ausdruck, mit welchem er einen bestimmten Begriff um so weniger verbinden kann, als es eine logische Unmöglichkeit ist, dass den verschiedenartigen Lebensäusserungen Eine Krast zu Grunde liegen könne, und dass die Materien, die ein Organismus von aussen ausnimmt, um seine Existenz zu fristen, während ihres Ausenthaltes im thierischen Leibe andere Kräste entwickeln sollten, als in der Aussenwelt. Der Unwissenheit der älteren Physiologie that der ehrsame Deckmantel der geheimnissvollen Lebenskrast noth; - die neuere Wissenschast hat den Schleier schon etwas gelustet, der das Antlitz der Göttin birgt, und an welchem so viele Hande zupsten, um ihm nur neue Falten einzudrücken. Die Physiologie ist unablässlich bemüht, für die Erscheinungen des thierischen Lebens naturgemässe Erklärungen aufzufinden, und die als specifisch statuirte Lebenskrast auf jene Kraste zurückzusühren, die sich in den Besitz des Weltganzen theilen, und braucht deshalb durchaus nicht in jenen Materialismus zu verfallen, welchen das höhere Gefühl des Menschen verwirft. — Eine höchst interessante philosophische Erörterung dieses Gegenstandes enthält der Artikel "Leben und Lebenskraft" in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie.

§. 2. Organisation. Organ. Organismus.

Die vollkommensten anorganischen Körper — die Krystalle, — welche eine neuere mineralogische Schule als Individuen zu bezeichnen beliebte, sind immer nur Aggregate gleichartiger Moleküle, während organische Körper aus verschiedenartigen Gebilden, die sich wechselseitig durchdringen, zusammengesetzt sind. Hierin liegt der Begriff der Organisation, als Modus der Vereinigung heterogener Glieder zu einem Ganzen, welchem ein vernünstiger Plan zu Grunde liegt. Aggregate sind nicht organisirt. Aufrechthaltung einer individuellen Lebensexistenz durch Zusammenwirken heterogener Theile ist die Idee, die sich in der Organisation ausspricht. Jeder

Theil des Ganzen, der seine partielle Existenz dem Endzwecke unterordnet, welcher durch die vereinte Wirkung aller übrigen Theile erzielt werden soll, heisst Organ, und die zweckmässige Vereinigung aller Organe zu einem lebensfähigen Ganzen: Organ is mus. Ein Organ hat den Grund seines Vorhandenseins nicht in sich, sondern in dem Ganzen, welchem es angehört. Der letzte Zweck der Organe ist somit nicht ihr eigenes Bestehen, sondern ihre Concurrenz zum Bestehen des Ganzen. Sie bilden eine Kette, deren Glieder nicht blos eines mit dem anderen, sondern jedes mit allen übrigen zusammenhängt, und von welchen keines ausgehoben werden darf, ohne den Begriff des Ganzen zu stören. Die Aggregattheile anorganischer Körper existiren blos neben einander, sie bedingen sich nicht wechselweise, und hören, selbst wenn sie aus ihrem Zusammenhange gebracht werden, nicht auf zu sein, was sie sind.

Die Begriffe organisch und organisirt dürfen nicht verwechselt werden. Jede durch das Leben eines Organismus erzeugte Substanz, die in der anorganischen Welt nicht vorkommt, heisst organisch, und sie muss nicht nothwendig organisirt sein, d. h. sie kann dem Auge homogen erscheinen, und weder durch das Messer, noch durch andere anatomische Hilfsmittel in ungleichartige Theile zerlegbar sein. Alles Organisirte dagegen besteht aus verschiedenen organischen Substanzen von bestimmter Form, deren jede besondere Eigenschaften besitzt, welche sich nach einem gewissen Gesetze neben einander lagern oder durchdringen, und sich durch die Zergliederung oder das Mikroskop als Differentes unterscheiden lassen. Eiweiss, Protein, Blutserum, Lymphe sind organisch, aber nicht organisirt (sie heissen deshalb auch formlose organische Substanzen), — Nerv, Muskel, Drüse dagegen sind organisirt, und eo ipso auch organisch.

§. 3. Lebensverrichtungen.

Das organische Naturreich umfasst die Thier- und Pflanzen welt, unermesslich an Zahl und Art. In beiden finden sich, nebst wesentlichen Unterschieden, zahlreiche Uebereinstimmungen. Ja in den niedrigsten Formen beider wird es oft sehr schwer, ihre animalische oder vegetabilische Natur mit Sicherheit zu bestimmen. Beide leben, d. h. sie zeigen eine Auseinanderlolge bestimmter, und sich wechselseitig bedingender Entwicklungen und Thätigkeiten. Entstellung durch Zeugung, Succession von Bildungsstadien, Ernährung, Stoffwechsel, Assimilation, Sastbewegung, Ab- und Aussonderungen sinden sich in beiden. Die Pflanze empfängt ihren Nahrungsstoff aus dem Boden, in welchem sie gedeiht. Sie saugt ihn durch ihre Wurzeln an sich, leitet ihn durch ein wunderbar complicites System von Zellen und Röhren zu allen ihren Theilen, und scheidet davon dasjenige nach aussen wieder ab, welches zu ihrer Ernährung und ihrem Wachsthum nicht mehr dienen kann. Kohlensäure, Wasser, Ammoniak, und einige Salze, genügen vollkommen zu ihrer Erlaltung. Anders ver-

halt es sich im Thiere und Menschen. Seine vollkommenere Bauart, seine intensivere Lebensenergie fordern edlere Nahrungsstoffe als blosse Elemente. Er nimmt diese Stoffe, welche durch den Lebensact einer Pslanze oder eines anderen Thieres zu seinem Genusse vorbereitet wurden, durch eine einzige Oeffnung auf; ein eigener Wächter (Instinct in den niederen, Geschmack in den höheren Thieren) sorgt dafür, dass er in der Wahl seiner Nahrung keine Missgriffe mache, und erlaubt dabei seiner Willkür einen gewissen Spielraum, der der Pflanze gänzlich abgeht. Durch die Verdauung (Digestio), welche in seinem Darmkanale stattfindet, wird der nahrhaste Bestandtheil seiner Speisen vom unnahrhasten getrennt, ersterer durch Gefässröhren aufgesogen (Absorptio), in das Blut gebracht, diesem gleichartig gemacht (Assimilatio), und durch die Schlagadern, welche mit dem Druckwerke des Herzens in Verbindung stehen, zu allen Organen hingeführt, um sie zu ernähren (Nutritio); letzterer als Caput mortuum der Verdauung aus dem Bereiche des lebendigen Leibes fortgeschafft (Excretio). Das zugeführte Blut strömt, nachdem es seine nährenden Bestandtheile den Organen abgegeben, und dafür die Abfälle ihres Stoffverbrauches aufgenommen hat, in den Kanälen der Blutadern wieder zum Herzen zurück, um von hier aus in die Lungen getrieben zu werden, wo es aus der Atmosphäre Sauerstoff aufnimmt, und dafür weiter Unbrauchbares an sie abgiebt, dadurch neuerdings nahrungskrästig wird, und auf anderen Wegen, als es zu den Lungen kam, diese verlässt, um zum Herzen zurückzukehren, von welchem es sosort wiederholt in die Schlagadern gepumpt, und durch diese zu den nahrungsbedürstigen Organen geführt wird. Der in der Lunge statthabende Austausch gewisser Blutbestandtheile gegen andere neue, bildet den Begriff des Athmens (Respiratio), die Blutbewegung zum und vom Herzen jenen des Kreislaufes (Circulatio). Das Blut dient nicht blos auf die angeführte Weise zur Ernährung; es werden vielmehr aus ihm noch besondere Flüssigkeiten durch die Thätigkeit besonderer Organe, welche man Drüsen nennt, abgesondert (Secretio), und diese Flüssigkeiten (Secreta) zu den verschiedensten Zwecken im thierischen Haushalte verwendet. So werden Speichel, Galle, Harn, und alle flüssigen Auswursstoffe, durch Secretion aus dem Blute bereitet.

Ernährung, Kreislauf, Athmung, Ab- und Aussonderungen sorgen für die Erhaltung des Individuums; zur Erhaltung der Gattung führt die Zeugung (Generatio), die in der Pflanze auf einer Nothwendigkeit, im Thiere auf einem Instincte beruht, im Menschen ein durch die Dazwischenkunft des Geistigen veredelbarer Trieb ist. — Auch in der Pflanze finden sich Analogien dieser aufgezählten thierischen Verrichtungen, welche zusammengenommen als Ernährungs- oder vegetatives Leben bezeichnet werden. — Empfindung und Bewegung sind nur dem Thiere eigen, haben in der Pflanzenwelt nichts Aehnliches oder Gleiches, und werden somit als animales Leben vom vegetativen unterschieden.

Diese Unterscheidung der Lebensmanisestationen im Thiere und Menschen als vegetatives und animales Leben ist jedoch in den Erscheinungen des Lebens keineswegs so scharf gezeichnet, wie sie der Verstand nimmt, da die Ernährungsfunctionen ohne Bewegung und Empfindung eben so wenig vor sich gehen können, als letztere ohne erstere.

§. 4. Begriff und Eintheilung der Anatomie.

Anatomie im weitesten Sinne des Wortes ist die Wissenschaft der Organisation. Sie zerlegt die Organismen in ihre nächsten bildenden Bestandtheile, eruirt das Verhältniss derselben zu einander, untersucht ihre äusseren, sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften und ihre innere Structur, und lernt aus dem Todten, was das Lebendige war. Eine herrlichere Aufgabe kann sich der menschliche Geist nicht stellen. — Die Anatomie ist eine der anziehendsten, und zugleich gründlichsten, exactesten, und vollkommensten Wissenschaften, und ist dieses in sehr kurzer Zeit geworden.

Die organische Welt umfasst zwei Naturreiche, - die Pflanzen und Die Anatomie wird somit Pflanzen- und Thieranatomie sein, Phyto- et Zootomia. Nur einen kleinen Theil der letzteren bildet die Anatomie des Menschen, welche, wenn man lange Namen liebt, Anthropotomie genannt werden mag. Dem Wortlaute nach drückt Anatomie (ἀπὸ τοῦ ἀνατέμνειν, ausschneiden) nur eines jener Mittel aus, deren sich diese Wissenschaft zur Lösung ihrer Aufgabe bedient, - die Zergliederung. Zergliederungskunde ist somit ein beschränkterer Begriff als jener der Anatomie, obwohl beide häufig im selben Sinne gebraucht werden. - Die Zergliederung lehrt nur die gröbsten, ausserlichen Verhältnisse der Organe. Um ihren inneren Bau kennen zu lernen, genügt sie allein nicht. Der Wissenschaft müssen noch eine Menge Methoden zu Gebote stehen, durch welche das Zarteste, das Verborgene, das dem freien Auge nicht mehr Wahrnehmbare, der Untersuchung zugänglich wird, und die Anatomie wird somit, nebst den rohen Handgriffen der Zergliederung, noch über eine reiche und subtile Technik zu verfügen haben, die bei jeder Detailuntersuchung unentbehrlich wird. Die Anatomie ist somit theils Wissenschaft, theils Kunst, und wird ersteres nur durch letzteres. Wenn man sich blos damit begnügt, die Resultate der anatomischen Forschungen kennen zu lernen, ohne sich darum zu knimmern, wie sie gewonnen wurden, mag man immerhin eine theoretische und praktische Anatomie unterscheiden.

Wie jede Wissenschaft unter einer verschiedenen Behandlungsweise und den hiebei verfolgten Tendenzen, einen verschiedenen Charakter annimmt, so auch die Anatomie.

Ihre nächste und allgemeinste Aufgabe ist, die Zusammensetzung eines Organismus aus verschiedenen Theilen mit verschiedenen Thätigkeiten ken-

nen zu lernen. Da der menschliche Geist sich nicht mit dem gedankenlosen Anschauen der Dinge zufrieden giebt, sondern Plan und Bestimmung auszumitteln sucht, so kann die innige Verbindung der Anatomie mit der Functionenlehre (Physiologie im engeren Sinne) nicht verkannt werden. Die Anatomie ist somit Grundlage der Physiologie, und dadurch zugleich Fundamentalwissenschaft der gesammten Heilkunde.

Hat sie sich die Außgabe gestellt, die Organe des menschlichen Leibes im gesunden Zustande allseitig kennen zu lernen, so führt sie den Namen der normalen oder physiologischen Anatomie. das Studium der Medicin und Chirurgie. Die Veränderungen, welche durch Krankheit bedingt werden, sind Object der pathologischen Anatomie. Die pathologische Anatomie verhält sich zur Krankheitslehre, wie die normale zur Physiologie. Ihre Beziehungen sind nothwendige und bedingende; - eine kann ohne die andere nicht existiren. Die physiologische Anatomie befasst sich a) theils mit der Kenntnissnahme der äusserlich wahrnehmbaren Eigenschaften, Gestalt, Lage, Verbindung der Organe, und behandelt sie in der Ordnung, wie sie zu gleichartigen Gruppen (Systemen), oder zu ungleichartigen Apparaten (welche aber auf die Hervorbringung eines gemeinschaftlichen Endzweckes berechnet sind) zusammengehören. Sie heisst in dieser Richtung beschreibende, specielle oder systematische Anatomie, und zerfällt in so viele Lehren, als es Systeme und Apparate giebt: Knochen-, Bänder-, Muskel-, Gefäss-, Nervenlehre für die Systeme; Eingeweide- und Sinnenlehre für die Apparate. Oder b) sie geht generalisirend au Werke, abstrahirt aus der beschreibenden Anatomie allgemeine Normen, ordnet ihre vereinzelten Darstellungen zu einem Systeme, dessen Eintheilungsgrund der innere Ban (das Gewebe, Textura) ist, und wird als allgemeine Anatomie oder Gewehlehre (Histologie, von lords. auch igreur, Gewebe) von der speciellen unterschieden. Da die Gewebsarten, als die letzten und feinsten, sinnlich wahrnehmbaren Structurverhältnisse, nur mit Hilfe des Mikroskops untersucht werden können, heisst die Geweblehre auch allgemein mikroskopische Anatomie. Genau genommen, tragen nicht alle Untersuchungen der allgemeinen Anatomie den histologischen oder mikroskopischen Charakter au sich. Die Eintheilungen der Einzelheiten eines organischen Systems, z. B. der Muskeln, der knochen, die Aufstellung allgemeiner Normen für Verlauf und Verbreitungsweisen anderer, die Abstraction der Gesetze, denen die anatomischen Verhältnisse der Organe unterthan sind, sind Argumente der allgemeinen Anatomie, nicht der Histoingie, and wurden schou an jenen Zeiten richtig außgelässt und beurtheilt. we man weder an Gewebe, noch an den anatomischen Gebrauch des Mikruskupes darkte.

In den hiesigen Lectionskatalogen figuret auch eine hühere Anatomie. Es muss demnach auch eine niedere geben. Es wäre uns interensant, zu erfahren, wo die eine aufhört, niedrig zu sein, und die andere aufmigt, hier zu werden. Es ergiebt sich von selbst, dass die allgemeine Anatomie, als etwas Abstractes, eine Tochter der speciellen ist, und dass sie in anatomischen Vorlesungen nicht als Einleitung in die anatomische Wissenschaft vorangeschickt werden kann, da ihre aus der speciellen Anatomie entnommenen und durch sie belegten und begründeten Angaben, die Kenntniss der Detail-Anatomie voraussetzen. Sie kann jedoch immer den ersten Platz in einem anatomischen Handbuche einnehmen, obwohl der Vortrag, soll er dem Anfanger nützlich sein, nicht mit ihr zu beginnen hat. Die Grenze zwischen allgemeiner und specieller Anatomie ist überhaupt schwer zu bestimmen. Beide spielen so häusig in einander hinüber, bedingen sich wechselseitig so nothwendig, und müssen im Vortrage so oft mit einander verwebt werden, dass eine strenge Sonderung derselben kaum möglich wird.

Behandelt die Anatomie die Theile des menschlichen Körpers nicht nach den einzelnen Systemen, sondern untersucht sie ihr Nebeneinandersein in einem gegebenen Raume, von den oberstächlichen zu den tiesliegenden übergehend, so wird sie topographische Anatomie genannt. Sie ist jedenfalls der praktisch-nützlichste Theil der Anatomie, da es der Arzt nie mit isolirten Systemen des menschlichen Körpers, sondern mit der Verbindung derselben zum lebendigen Ganzen zu thun hat. Das örtliche Verhältniss der Organe in einem gegebenen Raume ist bei Krankheiten von hohem Interesse, und die Störungen desselben werden eine Gruppe von localen Krankheitserscheinungen hervorrusen, welche nur, wenn jenes Verhältniss bekannt ist, richtig beurtheilt werden können. Die topographische Anatomie abstrahirt in der Regel von den sunctionellen Bestimmungen der einzelnen Organe, und stellt sich überhaupt keine andere Ausgabe als die, die Verwendung des anatomischen Raumes und die Verpackung seines disserenten Inhaltes kennen zu lernen.

Nimmt die topographische Anatomie vorzugsweise auf das Bedürfniss des Arztes Rücksicht, erörtert sie den Einsluss der räumlichen Lagerung auf Krankheitserscheinung, untersucht sie, wie sich die palpable Krankheit eines Organs in den nebenliegenden reflectirt, in sie übergreift, ihre mechanischen Beziehungen stört und ihre Verrichtungen beeinträchtigt, leitet sie hieraus die Regeln ab, nach welchen dem localen Uebel local begegnet werden soll, beurtheilt sie, vom anatomischen Standpunkte aus, den Werth der blutigen Eingriffe (Operationen), und stellt Normen für sie auf: so wird sie insbesondere chirurgische Anatomie genannt; ein Name, der füglich in den der angewandten Anatomie umzuwandeln wäre, da die Ergiebigkeit dieses Faches für die Medicin keine geringere als für die Wundarzneikunde ist, und es überhaupt nur Eine Heilkunde giebt. Die angewandte Anatomic enthält sich aller beschreibenden Details, aus denen keine unmittelbaren praktischen Folgerungen gezogen werden können; — sie ist die Blumenlese der zahlreichen Nutzanwendungen der Wissenschaft, - somit die Anatomie des prakticirenden Arztes. Sie setzt also die Kenntniss der speciellen Krankheitslehre voraus, und bedingt im Bunde mit der pathologischen Anatomie die Wissenschaftlichkeit der Heilkunde.

Da die Oberstäche des Organismus das Resultat der Gruppirung seiner

inneren Theile ist, so braucht nicht erst bewiesen zu werden, dass die Kenntniss der äusseren Form des menschlichen Leibes (Morphologie, unpassend Anatomia externa) einen sehr wichtigen Theil der Anatomie bildet, und wenn man bedenkt, wie mit gewissen inneren krankhasten Zuständen, entsprechende Veränderungen der Oberstäche Hand in Hand gehen, so wird die praktische Wichtigkeit dieser Lehre für Jenen, welcher Arzt werden will, keiner besonderen Empfehlung bedürfen. Die Beinbrüche und Verrenkungen, die Wunden und das Heer von Geschwülsten, also gerade die häufigsten chirurgischen Krankheiten, bestätigen täglich ihre nutzvolle Anwendung. Die ästhetische Seite dieses Zweiges unserer Wissenschast begründet nebenbei seine Geltung in der bildenden Kunst, und die plastische Anatomie, welche die äusseren Umrisse auf innere Bedingungen reducirt, giebt den Werken der Kunst die Wahrheit des Lebens. - Die Würde einer philosophischen Wissenschaft wird von der vergleichendeu Anatomie angesprochen. Sie hält die Heerschau über die bunten Schaaren lebensfähiger Wesen, von der Monade, deren Welt ein Wassertropfen ist, bis zum Ebenbilde Gottes. Wie das Leben in seiner tausendfältigen Daseinsform sich selbst und sein Substrat veredelt; wie es von den ersten und einfachsten Regungen sich durch eine endlose Reihe von Organismen hinausbildet; wie dieselbe Idee des Lebens sich in den mannigfaltigsten Gestalten ausprägen kann; wie Plan und Gesetzmässigkeit, Regel und Verstand jedem Individuum den Stempel relativer Vollkommenheit, d. h. höchster Zweckmässigkeit für seine Existenz, aufdrückt: dieses zu kennen, ist das preiswürdige Object der vergleichenden Anatomie. Vergleichende Anatomie und Zootomie sind nicht identische Wissenschasten. Während die Zootomie nur das Einzelne monographisch behandelt, und die Summe anatomischer Kenntnisse vergrössert, giebt diesen die vergleichende Anatomie, welche mit aller Strenge einer philosophischen Wissenschaft verfährt, und die Einzelheiten unter allgemeine Gesichtspunkte bringt, erst Bedeutung und Zusammenhang, und begeistigt das todte Materiale durch die Ideen, die es aus ihnen schöpfte. Sie hilst nicht zunächst einem praktischen Bedürfnisse ab, wie die angewandte Anatomie; - ihr Adel beruht nicht auf den materiellen Rücksichten des Nutzens, sondern auf Veredlung des Geistes durch Wahrheit.

Die Anatomie der Menschenracen, der Altersstufen, der Varietäten der Organe bilden keine selbtsständigen Doctrinen, sondern werden vielmehr der beschreibenden Anatomie an passender Stelle eingewebt.

Die Entwicklungsgeschichte oder Evolutionslehre beschäftigt sich nicht mit dem, was die Organe des thierischen Leibes sind, sondern wie sie es wurden. Sie studirt die Gesetze, nach welchen aus dem einfachen Keim die Vielheit der Organe sich bildet, welche Metamorphosen sie durchliefen, bevor sie den Culminationspunkt ihrer Entwicklung erreichten. Sie gehört ganz der Neuzeit an, und wohl hat keine Wissenschaft in

so kurzer Zeit so Vieles und Ueberraschendes geleistet, wie sie. Die durch Störung der Entwicklungsgesetze bedingten Abweichungen in Form und BauHemmungsbildungen, Monstrositäten — finden durch sie ihre wissenschaftliche Erledigung.

Da die Entwicklungsgeschichte das Werden der Organe, nicht einen fertigen und bleibenden Zustand derselben untersucht, es somit nicht mit Beschreibungen vollendeter Zustände allein, sondern mit Uebergängen und wechselnden Thätigkeiten zu thun hat, so wird sie gewöhnlich in die physiologischen, nicht in die elementaren anatomischen Vorträge aufgenommen. Es ist jedoch unvermeidlich, auch bei anatomischen Demonstrationen auf ihre Ergebnisse Rücksicht zu nehmen, da der anatomische Sachverhalt im vollkommen entwickelten Organismus besser verstanden wird, wenn man weiss, auf welche Weise er zu Stande kam.

§. 5. Verhältniss der Anatomie zur Physiologie.

Haller's Worte: "neque multa in physiologicis scimus, nisi quae per anatomen didicimus", bezeichnen richtig das Verhältniss der älteren Anatomie zur älteren Physiologie. Aus ihnen spricht nur etwas zu viel Hochachtung des grossen Anatomen für sein Fach. Die neuere Physiologie lässt sich mit Recht etwas stolzer über ihre Leistungen vernehmen, obwohl sie den unschätzbaren Werth anatomischer Forschungen nicht in Abrede stellt.

Es kann der Anatomie nicht zugemuthet werden, sich nur an der Aeusserlichkeit der Organe zu erschöpfen. Ihre Tendenz ist der Enträthselung der Functionen zugewendet, ihr Princip ist die Physiologie. geistloses Handwerk, - und ein solches wäre die Anatomie ohne Verband mit Physiologie, - hat keinen Anspruch auf den Namen einer Wissenschaft. Kann man die Einrichtung einer Maschine studiren, ohne Vorstellung ihres Zweckes, oder, so lange man bei Vernunst ist, den Klang der Worte hören, ohne den Sinn der Rede aufzufassen? - Ist es möglich, harmonisch geordnete Theile eines Ganzen zu sehen, sie blos anzustarren, ohne zu denken? — Die Physiologie setzt die Anatomie nicht voraus, sie existirt vielmehr in und mit ihr. Der Anatom kann keine Untersuchung vornehmen. ohne von der physiologischen Frage auszugehen, oder am Ende auf sie zu stossen. Die Bahnen beider Wissenschaften begegnen und kreuzen sich an so vielen Punkten, dass nur wenig divergirende Zwischenstellen eintreten. Die Physiologie eine angewandte Anatomie zu nennen, ist unlogisch, da eine reine Anatomie nicht existirt. Beruht die Eintheilung der anatomischen Systeme und Apparate nicht auf physiologischer Basis? werden die Arten der Gelenke nicht nach ihrer möglichen Bewegung unterschieden? führt nicht eine ganze Schaar von Muskeln physiologische Namen? - Gehört eine eigene Wissenschast dazu, um zu finden, dass der Biceps brachii ein Beuger ist, oder liegt diese Wirkung nicht in seiner Erscheinung deutlich ausgesprochen? - Wer kann den Mechanismus der Herzklappen, die sinn-

reiche Construction des Auges und seiner dioptrischen Theile, die Verhältnisse der Bewegungsorgane und so vieles Andere beschauen, ohne einem physiologischen Gedanken Raum zu geben? - Ist nicht die Hällte eines anatomischen Lehrbuches in physiologischen Worten abgefasst, und hat irgend Jemand deshalb über Unverständlichkeit Klage geführt? — Allerdings unterrichtet uns das anatomische Factum nicht über jede physiologische Frage. Das leider auch oft missbrauchte Experiment am lebenden Thiere, die chemischen und physikalischen Versuche, Vergleich, Induction, Analogie, tragen nicht weniger dazu bei, das physiologische Lehrgebäude aufzuführen, und seine dunklen Kammern dem Tageslicht der Wissenschaft zu öffnen. Die Grundfesten dieses Gebäudes sind und bleiben jedoch die anatomischen Thatsachen. Es ist deshalb mit der Trennung der Physiologie und Anatomie von jeher eine missliche Sache gewesen. Sie existirt de facto, aber nicht de jure, und wurde überhaupt nur durch die Nothwendigkeit veranlasst, die täglich sich vermehrende Menge physiologischer Erfahrungen zum Gegenstande eigener Schriften und Vorträge zu machen. Man nehme aber der Physiologie die Anatomie und die organische Chemie, und sehe, was dann übrig bleibt.

§. 6. Verhältniss der Anatomie zur Medicin.

Es hiesse die Würde unserer Wissenschaft sehr verkennen, wenn man in ihr blos ein Vorbereitungsstudium der Heilkunde erblicken, und ihre vielfältigen Anwendungen in praxi als die einzige Empfehlung derselben dem Studirenden hinstellen wollte. Der Nutzen ist freilich das Idol der Zeit, dem alle Kräste huldigen, alle Talente fröhnen. Am allerwenigsten ist es dem Schüler zu verargen, wenn er bei einem Fache, dessen Betrieb so viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, vorerst fragt, wozu er es brauchen kann. Die cadaverum sordes und die mephitis der Secirsäle entschuldigen diese Frage. Allein die Anatomie als Wissenschaft ist keine Magd der Heilkunde. Jede Naturforschung hat einen absoluten, nicht in ihren Nebenbeziehungen gegründeten Werth. So auch die Anatomie. Das Geheimniss des Lebens aufzuhellen, ist an und für sich ein erhabener Zweck, der jede Rücksicht des Nutzens und der Brauchbarkeit ausschliesst. Hieher gehören Döllinger's Worte: "Ehe man fragt, wozu ein Wissen nütze, sollte man billig erst untersuchen, welchen inneren eigenthümlichen Gehalt und Werth es habe, inwiesern es den menschlichen Geist zu erfüllen und zu erheben fähig sei, ob es an sich gross und kräftig, Anstrengung fordernd, uns die Macht und den Gebrauch unserer Kräfte kennen lehre." — Die ganze Welt ist damit einverstanden, dass die Anatomie die Grundlage der Medicin abgiebt. Dieses ist richtig. Die Medicin kann der Anatomie nicht entbehren, obwohl die Anatomie sehr wohl ohne Medicin bestehen kann. Und sie bestand auch lange schon, bevor die Medicin noch Anspruch auf Wissenschaftlichkeit machen konnte. Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass

die grossen Entdeckungen in der Anatomie und Physiologie lange Zeit den Entwicklungsgang der Heilkunde nicht hemmten und nicht förderten, ihm auch keine andere Richtung gaben. Die Philosophie hat sich in dieser Beziehung viel einslussreicher bewiesen. Es hat eine Zeit gegeben, wo Philosoph und Arzt synonym waren, und die Aerzte über die Krankheiten nicht klüger urtheilten, als die Philosophen über das Unbegreisliche. Die Anatomie wurde damals gar nicht befragt. Das Humidum und Calidum wurde für viel wichtiger gehalten. Als die Anatomie ihre Wiedergeburt feierte, und Sitz und Stimme erhielt im Rathe der Aerzte, pries man zwar ihre Wichtigkeit, aber ohne sie zu verstehen. Man weidete sich blos an grossen Hoffnungen für die Zukunft, und blieb um so eifrigerer Parteigänger der herrschenden medicinischen Systeme. Die Zeit ist nicht so lange um, wo die akademischen Gesetze gewisser Universitäten den Betrieb der Anatomie entweder gar nicht, oder nur den Wundärzten gestatteten. Auch diese Periode des Jammers ging vorüber; es fiel ein Lichtstrahl auch in diese Nacht, und liess das Bewusstsein entstehen, dass das Heil der Heilkunde aus fruchtbarerem Boden, als aus dem Flugsande der Hypothesen erblühen müsse. Sie hat ihn endlich nach tausendjährigem vergeblichen Suchen gefunden, und die Anatomie hat ihr hiebei die Leuchte vorgetragen. Dass hier vorzugsweise die pathologische Anatomie gemeint ist, versteht sich wohl von selbst. Man sollte es kaum glauben, dass der Versuch, die Heilkunde auf anatomischem Wege vorwärts zu bringen, so lange hinausgeschoben werden konnte. Die Bahn ist gebrochen, und was bereits geschah, berechtigt zu den schönsten Erwartungen. Ein Rückschritt ist nicht mehr möglich. Man kann nicht mehr zurückfallen in den alten Fehler, sich Begriffe von Krankheiten aus ihren äusseren Symptomen zu construiren; von Kräften. Factoren, Polaritäten zu träumen, die nicht existiren; für jedes Leiden eine Formel aufzustellen, was man, um sich selber zu betrügen, rationelles Verfahren nannte, und die Hauptsache zu übersehen, dass die Krankheit, wie jede andere Naturerscheinung, analysirt und auf ihre in der Organisation begründeten ursächlichen Momente zurückgeführt werden müsse. Ich weiss recht wohl, dass das Gesagte dem Anfänger, an welchen diese Worte gerichtet sind, so gut als unverständlich ist. Sollte er sich in der Folge ein Urtheil über die Wissenschaft gebildet haben, der er sein Leben und seine Kraste zu widmen im Begriffe steht, so wird er diese Ansicht über den praktisch-medicinischen Werth der Anatomie nicht zu hoch gehalten finden. ..Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae." So las ich über der Thüre eines Pariser anatomischen Hörsaales geschrieben, und wahrlich, es bedarf nicht mehr bezeichnender Worte, um die Seele des Eintretenden an der Schwelle schon mit heiliger Ehrfurcht zu füllen. Diese soll die vorwaltende Stimmung jedes Einzelnen sein, der an den der Auflösung verfallenen Resten unseres eigenen Geschlechtes lernen will. Gesundheit und Leben seiner Mitmenschen zu wahren.

. Trainis et amon at Tanan

and the state of t marrier at many man it on many proper washing men a februard from home margins & on home on Name of angle is a figuration with a second second second and restaurant or the to comment the same Section Sect provide the first and the second terms of the 2000 Note 1 7 Not 160 777 Texter 000 THE THE PARTY BOTH THE PARTY BOTH THE PARTY WHEN THE PARTY BOTH TH and the second of the second o The second secon The second secon The same of the sa andre en la commune de la companya della companya de la companya della companya de la companya della companya d and the same of th the second of the late of the second of the A STATE OF THE PARTY OF THE PAR art in the time of the state of and the second of the state words and the The second secon Harman I was a second order of the last with the and the second of the second of the second · -11: - 12: 1 the same of the sa to severe brighter with all of the latter of the same . .

welche bei der Untersuchung solcher Zustände die Hand des Wundarztes leiten? Den Sitz, die Richtung eines Beinbruches zu erkennen, die Gefährlichkeit einer Verwundung zu beurtheilen, ist für den Anatomen, der nicht Chirurg ist, wahrlich nicht schwerer, als für den Wundarzt, der kein Anatom ist. Ich halte es für überflüssig, die Wichtigkeit der Anatomie für den Wundarzt, welche sicher Niemand bezweifelt, noch weiter zu motiviren, und ich erlaube mir nur noch eine vortheilhafte Seite chirurgischanatomischer Studien hervorzuheben. Wie selten trifft es sich, alle jene interessanten chirurgischen Krankheitsfälle auf den Kliniken zu beobachten, welche unsere Ausmerksamkeit in so hohem Grade sesseln. Nicht jedes Jahr bringt alle Formen von Leiden zur Anschauung. Der Schüler muss sich deshalb an die Handbücher wenden, und was diese sagen, ist nicht immer vollwichtiger Ersetz für mangelnde Autopsie. Die Anatomie kann hier auf die trefflichste Weise aushelfen. Ihr steht in der Leiche ein reiches Promptuarium von Krankheitsformen zur Verfügung, welche sich nach Belieben hervorrusen, absichtlich erzeugen lassen. Ich sage nicht, dass solche Behelfe die klinische Beobachtung ersetzen, oder sie entbehrlich machen können. Aber nutzlos wird gewiss Niemand eine solche Uebung nennen, die gerade die wichtigsten (pathognomonischen) Erscheinungen zur gründlichen Anschauung bringt. Alle Beinbrüche, alle Verrenkungen, alle Hernien, alle Höhlenwassersuchten lassen sich auf diese Weise mit dem besten Erfolge an der Leiche studiren.

Ich kann nicht umhin, noch eines besonderen Vortheiles zu erwähnen, den die Chirurgie aus einem bei uns vielleicht zu wenig gewürdigten Zweige der Anatomie schöpfen kann, - ich meine das Studium der ausseren Form des menschlichen Leibes. Da die äussere Form nur das Ergebniss der inneren Zusammensetzung ist, und wir von gewissen äusseren Anhaltspunkten auf den Zustand innerer Organe schliessen, so wird die praktische Bedeutung dieses Zweiges der Anatomie keiner besonderen Empfehlung bedürsen. Richtig und schön bemerkt Ross in seinem Versuche einer chirurgischen Anatomie: "Das Studium der ausseren Körperform bietet dem Chirurgen eine reiche, noch lange nicht erschöpste Fundgrube dar; - die allgemeinen Bedeckungen werden für ihn zu einem Schleier, der weit mehr durchsehen lässt, als Mancher vielleicht glaubt." Und in der That, wie leicht erkennt der richtige, sogenannte praktische Blick, an einer bestimmten Alteration der äusseren Form einer Leibesgegend, aus dem Vorkommen einer einzigen Vertiefung oder Erhabenheit an einem Orte, wo keine sein soll, die Natur des sich so einfach äussernden Uebels, ohne erst durch die Tortur der sogenannten manuellen Untersuchung, hinter welcher so mancher ungeschickte Wundarzt seine Verlegenheit zu bergen, und Fassung zu gewinnen sucht, dem Kranken unnöthiges Leid zu verursachen. Der Chirurg soll ein Auge haben für die Form, wie der Künstler, und da er in den Secirsälen so äusserst wenig Gelegenheit findet, die Gestalt gesunder menschlicher Leiber zu bewundern, und die nackten Spiele der Griechen

unserem behosten Zeitalter nicht anstehen, so muss er am höchsteigenen Leibe, oder, wie der Künstler, am lebenden Modell, sich im Studium normaler Formen üben, um die abnormen verstehen zu lernen. Die Kleider der Frauen, über welche sich Seneca erzürnte: Vestes nihil celaturae, nullum corpori auxilium, sed et nullum pudori, erlauben gelegentlich auch heutzutage noch einen guten Theil des Körpers mit anatomischen Augen zu prüsen. — Die Anatomie giebt dem Wundarzte praktischen Blick, lebendige Anschauungsweise, Selbstständigkeit und Schärse der Beobachtung und des Urtheiles, und setzt ihn in den Stand, bei jedem vorkommenden Falle sich nicht nach den vagen Worten der Compendien, sondern nach wohlverstandenen anatomischen Gesetzen zu orientiren.

Ein geachteter deutscher Chirurg hat das Paradoxon ausgesprochen, dass die Anatomie den Wundarzt furchtsam mache, und ihm den Muth lähme, im menschlichen Leibe, dessen Wunder er als Anatom mit einer Art von heiliger Scheu betrachtete, und die er nur durch die sorgsamste und minutiöseste Technik zu entschleiern gewohnt ist, mit gewaffneter Hand zu schalten und zu walten. Es ist fürwahr etwas Richtiges an der Sache-Wer nur für alle die Kleinlichkeiten und Umständlichkeiten subtiler anatomischer Arbeiten Sinn hat, wer sich in den die Geduld eines Sisyphus erschöpfenden Präparationen der seinsten Gesässe und Nerven gesällt, und mit der Aengstlichkeit eines allerdings höchst nützlichen und lobenswerthen Handwerkssleisses am Secirtische niedliche und gefällige Arbeit zu liefern für den eigentlichen Zweck des anatomischen Berufes hält, der ist nicht zum Chirurgen geboren, und mancher höchst achtbare Anatom würde sicherlich als operirender Wundarzt eine sehr klägliche Rolle spielen. Allein es ist zu weit gegangen, und obiger Satz zu allgemein, wenn er gemeint ware, auch die chirurgische Anatomie, die gewissermassen nur die Blumenlese praktischer Anwendungen der Anatomie enthalten soll, zu verdächtigen.

§. 8. Lehr- und Lernmethode.

So Manchem, der zurückdenkt an jene Zeit, welche er in anatomischen Hörsälen zubrachte, möchte es fast bedünken, dass sie verloren war. Mit welchen Erwartungen betritt der junge Mensch diese Räume, und wie wenig nimmt er daraus für das Leben mit! Die Schuld liegt nicht an der Wissenschaft, sondern an ihrer Behandlung. Hätte die Anatomie keine geistreiche Seite, wäre sie als rein beschreibende Wissenschaft blos auf das trockene Aufzählen der Eigenschaften der Organe beschränkt, und geschieht dieses überdies noch mit einer gewissen ins Breite gedehnten Umständlichkeit, welche man Genauigkeit nennt, so würde es allerdings unvermeidlich sein, dass der Eindruck, den eine solche Behandlung nothwendig hervorbringen müsste, in einer abspannenden, gedankenlosen Leere bestände. Dieses Häufen von nichtssagenden Worten, dieser Aufwand an Ueberflüssi-

gem, diese einschläfernde Monotonie der Beschreibungen, diese häufigen Wiederholungen, verbunden mit der Abgeschmacktheit veralteter Ausdrücke, an denen die Sprache der Anatomie so viel Ueberfluss hat, werden gewiss nicht verfehlen, eine klägliche Verödung des Geistes und der Gedanken zu erzielen. Insbesondere ist dieses der Fall, wenn der Lehrer unter der drückenden Bürde leidet, die ihm die stete Wiederholung bekannter Dinge auserlegt, und die gerade der Gelehrte am meisten fühlt, der deshalb seine Vorlesestunde nur zu oft als tädiose Geschäftssache — als nothwendiges Uebel seines Standes — absertigt.

Es erscheint kaum möglich, Gegenstände, welche der Ausdruck der höchsten Weisheit sind, geistlos behandeln zu können. Wie ganz anders erscheint die Anatomie, welche Befriedigung und geistige Anregung fliesst aus ihr, wenn sie das todte Wort mit dem lebendigen Gedanken beseelt. Reflexion und Urtheil ihren Wahrnehmungen einflicht, und den Verstand nicht weniger als das Auge in ihr Interesse zieht! Es soll dem Schüler durch den Vortrag, den er anhört, klar werden, warum er Anatomie studirt. Der physiologische Charakter der Anatomie, ihre innige Beziehung zur praktischen Heilwissenschaft, der Geist der Ordnung und Planmässigkeit, der das Object ihrer Wissenschast durchdringt, giebt Anhaltspunkte genug an die Hand, sie anziehend und lehrreich zu machen. Um nur Ein Beispiel anzusühren: wie ermüdend erscheint die descriptive Anatomie der Rückenmuskeln, wenn sie, wie sie auf einander folgen, mit ihren verwickelten Ursprüngen und Insertionen umständlich beschrieben werden - ein reizloses, ödes Gedächtnisswerk! - und wie gewinnt diese Masse Fleisch, an Licht und Sinn, wenn sie auf die typische Uebereinstimmung der einzelnen Wirbelsäulenstücke und die Analogien des Hinterhauptknochens mit den Wirbelelementen bezogen wird! — Auf so viele Fragen: "warum es so sei," hat die Anatomie eine Antwort bereit, wenn man sie ihr nur zu entlocken versteht. - Wer für den geistigen Reiz der Wissenschast nicht empfänglich ist, der wird vielleicht durch ihren materiellen Nutzen bestochen, und darum muss die Anatomie in beiden Richtungen verfolgt und gewürdigt, und auf die zahlreichen Anwendungen der Wissenschaft im Gebiete der Medicin und Chirurgie, wo es sich auf verständliche und ungezwungene Weise thun lässt, hingewiesen werden. - In einer demonstrativen Wissenschast geht alles Weitere vom Sehen aus, und was gesehen werden soll, muss gezeigt werden. Die Objecte der Anatomie müssen dem Vortrage zur Seite stehen, und jedes Hilssmittel versucht werden, richtige und allseitige Anschauungen zu erzielen. Die künstlichen Darstellungen von schwierigen und complicirten Gegenständen in vergrössertem Massstabe, naturgetreue Abbildungen, Durchschnitte und Aufrisse. an der Tafel entworfen, sollen den Demonstrationen an der Leiche vorangehen. und ein reiches, geordnetes, den Zustand der Wissenschaft repräsentirendes anatomisches Museum auf die liberalste Weise jedem Studirenden offen stehen. Was gezeigt wird, soll sich unter den Händen des Lehrers ent-

wicheln, mehr seinen ferteg in die Verlesung gebracht werden, damit der Enhirer auch mit der Methode des Lergfiederns vertrauter werde, und die anatomische Technik nicht biss von Birensagen bennen ierne. Die praktischen Lerztiederungen sellen unter steuer Labacht und Labeitung eines sachkundigen und für semen Deref begeinneren Demonstraters, oder mehreter, vergenommen, und eine Sermennsch mit Alem eines deuer werden. was die in der Noor der Siehe begenden Commissionien andermischer Deschilbreng an wengsten Sibiler macht. Die prainsche Lerzhiederung der Leiche at seibst undager für die Richten des Lautemen, als die Theilmakene am Scomiumocrasion. Der Leiter isne auf aufregen, Gedanken erwerken, den bent der Wessenstind und seine Architegen undenten, — die feststehende Understeheng, das biedende Bild der umstandischen Verhältmess, versionie sousse Ersprung war der ogsome Entersteilung — de zohlrender directs on manuscries (elegant result wird, done winter herst der Einzele. Preses begt in der Anne demonstration Verbranden. de un se recuirmender verden, je komer de l'universaint. Den bleinen Umverstäten Dentschands vereinnt mit insere Wassenschaft under Forevaritie, as are suit aren (400 Standard premiumore Besidenne) Um vergoude sur des bedat de hangermentlies der ermeren, mit prove der occurren. Des uns but mon ser, deur Erstemfelben wegen. assaine administrate distrates

the serious so were, we are promote, esterillare see of se of their it. The fire building brands and but confident and mine takes were it menter of a time of man track manager where we it will madding break about being being being being beingen ministere commended and the productional superior bet accommended moved and no can discrept stands over the stands recom et este meret de trelleristen Benser. Die Snitte fit Aillandur a Wird british and it for proposition theretary that he cannot the care with the resident of president and a resident at the same De Bundige no croces executates bestrationers devine L. an mathema there are experience and experience are reflecte to the contract of th THE ENGINEER IN THE SERVICE PRESENT OF THE PARTY PROPERTY BUR MOUNTAIN . S. o duri was a word hours with the state 12 TH. All Property being our Market Samuelle. Best white mark Fertare lance area de bander étacte lante un un forme The second of the same with the same of the same and THE ME WHEN THE WASHINGTON AND STREET THE THE PERSON AND THE PERSON IN arties itale as faultee or harristers.

They we straight at an above or Saidler the one and International States of Desired Colleges and Saidler the colleges of Saidler and Colleges of Saidl

§. 9. Terminologie der Anatomie.

Die anatomische Terminologie beruht auf keinem allgemeinen Principe; sie ist ein buntes Gemisch von einigen bezeichnenden und vielen sonderbaren, mitunter absurden und schlecht gewählten Ausdrücken. Die beschreibende Thier- und Pslanzenkunde haben eine viel tressendere und bessere Nomenclatur. Da die Theile des menschlichen Körpers grösstentheils zu einer Zeit bekannt wurden, wo man sich nicht viel Mühe gab, über ihre Verrichtungen nachzudenken, auch das Bedürfniss einer wissenschastlichen Sprache noch nicht sühlte, so darf es nicht wundern, in jenem Theile der Anatomie, der aus dem entlegensten Alterthume stammt, die sonderbarsten, bizarrsten, mit unseren gegenwärtigen physiologischen Ansichten im grellsten Widerspruche stehenden Namen zu finden. Die gegenwärtig noch geläufigsten Worte: Musculus (wörtlich übersetzt Mäuslein), Arteria (Lustgang), Bronchus (Weg für das Getränk), Parenchyma (Erguss). Nervus (worunter man alle strangartigen Gebilde von weisser Farbe zusammenfasste, also nebst den Nerven auch Sehnen und Bänder, wie das Wort Aponeurosis beweist), drücken vi nominis etwas ganz Anderes aus, als was wir heut zu Tage darunter verstehen. Das Mittelalter war in der Wahl seiner anatomischen Benennungen noch unglücklicher. Die Einfalt unserer Vorfahren und die geistige Beschränktheit der damaligen Zeiten gefiel sich in den unpassendsten Ausdrücken, deren mystische oder religiöse Interpretationen vielleicht dazu dienen sollten, die missgünstigen Blicke des finsteren Zeitgeistes in freundlichere zu verwandeln. Hieher gehören der Morsus diaboli, das Pomum Adami, die Lyra Davidis, das Psalterium, das Memento mori, der Musculus religiosus, das Collare Helvetii etc. Wie sehr es den Anatomen zu thun war, ihr für unheilig gehaltenes Treiben in einem besseren Lichte erscheinen zu lassen, mag ihren Geschmack an derlei Benennungen entschuldigen. Hat doch der sonst tüchtige Adrianus Spigelius sich nicht entblödet, in den musculis glutaeis ein dem Menschen verlichenes Polster zu bewundern, "cui insedendo, rerum divinarum cogitationibus rectius et intensius animum applicare possit," und in dem Kaputzenmuskel ein allen Sterblichen umgehängtes Pro memoria zu sehen, "ut vitam religiosam ducendam esse meminerint." Die obsconen Bezeichnungen gewisser Gehirntheile, als: Anus, Vulva, Penis, Nates, Testes, Mammae, welche man im Mittelalter erfand: "ut turpis scientia juvenibus magis grata reddatur" (Vesling), haben anständigeren weichen müssen; allein die auf rohen Vergleichen beruhenden (Schleienmaul, Seepferdefuss, Fledermausslügel, Schnepfenkopf, Hahnenkamm, Herzohren, Hammer und Ambos etc.) werden blos getadelt, aber dennoch beibehalten. Die Mythologie hat die Namen ihrer Götter und Göttinnen der Anatomie geliehen (Os Priapi, Mons Veneris, Cornu Ammonis, Tendo Achillis, Nymphae, Iris, Hymen, Hebe für die weibliche behaarte Schaam, Linea Martis et Saturni etc.). Die Botanik ist durch die Amygdala, den

Arbor vitae, das Verticillum (im Chordensysteme des Gehirns), die Olive, den Nucleus lentis, die Siliqua, das Os pisiforme, die Carunculae myrtiformes, - die Zoologie durch den Tragus, Hircus, Hippocampus, Helix, den Vermis bombycinus, den Rabenschnabel, die Cornua limacum, den Pes anserinus etc. repräsentirt, und eben so gross ist das Heer von Namen, die einer weit hergeholten Aehnlichkeit mit den verschiedensten Gegenständen des täglichen Gebrauches ihre Entstehung verdanken. Die Hundszähne, der Rachen, der Schmerbauch, das Scrotum (vielleicht ursprünglich Scortum), das Ohrenschmalz und die Augenbutter, sind eben keine Erfindungen der Delicatesse, aber noch immer besser, als jene Namen, deren Ursprung und Sinn gar nicht auszumitteln ist. In der Benennung der Organe nach ihren vermeintlichen Entdeckern war die Anatomie sehr ungerecht. Es lässt sich mit aller historischen Schärfe nachweisen, dass viele Theile, welche den Namen von älteren Anatomen führen, nicht von ihnen entdeckt wurden. Die Aufzählung derselben wäre für diesen Ort zu umständlich. Den grössten Männern des Faches wurde diese Ehre nicht erwiesen, und Viele sind derselben theilhaftig geworden, von denen die Geschichte sonst nichts Rühmliches zu berichten hat.

Die Versuche, welche gemacht wurden, die anatomische Nomenclatur zu modernisiren, blieben ohne Dank und Nachahmung. Selbst das Unrichtige wird ungern aufgegeben, wenn es durch langen Bestand eine gewisse Ehrwürdigkeit errang. Man kann der Anatomie, so wie der Medicin und Astronomie, ihre alten Namen belassen, da es sich gar nicht um den Laut, sondern um Begriffe handelt. Ich habe es auch nicht für unpassend gehalten, die häufiger gebrauchten Synonymen eines Organs im Texte des Buches aufzuführen, besonders wenn sie verschiedene Eigenschaften des fraglichen Organs ausdrücken, und dadurch eine Art Beschreibung desselben abgeben.

§. 10. Besondere Nutzanwendungen der Anatomie.

Es verdienen noch zwei Nutzanwendungen der Anatomie hervorgehoben zu werden. Die eine betrifft die physikalischen Naturwissenschaften, die andere das tägliche Leben. Die mechanischen Grundsätze, die in dem Baue der Bewegungsorgane des thierischen Leibes zur Ausführung gebracht sind, verdienten von dem Physiker nicht minder, als von dem Anatomen studirt zu werden. Die Gelenke, die der Maschinenbauer ausführt, werden um so vollkommener sein, je mehr sie sich der Norm der menschlichen nähern. Diese sind die Prototype technischer Vollendung. Die in der Mechanik der Bewegungsorgane eine so wichtige Rolle spielende Hebelwirkung, die beim Kreislauf und beim Athmen thätigen Gesetze der Hydraulik und des Lustdruckes, die Druckpumpe des Herzens, die sinnreiche Construction des vollkommensten aller optischen Instrumente — des Auges, der Achromatismus desselben, seine aplanatische Linse, die Schwingungs- und Tonver-

hältnisse der menschlichen Hör- und Sprachwerkzeuge, und viele andere physikalische Probleme, die im thierischen Leibe auf die einfachste und sinnreichste Weise gelöst erscheinen, sollten das Augenmerk der Physiker nicht weniger auf sich ziehen, als ihre vergleichungsweise rohen, todten Apparate. Wurde die erste Idee achromatischer Linsen nicht durch das menschliche Auge angeregt, und hat sich nicht die durch Rechnung bestimmte vollkommenste Linsenform, deren Ausführung der Kunst unerreichbar ist, im menschlichen Auge gefunden? —

Jeder Gebildete soll im Gebiete der Anatomie kein Fremdling sein. Wenn er auch in die Tiefen der Wissenschaft sich nicht einlassen kann. werden doch die Umrisse derselben für ihn Anziehendes haben. Was soll den Menschen mehr interessiren, als eine Kenntniss, die seine Person so nahe angeht? Ludwig XIV. liess den Dauphin in der Anatomie unterrichten, welche dessen Erzieher, der berühmte Kanzelredner Bossuet, mit Eifer Napoleon äusserte einmal den Wunsch, die Anatomie des Menschen besser kennen lernen zu wollen, als durch die Schwerthiebe seiner Cuirassiere, und ich habe selbst in früheren Jahren hochgestellten Männern von Geist und Wissensdrang, Unterricht in meinem Fache gegeben. Soll jedoch die Anatomie nur das Interesse Einzelner anregen? Wie viel Irrwahn, dem selbst die gebildete Menschenklasse huldigt, wäre umgangen, wie viel Gefahr für Gesundheit und Leben der Einzelnen wäre vermieden, wie viel absurde Vorstellungen über Nützliches und Nachtheiliges im Leben wären unmöglich, wenn der Anatomie auch der Eingang in das tägliche Leben offen stünde. Kann nicht ein Fingerdruck auf ein verwundetes Gesass das Leben eines Menschen retten, und ist nicht in so vielen Gesahren die Selbsthilfe eine Eingebung anatomischer Vorstellungen? Es könnte nur von Vortheil sein, wenn die Bildung von Lehrern, Seelsorgern, und öffentdichen Amtspersonen, von welchen man nur Kenntnisse über die Erkrankungen der Hausthiere fordert, auch einen kurzen Inbegriff unserer Wissenschaft umfasste, und der elementare Unterricht in den niederen Schulen würde deshalb nicht schlechter bestellt sein, wenn die Schüler, statt mit den Zeichen des Thierkreises, oder den Wüsten Afrikas, auch ein wenig mit sich selbst bekannt würden.

Die Nutzanwendungen der Anatomie in der plastischen Kunst sind so wesentlich, dass die grossen Meister des Mittelalters anatomische Studien eifrig betrieben, und ihren Schülern nachdrücklich empfahlen; so Leonardo da Vinci, und dessen Lehrer Della Torre, von denen noch gegenwärtig anatomische Handzeichnungen existiren. (Mengs, über die Schönheit und den Geschmack in der Malerei, pag. 77.) — Geognosie und Geologie können der Behelfe nicht entbehren, welche die anatomische Kenntniss der im Schosse der Erde begrabenen antediluvianischen Thiergeschlechter ihren Forschungen darbietet, und die Geschichte der Verbreitung des Menschengeschlechts, des Wechsels der Bevölkerungen in jenen Zeiten, über welche die historischen Urkunden schweigen und blos die Vermuthungen sprechen, schöpst ihre verlässlichsten Data aus — Gräbern.

§. 11. Geschichtliebe Bemerkungen über die Entwicklung der Anatomie. Erste Periode.

Die Geschichte der Anatomie zerfällt in zwei Perioden. Die erste gehört der Vorzeit an, und erstreckt sich bis in die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts.

Man kann die vereinzelten anatomischen Wahrnehmungen, die das Schlachten der Thiere, die Opfer, das Balsamiren der Leichen, und die zufälligen Verwundungen lebender Menschen veranlassten, keine Wissenschaft nennen. Die Menschen, welche bei den Aegyptiern das Balsamiren der Leichen verrichteten (Taricheutes), waren in der Anatomie ebenso unerfahren. als das Volk, welches sie nach Beendigung ihrer Verrichtung mit Steinwürsen verfolgte, wie die Henker (Diodorus). Erst als die Heilwissenschast sich mit der Anatomie verbündete, und das ärztliche Bedürsniss ihre nähere Bekanntschast nachsuchen machte, nahm sie den Charakter einer Wissenschaft an. Ihr Entwicklungsgang war, wie jener der Naturwissenschaft überhaupt, ein langsamer und östers unterbrochener. Die Schwierigkeiten, die sich ihrem Gedeihen entgegenstellten, schienen unüberwindlich zu sein, und wurzelten weniger im natürlichen Abscheu vor dem Objecte der Wissenschaft, als in der Gewalt des Aberglaubens und des Vorurtheils. Sehr richtig bemerkt Vicq d'Azyr: L'anatomie est peut-être, parmi toutes les sciences, celle, dont on a le plus célébre les avantages, et dont on a le moins favorisé les progrès. Selbst die religiösen Vorstellungen des Alterthums sprachen das Verdammungsurtheil über sie. Der Glaube, dass die Seelen der Verstorbenen so lange an den Ufern des Styx herumirren müssten, bis ihre Leiber beerdigt waren, machte die Anatomie bei den Griechen unmöglich. Es war bei ihnen fromme Sitte, jeden zusällig gefundenen Menschenknochen mit einer Handvoll Erde zu bestreuen, und die Athener gingen in der Sorge für die Seelen der Todten sogar so weit, dass sie einen ihrer siegreichen Feldherren zum Tode verurtheilten, weil er nach gewonnener Schlacht, über der Verfolgung der Feinde, die Beerdigung der Gefallenen unterliess. Die Römer, welche die Ausübung der Heilkunde lange Zeit nur Sklavenhänden überliessen, hatten denselben Abscheu vor unserer Wissenschaft, welche sie als eine, die Menschenwurde entheiligende Anmassung verwarfen. Gegen Thierzergliederung waren beide Völker nachsichtiger, und die wenigen Männer, welche die Geschichte als Anatomen dieser Zeit anführt, haben für die menschliche Anatomie nichts gethan. Die Wiedergeburt der Wissenschasten im Abendlande äusserte auf den Zustand der Anatomie ebenfalls sehr wenig Einfluss, und wenn sie gleich begann, sich äusserlich freier zu bewegen, so wagte sie es dennoch nicht, an der Autorität der alten, auf Thierzergliederungen basirten Ueberlieferungen zu zweiseln. Die Schriften, welche über diese lange Erstlingsperiode der Wissenschast Zeugniss geben könnten, sind durch die Unbild der Zeit grösstentheils verloren gegangen, und was sich bis auf unsere Tage erhielt, hat

mehr Werth für den anatomischen Historiker, als für den Forscher, der Wahrheit sucht. Alc mae on von Croton, ein Schüler des Pythagoras (500 Jahre vor Christus), soll nach dem Zeugnisse Galen's das erste anatomische Werk geschrieben haben. Anaxagoras von Clazomene, Lehrer des Socrates, Empedocles von Agrigent, und Democritus der Abderite. sollen sich, nach dem Texte Plutarchs und Chalcidius, mit Zergliederungen, letzterer besonders mit vergleichender Anatomie, beschäftigt haben, wofür ihn seine Mitbürger für wahnsinnig hielten, und ihm nicht erlaubten, in ihrer Mitte zu wohnen. Ob Hippocrates, den die Geschichte den divus pater medicinae nennt, sich mit der Anatomie befreundet habe, ist aus seinen als echt anerkannten Schristen nicht zu entnehmen. Die ihm zugeschriebenen Bücher: de ossium natura, de glandulis, de carnibus, de natura pueri, etc. stammen unzweiselhast von späteren Autoren ab. In der Priesterschule der Asclepiaden, deren Gründer Aesculap mit göttlichen Ehren geseiert wurde, und aus welcher auch Hippocrates hervorging, sollen sich Traditionen anatomischer Kenntnisse vererbt haben (Galen). — Aristoteles, ein Schüler Plato's, Lehrer und Freund Alexanders des Grossen, hat in seiner Historia animalium, dem ehrwürdigen Fundamentalwerke der Naturgeschichte, so zahlreiche und mit so musterhafter Genauigkeit ausgearbeitete Daten über die Anatomie der Thiere niedergelegt, dass mehrere derselben selbst die Bewunderung der Neuzeit noch verdienen. (Cuvier erklärte die Anatomie des Elephanten bei Aristoteles, für besser, als jene, welche der Akademiker Daubenton schrieb.) Menschliche Anatomie ist ihm, aller Wahrscheinlichkeit nach, fremd geblieben (Le Clerc). — In der von Ptolemäus I. gestisteten medicinischen Schule zu Alexandria (320 Jahrevor Christus) scheint die menschliche Anatomie ihr erstes Asyl gefunden zu haben, wenigstens bildeten sich in dieser Schule Männer, welche, wie Herophilus, Eudemus, und Erasistratus, ihr Leben dieser Wissenschast widmeten. Leider sind ihre Schristen nicht auf uns gekommen, und nur Einiges über ihre Leistungen in Celsus, Rufus Ephesius, und Ga-Herophilus und Erasistratus sollen selbst lebende Verbrecher geöffnet haben (nocentes homines a regibus ex carcere acceptos vivos inciderunt, consideraruntque etiam spiritu remanente ea, quae antea clausa fuere. Celsus, de medicina, in procemio), und es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie die Chylusgefässe des Darmkanals gekannt haben, was selbst der spätere Entdecker derselben, Kaspar Aselli, zugiebt. Im Galenus, de usu partium, lib. IV., findet sich hierüber folgende merkwürdige Stelle: Toti mesenterio natura venas effecit proprias, intestinis nutriendis dicatas, hand quaquam ad hepar trajicientes. ut et Herophilus dicebat, in glandulosa quaedam corpora desinunt hae venae, cum ceterae omnes sursum ad portas ferantur. — Claudius Galenus (geb. 131 nach Christus), Arzt an der Fechterschule zu Pergamus, studirte zu Alexandria, wohin er, wie er selbst angiebt, reiste, um ein vollkommenes menschliches Skelet zu sehen. Er übte die Heilkunde zu

Rom, unter den Imperatoren Marcus Aurelius und Commodus, wo er auch als Lehrer eine grosse Zahl von Schülern um sich versammelte, und dieselben im Tempel des Friedens (seiner abseitigen Lage wegen) in der Anatomie unterrichtet haben soll. Seine Schriften sind die Hauptquelle, aus welcher wir den Zustand der Anatomie vor Galen kennen lernen. Ob er je menschliche Leichname zergliederte, wird bestritten. Seine Beschreibungen passen nur selten auf die menschlichen Organe, obwohl er sie selbst, als denselben entlehnt angiebt. Er scheint sich ausschliesslich der Affen und Hunde bei seinen Arbeiten bedient zu haben. So ist z. B. seine Angabe über das Herabsteigen des hinteren Musculus scalenus bis zur 6. Rippe dem Hunde, und über den Ursprung des Rectus abdominis vom vorderen Ende des Brustblattes, den Affen entnommen. Ein Mann voll Talent und Geist, errang er sich eben sowohl durch seine Entdeckungen, als durch seine Schriften, welche durch vierzehn Jahrhunderte als Codex der anatomischen und heilkundigen Wissenschasten galten, den Ruhm der ersten Autorität, und es hat vieler Kämpfe bedurft, um am Beginne der zweiten Periode unserer Geschichte sein Ansehen fallen zu machen. Was seine anatomischen Schristen lesenswerth macht, sind die schönen Reslexionen, die den anatomischen Beschreibungen hin und wieder eingeflochten sind. -In den stürmischen Zeiten, die auf den Verfall des römischen Reiches folgten, und in welchen die Anatomie, wie alle Kunst und Wissenschaft, kein Lebenszeichen von sich gab, waren die Werke Galen's das einzige Testament der Arzneikunde, welchem alle Völker des Abendlandes Glauben zuschwuren. und sich, wie die Araber (Rhazes, Averroës, Avicenna) und die Barbaro-Latini, in Commentaren und Uebersetzungen desselben erschöpften. Leichen konnten und dursten nicht zergliedert werden, da nach einer Stelle im Cassiodorus, welcher im 7. Jahrhunderte lebte, um die Entweihung der Gräber und die wahrscheinlich bisher öfters heimlich vorgenommene Exhumation der Leichen zu verhindern, auf den christlichen Kirchhöfen immer Grabhüter aufgestellt wurden, und das Salische Gesetz jeden Umgang mit einem Menschen strengstens untersagte, der sich dieses Verbrechens schuldig gemacht hätte. — Durch Mondini (Mundinus), Professer zu Bologna (Geburtsjahr unbekannt, gestorben 1326), feierte die Anatomie ihre Wiedergeburt zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts. Er wagte es, nach so langem Verfalle der Anatomie, wieder Hand an die menschliche Leiche zu legen, und zergliederte zwei weibliche Körper. Von welcher Art diese neu erstandene Anatomie gewesen sein mag, ersehe ich aus folgendem Barbaro-Latein des Guido Cauliacus (Guy de Chauliac, Capellan und Leibarzt Papst Urban's V.): Magister meus, Bertuccius, fecit anatomiam per hunc modum. Situato corpore in banco, faciebat de ipso quatuor lectiones. In prima tractabantur membra nutritiva, quia citius putrebilia, — in secunda membra spiritalia, — in tertia membra animata, — in quarta extremitates tractabantur. - Mundinus - schrieb ein anatomisches Werk, welches bald unter dem Titel Anatomia Mundini, bald Anatome omnium humani corp.

interiorum membrorum, viele Auflagen erlebte, und, obwohl es gar nichts Neues enthielt, durch zwei Jahrhunderte in grossem Ansehen stand. erfahren aus Jac. Douglas (Bibliographia anat. pag. 36), dass zu Padua, der herühmtesten aller damaligen Universitäten, die Statuta academica ausdrücklich befahlen: ut anatomici Patavini explicationem textualem ipsius Mundini sequantur. Er copirte häufig den Galen, und mitunter die Araber, wie die beibehaltenen arabischen Worte Myrach (Unterleib), Syphac (Bauchfell) etc. beweisen. - Leider wurde die durch ihn neu in's Dasein gerufene Anatomie des Menschen sehr frühzeitig durch die berühmte Bulle Bonifaz VIII. (anno 1300) gefährdet, welche den Kirchenbann über alle Jene aussprach, die es wagten, einen Menschen zu zergliedern, oder seine Gebeine auszukochen. Die Beschästigung der damaligen Mönche Italiens mit der Heilkunde, und die nicht ungegrundete Befürchtung, dass sie dadurch, wie die weltlichen Doctoren, dem Beten und Fasten abgeneigt werden dürsten, scheint diese Strenge der Kirche gegen unsere Wissenschaft veranlasst zu haben. Mundin selbst gesteht, dass er, "der Sünde wegen" die Untersuchung gewisser Knochen aufgeben musste: "Ossa autem alia, quae sunt infra basilare, non bene ad sensum apparent, nisi ossa illa decoquantur, sed propter peccatum dimittere consuevi." - Alexander Benedetti, Magnus Hundt, Gabriel de Zerbis (seines tragischen Endes wegen bekannt, indem er von den Türken zwischen zwei Brettern eingeklemmt und in der Mitte auseinander gesägt worden sein soll, 1505), Alexander Achillinus, Berengarius Carpensis waren nur getreue Anhänger des Altherkömmlichen. Jac. Sylvius (geb. 1417). Professor der Anatomie zu Paris, trat etwas selbstständiger auf, änderte Einiges an der Nomenclatur, berichtigte die Anatomie der Muskeln und Gefässe, und hat - der erste unter den christlichen Anatomen - seinen Namen in der Fossa Sylvii verewigt. Seine Isagoge anatomica nennt Douglas: solertis ingenii foetura incomparabilis. Die erste Idee, die Blutgefässe mit eingespritzten Flüssigkeiten zu füllen, ging von ihm aus. seinem Grabsteine zu Paris steht Folgendes:

> Sylvius hic situs est, gratis qui nil dedit unquam, Et quod Tu gratis haec legis, ipse dolet.

§. 12. Zweite Periode der Geschichte der Anatomie.

Die zweite Periode der Wissenschast beginnt mit dem berühmten anatomischen Triumvirat des Vesalius, Eustachius, und Fallopia.

Andreas Vesalius, 1514 zu Brüssel geboren (seine Familie stammte aus Wesel im Herzogthume Cleve), daher der Name Vesalius), studirte zu Löwen, und musste, der vielen Verfolgungen wegen, die ihm sein Eifer für die Anatomie zuzog (indem er, nach seinem eigenen Geständnisse, die Kirchhöfe plünderte, und die Leichname der Verbrecher von Galgen und Rad entwendete), sein Vaterland verlassen, um in Paris unter Jac. Sylvius

THE RESIDENCE OF BELLEVILLE The second of the second 1% The state of the s - The same of the same ----- Warm miller II and passed souther or species of the - - - - ali - unatomic T 24 Nebca-·== wate in -- --- h arrace wie . 443848 "Hate - ... -•~

Zergliederers, den er leider dadurch besleckte, dass er zu Pisa zum Tode verurtheilte Verbrecher zur Vornahme seiner Versuche über die Wirkungsart der Giste auswählte (dux enim corpora justition tradenda anatomicis exhibebat, ut morte, qua ipsis videbatur, interficerentur. De compos. medicam. cap. 8).

Bartholomaus Eustachius (sein Geburtsiahr ist nicht bekannt. sein Tod fallt auf 1574), ein eilriger und gelehrter Gegner des Vesal. wie seine Opuscula anatomica, Fenet. 1564, heweisen. Seine Tabular anatomicae, über deren Versertigung er starb, blieben durch 150 Jahre verborgen, und wurden für verloren gehalten, his die Kunfernlatten zu Rom ausgesunden, und durch Papst Clemens XI. seinem Leibarzte J. Mar. Lancisius geschenkt wurden, welcher, selbst Anatom, sie im Jahre 1714 berausgab, und den Text dazu schrieb. Sie sind so vollständig, dass der grosse Albin in der Mitte des vorigen Jahrhunderts noch noch ihnen lehrte.-Es ist leicht zu begreifen, dass in jener Zeit, wo die zu einem neuen Leben erwachte Wissenschaft einer genaueren und sorgsameren Pflege gewirdigt wurde, die grossen Entdeckungen an der Tagesordnung waren, und wer immer sich etwas mehr mit ihr einliess, sicher sein konnte, seinen Namen durch irgend einen Fund zu verewigen. Die sogenannte italienische Schule ist reich an Männern, deren jeder sein Schärflein zum schnellen Aufhlüben unserer Wissenschaft beitrug. Dass sie nur das robe Material sichteten, und von subtileren Untersuchungen noch nichts wissen konnten. liegt in der Natur der Sache, und in der Art des Fortschrittes jedes menschlichen Wissens. Die Geschichte erwähnt folgende bedeutendere Namen: Fabricius ab Aquapendente, Prof. zu Padua (1537-1619), Const. Vareli, Prof. zu Bologna (1543-1575), und dessen Nachfolger J. Caes. Aranti (starb 1589), Volcherus Coyter, Stadtphysikus zu Nürnberg (1534-1600), Kaspar Bauhin, Prof. zu Basel (1560-1624), und Julius Casserius, Prof. zu Padua (wahrscheinlich 1545-1605). Letzterer hinterliess eine Sammlung von 78 anat. Tafeln, welche ein deutscher Arzt, Daniel Rindsleisch, genannt Bucretius, an sich kauste, und zugleich mit Adriani Spigelii, de corp. hum. fabrica libris decem, zu Venedig 1627 auslegen liess.

Die Entdeckung des Kreislaufs bedingt einen neuen Abschnitt dieser Periode. Nach mehreren Vorarbeiten zur Begründung einer richtigen Ansicht vom Kreislauf des Blutes, welche von Realdus Columbus, Fabricius ab Aquapendente (welcher zuerst bemerkte, dass die Klappen der Venen der centrifugalen Bewegung des Blutes im Wege ständen), Caesalpinus, und Michael Servetus (Mönch des Servitenordens, 1553 auf Calvin's Anstisten zu Genf als Ketzer verbrannt) vorgenommen wurden, gelang es dem Engländer William Harvey (1578 zu Folkston geboren, starb 1657), der während seines Ausenthaltes in Italien, wo er zu Padua promovirte, von diesen Vorarbeiten Kenntniss erhielt, die neue Lehre der Circulation des Blutes auf dem Wege exacter Versuche mit wissenschaftlicher Schärfe zu

begründen. Er wurde dafür von seinen Zeitgenossen so sehr angefeindet (malo cum Galeno errare, quam Harveji veritatém amplecti), dass er sein Amt und seine Praxis verlor. Ich finde in dem interessanten Werkchen von R. Knox, Great Artists, and great Anatomists, London, 1852, eine geschichtlich interessante Notiz, pag. 160, 161, über ein Buch von Handzeichnungen Leonardo da Vinci's, welches sich in der Privatbibliothek der Königin Victoria von England befindet. Unter diesen Zeichnungen findet sich eine über die verschiedenen Stellungen der Valvulae semilunares (deren Noduli Arantii ganz genau dargestellt sind), welche nur durch eine Idee von dem wahren Kreislauf entworsen werden konnte. Da der grosse Maler lange vor Fabricius und Harvey lebte, ist diese Angabe, der Prioritätsfrage wegen, nicht unwichtig. - Fast gleichzeitig mit Harvey entdeckte Kaspar Aselli. Prof. zu Pavia, an einem Hunde die Lymphgefässe (1622), mit deren genaueren Untersuchung sich Jean Pecquet (Entdecker des Ductus thoracicus), Olaus Rudbeck, Prof. zu Upsala, und Thomas Bartholin. der grösste Polyhistor seines Zeitalters, und Verfasser der noch immer geachteten Anatomia reformata, beschäftigten. Lancisi, Willis, Winslow, Valsalva, Santorini, Regnier de Graaf, und der ehrwürdige Veteran der deutschen Chirurgie Laurentius Heister (1683-1758) sind würdige Repräsentanten dieser Periode. Leider stand auch sie noch lange unter dem Druck des allgemeinen Vorurtheiles und des Leichenmangels, indem nur justificirte Verbrecher unserer Wissenschaft überlassen wurden. Petrus Paaw rühmte sich: sese bina aut terna cadavera quotannis secuisse (Primitiae anat. Lugd. 1615). Der Schrecken, in welchem Rolfink's Name bei dem Volke stand, veranlasste manchen armen Sünder zur Bitte, nach dem Richten nicht gerolfinkt zu werden, und dem Professor Albrecht, der in Göttingen, in einem sinsteren Keller des Festungsthurmes neben dem Groner Thore, seine Zergliederungen hielt, wurde von den Einwohnern Wasser und Holz verweigert! - Noch hatte man nicht mit dem Vergrösserungsglase in die Tiefen der Wissenschaft geschaut. Marcello Malpighi (1628-1694) war der Schöpfer der mikroskopischen Anatomie. Er lehrte zu Bologna, Pisa, Messina, war ein Freund des grossen Alph. Borelli, und starb als Leibarzt Papst Innocenz XII. Er bediente sich zuerst der stark convexen Glaslinsen, um auch das Gewebe der Organe. kennen zu lernen, und behauptet durch die seinen Operibus medicis eingeschalteten anatomischen Tractate auch in der Gegenwart den Ruhm Die beiden Niederländer Ant. Leeuweneiner achtbaren Notabilität. hoeck (1632-1723), und Joh. Swammerdam (1627-1680), machten in dem Gebiete der mikroskopischen Anatomie (besonders ersterer) folgenreiche Entdeckungen, und Friedr. Ruysch (1638-1731), Prof. der Anatomie und Botanik zu Amsterdam, brachte die von Swammerdam erfundene. durch van Hoorne vervollkommnete Methode, die seinen Blutgesässe mit erstarrenden Massen auszufüllen, so weit, dass seine Injectionen weltberühmt wurden, und Peter der Grosse (der, als er sich zu Shardam aufhielt, um

Schiffsbaukunde zu studiren, ihn öfters besuchte) seine Präparatensammlung um 36,000 Goldgulden ankaufte. In Leyden habe ich noch zwei angeblich von Ruysch herstammende unbrauchbäre Präparate angetroffen. Ebenso in Greifswalde (ein Schenkel und eine Planta pedis eines Kindes). Sonst ist von allen den Schätzen, welche Ruysch mit Beihilfe seiner Tochter in seinem langen Leben (er wurde 93 Jahre alt) verfertigte, und in seinem Thesaurus anatomicus abbilden liess, nichts mehr vorhanden! Ein ähnliches Schicksal erlebte die von A. Vater errichtete, und von ihm beschriebene Sammlung (Museum anat. proprium. Helmst. 1750). Sie wurde von einem Apotheker in Wittenberg, der Gläser wegen, um einen Spottpreis gekauft. Meine Privatsammlung von 5000 Injectionspräparaten vernichtete das Jahr 1848. Sie transit gloria mundi!

Die Anatomie hatte sich nun als Wissenschaft geltend gemacht, man gab die nutzlose Polemik auf, die bisher einen Hauptinhalt der anatomischen Schriften bildete, und wendete sich dem Reellen zu. Physiologie und Medicin ersuhren eine einslussreiche Rückwirkung; erstere wurde durch Albert Haller, den grössten Gelehrten seines Zeitalters (1708-1777). zur Würde einer Wissenschaft erhoben, und für letztere durch Joh. Bapt. Morgagni (1682-1771), und den grössten Lehrer der Leydener Hochschule, Bernhard Siegfried Albin, der erste Versuch dazu gemacht. Morgagni's Adversaria anatomica können noch immer als Muster von Genauigkeit dienen, und sein unsterbliches Werk, de sedibus et causis morborum, war die erste Vorarbeit für die pathologisch-anatomische Richtung der Medicin. Unter dem bescheidenen Titel: Elementa physiologiae speicherte Haller, Albin's Schüler, die grossen Vorräthe alles dessen, was man vor ihm wusste, auf, und machte dadurch die ganze ältere Literatur entbehrlich. Die Entwicklungsgeschichte wurde von ihm zuerst bearbeitet, und den classischen Untersuchungen von Kasp. Friedr. Wolff (1733-1794) der Weg gebahnt. Die vergleichende Anatomie beschäftigte die geistvollsten Männer. Jean Marie d'Aubenton (1716-1799), Felix Vicq d'Azyr, die Gebrüder John und William Hunter, der Niederländer Peter Camper (1722-1789) glänzen als Sterne erster Grösse im Buche der Geschichte. Die beschreibende Anatomie wurde durch die Genauigkeit der Deutschen am meisten gefördert, denen diese Wissenschaft ihre schönsten und wichtigsten Entdeckungen verdankt. Die Gelehrtenfamilie der Meckel's, so wie die deutschen Professoren: Weitbrecht, Zinn, Wrisberg, Walter, Reil, Rosenmüller, Sömmerring, Hildebrandt, und so viele meiner gegenwärtigen Zeitgenossen, stellt die Wissenschaft auf die höchste Höhe der Anerkennung. Die praktische Richtung der Anatomie, ihre Anwendung auf Natur- und Heilwissenschaft, wurde durch die Engländer Baillie, Everard Home, Abernethy, John und Charles Bell, A. Cooper, und den Niederländer Sandisort, vorzüglich verfolgt. Die chirurgische Anatomie war in Frankreich schon weit gediehen, bevor man ihren Namen in Deutschland kannte. Palfin, Por-

tal, Lieutaud, J. Cloquet, Velpeau, Blandin, Malgaigne, und Pétrequin sind ihre geistreichen Repräsentanten. In England wurde die Anatomie von ihrer praktischen Anwendung gar nie getrennt, während in Deutschland Hesselbach, in Italien Scarpa die Einzigen waren, welche sich der chirurgischen Anatomie mit Erfolg annahmen. Das Genie eines Bichat (geb. 1771, gest. 1802) schuf die allgemeine Anatomie. Die Gewebslehre wurde durch Schwann's Entdeckung der thierischen Zelle (1830) ins Dasein gerufen, und zählt auf deutschem Boden ihre grössten Männer. Die Namen Henle, Purkinje, Reichert, R. Wagner, Valentin, J. Müller, Kölliker, u. v. a. sind durch ihre Leistungen verewigt, und die histologischen Forschungen haben in der Jetztzeit eine solche Ausdehnung gewonnen, dass die eigentliche Messeranatomie immer mehr und mehr in den Hintergrund tritt. - Die vergleichende Anatomie erhob sich zum Lieblingsstudium aller Anatomen von Verstand, und zählt bei allen gebildeten Nationen zahlreiche Freunde und Vertreter. Durch Cuvier's Riesengeist entstand die Palaeontologie. Der Gang der vergleichenden Anatomie war vorwiegend der Beschreibung der thierischen Organisation zugewendet. Wie lichtvoll die Reflexion über den Fortschritt vom Einfachen zum Zusammengesetzten auch für die menschliche Anatomie werden kann, haben die physiologischen Ansichten Vicq d'Azyr's (Memoiren der Pariser Akademie, 1774), R. Owen's (on the Archetyp and Homologies of the Vertebrate Sceleton, 1848), ganz vorzüglich aber Joh. Müller's (Anatomie der Myxinoiden, 1835) bewiesen, und es ware zu wünschen, dass die hier eingeschlagene Tendenz den anatomischen Forschungen überhaupt zum Grunde gelegt wurde. - Die Entwicklungsgeschichte ist der verdienteste Ruhm deutscher Naturwissenschaft. Pander und Döllinger haben die von Haller und Wolff betretene Bahn geebnet, und was in diesem Fache Grosses geschah, ist in der Jetztzeit von unserem gemeinsamen Vaterlande ausgegangen. Dasselbe gilt von der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Deutschlands kleinste Universitäten haben in diesen Gebieten sehr Verdienstliches, einzelne Grosses geleistet.

§. 13. Allgemeine Literatur der Anatomie.

Man hat nicht mit Unrecht der deutschen Anatomie ihr Prunken mit Literatur vorgeworsen. Um diesem Tadel nicht zu unterliegen, und zugleich dem Bedürfnisse des Anfängers zu entsprechen, dessen Literaturkenntniss sich leider so oft nur auf das Handbuch erstreckt, welches er sich anschasste, soll hier nur ein Verzeichniss von Büchern angeführt werden, welches Jeden, der nähere Bekanntschast mit den einzelnen Zweigen unserer Wissenschast machen wollte, mit den besten und wichtigsten Quellen derselben bekannt macht.

a) Geschichte der Anatomie.

Andr. Ottomar Goelicke, historia anat. nova etc. Halae, 1713. 8.

- Gottlieb Stollen, Einleitung zur Historie der medicinischen Gelahrtheit. Jena, 1731. 4. Die Geschichte der Anatomie und Physiologie, von pag. 385—513, enthält interessante Notizen über das Leben und Wirken der berühmtesten Anatomen bis auf Herm. Friedr. Teichmeyer.
- Anton Portal, histoire de l'anatomie et de la chirurgie. 6 Vol. Paris, 1770 —1773. 8. Durchaus biographisch bearbeitet.
- Alb. Haller, bibliotheca anat. 2 Vol. Tigur., 1774—1777. 4. Reicht bis 1776, und enthält die genauesten Angaben über die gesammte anatomische Bibliographie.
- Thom. Lauth, histoire de l'anatomie. Tom. I. et II. Strassbourg, 1915 und 1816. 4. Bei der umfassenden Anlage des Ganzen ist sehr zu bedauern, dass der zweite Theil den Entwicklungsgang der neueren Anatomie nur in Kurze behandelt.
- Kurt Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde. 5 Bde. Halle, 1821-1828. 8.
- Jos. Hyrtl, antiquitates anatomicae rariores etc. Vindob., 1835. 4. cum tabb. Enthält blos Nachrichten über den Ursprung der Anatomie.
- A. Burggraeve, Précis de l'histoire de l'Anatomie. Gand, 1840. 8.

b) Handbücher über descriptive Anatomie.

Mit Uebergehung aller älteren, welche in der alphabetisch geordneten, und mit einem zum leichten Außuchen dienenden, vollständigen Materienregister versehenen Bibliothera medico-chirurgica und anatomico-physiologica von W. Engelmann, Leipzig, 1848. 8. nachgesehen werden können, führe ich von neueren nur jene an, welche durch Originalität und Genauigkeit über dem Wuste der Compilationen stehen.

- J. F. Meckel, Ilandbuch der menschlichen Anatomie. Halle und Berlin, 1815
 —1820. 4 Bände. S. Durch seine vergleichend anatomischen Angaben über Varietäten, und genaue Daten über die Entwicklung der Knochen ausgezeichnet.
- F. Hildebrandt, Lehrbuch der Anatomie des Menschen, umgearbeitet und vermehrt von E. H. Weber. Braunschweig, 1830-1832. 4 Bände. 8.
- E. A. Lauth, Handbuch der praktischen Anatomie. Stuttgart, 1835 1836.
 2 Bände.
- J. Cloquet, traité d'anatomie descriptive. Sixième édition. Paris 1836. 8., und J. Cruveilhier, traité d'anatomie descriptive. Paris. 3. Aufl. in 4 Bänden. Durch Correctheit (bis auf die Angabe der Structuren) vor den übrigen französischen Manuels ausgezeichnet.
- M. Langenbeck, Handbuch der Anatomie, 1—4. Abth. Göttingen, 1831—1847.
 C. E. Bock, Handbuch der Anatomie des Menschen. 4. Aufl. Leipzig, 1849.
 S. Eine fleissige Compilation.
- S. Th. Sömmerring, vom Baue des menschlichen Körpers. Neue Originalausgabe in 9 Bänden, durch einen Verein der geachtetsten Anatomen Deutschlands besorgt. Die einzelnen Theile werden bei der Special-Literatur erwähnt.
- M. J. Weber, vollständiges Handbuch der Anatomie. Leipzig, 1845. 3 Bände.
 8. Sehr umständliche Beschreibungen mit Präparationsmethode, ohne Literatur, mit vielen eigenen Beobachtungen, von denen die meisten richtig sind.
- F. Th. Krause, Handbuch der menschlichen Anatomie. Hannover, 1841—1843.

 8. Der Gehalt dieses durchaus nach eigenen Untersuchungen entworfenen Handbuches empfiehlt es, bei seinem mässigen Volumen, vorzugsweise zum Lehrbuch der Anatomie. 5. Auß.

and the second of the second o The state of the second e similar to the response tendence in the Continue trained 1 MESSER TO SEE THE PROPERTY WAS THE RESERVE ASSESSED IN THE RESIDENCE IN CO. The same of the sa The state of the same of the s To the of Trades . But 1787 HI Controlled Annual Total the state of the s The state of the s Emmiliarities and collection where I be to the collection the second The Control of South the general months and the sea and the season of th on the time of a le transmission of the same life. The control of the second of t and the second section in the second sides Similar & committee for the street by the street statement with the street of the stre Section to the Manholds to the first the section of miller to bride of the on election of the threshold the The same of the property of the same of th want or with the antendergen fanns - Take Life in A TO PORTE TO PRODUCE TO PROPERTY IN THE PROPERTY OF THE PROPE material sees and compared per the 1 STATE OF THE Tillithen of well-wind the - the A therefore the the tillity The second of th The state of the s Additional of the second security of the second sec The M git a some per lance to the 1 hours are The Control of the Co Section of the sectio office content of the second o The state of the same of the same

The state of the same of the s

The second of th

THE THE PARTY OF STREET

Man The good the tree Man

- R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. Braunschweig. 4 Bände. 1842—1853.
 - e) Kupferwerke über die gesammte Anatomie des Menschen.

Nebst den älteren von Caldani, Loder, A. Mayer, dem Prachtwerke von Mascagni (Anatomia universa XLIV tabulis repraesentata. Pisa, 1823. fol.) und den neueren ausländischen von Lizars (London), Bourgery und Jacob (Paris), Bonamy und Beau (Paris), noch:

- J. M. Langenbeck, icones anatomicae. Göttingen, 1826—1838. Desselben Verfassers Handbuch der Anatomie bezieht sich auf dieses Kupferwerk.
- M. J. Weber, anat. Atlas. Dusseldorf. 2. Auflage.
- F. Arnold, tabulae anatomicae. Turici, 1838—1843. Jedem Anatomen unentbehrlich, und dem gegenwärtigen Standpunkte der descriptiven Anatomie vollkommen entsprechend.

Eine neuere iconographische Leistung: R. Froriep, atlas anatomicus partium corporis hum. per strata dispositarum. Weimar, 1850 und 1851. fol. ist in anatomischer und artistischer Hinsicht wahrhaft ausgezeichnet. Weibliche Genitalien fehlen.

Durch Billigkeit und Correctheit, empfiehlt sich für Studirende E. Bock's Handatlas der Anatomie des Menschen, 3. Ausl. (6 Thlr.), und die durch F. W. Assmann besorgte deutsche Ausgabe von N. Masse's Handatlas, Leipzig, 1854.

f) Allgemeine Anatomie und Geweblehre.

Aeltere Literatur.

- X. Bichat, anatomie générale. Paris, 1801. 4 Vol. 8. Deutsch von C. H. Pfaff. (Leipzig, 1802 und 1803.) Letzte Auslage mit Zusätzen von Blandin. 1832.
- F. Heusinger, System der Histologie. Eisenach, 1822. Th. I. (2 Hefte.) 4.
- E. H. Weber, allgemeine Anatomie (1. Band der Weber'schen Ausgabe von Hildebrandt's Lehrbuch der Anatomie), mit Berticksichtigung des Historischen.

Neuere Literatur.

- Th. Schwann, mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Structur der Pflanzen und Thiere. Berlin, 1839. 8. Mit diesem Fundamentalwerke beginnt die auf die Zellenmetamorphose gegründete neue Gestaltung der Histologie.
- F. Gerber, Handbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen und der Haussäugethiere. Bern, 1840. 8. Mit vielen Abbildungen der mikroskopischen Verhältnisse gesunder Gewebe und krankhafter Producte. Neue Auslage, 1845, an welcher nur der Titel neu ist.
- Bruns, Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen. Braunschweig, 1841. 8.
- J. Henle, allgemeine Anatomie. Leipzig, 1841. 8. Unbedingt das wichtigste, umfassendste, durchaus nach eigenen Untersuchungen entworfene Handbuch der allgemeinen Anatomie, mit meisterhaften Abbildungen.
- R. B. Todd und W. Bowman, the Physiological Anatomy and Physiology of Man. London, 1845—1852. Zum grössten Theil auf eigene Untersuchungen basirt. Genau und kurz.
- G. Valentin, Gewebe des menschlichen und thierischen K\u00fcrpers, in R. Wagner's Handw\u00fcrterbuch der Physiologie.
- J. Paget und W. B. Carpenter, Bericht über die durch den Gebrauch des

Marsslops in dem Stoften der Austeure und Physiologie erhaltenen Resaltate etc. A. d. Englischen. Angeborg. 1845. S.

A. F. Ginder, Lehrbach der allgemeinen Physiologie. Leipzig. 1545.

- 4. H. Hannel, the Microscopical Austrany of the human body at health and disease. London, 1546—1549. Enter deutsche Universetzung von Kohlechiert erschent helerungsweise in Leipzig. 11. z. 12. Leiferung bereits ausgegeben.
- B. A. Berlard, élémens d'autoure générale, 3, élét, par J. Berlard. Paris, 1552.
 J. Gerlach, Handbuck der allgemeinen und speciellen Gewehlehen. Zweite, villig amgearbeitete Anfage. Manz. 1553. En durch Dindigheit empfehlenswertles Handbuck, mit guten Bobischautten.

Assemblet schine Perstellunger von Geweben und Geginen finden sich in den jitnest neu durch Prof. A. Ecter besongten Jesus physiologicus von R. Wagner, in 3 Lief. Sci. Zwei Lieferungen bereits erschinnen.

Neuertes Hamptwerk: A. Krisiker, mitrositoposche Anatomie oder Geweisleiter des Menselien. Der 2. Rund bereits vollendet.

Ferner beseiben Anters: Randboch der Geweibiehre des Menschen. Leipner. 1852. Beide mit suspenserhart schioen Heksehmitten.

J. Coulet Lectures in Estimate. Limital 1883. Mr. melen Buberlanden. Bertrikerhalt vermanweise theresche Verhältnisse.

De Literatur der emzelnen bewebe fidet bei beisen.

g. Eeler ien Gebrench des Marinkings.

J. Uspei, Ambertung zum Geberauche des Malveskips etc. Leipzig, 1541. S. Daparetta, marven mannel complet de l'abservateur un nurrescipe. Pares, 1543. 12. En durch some Waldfelbent unit Alsentagnet emplehèneswerthes (passendum unt 3) metten l'alch.

Pricherd, Microscopic Mastrations, with researches roncerning the methods of constructing increasings and using them. 3, eds. London, 1945. Parkings Artified "Microscopic in Wagner's Emigration for Physiologic, and Anhangelsementangen des Hermagebers.

B. Corposer, Art. Microscop, in der Cyclopardia il Azie, une Pars.

J. Quellett, peuktischen Hundbuch der Hihrenkopet, Aus dem Engl. Weimer, 155er. Vom englischen Original at bereits eine 2. Auflage erschienen. Gute Instruction zur Verfertigung und Außewahrung mikroskopsicher Priparate.

Barrang a classisches Werk. Bet Microscoop. destells gebruik, geschiedents en tengenwoordige toestand. Utrecht. 1545—1554. 3 Theile: verdiente eine deutsche Unbersetzung.

A. Harrower, des Microscop, some Construction, und som Cohestok, mit Beleischmitten. Leppin, 1953.

A Pathologische Anatomie.

Die Specialwerke und Compendien von Andrei, Cruceithier, Haus, Ginge (mit Atlas). Fogel, Bock 3. And., Engel, Winisch und Förster 13. And., und das durch Organistien und Wahrheit gleich ausgestenehnete Han ib weit der pathol. Anatomie von Prof. Richtenalty in Wien von Wenigen ausgezoffen, wie Vielen abgeschrieben, repräsentiern diese Wissenstiad in Airer praktischen Berhamp. Eine neue Angesie des lectoren unt Hinternisien ist unter der Preise. — Für pathol. Histologie ist C. Wolf die Rich eröffnet Geundritge der path. Histologie. Wien 1854, mit Holzschutten. Die überen Hindlicher von Foignet, F. Hochel, W. Otto, Lob-

- R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. Brauschweig. 4 Binne. 1842—1853.
 - e) Kupferwerke über die gesammte Anatomie des Menschen.

Nebst den älteren von Caldani, Loder. A. Moyer, dem Praciewwise von Mascagni (Anatomia universa XLIV tabulis repraesentata. Psa. 1521. fol.) und den neueren ausländischen von Lizera Landon, Bourgery und Jacob (Paris), Bonemy und Been (Paris, mech:

- J. M. Langenbeck, icones anatomicae. Göttmern. 1526—1535. Desselben Verfassers Handbuch der Anatomie bezieht sich auf dieses Kupferwerk.
- M. J. Weber, anat. Atlas. Dusseldorf. 2. Auflage.
- F. Arnold, tabulae anatomicae. Turici, 1535—1543. Jeden Anatomen unentbehrlich, und dem gegenwärtigen Standpunkte der descriptiven Anatomie vollkommen entsprechend.

Eine neuere iconographische Leistung: R. Froriep, atlas anatomicus partium corporis hum, per strata dispositarum. Weimar, 1550 und 1551, fol. ist in anatomischer und artistischer Hunsicht wahrhaft ausgezeichnet. Weibliche Genitalien fehlen.

Durch Billigkeit und Correctheit, empfiehlt sich für Studirende E. Bock's Handatlas der Anatomie des Menschen, 3. Aufl. (6 Thir., und die Eurch F. W. Assmann besorgte deutsche Ausgabe von N. Masse's Handatlas, Leipzig, 1854.

f) Allgemeine Anatomie und Geweblehre.

Aeltere Literatur.

- X. Bichat, anatomie générale. Paris. 1801. 4 Vol. S. Deutsch von C. H. Pfag. (Leipzig, 1802 und 1803.) Letzte Auflage mit Zusätzen von Blandin. 1832.
- F. Heusinger, System der Histologie. Eisenach. 1522. Th. I. (2 Belle. 4.
- E. H. Weber, allgemeine Anatomie (1. Band der Weberschen Ausgabe von Hildebrandt's Lehrbuch der Anatomie), mit Berücksichtigung des Historischen.

Neuere Literatur.

- Th. Schwann, mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Structur der Pflanzen und Thiere. Berlin, 1539. 8. Mit diesem Fundamentalwerke beginnt die auf die Zellenmetamorphose gegründete neue Gestaltung der Histologie.
- F. Gerber, Handbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen und der Haussäugethiere. Bern, 1540. 8. Mit vielen Abbildungen der mikroskopischen Verhältnisse gesunder Gewebe und krankhafter Producte. Neue Auflage, 1845, an welcher nur der Titel neu ist.
- Bruns, Lehrbuch der allgemeinen Anatomie des Menschen. Braunschweig, 1841. 8.
- J. Henle, allgemeine Anatomie. Leipzig, 1541. 5. Unbedingt das wichtigste, umfassendste, durchaus nach eigenen Untersuchungen entworfene Handbuch der allgemeinen Anatomie, mit meisterhaften Abbildungen.
- R. B. Todd und W. Bournan, the Physiological Anatomy and Physiology of Man. London, 1845—1852. Zum grössten Theil auf eigene Unterspektigegen basirt. Genau und kurz.
- G. Valentin, Gewebe des menschlichen und thierischen Körpers. m. R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie.
- J. Paget und W. B. Carpenter, Bericht über die durch den febrouch des

I) Chirurgische Anatomie.

Nehst den älteren Schriften von Palfin, Portal, Allen Burns, und den absiehtlich übergangenen grossen und kostspieligen englischen Kupferwerken, gehören hierher:

Milne Edwards, manuel d'anatomie chirurgicale. Paris, 1826. 12. Ein kleines, aber sehr nutzliches Compendium.

Lebaudy, Surgical Anatomy of the Regions. London, 1935. fol.

- B. B. Cooper, Lectures on Anatomy, interspersed with practical remarks. London, 1835. 4 Vol., mehr anatomisch belehrend als chirurgisch.
- E. Wilson, Practical and Surgical Anatomy. London, 2. edit.
- M. Velpeau, traité complet d'anatomie chirurgicale générale et topographique. 3. édit. 2 Vol. Avec un atlas. Paris, 1837. Deutsch in 3 Abtheil. Weimar, 1826—1937. Die Darstellungen der Fascien sind etwas verworren, die deutsche Uebersetzung hin und wieder uncorrect.
- M. Velpess, Manuel d'anat. chirurgicale, générale et topographique. Paris, 1837. Für Anfänger empfehlenswerth.
- Ph. Fr. Blandin, traité d'anat. topographique. 2. édit. Bruxelles, 1637. Avec un atlas de planches in fol.
- J. F. Malgaigne, traité d'anat. chirurgicale et de chirurgie expérimentale. 2 Vol. Paris, 1837. Eine hôchst interessante Lecture, wenn auch der Verfasser zuweilen sich in allzu subtile Discussionen einlässt. Eine deutsche Uebersetzung erschien in Prag 1842.
- J. E. Petrequin, traité d'anat. medico-chirurgicale. Paris, 1843. Enthalt wenig Anatomie, mehr Operatives. Deutsch, Erlangen, 1844.
- F. Jarjavay, traité d'anat. chirurgicale. Paris. 2 Vol. 1852—1954, steht dem Malgaigne'schen Werke in vieler Hinsicht, nur nicht an Umfang, nach.

 Ausser der topographischen Schrift von Seeger, und der bei weitem besseren von Nuhn, wurde in der neuesten Zeit die deutsche Literatur dieses Faches durch folgende Werke bereichert:
- W. Roser, Chirurgisch-anatomisches Vade mecum. 2. Aufl. Stuttgart, 1851. 8. Mit Holzschnitten. Sehr kurz und sehr gut.
- G. Ross, Handbuch der chirurgischen Anatomie. Leipzig, 1848. 8. Ich habe diese kurze und originelle Schrift mit wahrem Vergnügen gelesen.
- J. Hyrtl, Handbuch der topographischen Anatomie und ihrer praktischen, medicinisch-chirurgischen Anwendungen. 2 Bände. Wien, 1847. Das "Archiv für wissenschaftliche Heilkunde." 1848. pag. 106. äusserte sich über dieses Werk: "Die vorliegende Schrift hat in uns den freudigen Ge-"danken angeregt, dass jetzt die deutsche Schule, wie in allen anderen "Theilen der Medicin, so auch in der angewandten Anatomie, die anderen "überfütgelt. Wir sehen einen Anatomen ersten Ranges von den bisher in "Deutschland herrschenden Systemen der abstracten Anatomie eine Aus-"nahme machen, und sich jener lebendigen Betrachtung der anatomischen "Verhältnisse zuwenden, welche von der physiologischen Heilkunde gefor-"dert wird." Die zweite vermehrte und theilweise umgearbeitete Auslage erschien. 1853.

Chirurgisch-anatomische Tafeln von Nukn, Bierkowski, R. Froriep, und Pirogoff.

Die Specialabhandlungen folgen in der Literatur der einzelnen Regionen.

m) Morphologie und Racenstudium.

J. S. Elsholtz, anthropometria. Francof. ad Viadr., 1663. 8. Ein hüchst unterhaltendes Schriftchen.

- Fr. Blumenbach, de generis humani varietate nativa. Cottingue. 1795. 5. Fundamentalwerk der Racenkunde.
- C. Bock, der menschliche Körper nach seinem Jusseren Umfange. Lenpag. 1824. fol. Enthält nur Namen.
- P. N. Gerdy, anatomie des formes extérieures du corps human. Paris. 152h.
 8. Für Künstler und Wundärzte gleich mitzlich. Deutsch. Weimar. 1531.
- G. Schadour, Polyclet, oder von den Massen der Menseinen nach dem Geschlechte, Alter etc. Mit vielen Abbildungen in Fol. max., Text is 4. Berlin, 1834. Nur für Künstler georgnet.
- Bory de St. Fincent, l'homme, essay zoologaque sur le genre homan. 3. éda... Paris, 1836.
- D. F. Broc, essay sur les races humaines. Paris. 1536.
- A. Quetelet, sur l'homme, et le développement de ses qualisés. Bruxelles, 1836. 2 Vol. 5. Deutsch met Anhang von Riecte. Statigart. 1535. 5.
- J. C. Prichard, Naturgeschichte des Menschenzwschlechts. Nach der deuten Auflage des englischen Originals mit Aumerkungen und Zusätzen bezusgegeben von R. Wagner. 4 Rände. Leipzig. 1549—1545. 5. Bienst amfassende, naturhistorische, ethnographische und Enguistische Anzahen. Leider fehlen die Abbildungen des Originals.
- A. A. Berthold, Geschlechts-Eigenthunhehkeiten. m. R. Wagner's Handwirterbuch.
- W. Laurence, Lectures on Comparative Anatomy. Physiology. Zoobury and the Natural History of Man. London. 1545. Neutre Ankare. Eme learreiche und unterhaltende compilatorische Arbeit.
- Ch. Hamilton Smith, the Natural History of the Human Species. Earthurgh. 1845.
- C. Nott, and R. Gliddon, Types of Marked. Looks, 1954.
- G. Carus, Symbolik der menschlichen Gestalt. Lengur. 1553.
- Desselben Proportionenlehre der menschl. Gestalt. Lemazz, 1554.

n) Vergleichende Anatomie.

- A. Hauptwerke zum Nachschlagen.
- G. Curier, leçons d'anatomie comparée, publiées par Dumeril et Durerney.

 Paris, 1536—1846. Unterliegt übrigens dem allgemeinen Tadel franzissscher Sammelwerke, dass es auf fremde, und namentlich deutsche Leistungen zu wenig Rücksicht nimmt.
- J. F. Meckel, System der vergleichenden Anatomie. 6 Binde in 7 Abtheilungen. Halle, 1521—1533. Leider unvollendet. (Geschlechtsserzune, Sinneswerkzeuge und Nervensystem fehlen.)

Die herrlichen, von Carus und d'Alton herausgegebenen Erläuterungstaßeln zur vergl. Anatomie, von welchen bereits 5 Hefte Imp. Fol. erschenen, sind jedem Fachmann unentbehrlich.

- B. Compendien.
- C. G. Carus, Lehrbuch der vergleichenden Lestonie. 2. Aufl. Lenguz. 1536. Mit 20 Kupfertafeln. Wird entbehrlich durch:
- R. Wagner, Lehrbuch der vergl. Anatomie. 2. Aufl. Leipzig. 1544. Bezieht sich durchaus auf dessen Icones zootom. Leipzig. 1541. Vol.
- Rymer-Jones, General Outline of the Animal Kingdom etc., illustrated by 336 engravings. London, 1544. Ein höchst lehrresches, leider sehr kostspeliges Handbuch.
- R. E. Grant, Outlines of Comparative Anatomy. Deutsch von C. Ch. Schmidt. Leipzig, 1842. Mit 105 Holzschn. Ist durch die schlechte Uebersetzung etwas ungeniessbar.

- P. Evers, the Student's Compendium of Comparative Anatomy. London, 1838.
- R. Owen, Lectures on the Comparative Anatomy and Physiology. Invertebrate Animals. London, 1843. Vertebrate Animals (Part. I. Fishes). 1846. Amphibien, Vögel und Säugethiere fehlen noch. Ein ausgezeichnetes, mit philosophischem Geiste verfasstes Werk.
- v. Siebold und Stannius, Lehrbuch der vergl. Anatomie. 2 Bände. Berlin, 1845 1848. Durch Reichhaltigkeit und übersichtliche Kürze das beste Lehrbuch. Die zweite Auflage ist im Erscheinen.
- O. Schmidt, Handbuch der vergl. Anatomie. 2. Aufl. Jena, 1852. Ein kurzer Leitfaden für Vorlesungen und Privatstudien, mit Atlas.
- C. Bergmann und R. Leuckart, anatomisch-physiologische Uebersicht des Thierreichs. Mit Holzschnitten (etwas roh). Nach einer trefflichen, übersichtlichen Weise behandelt. Stuttgart, 1851—1853. 8.

o) Zeitschriften.

Lehrreich für alle Fächer der Anatomie bleiben:

- Reil's Archiv, 12 Bände; Meckel's deutsches Archiv für Physiologie, 8 Bände; Meckel's Archiv für Anatomie und Physiologie, welches durch J. Müller gegenwärtig fortgesetzt wird.
- Valentin, Repertorium für Anatomie und Physiologie (jährlich 1 Band in 2 Hesten; hat mit dem achten Bande aufgehört).
- Froriep und Schleiden, Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde (jährlich 4 Bände in wöchentlichen Nummern), und die
- Jahresberichte über die Fortschritte aller Zweige anatomischer Wissenschaft in Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie, so wie Canstatt's Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern werden Jene, welche an der Entwicklung der Wissenschaft Antheil nehmen, von deren Bereicherungen unterrichten.
- Müller's Archiv, Siebold und Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Virchow und Reinhardt's Archiv für path. Anatomie und Physiol., Roser und Wunderlich's Archiv für physiol. Heilkunde, Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin, liefern Originalaussätze über alle Zweige anatomisch-physiologischer (besonders mikrotomischer) und pathologischer Forschungen.

ERSTES BUCH.

Gewebslehre und allgemeine Anatomie.



§. 14. Bestandtheile des menschlichen Leibes.*)

Durch die Zergliederung lernt man die Formbestandtheile, durch chemische Analyse die Mischungsbestandtheile des menschlichen Leibes kennen. Beide zerfallen in nähere und entferntere, je nachdem sie durch die erste anatomische oder chemische Zerlegung, oder durch wiederholte Trennungen beiderlei Art erhalten werden. Mischungsbestandtheile, welche durch keine Methode in einfachere Grundstoffe zerlegt werden können, heissen chemische Elemente; Formbestandtheile, welche durch keine anatomische Behandlung in verschiedenartige feinere Theilchen getrennt werden können, heissen mikroskopische Elemente, oder kleinste Gewebtheilchen. Zur Erklärung folgendes Beispiel: - Ein Muskel ist ein Formbestandtheil des menschlichen Leibes. Seine näheren, durch die Zergliederung darstellbaren Bestandtheile sind: sein Fleisch, seine Sehnen, seine Hüllen. Seine entfernteren Bestandtheile sind: Nerven, Blutgefässe, Bindegewebe, und Muskelfasern. Letztere bestehen wieder aus einer Menge nicht weiter zu zerlegender, also einfacher mikroskopischer Fäserchen, welche somit die entserntesten Bestandtheile oder mikroskopischen Elemente desselben darstellen. — Kochsalz ist ein näherer Mischungsbestandtheil vieler thierischer Flüssigkeiten. Salzsäure und Natron wären die entfernteren, Chlor, Wasserstoff, Natrium und Oxygen die entferntesten, nicht mehr zu vereinfachenden chemischen Elemente desselben.

Die chemischen Elemente, oder die Ergebnisse der letzten chemischen Scheidung, sind einfache Stoffe, welche sich als solche nicht blos im thierischen Leibe, sondern auch in der uns umgebenden anorganischen Welt vorfinden. Sie sind feuerflüchtig oder fix, gasförmig oder fest. Zu ihnen gehören der Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff, Phosphor, Chlor, Schwefel, Fluor, Kalium, Natrium, Calcium, Magnium, Silicium, Mangan und Eisen. (Aluminium, Titan, Arsen, Jod, Brom, sind noch zweifelhaft, und scheinen, wenn sie im thierischen Leibe gefunden werden, nur zufällig vor-

^{*)} Für den Anfänger ist es nutzbringender, das Studium der Anatomie mit dem zweiten Buche (Knochenlehre) zu beginnen, denn die Behandlung der allgemeinen Anatomie setzt die Kenntniss der speciellen voraus. Jedoch kann von der allgemeinen Anatomie dasjenige, was auf Knochen Bezug hat, mit Vortheil gleich anfangs nachgelesen werden.

handen, und durch Nahrungsstoffe oder Arzueien dem Organismus für eine gewisse Zeitdauer einverleibt worden zu sein.)

Die Verbindungen dieser chemischen Elemente, oder die näheren Mischungsbestandtheile unseres Leibes sind doppelter Art: organisch und anorganisch.

Die organischen können nur unter dem Einstlusse des Lebens stattfinden, und kommen im todten Mineralreiche nicht vor. Die wichtigsten von ihnen sind, nebst Leim (Glutin), Chondrin, Keratin, Fettarten und Blutroth, die sogenannten eiweissartigen Stoffe: Albumin, Fibrin, Casein, und Globulin (Crystallin). Man nannte die letzteren auch Proteinverbindungen. da Mulder aus ihnen, durch Behandlung mit Kalilauge, ein zusammengesetztes Radical, — das Protein — darstellte, welches jedoch, neueren Untersuchungen zufolge, im schwefelfreien Zustande kaum vorkommen dürfte. -Alle eiweissartigen Stoffe enthalten Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, und Sauerstoff (am meisten Kohlenstoff, am wenigsten Wasserstoff), nebst Schwefel. Einige noch Phosphor, und gewisse anorganische Salze, z. B. das Casein. phosphorsauren Kalk. Folgendes Verhalten dieser Stoffe gegen chemische Reagentien, dürste bei histologischen Arbeiten von Wichtigkeit sein. 1) Von concentrirter Salpetersäure werden sie beim Erhitzen gelb gefärbt (Xanthoproteinsäure). 2) In concentrirter Salzsäure werden sie mit violetter Färbung gelöst. 3) Salpetersaures Quecksilberoxyd bewirkt beim Erwärmen eine rothe Färbung derselben.

Die anorganischen dagegen finden sich in- und ausserhalb des thierischen Leibes, können auch durch Kunst erzeugt und wieder in ihre Elemente zurückgeführt werden, während die organischen wohl in die einfachen Grundstoffe zerlegt, aber nie durch Verbindungsversuche wieder neu hergestellt werden können. So kann das Fett in Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff zerlegt, aber unter keiner Bedingung durch Vereinigung dieser drei Elemente neu erzeugt werden, dagegen der phosphorsaure Kalk der Knochen auf chemischem Wege in seine Elemente aufgelöst, und jederzeit wieder neu daraus zusammengesetzt werden kann.

Die mikroskopischen Elemente, d. h. die letzten Bestandtheile der Form, welche weder durch das Messer in einfachere Theilchen zerlegt werden können, noch bei mikroskopischer Untersuchung eine Dissernz von constituirenden Bestandtheilen erkennen lassen, sind a. Elementarkörnchen (Granula), d. i. mikroskopische Kügelchen ohne Höhle, srei in Flüssigkeiten oder in Blastemen suspendirt, oder zu grösseren Klumpen zusammengeballt, oder zwischen andere mikroskopische Elemente eingestreut; Beispiele: die Pigmentkörnchen, die Eiweisskörnchen in gewissen Sästen etc.; β . Bläschen (Vesiculae), mit Hülle und deutlichem Hohlraum, z. B. Dotterbläschen, die Blutkörperchen; γ . Röhrchen (Tubuki), hohle Cylinder mit oder ohne Verästlung; δ . Fasern (Fibrue), sadensörmige solide Cylinder, welche in Bündel (Fasciculi), oder zu breiten slachen Blättern (Lamellae) zusammentreten. — Die mikroskopischen Elemente der Organe

und die Art ihrer Verbindung kennen zu lernen, ist Vorwurf der Gewebslehre. Die Bestandtheile der Mischung sind kein Object der Zergliederung, und gehören in das Bereich der organischen Chemie.

Man theilt die Gewebe in einfache und zusammengesetzte ein. Einfache Gewebe bestehen aus durchaus gleichartigen, oder nur wenig verschiedenen mikroskopischen Elementen; zusammengesetzte Gewebe sind Combinationen mehrerer einfacher. Das Drüsengewebe, an dessen Bildung Blutgefässe, Ausführungsgänge, Bindegewebe und Nerven Antheil haben, ist ein zusammengesetztes, — das Bindegewebe, das Epithelium, ein einfaches.

Alle Organe mit gleichem Gewebe gehören Einem Systeme an. Ein System ist entweder ein zusammenhängendes Ganzes, welches den Körper in jeder Richtung durchdringt, und an der Bildung seiner einzelnen Organe Theil nimmt, oder es begreift viele, unter einander nicht zusammenhängende, aber gleichartig gebaute und gleich functionirende Organe in sich. Man könnte die ersteren allgemeine Systeme nennen. Sie haben entweder keinen Centralpunkt, von welchem sie ausgehen, z. B. das Bindegewebsystem, oder besitzen einen solchen, wie das Nerven- und Gefässystem in Gehirn und Herz. Die letzteren wären besondere Systeme zu nennen, und zu diesen werden gezählt: das Epithelialsystem, das elastische System, das Muskelsystem, das fibröse System, das seröse System, das Knorpelsystem, das Knochensystem, das Haut- und Schleimhautsystem, und das Drüsensystem.

Das Wort System wird noch in einem anderen Sinne gebraucht, insofern man darunter nicht den Inbegriff gleichartig gebauter Organe, sondern eine Summe verschiedener Apparate versteht, welche zur Hervorbringung eines gemeinsamen Endzweckes zusammenwirken. So spricht man von einem Verdauungs-, Zeugungs-, Athmungssystem, als Gruppen von Organen und Apparaten, deren Endzweck die Verdauung, die Zeugung, das Athmen ist. Man könnte sie physiologische Systeme nennen, da ihr Begriff nur functionell, nicht anatomisch aufgefasst ist.

Die Formbestandtheile sind fest oder flüssig; die flüssigen tropfbar oder gasfürmig. Die gasfürmigen kommen entweder frei in Hühlen und Schläuchen des Leibes vor, wie im Athmungs- und Verdauungssystem, wohin sie entweder von aussen her eingeführt, oder in diesen Räumen selbst gebildet wurden; oder sie sind an tropfbar-flüssige Bestandtheile gebunden, ungefähr wie die Gase der Mineralwässer, und können durch die Lustpumpe daraus erhalten werden.

Die tropsbar-slüssigen Formbestandtheile sinden sich in so grosser Menge, dass sie mehr als 4/s des Gewichtes des menschlichen Leibes betragen. Eine Guanchenmumie mittlerer Grösse (ohne Eingeweide) wiegt nur 13 Pfd. — Die Flüssigkeiten bieten in ihren Verhältnissen zu den sesten Theilen ein dreisaches Verhältniss dar. a) Sie durchdringen sämmtliche Gewebe und Organe, und bedingen ihre Weichheit, theilweise auch ihr Volumen: thierisches Wasser und Ernährungsssüssigkeit. b) Sie sind in den vollkommen geschlossenen und verzweigten Röhren des Gestassystems eingeschlossen — Blut, Lymphe, Chylus, — und in sortwährender Strömung begriffen. c) Sie süllen die abson-

dernden Kanäle der Drüsen aus, durch welche sie an die Oberfläche des Körpers, oder in die inneren Räume desselben befördert werden, — Absonderungen, Secreta.

Da es ganz gleichgültig ist, in welcher Ordnung die einzelnen Gewebe abgehandelt werden, indem jedes derselben für sich ein Ganzes bildet, so erlaubte ich mir jene zu wählen, in welcher Gewebe, deren Darstellung einfacher ist, den complicirteren vorangeschickt werden.

§. 15. Die thierische Zelle.

Die Gewebslehre (Histologie) beschäftigt sich mit dem Studium der letzten anatomischen Bestandtheile der Gewebe. Um die Gewebselemente zu verstehen, ist es nöthig, ihre Entstehung zu kennen. Die Gewebe entstehen aus Zellen. Wie entsteht die Zelle? - Bevor noch ein Gewebe da ist, existirt an dessen Stelle eine gleichartige, structurlose, stüssige oder weiche Masse, welche den Grund und Boden vorstellt, dem das zu bildende Gewebe entsprosst. Diese Masse heisst Cytoblastema oder Zellenkeimlager (χύτος die Zelle, βλάστημα der Keim) — auch kurzweg Blastem. Sie besteht aus Proteinstoffen mit beigemengtem flüssigen Fett, und einigen Salzen. Im Cytoblastem entstehen isolirte Körner, als festere organische Moleküle; sie werden Elementarkörnchen genannt. Sie sind rund, ausserordentlich klein, und besitzen nur 0,0003 bis 0,0008 Linien im Purchmesser. Unter dem Mikroskope sieht man sie in ununterbrochener zitternder Bewegung, welche aber keine lebendige, sondern eine physikalische Erscheinung ist (R. Brown's Molecularbewegung). Sie bleiben entweder vereinzelt, und umgeben sich mit einer fein granulirten Substanz (Schwann), welche sich aus dem Blasteme auf und um sie ablagert, oder es treten deren mehrere zu einem Aggregat zusammen, und verschmelzen durch ein halbstüssiges, helles, zähes Bindungsmittel zu einem Klümpchen. so entstehen die sogenannten Zellenkerne, Nuclei oder Cytoblasti, de-Purchmesser von 0,002 — 0,003 Linien schwankt. Durch Behandlung nut Essigsäure zerfallen junge Kerne wieder in Elementarkörnchen, illere erleiden blos eine theilweise Trennung (Spaltbarkeit der Kerne), und wenn der Kern sich vollständig consolidirte, bleibt die Einwirkung Essissiure ohne allen Erfolg. Diese fertigen Zellenkerne lassen in Bezel in ihrem Inneren einen oder mehrere dunkle Punkte unterwelche man Kernkörperchen nennt. Es ist noch unentdas Kernkörperchen durch eine Verdichtung der Substanz des oder gerade das Gegentheil, eine kleine Höhlung, anzeigt. 🗕 📺 vereinzelten Kern bildet sich eine Hülle, welche Zelle heisst. allen Zellen, ohne Ausnahme, ein dünnes, homogenes, Hautchen, welches keine Textur besitzt, und deshalb grant wird. - Die fertige Zelle und ihr Kern zeigen ein charakteristisches Verhalten gegen Essigsäure. Die Hülle Essigsäure durchsichtig gemacht, bei jungen Zellen

sogar aufgelöst, während der Kern schärfere Umrisse bekommt, und seine Kernkörperchen deutlicher werden. — Die Höhle der Zelle ist mit Flüssigkeit gefüllt, welche von der Zelle bereitet, und höchst wahrscheinlich auch verschiedenartig umgewandelt wird. Das zwischen den Zellen noch übrige Cytoblastem, welches ihr Bindungsmittel darstellt, wird Intercellularsubstanz genannt.

Wie sich die Zelle um den Kern bilde, ist noch nicht definitiv festgesetzt, nur so viel ist gewiss, dass der Kern vor der Zelle existirt, und wenn die Zelle fertig ist, der Kern bleiben oder schwinden kann. Bleibt er, so liegt er nicht im Mittelpunkte der Höhle der Zelle, sondern an oder auch in der Wand derselben, — er ist excentrisch. Das Eingeschlossensein des Kerns in der Zellenwand kommt höchst wahrscheinlich dadurch zu Stande, dass die Zelle nicht rings um den Kern entsteht, sondern die Zellenbildung, wie bei den Pflanzenzellen, von der einen Seite des Kerns ausgeht, wo das Zellenhäutchen sich von dieser Seite des flachen Kerns erhebt, und sich zu ihm verhält, wie das Uhrglas zur Uhr. Würde das Glas einer Taschenuhr zu einer grossen Blase — Zelle — ausgedehnt, so würde das Uhrwerk dieselbe excentrische Lage zu ihr haben, wie der Zellenkern zur Zelle.

Jede fertige thierische Zelle äussert ihre lebendige Thätigkeit durch Stoffaufnahme aus dem Blute. Dieser Stoff wird theils zur Ernährung und weiteren Umbildung der Zelle verwendet, theils von der Zelle nur verändert, und im veränderten Zustande wieder ausgeschieden. Für den letzten Grund dieser Thätigkeiten gebraucht Schwann den Ausdruck: metabolische Krast. Das richtige Verständniss der metabolischen Erscheinungen bildet den Knotenpunkt aller physiologischen Fragen über Stoffbildung und Stoffwechsel.

Eine besonders für den pathologischen Anatomen wichtige Abart von Zellenbildung ist die Entstehung der Körnchenzellen. Nicht um einen Kern, sondern um einen Körnerhaufen, welcher einen Kern zum Mittelpunkt hat, bildet sich eine Zellenwand. Der Inhalt der Zelle war somit früher vorhanden, als die Zelle selbst. Höchst wichtig sind jeue Körnehenzellen, in welchen Blutkörperchen nicht blos die Stelle der Körner einnehmen, sondern auch daselbst eine Reihe von Metamorphosen erleiden, welche endlich zu ihrer (und der Zelle) Auflösung führen.

§. 16. Vermehrung der Zellen.

Wenn die Zellen die Grundlagen der zu bildenden Gewebe sind, so müssen sie sich durch Vermehrung so anhäufen, dass sie der Masse des zu bildenden Gewebes entsprechen. Die Vermehrung der Zellen geschieht vorzugsweise auf zweifache Weise:

a) Durch Bildung neuer Zellen aus dem Cytoblastem. Die neuen bilden sich zwischen den alten auf dieselbe Weise, wie die alten selbst, d. h. aus dem Blastem. Man nennt diese Neubildung von Zellen die inter-

cellulare oder die freie Zellenhildung. Sie findet im thierischen Organismus im Chylus, in der Lymphe, in Drüsensäften statt, so wie in krank-halten Producten: im Eiter und in Exsudaten. Jede Zelle ist während ihrer Entstehung ganzach unabhängig von ihren Nachbarn.

h. Bet der zweiten Entstehungsart neuer Zellen gehen diese von den alten aus. Die neuen Zehen buiden sich im Inneren einer schon fertigen Jelle, welche deshaib Mutterzeile oder Schachtelzelle genannt wird. In der Mutterzelle namuch verlangert sich der Kern, bekommt zwei Kernkorperchen, und schmart sich zu zwei Kernen ab. welche sich mit Hüllen ungeben Die Matterzelle wurd hieben grösser, ihre Hülle dünner, bis sie endlich berstet, und ihre Rest entwert, oder mit dem umgebenden Cytoblastem sich niemeneurt is de neu auch in einer Zelle neue Kerne neben dem alten entstellen, und sen mit Zeilenwänden umgeben. Man nennt diese Vermehrung der der eine der endogene. In der ersten Entwicklungscent des l'induses sonce se come avese Rolle. (Unter den pathologischen Neutsidungen mich sont da e sagete Zeitenbildung bei bösartigen Geschwalsten, namers on by Care risens. Jose durch endagene Bilding entstandene Jese wird with se De geworden, sellet wieder Hutterzelle wenten und dieser Process in sein al westerbeiten. Ein Zerfallen von guiren eer gen deere earre toe anarrang in zwei, findet sich an den Better der Herrer and Sounds make wen

a. 17. Neumerikein der Zellen.

The Total Control of the Control of the State of the Stat

The later was the section of the sec the second with the first transfer was the second transfer الروارية والمواطنية المتناهية Service school property in the latter and the State of State of State of the late of the Letter der Oberart of the same of the same Lienes de ver-والمستناد والمستناد والمرازي والمرازي والمستناد والمستنا when the real state of the stat Sometime with the same of the same with the same with the same with on the or to have me some many a popular. It has can bear our or storm or hour towns have und left back restaurance of the second of the second of the second of the Therefore out to be a secured to the second to approximate for the angle of the Parketter with the second with the second the fall where were

- b) Die Zelle kann durch Ablagerung auf die Zellenwand (von aussen oder innen her) sehr verschiedentlich verändert werden. Durch körnige Ablagerung von aussen entstehen Henle's complicirte Zellen, d. i. kugelige Körper, deren Mittelpunkt eine Zelle bildet (gewisse Ganglienzellen). Die Ablagerung von innen her führt, wenn sie gleichförmig ist, zu einer schichtweisen Verdickung der Zellenwand, wenn sie ungleichförmig, d. h. nur stellenweise austritt, wird die Zellenhöhle eckig verzogen, oder mit Ausläusern besetzt erscheinen (Porenkanälchen), welche jenen Stellen entsprechen, an denen keine Ablagerung stattfand (Henle, Kölliker).
- c) Die Zellen verlieren ihre Isolirtheit, indem sie mit der sie umgebenden sesteren Intercellularsubstanz verschmelzen, so dass nur ihre Höhlen, als Lücken der Intercellularsubstanz, übrig bleiben, z. B. Knorpelzellen. Hiebei kann es geschehen, dass eine Zelle mit einer oder mehreren an sie anstossenden verwächst, und die Zwischenwände schwinden, wodurch die Lücken grösser als der Hohlraum einer einzelnen Zelle werden.
- d) Die Zellen lagern sich der Reihe nach an einander, verwachsen, und werden durch Schwinden der Zwischenwände zu einer continuirlichen Röhre. Einfache Drüsenschläuche und Nervenröhren.
- e) Die Zellen werden sternförmig, und schicken hohle Fortsätze Aeste aus, welche mit ähnlichen Fortsätzen benachbarter Zellen verwachsen, und sich in sie öffnen. Röhrenuetze, Capillargefässe.
- f) Die Zellen gehen durch Abplattung, Schwinden ihrer Höhle und ihres Kernes, und durch völliges Verschmelzen mit den in derselben Ebene neben ihnen liegenden Zellen, in einfache, sogenannte structurlose Häute über, z. B. Demours'sche Haut, Linsenkapsel, und Glashaut (?).
- g) Die nach zwei Richtungen verlängerten Zellen reihen sich der Länge nach an einander, und zerfasern sich in derselben Richtung zu Bündeln longitudinaler Fäden. Nervenfasern, animale Muskelfasern.
- h) Henle hatte die Ansicht, dass nicht alle Kerne sich mit einer Zellenwand umhüllen. Einige sollen auch frei bleiben, und durch Verlängerung und Verwachsung mehrerer in linearer Richtung, in sehr feine Fasern Kernfasern übergehen. Die Kernfaser ist durch ihre dunklen Contouren ausgezeichnet, und ist wohl nur eine elastische Faser (§. 21). Durch Essigsäure tritt sie schärfer hervor. Virchow's und Donders neueste Untersuchungen bestreiten mit Recht die Entstehung der Kernfasern aus Kernen, und nehmen auch für sie die Entstehung aus spindelförmig verlängerten Zellen, welche den früh verschwindenden Kern sehr enge umschliessen, in Anspruch.
- i) Die Zellen schwellen durch Zunahme ihres Inhaltes bis zum Bersten an (Dehiscenz), worauf sie schwinden, ein Vorgang, der in den Drüsenzellen, bei einigen Secretionsprocessen, eine wichtige Rolle spielt.

Die Entstehung der Gewebe aus Zellen fällt, wie alle Entwicklungsprocesse, der Physiologie anheim, und es konnten deshalb nur die äussersten Umrisse derselben hier gegeben werden, was, insofern es die verschiedenen Gewebe Lehrbuch fer Anatomie. 5. Aus.

unt gleichertige beierigeserfahrusse zuruckführt, und das einfache Gesetz kennen leiter wick ist ner Futwicklung des Mannigfiehen zu Grunde liegt, so bie Nomen mich milieber. Auslichtlich behandelt wirf der Gegenstand in: Ph. S. is the implicit consideration to the constitution of the constitution in do Structur and done Warre name over Phinner and Thomas Recta, 1939. -H. Dayon, Laboured over severation Physicians. 3. 12834. - Hente, 21grant a Valence rage 22 angles with a sea des tieses rationise and fabrich Notes Contracted by the Building for few electors, 142, 14-25. North and the Base grows Northern one Inc. 1112 of the Assessment des the edge of Property of the manner Phononical mediane and the crase field and the manifestant but we make your Embrow their procession, and how before which will be break and in the money because with became all the sales. The ucoli negali is Novinces at son Australia and Full foldet and Zeme and regions des 3 mem en exame dans 5 1 cm i de Betreamit des Leitenwhich is the middle control to the appearance and many Park age. Notice of the second section of the moderate second personal Laboration нь на Материя в строительной выполнением и споредели Енифорф so the proper suspension theorem, and demanded set in the conproducts done to work

a finance de l'acceptant de les consentents de la Societa de l'act. Same de la Societa de la Societa

& ! Sinderen disposen.

the Same and the court of the above known. There will was med in a companie Seneralizaria med in descriptione front, governors a committee ones on angenoused the His Bessell concentrate appropriate Science mann is fless to these manufic many mentioned of terms of the first and many the beautiful control of the thirty of Sentillaria, and the mediate that it interests between will there in the figure with important and all findingstates after the commend described the engage of the second control of the second c and the control of the same of with the Bright of the management of the large angles in Name I. 1-Burn Brown Alle the second community of the second surranteer as the greenwest configuration as a second concept for-CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF TH BUTCHEST TO SEE THE MEMBERS WHITE TO SEE THE SECOND SEE TO SETTING section is an experience when the property of the contract of the second of the second of the second of the second of without the a man is a first figure to the first of the f ment where there is not been a recommended to be greatern a matter. manufact, and the the state of the property of the first of the contract of th Care the left of the first three one will be a secreчен вы Высто на проделения пределения по выправно по пред чен. the manufact the training against the comments of

elementare Zusammensetzung aus Fäden verräth. Die einzelnen Bündel verflechten sich in jeder denkharen Richtung, und tauschen häufig kleinere Fascikeln von Fäden wechselseitig aus, wodurch ihr Zusammenhang inniger wird. Sie haben keine besondere Hüllungsmembran, und ihre Fäden lassen sich durch Nadeln auseinander ziehen, indem sie nur durch ein weiches, gallertartiges, homogenes, oder sein granulirtes Bindungsmittel zusammenhalten. Haben sich die Bündel zu Plättchen vereinigt, und kreuzen sich diese in mehrfacher Richtung, so muss dadurch ein System von Räumen oder Zellen (jedoch nicht im obigen elementaren Sinne) entstehen. welche nicht abgeschlossen sind, sondern durch weite Oeffnungen unter einander communiciren, und im Leben theils mit Fettklümpchen, theils mit tropfbar-flüssigen und dunstförmigen Exhalaten des Blutgefässsystems (Serum, Ernährungsfluidum) durchtränkt sind. Eingeblasene Luft, die, von Einer Zelle aus, grosse Strecken des Bindegewebes füllt, krankhafte Ergüsse von Wasser oder Blut, welche von einer Zelle zur anderen wandern, und sich, den Gesetzen der Schwere zufolge, in den tiefstgelegenen anhäusen, sprechen für die Zellencommunication, welche sonst kein Gegenstand anatomischer Darstellung ist.

Die Bindegewebsbündel sind häufig mit elastischen Fasern (§. 19 und 21) gemischt, und von ihnen nicht selten in Spiraltouren umwunden.

Reichert's Ansicht zufolge (Bemerkungen zur vergleichenden Naturforschung etc. Dorpat, 1845) wären die Streisen des Bindegewebes nicht der mikroskopische Ausdruck seiner faserigen Zusammenzetzung, sondern die Folge von Faltungen, welche die sonst homogene, structurlose, nur mit Kernrudimenten versehene Substanz des Bindegewebes eingeht, indem sie verschwinden, wenn man das untersuchte Stuck Bindegewebe mit einem Glasplättchen breitdrückt, und die vergleichend anatomische Untersuchung die faserigen Elemente desselben häufig nicht nachweist. Die leichte Spaltbarkeit des Bindegewebes in einer gewissen Richtung, als Folge seiner faserigen Textur, soll nach Reichert in der Gegenwart von Spaltöffnungen, durch welche die homogene Masse gewissermassen aufgeschlitzt würde, begründet sein. Das gestreifte Ansehen, welches durch Druck verschwand, soll bei nachlassendem Drucke sich wieder einstellen. Die nicht gefaserte Beschaffenheit mancher Bindegewebarten ist eine unläugbare Thatsache, und auch Kölliker nennt sie homogene Bindegewebe, allein der faserige Bau vieler peripherischen Bindegewebarten ist durch das, an den Rissstellen von selbst eintretende Zerfallen der stärkeren Bündel in feinere Fasern, ebenso gewiss zu erkennen. Uebergänge von gefasertem in nicht gefasertes, homogenes Bindegewebe, werden an vielen Orten, namentlich in der Schleimhaut des Darmkanals erkannt. - Ueber die Entstehung des Bindegewebes siehe Remak, in Müller's Archiv. 1852, 1. Hft.

§. 19. Physikalische, chemische und Lebenseigenschaften des Bindegewebes.

Die physikalischen Eigenschaften des Bindegewebes entsprechen seiner physiologischen Bestimmung. Seine Weichheit und Dehnbarkeit erlaubt den Organen, welche es verbindet, einen grossen Spielraum von Bewegung und Verschiebung, seine Elasticität hebt die schädlichen Wirkungen der Zerrung auf, seine Zusammensetzung aus geschlängelten, gekreunen und vielfüch verwehten Bündeln, sichert seine Ausdehnbarkeit in judif Ruhtung.

Das chemische Verhalten ist wenig geprüft. Eine besondere, für die unkroskopische Behandlung des Bindegewebes wichtige Veränderung erleidet es durch schwache Essigsäure. Es verliert sein gestreiftes Anschen, seine Bündel quellen auf und werden durchsichtig, wodurch die beigemengten elastischen oder kernfasern, auf welche die Essigsäure jene Wirkung nicht äussert, der Beobachtung zugänglich werden. In kaltem Wasser bleibt es lange unverändert, und fault überhaupt schwer. In siedendem Wasser schrumpfen die Organe, welche vorzugsweise aus Bindegewebe bestehen (Haut), aufangs stark ein, und lösen sich nach längerem kochen zu einer gelatmosen Masse auf, welche beim Erkalten stockt (Leim). Alkalten und Muieralsauren wirken diesem ähnlich, aber rascher.

the vitalen Eigenschaften sind von grosser Bedeutung. Da es das Lager bildet, in welchem die Blutgefässe und Nerven ihre Bahnen verfolgen, bevor sie an die Organe treten, für welche sie bestimmt sind, so erhellt davaus seme wichtige Beziehung zu letzteren. Seine vegetativen Thätigkeiten freten mit einer gewissen Raschheit auf, welche durch seine leichte Wiedererzeitung, wenn es durch krankheit oder Verwundung zerstört wurde, durch seine Thednahme an dem Wiederersatze von Substanzverlusten, an der Narbenbildung, an der Zusammenheilung getrennter Systemtheile, und durch die Reobachtung bestätigt wird, dass das Bindegewebe das entrige und schnell geschaffene Ersatzmittel jener Organe wird, deren krankhalte Zustande eine Entfernung derselben aus dem lebenden Organismus durch kunsthilfe nothwendig machten (Hode, Augapfel, Lymphdrüsen). Die Schnelligkeit, mit welcher unter besonderen Umständen krankhafte Ergüsse Infiltrationen) im Rindegewebe auftauchen und verschwinden, so wie seine absolute Vermehrung und Wucherung in Folge gewisser Krankbeitsprocesse (Auswüchse der Haut, Hypertrophien des Zellgewebes, Pseudomembranen. Obliterationen etc.), belehren hinlanglich über die Energie der in ihm waltenden vegetativen Processe.

Mikroskopische Behandlung. Eine Parthie fettlosen Bindegewebes, weiche zwischen den Muskeln oder besser den Sehnen des Vorderarms herviegelicht, oder unter der Conjunctiva des Augapfels aufgelesen wurde, wird nur Nicht auf einer angehauchten (flasplatte auseinander gezogen, mit einem Inighten lichteren inicht schaumigen) Speichels befeuchtet, und nut einem feinen Gesplätischen bedeckt unter das Mikroskop gebricht, um bei einer Linear-Vergrisserung von 300 – 400 bei durchgehendem Lichte untersucht zu werten. Desses genügt, um die anatomischen Eigenschaften der letzten fadigen Bindegewebiselemente kennen zu lernen.

Eine merkwurdige Veränderung erleiden einselne Randel durch Essgesture, weine mittelst eines Pinsels an dem Rande des Perlighischens aufgetragen wird, so dass ihre weitere Verbreitung durch das zu beobachtende Object nur allmälig erfolgt. Man bemerkt sehr oft, in dem Masse, als das Object durch die Einwirkung der Säure durchsichtig wird und aufquillt, eine schnürende Faser in Spiraltouren um das Bundel laufen. Diese Faser ist feiner als die Bindegewebsasern, und hat dunklere Contouren. Ist ihre Continuität irgendwo unterbrochen, so scheint sie sich loszudrehen; ist sie unverletzt, so bedingt sie, wegen des Aufschwellens des Bundels, Einschnurungen desselben. Dass solche Fasern an allen Bundeln existiren, muss verneint werden, da man häufig vergebens nach ihnen sucht. In dem fadenförmigen Bindegewebe, welches man an der Basis des Gehirns zwischen Arachnoidea und Pia mater (um den Circulus Willisii) leicht isolirt, finden sie sich regelmässig, und auf leicht zu erkennende Weise. Sie sind ihrem anatomischen und chemischen Verhalten nach mit den Bindegewebfasern nicht identisch, können Umwicklungsfasern genannt werden, und gehören dem elastischen Gewebe an (von welchem später).

An vielen Bündeln ohne Umwicklungsfasern bemerkt man, besonders wenn mehrere derselben parallel neben einander liegen, dunkelrandige, spindelförmige, in die Länge gezogene Kerne, welche an beiden Enden in Fäden auslaufen (nicht immer deutlich), die mit ähnlichen Fäden eines nächst vorderen und hinteren Kernes zusammenhängen, und eine absatzweise stärker und schwächer werdende, aber continuirliche dunkle Faser bilden, die, ihrer Krümmung und ihres Ansehens wegen, höchst wahrscheinlich blos eine frühere Entwicklungsstuse der spiralen, elastischen Umwicklungsfasern darstellt.

Die scheinbare Zusammenziehungssähigkeit des Bindegewebes in gewissen Gegenden des menschlichen Körpers, hängt von der Gegenwart organischer Muskelfasern (siehe §. 28), deren weite Verbreitung im Bindegewebe durch Kölliker nachgewiesen wurde, ab, und ist keine dem Bindegewebe zukommende vitale Eigenschaft, wie früher angenommen wurde. In der Haut äussert sie sich auf die Einwirkung von Kälte, oder bei gewissen Gemüthsaffecten sub forma der Gansehaut, Cutis anserina, i. e. Schrumpsen der Haut mit kriebelndem Gefühle und stärkerem Hervorragen der Mündungen der Haartaschen, welche auf der Haut ein Höckerchen bilden. Die Contraction der Haut kann auch den Haarbalgmündungen eine andere Richtung geben, welche das Haar selbst annehmen muss (Sträuben der Haare). Noch deutlicher ist die Zusammenziehung der Tunica dartos des Hodensackes auf Kältereiz und andere locale Erregungen. Sie unterscheidet sich von der Contraction der willkürlichen Muskeln dadurch, dass sie nur langsam entsteht, allmälig zuund abnimmt, und überhaupt länger anhält, als jene der Muskeln. Dass sie unter dem Einflusse des Nervensystems steht, beweist ihre Vergesellschaftung mit bestimmten Erregungszuständen desselben.

Bruch, über Bindegewebe, in der Zeitschrift für wiss. Zool. 6. Bd. 2. Hft.

§. 20. Formen des Bindegewebes.

Das Bindegewebe erscheint im menschlichen Körper unter mehreren Formen, bei gleicher elementarer Structur. Das früher angenommene umhüllende, und parenchymatöse oder Organen-Bindegewebe, ist nur der Lage und dem Vorkommen nach verschieden. In beiden Fällen bindet es, in dem ersten Organ an Organ, in dem zweiten Organtheile unter einander. Hat das Bindegewebe eine grosse Flächenausdehnung, so spricht man von Bindegeweb häuten (Membranae cellulares). Nimmt

es die Form einer cylindrischen Hülle um ein langgezogenes Organ an, so wird es Bindegewebscheide (Vagina cellularis) genannt. Ist es in grösseren Massen angehäuft, in welche andere Gebilde eingeschaltet werden, so heisst es Bindegeweblager (Stroma cellulare). Liegt es unter der äusseren Haut, unter einer Schleimhaut oder serösen Haut, und verbindet es diese mit einer tieferen Schichte, so wird es Textus cellularis subcutaneus, submucosus, subserosus genannt, und in diesem Zustande wohl auch als besondere Membran beschrieben.

Henle unterscheidet das formlose und geformte Bindegewebe. und rechnet zu ersterem jenes, welches um und zwischen den Organen abgelagert erscheint, um sie zu verbinden; zu letzterem dagegen alle Häute. Stränge und Blasen, welche vorzugsweise aus Bindegewebe bestehen. (Gegenwärtig wird der Name: formloses Bindegewebe, häufig auf homogenes Bindegewebe [Note zu §. 18] angewendet.) — Der Begriff einer Bindegewebhaut wird in sehr verschiedenem Sinne genommen. Versteht man darunter iedes in der Fläche ausgebreitete und condensirte Bindegewebe, so giebt es sehr viele Bindegewebhäute. Wird der Zusammenhang solcher Häute sester, ihr Gewebe dichter, und stehen sie überdies in einer umhüllenden Beziehung zu den Muskeln, so werden sie auch als Binden. Fasciae. außgeführt, in welchen die Faserung schon mit freiem Auge zu erkennen ist, und welche daher vorzugsweise fibros genannt werden. Festigkeit und Stärke mit der Entwicklung der Muskeln übereinstimmt. also bei schwachen Muskeln geringer, als bei krästig ausgebildeten ist, so kann es wohl geschehen, dass eine Binde an einem Individuum blos als Bindegewebe erscheint, während sie an einem anderen als scheinbar fibröse Fascia gesehen wurde (Fascia superficialis perinei, transcersa, Cooperi etc.). Die chirurgische Anatomie verdankt einen guten Theil ihrer Unklarheit im Capitel der Fascien diesem wenig gewürdigten Umstande. — Wollte man nur jenes Bindegewebe als Membrana cellularis gelten lassen, welches als deutlich begrenzte Schichte an gewissen Organen vorkommt (Zellhaut der Gefässe, Ausführungsgänge der Drüsen, Gallen- und Harnblase, Verdauungskanal, etc.), so liesse sich die Zahl der Bindegewebhäute sehr verringern. Im histologischen Sinne muss jede Membran als Bindegewebhaut genommen werden, welche sich unter dem Mikroskope aus Bindegewebfäden zusammengesetzt zeigt. Alle fibrösen und serösen Membranen, die Synovialhäute. selbst die Schwellkörper müssen in dieser Hinsicht als Unterarten Eines tiewebgeschlechts — des Bindegewebes — betrachtet werden.

leh glaube besser zu thun, wenn ich die fibrösen und serösen Membranen, die sich durch ihre äusseren anatomischen Merkmale so aufallend unter sich und vom Bindegewebe unterscheiden, als besondere Gewebformen im Verlaufe abhändle.

Merkwürdig ist es, dass des Sehnen und gewissen pathologischen Neubildungen zu Grunde liegende Bindegewebe nicht durch Zellenmetamorphose entsteht Zericky. Metamorphose des Thrombus. Zürich, 1844., und C. Bruch, die Dagmese der bösartigen Geschwülste. Mana, 1847.). Es bilden sich im

dem Blasteme nur Kerne, keine Zellen. Das Blastem selbst zerfällt in breite, bandartige Streifen, auf welchen die Kerne aufsitzen, und welche zuletzt in die feinsten Bindegewebfasern zerfallen.

§. 21. Elastisches Gewebe.

Da das Bindegewebe an sehr vielen Orten mit elastischem Gewebe, mit Fett, und mit Pigmenten gemischt vorkommt, so reiht sich hier die Untersuchung dieser drei Materien an.

Das elastische Gewebe, Tela elastica, kommt im menschlichen Körper kaum ganz rein, sondern mit anderen Geweben (namentlich dem Bindegewebe) gemengt vor. Seine mikroskopischen Elemente sind bandartig platte, dunkel contourirte, bei grösserer Anhäufung gelb erscheinende. mehr weniger breite Fasern mit geschlängeltem Verlauf, welche oft durch Aeste netzförmig zusammenhängen, und Stränge oder dicke Häute bilden. welche nach der Richtung der Fäden sehr dehnbar sind, und bei nachlassender Ausdehnung ihre frühere Gestalt wieder annehmen, also elastisch sind. Die Astbildung, und die Einrollung der abgerissenen Aeste, welche wie Schnörkel aussehen, unterscheiden diese Gewebform hinlänglich vom Bindegewebe, mit welchem es durch sein physikalisches und chemisches Verhalten nahe verwandt zu sein scheint. Die Fasern des elastischen Gewebes sehen den sogenannten Kernfasern des Bindegewebes täuschend ähnlich. und unterscheiden sich von ihnen nur durch ihre grössere Breite. (Kölliker giebt deshalb den Namen der Kernfasern ganz auf, und unterscheidet blos dickere und dünnere elastische Fasern.) Essigsäure. Wasser, Weingeist, so wie Austrocknen an der Lust, ändern die elastischen Fasern gar nicht. Verdünnte Salzsäure greist sie nicht an (Eulenberg). und sie widerstehen deshalb auch der auslösenden Krast des Magensastes. Die Stärke der Fasern ist sehr verschieden, von 0,0008"-0,0010". Das clastische Gewebe erscheint nur mit wenig Beimischung anderer, besonders Bindegewebsäden, a. in den gelben Bändern der Wirbelsäule und im Nackenband, B. in den Bändern, welche die Kehlkopf- und Luströhrenknorpel verbinden, y. in der mittleren Haut der Arterien. In vielen Fascien mischt es sich mit den Sehnensasern derselben; unter den Epithelien gewisser seröser Membranen (vorzugsweise des Bauchfells an der vorderen Bauchwand), in der äusseren Haut, in der Vorhaut, und im Textus cellularis submucosus des Darmschlauches sind elastische Fasern den Bindegewebbündeln eingestreut.

Das elastische Gewebe nützt dem Organismus durch seine physikalischen Eigenschaften, widersteht durch seine Dehnbarkeit der Gefahr des Reissens, eignet sich deshalb vorzugsweise zum Bandmittel, und vereinfacht, indem es lebendige Kräfte ersetzt, das Geschäft des Muskelsystems. Es hat nur wenig Blutgefässe, keine Nerven, und einen trägen Stoffwechsel. Wunden und Substanzverluste desselben heilen durch sehnige Narbensubstanz.

Man wählt zur mikroskopischen Untersuchung einen dünnen Schnitt, oder einen abgelösten Streifen des Nackenbandes eines Wiederkäuers. Die Elemente des elastischen Gewebes erscheinen dann scharf und dunkel gerandet, die abgerissenen Aeste mit zackigen Bruchrändern, häufig gabelig gespalten, mit rankenförmig aufgerollten Zweigen. Die netzförmigen Verbindungen der Fäden durch Aeste sind zuweilen so entwickelt, dass das Object das Aussehen einer durchlöcherten Membran annimmt. Man kann eingetrocknete Stücke des Lig. nuchae, an welchen sich seine Schnitzeln, die dann beseuchtet werden müssen. leichter als an frischen abnehmen lassen, zum Gebrauche ausbewahren. Essigsäure lässt die elastischen Fasern unverändert. Die Sprödigkeit der Fasern erlaubt nicht, die Faserbundel durch Nadeln auseinander zu ziehen. - Wie das elastische Gewebe als Stellvertreter von Muskeln austritt, lässt sich durch zahlreiche Belege aus der vergleichenden Anatomie anschaulich machen. Das Zusammenlegen des ausgestreckten Vogel- und Fledermausstügels, die aufrechte Stellung des Halses und Kopfes bei horn- oder geweihtragenden Thieren, die während des Gehens verborgene Lage der scharfen Krallen beim Katzengeschlechte u. s. w. werden nicht durch Muskelwirkung, sondern durch elastische Bänder bewerkstelligt.

Nebst den allgemeinen Werken über Gewebe, siehe die unter Schicann's Anleitung erschienene Abhandlung A. Eulenberg's, Dissertatio de tela elastica. Berol., 1836. 4°. A. Lauth, observations sur les tissus org. l'Institut. 1834. N. 57. (Entdeckung der elastischen Fasern.) — F. Räuschel, diss. de art. et ven. structura. Vratisl., 1836. 4°. (Ueber die elastische Haut der Arterien.) — L. Benjamin, Müller's Arch. 1847. (Zootomisch Interessantes über das elastische Gewebe.) — Donders, in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, Bd. III, 348. — Kölliker, über die Entwicklung der sogenannten Kernfasern, in den Verhandlungen der Würzburger phys. med. Gesellschaft. Bd. III, Heft 1.

§. 22. Fett.

Das Fett, Adeps s. Pinguedo, findet sich mit seinen bekannten ausseren Eigenschaften bei jedem gesunden Individuum im Bindegewebe in grösserer oder geringerer Menge, und schwindet in den auszehrenden Krankheiten, ja selbst durch den Hungertod an gewissen Stellen (in der Orbita, um die Nieren, in der Vola manus und Planta pedis) nie vollkommen. Im Inneren der Organe wird es, abgesehen von den chemisch an diese gebundenen Fettarten, nicht gefunden, und bei allgemeiner Fettsucht nur in den oberstächlichen Furchen der Organe (Sulcus cordis longitudinalis et transversalis, die verschiedenen Hili) abgelagert. - Das Fett ist kein Absonderungsstoff des Bindegewebes, so wenig als die in einer Zellscheide verlaufenden Nerven oder Gefässe durch diese Scheide gebildet wurden. Das Fett wird in kernlosen Zellen erzeugt - Fettzellen. Jede Fettzelle besteht aus einer äusserst feinen, structurlosen, durchsichtigen Membran, und einem Fetttröpfchen als Inhalt. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,01" und 0,05", ihre Obersläche ist gleichmässig gerundet (so lange das darin enthaltene Fetttröpschen slüssig ist), ihr Rand unter dem Mikroskope scharf geschnitten, und wegen starker Lichtbrechung dunkel. Es liegen immer mehrere Fettzellen in einer Lücke des Bindegewebes, von

deren Wand aus Blutgefässe abgehen, welche zwischen den Fettzellen durchlaufen, sie mit capillaren Reisern umweben, und sich zu ihnen beiläufig wie der verästelte Stengel einer Weintraube zu den Beeren verhalten. Das Fetttröpfchen ist nur im lebenden Thiere flüssig, und stockt nach dem Tode bei einer Temperatur von 17° R., wodurch die Fettzelle ihre Rundung einbüsst. — Das Fett ist eine vollkommen stickstofffreie Substanz, welche aus einer Verbindung der verschiedenen Fettsäuren (Oelsäure, Talgsäure, Margarinsäure) mit Glyceryloxyd besteht, in letzter Analyse 79 pCt. Kohlenstoff, 11,5 Wasserstoff und 9,5 Sauerstoff liefert (Chevreul), und sich somit von den fetten Oelen der Pflanzen nicht wesentlich unterscheidet. Menschenfett und Olivenöl haben nach Liebig dieselbe Zusammensetzung.

Als stickstofflose Substanz kann das Fett nie als einziges Nahrungsmittel eines Thieres dienen, da die stickstoffreichen thierischen Substanzen zu ihrer fortwährenden Neubildung stickstoffreiche Nahrungsstoffe fordern. Es häust sich das Fett bei reichlicher Nahrung und Mangel an Bewegung leicht an, und schwindet unter entgegengesetzten Umständen eben so leicht wieder. Es ist eine merkwürdige Thatsache, dass, vor der Vollendung des Wachsthums in die Länge, sich nur wenig Fett in jenen inneren Organen ablagert, welche (wie die Netze, das Gekröse, der Herzbeutel etc.) im mittleren Lebensalter ein bedeutendes Quantum davon aufnehmen. Bei Embryonen und Neugeborenen erscheinen, selbst bei exorbitirender Fettbildung unter der Haut, das Netz und die Gekröse settlos. In jedem interstitiellen und umhüllenden Zellgewebe kann die Fettentwicklung Platz greisen, und erreicht ihre höchste Ausbildung im Unterhautzellgewebe als sogenannter Panniculus adiposus (vorzüglich um die Brüste und am Gesässe), im Unterleibe, in den Netzen und Gekrösen (besonders des Dünndarms), und in den Interstitien der Muskeln, wo die grossen Gefässe der Gliedmassen verlaufen.

Die Vitalität des Fettes steht auf einer sehr niedrigen Stuse. Seine Empsindlichkeit ist gleich Null, seine Zellen besitzen durchaus keine Contractilität, sein Stosswechsel scheint gänzlich zu mangeln, da das einmal abgelagerte Fett erst bei beginnender Abmagerung wieder in den Kreislaus gebracht wird. Wunden eines settreichen Panniculus adiposus haben wenig Neigung zu schneller Vereinigung, und die chirurgische Praxis weiss, wie hoch dieser Umstand bei der Heilung der Amputations- und Steinschnittwunden anzuschlagen ist. Bis zu einem gewissen Grade ist die Fettbildung ein Zeichen von Gesundheit und Lebensfülle, darüber hinaus wird sie beschwerlich, und in höherem Grade eine kaum zu heilende Krankheit. Welch monströsen Umsang die Fettbildung erreichen kann, beweisen die Ersolge des Mästens der Thiere, und die zuweilen enorme Grösse der Fettgeschwülste (Lipomata). Man hat weibliche Brüste und männliche Hodensäcke durch Fettwucherung ein Gewicht von 30 Pfunden erreichen gesehen (Larrey), und sich zur Abtragung derselben mit dem Messer entschlossen.

Bringt man Oel- oder Fetttröpfchen in Erweiss, so hildet sich um sie ein Häutchen, die sogenannte Haptogenmembran (Ascherson), deren Entstehung sich wahrscheinlich aus einer oberflächlichen Verseifung des Fettes durch das Natron des Erweisses ergiebt. Die in den Blastemen der Zellenbildung vorangehenden Elementarkörnehen (§. 15), scheinen auf dieselbe Weise zu entstehen.

§. 23. Physiologische Bedeutung des Fettes.

Die physiologische Bedeutung der Fettablagerung ergiebt sich aus den Ernährungsgesetzen. Ein Ueberschuss kohlenstoff- und wasserstoffreicher Nahrungsmittel (Dele. Fette, und die stickstofffreien vegetabilischen Substanzen des Zuckers, Amylon, Gummi, Pectin ist das Antecedens derselben. Um den Kohlen- und Wasserstoff dieser Substanzen im Stoffwechsel umsetzen und als Kohlensäure und Wasser ausscheiden zu können, werden grosse Mengen Sauerstoff erfordert. Diese werden durch den Respirationsact berbeigeschafft. Ist die genossene Kohlen- und Wasserstoffnenze zu gross, um durch die eingenommenen Sauerstoffmengen als Kohlensäure und Wasser weggeführt zu werden, so lagert sich der Ueberschuss in jener Form, die wir Fett nennen, im Bindegewebe ab. Wird ein fetter Mensch auf knappe Kost reducirt, und die reichliche Nahrungszuführ abgeschnitten. so muss durch die ununterbrochen fortdauernde Ingestion von Sauerstoff. und Egestion von Kohlensiure und Wasser, wozu das Fett seinen Kohlenund Wasserstoff bergiebt, die Fettmenge nothwendig abuehmen. Nan könnte sagen, das Fett wird in diesem Falle ausgeathmet.

Dass des Fett die Geschmeidigkeit. Fülle und Rundung der Formen bedingt, die inneren Organe als schlechter Wärmeleiter vor Abkühlung schützt, kann allerdings seint dass es aber als eine Vorrathskammer zu betrachten sei, wo der Organismus seinen Ueberfluss an Nahrungsstoff aufspeichert, um in der Zeit des Mangels sich dessen zu bedienen, ist eine aus obgenannten chemischen Gründen durchaus irrige Vorstellung. Die reichste Fettnahrung führt wegen Mangel an Stickstoff, welchen alle eiweissund faserstoffreichen Gewebe zu ihrem Leben benötbigen zum sicheren Hungertode.

Ein wichtiger und wenig gewürdigter Nutzen des Fettes fliesst aus den physikalischen Eigenschaften der Fettzellen. Wenn jede Fettzelle ein geschlossenes Bläschen ist, dessen wassergetränkte Haut einen ziemlichen Grad von Stärke besitzt, so ist leicht einzusehen, dass ein starker Druck kaum vermögen wird, den öligen Inhalt der Zeile durch die feuchte Wand durchzupressen. Das Wasser in der Zeilenwand wird durch Capillarität in den Poren desselben so fixirt, dass es durch das nachdrückende Fett nicht zum Ausweichen gebracht wird. Die Fettzelle verhält sich somit beiläufig wie ein Luftkissen, durch welches Stoss und Druck abgewehrt werden. Diese mechanische Bedeutung der Fettzellen erklärt uns ihr häutiges und regelmässiges Vorkommen im Plattfusse, in der Hohlhand und auf dem

Gesässe, wo der äussere Druck am öftesten und anhaltendsten wirkt. Bei allgemeiner Abmagerung und bei Fettarmuth der Reconvalescenten aus fieberhasten Krankheiten, ist, abgesehen von der Schwäche der Muskelkrast, das Schwinden der Fettzellen wohl eine Hauptursache, warum längeres Gehen, Stehen, selbst Sitzen, nicht vertragen wird. Dieses Schwinden ist jedoch nicht als ein Vergehen der Fettzellen zu nehmen. Es schwindet nur der Inhalt der Fettzellen. Die Zelle selbst bleibt, schrumpst ein, und enthält blos Serum. - Da die durchseuchtete Zellenwand ein Hinderniss für die Aufsaugung des Fettes abgiebt, so kann diese nur dadurch möglich werden, dass entweder die Zelle schwindet, und die Fetttröpschen als solche vom Gefässsystem aufgenommen werden (wo dann die feuchte Wand der Capillaren ein neues Hinderniss setzt), oder, was wahrscheinlicher ist, das Fett wird vor seiner Außaugung verseift, in welchem Zustande die Häute, welche es zu passiren hat, seinen Durchgang gestatten. So scheint z. B. das Fett des Chylus durch die Einwirkung der Galle verseist zu werden. und dringt in diesem Zustande in die Darmwand ein. Mit Galle beseuchtete Capillarröhrchen lassen flüssiges Fett außteigen, was trockene nicht thun, und, um mit Tusche auf fettes Papier zu malen, versetzen die Maler erstere mit Fischgalle.

Uebermässige Fettabsonderung kann den Muskeln, zwischen welchen sie sich eindrängt, ihren Raum streitig machen, und sie so sehr zum Schwinden bringen, dass sie, wie bei gemästeten Hausthieren, kaum als rothe, den Speck durchziehende Striemen noch zu erkennen sind. Von diesem Verdrängen der Muskeln ist die sogenannte fettige Umwandlung derselben zu unterscheiden, welche als Krankheit, ohne allgemeine Fettwucherung, vorkommt.

Mikroskopische Behandlung. Ein kleines Fettklümpchen wird, wie früher beim Bindegewebe erwähnt, auf einer Glasplatte ausgebreitet, und bei 300 bis 400 Linear-Vergrösserung mit durchgehendem Lichte untersucht. Die Fettzellen erscheinen gleichförmig gerundet, sphärisch oder oval, mit dunklen Rändern, und so durchsichtig, dass man durch eine Zelle den Theil der darunterliegenden deutlich unterscheidet, welcher von ihr bedeckt wird. Die dunklen Umrandungen vieler Zellen werden als Kreislinien gesehen, die sich schneiden. Bei Beleuchtung von oben erscheinen sie weiss, mit lichtem, silberglänzendem Saume. Ein Unterschied von Zellenwand und flüssigem Inhalte ist nicht zu bemerken, so sein ist die erstere. Durch Behandlung mit Aether lässt sich das Fettcontentum der Zellen ausziehen, und die Zellenmembran bleibt unversehrt zurück. — Beginnt die Fettzellen zu trocknen, so wirkt die Zellenmembran, deren Feuchtigkeit verdunstet, nicht mehr isolirend auf den Inhalt, - letzterer schwitzt als fetter Tropfenbeschlag an der Oberfläche der Zelle heraus, und fliesst mit ähnlichen Fettperle der nahen Zellen zusammen. Dieses aus seiner Zelle gewichene Fett hat nie die Form der Zelle, sondern erscheint linsenformig, als schillerndes sogenanntes Fettauge (wie auf den Fleischbrühen, in der Milch, im Chylus, im Eiter, und unter besonderen Umständen auch in den Secreten). Essigsäure und Mineralsäuren, welche der Zellenwand ihre Feuchtigkeit entreissen, wirken auf ähnliche Weise. Mit dem Compressorium (einer Vorrichtung zum Abplatten mikroskopischer Objecte

nuren nethousenen Druck bemerkt man, dass die Zellen einen zienlichen tenek ausnatien, onne zu matten, mat wenn der Druck nachlässt, ihre frühere vertatt vierter innenmen, orausgeseint, tass das Fett nicht gestockt ist. In neutwern Zellen innet nam teost tem Fettinialte noch einen runden, an der Zellenwanst mittegenten Korn. Die soemförmigen Figuren an der Oberfläche ser Fettzelle wenne Handamen neutweistete. J. Vogel und Valentin sestatusten, wurden om inem Kattierson für krystallinische Gebilde gehalten Steatinarestade. Dies Unaufositenkeit in Aether steht dieser Annahme entzeten, ihn ause sie teim Dachs um Sebenschläfer sehr ausgezeichnet anzerroßen, und beim seunodännischen Striuss in beiden Polen derselben Fettzelle as Korstallerson von 3-20 Strinten gesehen.

Das Kingengen nicht. Mentitz gesone, stimmt in jeder Hinsicht mit der zestenenen Besonrenbung des Forgeweges überein, und ist somit Fett, und nicht für aus den inner ist konnenmark auch unmöglich empfindlich sein, wie nam in geschinntenen Leben neunt. Das Trocknen der Knochen mit der Bleiche weginnen ihr Wissergemalt der Knochensubstanz verloren zent, und erztere unt ihm von ihr Varsachlie mis in sie einfringenden Fette mortigner wirt, asst sie bestahb oft fett werden, während sie es im frischen Listunge nicht zu sein seinenen.

les Unieren common unen herige Fitturien bei den Volgeln unter der dant bei Sannaners inn der Fisse, in der Iris und Bettina vor, und die Fettobsonderung immit sinon versonischen Charakter in, wie im Larvenzustande der niseiten, der den Bautwogeln dem Winter und bei den Winterschläfern.

hisfilitetiener landeln R au algem. Cat. pag. 399. sepp. Schrenn, mikroskon. Thersteiningen. 1830 aug. 140. Durstelling der Fettrellen als Primitiviellen. Falente, im Bandworderbiene ier Physiol. Art. Gewebe. pag. 140. ind in seinem Louisdache der Physiologie. L Bil. pag. 773. wo auch ne chemischen Fortallinse asserer worden. Die erste genane Unterschung ies Fettreisenes teitere Lasgard in Browker. Bonert, gener. Fom. III. 1827. hag. 1935. The erste verlege Barsteilung des knochenmarks als Fett. mit Absteinungen ier Fettriäsenen, qui Physiologischen ihr dissum mediala. Lips., 1937. tall is mer noch mitter nach noch besteilt ihr ein Nutrimermung ausmin. — Jacoberum 1900 ion dissologischen Nation der Fettrieblen. in der Leitsenend für wess. 2001. 2 Bal. 5, 118.

& 24 Pigment.

Die Furden der Organe hangen tieses von ihrem Geweite, von der Sestant und der Zusammendigung ihrer Keunsten Thedeben, von ihrem Abnurschutum der durchscheutendichen Gebähden und von der Firdung der Interage der von auen desanderen schesskamigen un Zeilen eingeschausenen Filde die der Oberhaus des Segen, und im Auge über weiten inden son under der Oberhaus des Segen, und im Auge über Benscheuten us sunduche Printung der Keunsten Benschause unschen nicht dem Zeiten sind der Firdung der Keunsten Benschausen son der Ankantung des Brunden wirt. Die Benschutze und ihr Hou, die dasseren Gemanden und die Aberdenend, sind dandig dunke pagmennen in den Schenken des geweiten gemannen dem Langensubstand, im

den Ampullen der Bogengänge des Labyrinthes (nach Wharton Jones) wird dunkles Pigment abgelagert. Die Sommersprossen (*Ephelides*) und Leberslecke (*Chloasmata*) verdanken ihr Entstehen derselben Ursache, und nur von dem durch die Sonne gebräunten Teint der Südländer ist es noch unentschieden, ob er durch chemische Veränderung der Oberhaut, oder durch Pigmentbildung bedingt wird.

Anatomische Eigenschaften. Man unterscheidet an den Pigmentzellen (wie an allen Zellen) Hülle und Inhalt. Die Hülle besteht aus einem durchsichtigen, structurlosen Häutchen, welches entweder polygonal (meistens sechseckig), oder rundlich ist, oder mit ästigen Fortsätzen besetzt erscheint. Liegen mehrere Pigmentzellen dicht gedrängt in einer Fläche neben einander, so platten sie sich gegenseitig ab, und nehmen die polygonale Form an, wie an der concaven Fläche der Aderhaut des Auges, und unter der Oberhaut des Negers. Rücken sie etwas weiter aus einander, so fällt die Ursache des Eckigwerdens weg, und sie erscheinen rundlich, wie auf der hinteren Fläche der Iris, den Ciliarfortsätzen, und in den dunkel-pigmentirten Hautstellen weisser Racen. Treiben sie Aeste aus. welche entweder blind endigen, oder mit den Aesten benachbarter Zellen zusammensliessen, so entsteht jene sonderbare Zellensorm, welche im menschlichen Leibe besonders in der Lamina fusca des Auges, bei Thieren dagegen häufiger vorkommt. (Hieher gehören die Pigmentslecke in der Haut der Frösche, die gestrichelten oder gesprenkelten schwarzen Flecke im Peritoneum vieler Amphibien, in der Haut der Kalkschale der Krebse, in der allgemeinen Decke der Cephalopoden - Wagner's Chromatophoren.) Die eckigen Pigmentzellen erscheinen, wo sie sich nicht schichtweise decken, durch helle Streisen von einander getrennt, welche theils der durchsichtigen Zellenwand, theils dem formlosen Gewebe, in welchem die Zellen eingebettet sind, entsprechen. Die Grösse der Zellen variirt zwischen 0,005" und 0,008". Der Inhalt der Pigmentzellen ist eine körnige Masse, deren kleinste Theile (Pigmentmoleküle) nur 0,0003"-0,0006" gross sind, und entweder frei und zusammenhangslos, oder in Klumpen gehäust herumschwimmen, wenn eine Zelle platzt oder zerdrückt wird. Diese Pigmentkörnchen zeigen im freien Zustande lebhaste Bewegungen (Brown'sche Molecularbewegung), und scheinen ihre Form während der Dauer der Beobachtung zu ändern. Die Formänderung ist jedoch nur scheinbar, da ein Molekül bei seiner lebhasten Bewegung sich von verschiedenen Seiten zeigt. Schwann will die Bewegung selbst im Inneren der Zellen gesehen haben, was nur unter der Voraussetzung möglich wäre, dass die Zelle nebst den Körnchen auch Flüssigkeit enthielte, oder die Zellen nicht mehr ganz frisch waren. Fast in allen Pigmentzellen findet sich ein von den Körnern theilweise verdeckter, heller und durchsichtiger Kern von 0,003" Durchmesser.

Chemisches Verhalten. Die Pigmentzellen sind in Essigsäure löslich, im Wasser platzen sie gerne, und entziehen sich durch Entleerung

inres lubaltes der Reubschtung. Die Pigmenthörner sind under durch Wasner noch durch concentrate Essignare. Acther oder verdiente Mineralsaurez nessioner. Ituret tanstische Alkalien werden sie beld aufgelöst.

Auch 5 hebbet 5 Analise besieht das Pigment im Rindsunge aus: 58.284

Procont komenstoff. 55 mit Samerstoff. 13.765 Stickstoff. 5.916 Wasserstoff.

Loper die 11 estate au n. de Bestimmung des Pigments sind wir nur in Auge innermediet we es aus demochen optischen Grunde geschaften wurde aus weichen mar alle Perspective und Mitroshope an der Innenflörte schwarzt. Die besondung der Mautpigmente, welche hei vielen Timmen ein aussenst erhantes Commit bestinen, liegt ganz im Bunkel. In gewissen kronditen is wird das schwarze Pigment im gründeren Massen angehauft. Diesenss s

1 groupe en ger l'except une . Nan withle des Figurent der Chorames in on the signs of artefaces. Theorem, welches such and Carmida in grouptel many bed and one often comment fresh. John Breck and joke Lagrum blusset singuitig emmenter wertet i de die Zellen leicht gletzen, und de teder las comercios l'hennessis nur in unversebrie Latinde des Operts de tecche per sinc. Mar vermente auch, wenn min meht gerale de Mosentianiew einig der Dirmettieren sehen will, jedin Wisserweit, une tentene set une ferenciatura tentes uns frischen Essente. En die verment, versien, Se ets leuten dam as kupelige, oder plette lingliche horper not to a rest of action in Males, this dressal garaging Breite. tie bemeine de les binnen son au einer Tole umgebe, obre die Zelle ibr Figures comercie mass solds telativisme women date in the legic side quere eine gem talige einer tartinge lebe touter inn deren ben sich die Furtherin comments and a first more interest the traditionageschion Paymenton sich maers of term to businesses enders und dans est de Court and other Telescopes reservoired by the discussion interesant, has, von der Albument, die Zellen neuen der Albument, die Zellen ne Total Control of Control of the Cont

the second femily of the impositive policy time, not transmit Paradition of the Indian Community of Maskellasers at welcar artists of the femiliar of the community of the femiliar of the community of the commun

There we are the first than the firs

\$ 27 Annuary of Lemente Licenschafter as Barngewoler.

Le ten franzischen seinen mies die Louisemme frage Nagel, und

Das Horngewebe, Tela cornea, begreist in sich alle an der äusseren Oberfläche des thierischen Leibes, oder an den inneren freien Flächen von Höhlen, Kanälen, und Röhren, vorkommenden Deckschichten, lässt sich, wenigstens in seinen jungeren Zuständen, auf Zellenbildung reduciren, und schliesst sich demnach naturgemäss an das Fett- und Pigmentgewebe an. mit welchen beiden es sich gerne vergesellschaftet. Das Horngewebe erscheint an der freien Oberstäche von Häuten, welche den Stoff zu seiner Bildung hergeben (absondern). Am stärksten entwickelt findet es sich auf der äusseren Bedeckungshaut des Leibes. - In den Fett- und Pigmentzellen waren Zelle und Inhalt verschiedene Dinge. Im Horngewebe füllt sich die frische junge Zelle, von der Hülle gegen den Kern, mit einem der Hülle gleichartigen sesten Stosse nach und nach so an, dass die Zellenhöhle verschwindet. Dabei wird die Zellenwand trübe und endlich undurchsichtig. erhärtet oder verhorut, und ist in diesem Zustande durch Essigsäure nicht mehr auflösbar. Was aus dem Kern der Zellen wird, ist unbekannt. de die mit der Verhornung gegebene Trübung der Zelle ins Innere derselben keine Einsicht erlaubt. Die Zelle verliert während des Verhornungsprocesses ihre Fülle und Rundung, und wird zuletzt zu einem trockenen spröden Scheibchen oder Blättchen, welches mit seinen Nachbarn zu einer mehr oder weniger beträchtlichen Hornschichte verschmilzt, an welcher keine fernere lebendige Umbildung, höchstens mechanische Abnützung durch Reibung, oder Abfallen durch Verwittern, beobachtet wird. Das halbslüssige Blastem, in welchem sich die jungen Hornzellen bilden, erleidet dieselbe Erhärtung, wie die Zellen, und dient, wenn es ebenfalls vollkommen vertrocknet und verhornt ist, den Scheibchen und Blättchen zum sesten Bindungsmittel. Dieses Bindungsmittel wird durch verdünnte Schwefelsäure aufgelöst, wodurch die Scheibchen (welche ihr widerstehen) sich lockern und endlich trennen. - In jedem äusseren Horngewebe, welches mit der Lust in Berührung steht, und nicht durch schleimige oder wässerige Flüssigkeiten gebäht wird (wie die an der inneren Oberfläche der Körperhöhlen befindlichen), werden alle Stadien der Verhornung angetroffen. Geht von den älteren, bereits abgelebten Schichten eine durch Abblättern verloren, so wird durch neuen Nachschub frischer Zellen von unten, der Defect wieder ausgeglichen. Jede tiefe Schichte muss somit einmal die oberste werden, um ebenso abzufallen, wie ihre Vorgänger.

Die chemische Grundlage der Horngewebe bildet das Keratin (Hornstoff), — ein eiweissartiger Körper (§. 14). Derselbe ist in kaltem Wasser unlöslich, schwillt bei längerem Befeuchten etwas auf, erweicht sich durch Einwirkung von Alkalien (daher der allgemeine Gebrauch der Seife beim Waschen), löst sich aber selbst nach langem Kochen nicht auf. Alkohol und Aether lassen ihn unverändert; kaustische fixe Alkalien lösen ihn unter Entwicklung von Ammoniakgeruch auf. Bei 100° R. erweicht sich der Hornstoff, liefert bei trockener Destillation sehr viel kohlensaures Ammoniak mit empyreumatischem Oele, verbrennt unter Luftzutritt, und hinterlässt

one history weighe holdensouren und phosphorsauren Kalk, nehet einem kanterie annephorsauren Autrons geebt.

Jan Harmorwebe empinsiet meht, hat keine eigene Bewegung, besitzt weter Blumpflisse meh Nerven, kann sich somit weder entzünden, noch emmerzen, meh regeneiwe durch sich seilest erkranken, und zeichnet sich mern seine prompte Begeneration vor allen übrigen Geweben aus. Als einer mer Wirme- mier Eicktrottitsiester eletzterer nur im trockenen Zusante muss es als eine Art Isolator des Organismus angeseben worden.

in der Wirbeitherweit ist das Horngewebe sehr weit verbreitet: Hörder deweihe. Kinnen, Huse, Haure, Borsten, Stacheln, Schuppen, Schilder,
die Hornschnäbei der Vogel, die Barten der Walltische, die Kiefer der Cephatonowien, die Magenzähne weier Mollusken etc., gehören ihm an. Im
Mensenen erscheint es unter zwei Hauptformen: als inneres und äusdere. Die inneren Horngewebe erscheinen als Leberzüge der freien
Flachen der Schiem- und serösen Häute, und aller geschlossenen Höhlen,
nteinen immer im Zustande der Weichheit und Durchsichtigkeit, und häufen
men aucht im allgemein in mehrfachen Schichten über einander an, wie
die insseren Oberhaut, Haure, Nigel, welche durch ihre Compactheit und
Mächtigkeit zu treiffichen Schutznutteln, und bei Thieren durch besondere
Entwicklung zu fürchtbaren Angertis- und Vertheidigungswaffen werden.

Die Unterurten des ausseinen oder compacten Horngewebes, als: Oberhant, Nagel, Haure, so wie das aussere Hautorgan, mit welchen sie in so inniger Verbindung stehen, habe ich, gegen den zewöhnlichen Gehranch, in die specielle Anatomie aufgenommen. Die Beziehungen des Hautorgans in den Sinnen und den Eingeweiden bestimmten mich zu dieser Abweichung. Es erübeiget hier sount nur die Schilderung der inneren Horngewebarten, welche unter dem Sammelnamen der Epatholisen subsummirt werden.

§ 26. Epithelien. Arten derselben.

Jede freie Fläche einer Membran, jede Wand einer Höhle, jeder Kaml und dessen Verzweigungen, besttzen einen aus Zellen zusammengesetzten inneren Ueberzug (Epitheimm, von è i) te rekeg, auf der Endfläche, sollte also Epitelium geschreben werden, welcher theils als einfaches Zellenstratum, theils als mehrfach geschichtetes Zellenlager erscheint. Jede Zelle besteht aus einer geschlossenen Hülle und einem Kern. Form und chemische Zusammensetzung der Zellen ändert sich nach Verschiedenheit des Ortes, wo sie vorkommen. Der Kern existirt vor der Hülle, und letztere bildet sich erst secundär um ihn herum. Der Kern erscheint bei grossen Vergrößerungen mit einem oder zwei dunkleren Körnehen Kernkörperchen, versehen, und liegt selten in der Mitte der Zelle, meistens an oder selbst in der Wand derselben. Gelingt es, eine Zelle zu zersprengen, so tritt der freie Kern heraus (Vogel), und war die Zelle abgeplattet, so bildet der Kern an beiden Flächen derselben einen Vorsprung. Die

Grösse des Kerns variirt von 0,001" bis 0,005"; die Zelle schliesst ihn entweder knapp ein, oder übertrifft ihn um das 6-8fache an Volumen.

Man unterscheidet folgende zwei Arten von Epithelien:

- a) Das Pflasterepithelium wird, seines mosaikartigen Ansehens wegen, so genannt. Seine Zellen sind ansangs rundlich, slachen sich später durch gegenseitigen Druck ab und werden eckig. Ihre runden oder ovalen Kerne sind bei rundlichen (jungen) Zellen von der Hülle dicht umschlossen, entsernen sich aber durch das Wachsthum der letzteren von ihr, und der Raum zwischen Zelle und Kern wird entweder mit einem slüssigen, gleichartigen, oder körnigen Depositum gefüllt. Das Pflasterepithelium ist weiter verbreitet, als die übrigen Epithelialformen. Es findet sich an den freien, glatten Flächen aller serösen Membranen, und an der inneren Oberfläche der Blut- und Lymphgefässe und der Drüsenausführungsgänge als einfache, zierliche, nur mit dem Mikroskope erkennbare Zellenschichte, ebenso an gewissen, zarten Schleimhäuten (Trommelhöhle, Drüsenkanäle); mehrfach geschichtet erscheint es an gewissen Synovialhäuten, und an bestimmten Strecken des Verdauungs- und Zeugungssystems wird es so mächtig, dass es durch Maceration in grösseren oder kleineren Stücken abgezogen werden kann (Schleimhaut der Mundhöhle, des Rachens, der Speiseröhre, der weiblichen Scheide). In der Harnblase, den Harnleitern, den Nierenbecken und Nierenkelchen, kommt es ebenfalls mehrfach geschichtet, aber mit geringerer Mächtigkeit vor. Werden die Zellen zu flachen und breiten Blättchen, so heisst diese Form Plattenepithelium. - Die auffallendste Entwicklung erreicht das Epithelium an der inneren Fläche des Magens der körnerfressenden Vögel, wo es zwei sich gegenüberstehende, harte. dicke, hornige Platten bildet, die wie Mühlsteine gegen einander wirken, und die mechanische Zerreibung der Nahrung vollbringen.
- b) Das Cylinderepithelium entsteht durch Entwicklung und Wachsthum der ursprünglichen, runden Zellen, nach einer Richtung, welche senkrecht auf der betressenden Hautsläche steht. Die einzelnen Zellen stehen der Länge nach neben einander gelagert. Sie sind keine Cylinder im mathematischen Sinne, da jenes Ende, welches die darunter liegende Haut berührt, schmal, das gegen die Höhle gerichtete, von der Unterlage abgewendete Ende breiter ist. Die Cylinder sind also eigentlich abgestutzte Kegel. Da auf einer Ebene aufgepflanzte Kegel sich nicht allseitig berühren, so bleiben zwischen den schmäleren Theilen der Kegel Räume übrig, in welchen sich junge Zellen entwickeln können (Gerlach). Der Kern der Zelle liegt in der Mitte, zwischen dem schmalen und breiten Zellende, und ist zuweilen so ansehnlich, dass die Zellenwand dadurch herausgewölbt wird, wodurch die Cylinderform noch mehr beeinträchtigt wird, und bauchig erscheint. - Das Cylinderepithel findet sich im Darmkanale, vom Mageneingange bis zum Aster, in den Ausführungsgängen aller in den Darm einmündenden Drüsen, in den Milch- und Thränendrüsen, den Samenbläschen, dem Vas deferens, und in der Harnröhre, also nur auf

Schleimhäuten. Es setzt sich in alle Drüsenausführungsgänge fort, welche in die genannten Schleimhautschläuche münden. Die Ausstährungsgänge der Speichel- und wahrscheinlich auch der Thränendräsen besitzen Cylinderepithelien. Der Uebergang des Pflaster- in das Cylinderepitheliem erscheint nur an den Mündungen der Speicheldrüsen plötzlich, sust wird er durch Zwischenformen (Uebergangsepithelium, Henle) vorbereitet. Unter den Cylindern finden sich öfters jüngere Zellenformationen als rundliche Bläschen; auch erscheinen zuweilen cylindrische Zellen mit Pflesterzellen gemengt, wie an der Conjunctiva des Auges. Der Umstand, dass man zuweilen auf cylindrische Zellen mit zwei Kernen stösst, kan, seiner Seltenheit wegen, nicht als Beleg der Ansicht dienen, dass sich die Cylinderzellen durch Uebereinanderstellen von Pflasterzellen, und Resorption der Zwischenwand, entwickeln.

Eine besondere Unterart des Cylinderepithelium ist das Flimmerepithelium. Denkt man sich auf dem breiten, freien Ende eine benchigen Cylinderzelle 6-20 kurze, helle, platte und spitzige, äuserst feine Fädchen aufsitzen (Cilien, Flimmerhaare), welche während des Lebens, und selbst eine geraume Zeit nach dem Tode, in wirkelder Benegung sind (flimmern), so erhält man die Form einer Flimmerzelle. (Bei niederen Thieren kommen an verschiedenen Stellen, stat der Finmerzellen, blos vibrirende Fäden vor.) — Die flimmernde Benegung ist sehr rasch und lebhaft, und gleicht, wenn man eine größere int vierendem Epithelium überzogene Fläche unter dem Mikroskope betrackt, jeuen Wogen und Wirbelu, die man auf einem hochgewachsenen Kornfelle sicht, wenn der Wind darüber wegstreicht. Die Aggregate der Flimmerzellen zum Flimmerepithelium finden sich:

- 1. auf der Schleimhaut, welche die respiratorischen Wege ausbeidet, und zwar: α. in der knöchernen Nasenhöhle, von wo es in die Thrianwege eintritt, in den Thränenröhrehen durch Pflasterepithelium ersetzt wird, und an der hinteren Fläche der Augenlider wieder als finneral auftritt (?:: β. in dem oberen Ende des Pharyny, von wo es in die Tuber Eustachü eindringt; γ. im Kehlkopfe, wo es unter der Epiglottis beginnt, und durch die Luftröhre und deren Verzweigungen sich fortsetzt.
 - 2. auf der Schleimhaut des Uterus und der Tuben.
- 3. auf dem häutigen Ueberzuge der Gehirnkammern bei Emberens. (Bei Erwachsenen ungewiss, nach Hende, welcher es an einem 15 Kennach dem Tode untersuchten Verbrecher nicht beobachtete.)
- 4. In den Anfängen der Harnkanalchen eim Menschen noch nicht sicherzestellt, sehr deutlich beim gefleckten Salamander, und nach Gerlach in der Froschniere. Die Richtung der Bewegung ist wohl algemein zegen die Endmündung des betreffenden Kanals gerichtet, also in den Athmonisorganen nach oben, in den Geschlechtswegen nach Henre sah ein auf die Luftröhrenschleunhaut einer noch warmen Leiche gerichteten Verbrechers gelegtes Häufehen von Kohlenpulver kinnen.

15 Secunden um die Breite eines Knorpelringes durch Flimmerbewegung fortgeschafft werden.

Was die Form der Bewegung der einzelnen Härchen anbelangt, so ist diese bei den Säugethieren ein einfaches Hin- und Herschwingen, etwa wie ein elastischer Stab, der an einem Ende besetigt, an dem anderen aus der Gleichgewichtslage gebracht wird. Hacken- und peitschenförmige Bewegungen der Flimmerhaare kommen bei Mollusken, Bewegungen in einer Kegelsläche bei den Räderthierchen vor. — Flimmerbewegung sindet sich auch bei sehr niedrigen Psianzen.

Mikroskopische Behandlung. Um das einfache Pflasterepithelium kennen zu lernen, reicht es hin, mit dem Scalpelle über die freie Fläche einer serösen Membran, gleichviel welche, leicht hinzustreifen, und die abgeschabte schleimige Masse auf den Objectträger zu bringen, sie mit Speichel oder Blutserum zu beseuchten, auszubreiten, und mit einem dünnen Glasoder Glimmerblättchen zu bedecken. Man wird einzelne rundliche Zellen und mosaikartige Aggregate derselben zur Ansicht bekommen. Die Aggregate zerfallen, wenn sie jüngerer Formation sind, durch Zugabe von Essigsäure (welche das Bindungsmittel der Zellen löst) in einzelne Zellen. Um mehrfach geschichtetes Pflasterepithelium und die Metamorphosen der Zellen in den alten und jungen Schichten zu studiren, erwählt man eine dunne Schleimhaut (am besten die Bindehaut des Augapfels), praparirt sie ohne viel Zerrung los, und legt sie einmal so zusammen, dass die äussere (freie) Fläche auch nach der Faltung die äussere bleibt. Mit derselben Behandlung durch Anfeuchtung und Bedeckung, wird das Object so in das Sehfeld des Mikroskopes gebracht, dass man den Faltungsrand sieht, an welchem die verschiedenen Entwicklungsgrade der einzelnen Schichten, bei Veränderung des Focus, ganz befriedigend untersucht werden können. Das Compressorium leistet hiebei vortreslliche Dienste. Hat das zu untersuchende Epithelium eine sestere Unterlage (Hornhaut des Auges, Haut, Drusenschläuche), so können dunne Schnitte desselben, mit Valentin's Doppelmesser (welches vor dem Schnitte in Wasser getaucht wird) bereitet, eine sehr belehrende Profilansicht im Aufriss gewähren. Das Cylinderepithelium erscheint, von der Fläche geschen, als Pflasterepithelium. Nur die Seitenansicht lässt die wie Basaltsäulen neben einander gelagerten cylindrischen Zellen erkennen. Am besten eignen sich hiezu die Darmzotten eines ausgehungerten Säugethieres. An menschlichen Leichen sind die Epithelialcylinder der Darmzotten theilweise abgefallen, und man thut besser. feine Querschnitte der einfachen Drüsen des Dickdarms auszuwählen, an welchen die cylindrischen Zellen, von der Drüsenwand gegen das Lumen derselben gerichtet, wie Radien eines Kreises, dessen Mittelpunkt die Ilöhle der Drüse ist, gesehen werden. Essigsäure macht die getrübten Zellenwände durchsichtiger, und die Kerne deutlicher.

Die Zellen des Flimmerepitheliums sind leicht zu beobachten, wenn man irgend eine flimmernde Schleimhaut (Luftröhrenschleimhaut frisch geschlachteter Thiere) abschabt, und den Brei, nachdem er verdünnt, unter das Mikroskop bringt. Bei Kindern fehlt es im Sexualorgan. Die isolirten birn- oder keulenförmigen Flimmerzellen, mit ihren grossen Kernen und einer Krone von Flimmerhaaren am breiten Ende, sind bei einer Vergrösserung von 750 ohne Mühe zu erkennen. Um das überraschende Schauspiel des Flimmerns zu beobachten, eignet sich ganz vorzugsweise die Rachenschleimhaut der Frösche, welche (wie oben die Conjunctiva des Auges) gefaltet, und der Rand der Falte im Sehfeld

fixirt wird. Ich bediene mich zu den Schuldemonstrationen lieber der Zungenspitzen kleiner Früsche, welche leicht abzutragen sind, und da sie nicht gefaltet zu werden brauchen, um einen freien Schleimhautrand zu erhalten, das Phänomen in seiner ganzen Pracht selbst für den ungewandten Zuschauer genussbar machen. Die durch die Wimperbewegung, wie durch Ruderschläge, erregte Strömung des Wassers, welches das Object umgiebt, und in welchem abgefallene Epithelialzellen oder Blutsphären fortgerissen werden, leitet den Neuling zuerst auf die Fixirung des Flimmeractes. Im Nasenschleime, den man mit einer Feder aus den tieferen Partien seiner eigenen Nase herausholt (E. H. Weber), zeigen die Flimmerzellen ihre Cilien, und zuweilen ihr mehr weniger lebhaftes Wimperspiel ganz deutlich. Im Gehörorgane der Pricke wurden Flimmerbewegungen von Ecker entdeckt. Auch wimpert die äussere Haut sehr vieler niederer Thiere — selbst die Sporulae gewisser Algen (Vaucheria clavata).

§. 27. Physiologische Bemerkungen über die Epithelien.

Bei dem gegenwärtigen Zustande der Physiologie ist die Vorstellung, als seien die Epithelien weiter nichts als ein schützender Ueberzug der darunter liegenden Schleimhautslächen, nicht mehr zulässig. Das selbstständige Austreten des Kernes, dessen Umhüllung durch eine Zelle, die Metamorphosen, welche diese durchmacht, sprechen zu deutlich für einen besonderen Lebensact in diesen Gebilden, als dass man sie noch länger für einen todten Auswurfsstoff der Membranen, welche sie bedecken, ansehen könnte. Ihre Existenz ist insofern an diese Membranen gebunden, als letztere mittelst ihrer Blutgefässe den Stoff hergeben, in welchem sich die Kerne und sofort die Zellen bilden. Das Zellenleben selbst dagegen kann, wenn es einmal erwacht ist, von jenen Membranen aus nicht absolut beherrscht werden.

Das Abfallen der Epithelien, und die entsprechende Neubildung derselben, ist ein sehr weit verbreitetes, aber dennoch - wie es scheint kein allgemeines Phänomen. Die Flimmerepithelien unterliegen, so viel wir aus den jetzt vorliegenden Beobachtungen entnehmen können, dem Abfallen weit weniger regelmässig wie das Cylinderepithelium des Magens, welches sich während der Verdauung ablöst, oder jenes der Gebärmutter, welches während der Reinigung gewechselt wird. Allerdings enthält der während des Schnupfens reichlich abgesonderte Nasenschleim, und der Auswurf aus Kehlkopf und Luströhre, einzelne Flimmerzellen; diese scheinen jedoch, ahgesehen von den krankhasten Bedingungen, unter welchen sie ausgeleert werden, mehr auf mechanische Weise von dem Boden losgerissen zu werden, auf welchem sie wurzelten, als durch physiologische Processe abgelöst worden zu sein. - Viel häufiger sind Fragmente der eckigen und cylindrischen Zellen in allen Absonderungsstoffen, und werden im Schleime, in den Thränen, im Speichel, der Galle, dem Samen, dem Harne etc., in nicht unbedeutender Menge gefunden. Bei den Epithelien der geschlossenen Höhlen kann der Wechsel nicht mit Abfallen oder Abstossen im Ganzen, sondern wahrscheinlich nur mit Auflösung und Aufsaugung der älteren Formationen im Zusammenhange stehen, und muss überhaupt sehr langsam von Statten gehen. — Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Zellen, welche die innere Oberstäche der Drüsenkanäle einnehmen, an dem Absonderungsprocesse wichtigen Antheil haben. Kommen die Absonderungssäste aus dem Blute, so müssen sie, bevor sie in die Höhle des aussührenden Drüsenkanals gelangen können, sich durch mehr oder minder mächtige Zellenschichten durchsaugen, und erleiden durch die Einwirkung der Zellen jene eigenthümliche, freilich noch ganz unbekannte Veränderung, durch welche sie die Qualität eines bestimmten Secretes annehmen. Das Zellenleben hätte insosern einen bestimmten Einsluss auf die Art der Absonderungsproducte, welchen wir vor der Hand mit dem Worte "metabolische Krast" bezeichnen.

Die Flimmerbewegung, welche selbst nach Trennung der Zelle vom Organismus fortdauert (bei Fröschen, denen das Gehirn exstipirt war, 3—5 Tage nach dem Eintrocknen des Thieres in der Sonnenwärme; bei Schildkröten 8 Tage nach dem Tode noch bemerkbar ist), ist der sprechendste Beleg für die Lebendigkeit der Zelle. Die Organe dieser Bewegung der Wimperhaare, ihre Natur und ihre physiologische Bestimmung sind gänzlich unbekannt. Dass die Richtung der Flimmerbewegung gegen die Ausgangsöffnung der Schleimhaut gerichtet sei, gilt wohl für viele, aber nicht für alle Schleimhäute, und dass durch die Flimmerbewegung der Schleim an den Wänden der Schleimhäute gegen die Ausmündungsstelle derselben fortgeführt werde, ist eine für so zarte Kräste sehr rohe Arbeit. Auch müssten dann alle Schleimhäute Flimmerzellen besitzen. Die Nervenkrast bleibt bei den Flimmerbewegungen ganz aus dem Spiele, da die Erscheinung nach Zerstörung des Nervensystems, oder, was dasselbe sagen will, nach Herausnahme der Zelle aus ihren Verbindungen, fortdauert.

Literatur der Epithelien.

Die der Histologie der Epithelien zu Grunde liegende Zellenmetamorphose, welche erst in neuerer Zeit bekannt wurde, macht die altere Literatur ganz wohl entbehrlich. Purkinje hat durch seine und durch die Arbeiten seiner Schüler diesem Fache die Bahn geöffnet, und durch die Entdeckung der Flimmerbewegung das Wichtigste schon am Anfange geleistet. Purkinje et Valentin, de phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii etc. Vratislaviae, 1835. 4°. Henle stellte die Zusammensetzung der Epithelien aus Zellen für alle Formen fest in seinen: Symbolae ad anatomiam villorum intestin. Berol., 1837, und bewies in einem späteren Aufsatze (über die Ausbreitung des Epithelium im menschl. Körper, Müller's Archiv, 1838), die Beständigkeit des Vorkommens der Kernkörperchen. Hieher gehört noch: Henle, über Schleim- und Eiterbildung, und ihr Verhältniss zur Oberhaut, in Hufeland's Journal. 1838. -Durch Schwann's mikroskopische Untersuchungen etc. Berlin, 1839, wurde der Zellenbau der Epithelien mit dem allgemeinen Entwicklungsprincip der Gewebe aus Zellen in Einklang gebracht. Die histologischen Werke von Henle und Kölliker, so wie der Artikel "Gewebe von Valentin in Wagner's Handwörterbuch der Physiol., enthalten die übrige Literatur. Ueber Flimmerbewegung giebt in demselben Handwörterbuche Valentin einen höchst vollständigen, alle Beobachtungen an Menschen und Thieren enthaltenden Außatz.

Be physionerschen fandhumen für J. Miller und R. Wagner und chenklis wert desen Prinz, fein in Assamfier, so We der Arthei "Liber in Toda"s. 1 movema o. manon f. dat. Phys. mag.

4. In Austrigen eine Limitatische Ligenschaften des Austrigen eines

Independent of the second base o

John Misser brothe one gradered \$111.0.1 Section measures, to the anti-order barner brother consideration, other stal it residentials, measure will statement beautiful transfer order. John Statement and constitution of the con

In Minister Head Dan Girmitter bie ifterben er ben.

menter agreement with the properties of the control of the control

Is the manufactor of the parties of the second of the seco

werden durch zahlreiche Querstreisen geschnitten, welche unter einander parallel, und zur Längenstreisung mehr weniger senkrecht sind, um den ganzen Umfang einer Faser herumgehen, und einander so nahe stehen, dass ihre Abstände kaum 0,0005" betragen. Wodurch die Querstreisen entstehen, ist noch nicht ausgemacht. Dass sie einer continuirlichen, um die secundare Faser herumlaufenden Spiralfaser (Mandl), oder Ringbandern (Gerber, Skey) angehören, ist nicht anzunehmen. Erwähnung verdient die von Schwann und J. Müller ausgestellte, von Valentin modificirte Ansicht, dass die Querstreisen der optische Ausdruck einer knotigen (varikösen) Beschaffenheit der Primitivsasern seien. Sind die Primitivsasern knotig, so werden ihre Ränder wellenförmig gebogen sein. Die Wellenberge aller Primitivsasern, so wie deren Thäler werden, wenn sie der Breite nach einander entsprechen, den optischen Eindruck einer Querstreifung bedingen. Will leitet die Querstreifung von der Zickzackbiegung der Muskelfasern ab (Müller's Archiv. 1842. p. 353). Bowman hält die guergestreiste Muskelfaser für eine Säule an einander gereihter Scheibchen (wie eine Geldrolle), - eine Ansicht, die etwas für sich hat, da die Querstreifen nicht blos oberstächlich auf der Muskelfaser ausliegen, sondern durch ihre ganze Dicke gehen, wovon man sich leicht überzeugt, da bei mikroskopischer Untersuchung geringe Aenderungen des Focus, das gestreiste Aussehen nicht verschwinden machen. Da man jedoch diese Scheiben nie an frischen, sondern immer nur an chemisch veränderten secundären Muskelfasern beobachtet, drängt sich die Idee einer künstlichen Erzeugung derselben unwillkürlich auf. - In der neuesten Zeit hat Barry die Behauptung aufgestellt, dass jede Muskelfaser aus zwei gleichläufigen, spiralig gewundenen Fäden bestehe, deren Umdrehungen die Querstreisen bezeichnen, wofür er durch Kölliker etwas hart zurecht gewiesen wurde.

Wie viele Primitivfasern eine Muskelfaser bilden, ist kaum zu eruiren. Nach beiläufiger Schätzung mögen deren 300—1000 in einer Faser vorkommen. Die kleineren und grösseren Bündel von Muskelfasern besitzen feine Bindegewebshüllen, die von der, den ganzen Muskel umhüllenden Vagina cellularis abgeleitet werden. In der kunstmässigen Ablösung dieser Vagina, von der Oberstäche der Muskeln, besteht das Präpariren derselben.

b) Glatte Fasern finden sich in den sogenannten organischen Muskeln, d. h. in der Muskelhaut jener Schläuche und Behälter, deren Bewegungen vom Willen unabhängig sind: im Verdauungskanale, in der Harnblase, und deren zu- und ableitenden Kanälen (Harnleiter, Harnröhre), den Samenbläschen, der Gebärmutter, der Iris, den Ausführungsgängen vieler Drüsen, den Bronchien der Lunge bis in die Endverzweigungen derselben, in der Milz, in den Wänden der Blutgefässe, selbst in der äusseren Haut, jedoch nur, wo sie Haarbälge enthält, etc. Auch das früher sogenannte contractile Bindegewebe (Note zu §. 19) verdankt seine Zusammenziehungsfähigkeit der Anwesenheit von glatten Muskelfasern, welche in der Brustwarze, in der Dartos, und im Gewebe der Cutis durch Kölliker

mathrewesses ist — Die giatien Musichisert beschen aus hardeligen, somoelferingen, seinn angepratiesen, beseinert verlingeren meellen auch auch auch auch neuen Zehen, ogsen Hülle mit den werden, fiserstoffinge einensteren innahe in eine contractionsläuge Substant ungelindert ist, der dem seinem sie gestallt in der den dem den der den treiterettle Faserzeiten. Die jangestrechter Faserzeiten inner sich verzigsiehen der Mannen der Jeremanns die durzen, ist trombeschen, vorzigsien in der Wander der Arterier in der Drissenausführungsgängen, und im beidensteien der Mitt. — Die giatier Musichläsert intere, inden sie sich in Mehrzan neuen und al emanner lagert, de nur besteht welche einen mitegerenden bestandtheit der Wandunger des bertannischen welche einen mitegerenden bestandtheit der Wandunger des bertannischen der Hartmasse eit ausnachen.

The Minstein and some policier of. The Arteria developes tream general as neutron stolen is so on dringer twisteen des Bindels sente des 21 ones policier Terre vor sonder and une abstracted Acide at words or Langenti frame for linne forcet une out a capillare Zwelle aufford, words de sondicier fason into take une schaulegisteren betrei unstruken, ome in das linner om fason solde einzugelen. — Die bertei stehen of in onen grossen Minstein steren betreit strom solde einze des Binstein deserteit strome berteit betreit strome om Binstein. Some konte Minstein haben of starte sold grosse Binstein deserteit strome om Binstein strome betreit strome des Binstein des Binsteins des Binsteins

Some Locality and Social Constant for Vissons malating Zoninger, Inc. of the sources

The many transport of the later than the property with under detection. It statuted to the my hornite services to be the communities. The Black reproperties a distribution and area of all Marchitecture with being the stretchen between eine beiden auch in bemitten werte mit ment of the submitted the orange of the first of the section weight The of the Market beautiful on the size of the state of the same than and Mile Commercial comes in a company of the Commercial company to the Commercial company of th in the time the server that it is a series of the second location of the an interest of the analysis of the first the first of the first of the same and the metal from the first on the second of the second description and the land of the the second of th as making and the state of the winds. attivit a sia **kissislimen** To the property of the months and the contract of the purpose of the second of the sec with the form has at their fram Exemples, a copie of the ment of Seale earn in the second in the second of the second second in the second seco Anatolic description of the first of the fir as have the same and the same as the same and the same and the

kelfasern, welche keine Capillargefässe zu Begleitern haben, lässt eine gelbröthliche Färbung derselben erkennen, welche ganz genügt, bei solcher Anhäufung von Fasern, wie sie in der Fleischmasse eines Muskels stattfindet, die intensive Färbung des letzteren zu erklären, obwohl nicht zu läugnen ist, dass die Gegenwart des Blutes den Purpur des Fleisches erhöhen kann. Ein durch Wasserinjection der Blutgefässe ausgewaschener Muskel wird wohl blässer, aber nicht weiss. Es kann aber nur das Blut in den Capillargefässen einen Einfluss auf die Röthung des Muskels ausüben; denn der Bestandtheil des Blutes, welcher aus den Capillargefässen ausschweisst, und die Muskelbündel tränkt, ist wasserklar, und enthält kein Atom Blutroth.

§. 29. Chemische und physiologische Eigenschaften des Muskelgewebes.

Durch Maceriren werden die Muskelfasern in ihre Primitivsasern leicht zerlegbar, und verlieren zugleich ihre rothe Farbe, da der ihnen anhängende Farbstoff, welcher mit dem Blutroth identisch zu sein scheint, im Wasser löslich ist. Längeres Verweilen an der Luft röthet sie durch Oxvdirung ihres Farbstoffes, und durch Verdunstung des Wassers; vollkommen eingetrocknet, werden sie schwarzbraun. Durch Kochen werden sie anfangs fester, schrumpfen zusammen, und werden zuletzt wieder weich und mürbe, lösen sich jedoch nicht zu Leim auf. Der Leimgehalt der Fleischbrühen stammt von den Bindegewebscheiden der Muskeln, und von den Sehnen. - Der organische Hauptbestandtheil der Muskeln ist eine stickstoffreiche, dem Faserstoff des Blutes verwandte Substanz, das sogenannte Muskelfibrin oder Syntonin (Lehmann). Aus dem Muskelsleisch lässt sich eine sauer reagirende Flüssigkeit auspressen, aus welcher Liebig und Scheerer eine Summe stickstoffhaltiger und stickstoffloser Körper darstellten, wie: Milchsäure, Kreatin, Kreatinin, Butter-, Inosin-, und Ameisensäure und Muskelzucker (Inosit).

Der grosse Wassergehalt der Muskeln beträgt nach Berzelius 77, nach Bibra 74 Procent. Er ist, nebst der Blutmenge, welche die Muskeln enthalten, die Ursache des leichten Faulens derselben, wobei sich das Fleisch, wie in den Secirsälen täglich gesehen wird, mit einer schmierigen Schimmelwucherung (Byssus septica) bedeckt, unter welcher der Zersetzungsprocess rasch vorschreitet. Trocknen, Räuchern, Einsalzen, sind deshalb die besten Mittel, Fleisch durch lange Zeit vor Verderbniss zu schützen.

Die vorragendste physiologische Eigenschaft des lebendigen Muskels ist seine Zusammenziehungsfähigkeit durch Reize. Sie heisst Irritabilität oder besser Contractilität. Man spricht von inneren und äusseren Reizen. Das durch die Nerven einem Muskel übertragene Geheiss des Willens ist ein innerer, — mechanische, chemische, oder galvanische Einwirkung, wie sie bei physiologischen Experimenten angewandt wird, ein äusserer Reiz. Der continuirliche Strom einer galvanischen Säule versetzt einen Muskel nicht in continuirliche Zusammenziehung, sondern erzeugt nur bei seinem Anfange und Ende (Schliessen und Oeffnen der Kette)

eine momentane Contraction. Ed. Weber hat in dem discontinuirlichen Strome des elektro-magnetischen Rotationsapparates ein Mittel gefunden, die Muskeln in continuirliche Zusammenziehung zu versetzen.

Der durch Haller veranlasste Streit, ob die Irritabilität eine reine Eigenschaft der Muskelfaser, oder durch den Einfluss der Nerven bedingt sei, hat, genau genommen, nicht die Wichtigkeit, welche man ihm zu-Die Möglichkeit einer Zusammenziehung muss in den Kräften des Muskels liegen, welche von seinem Baue abhängig sind, und der Impuls des Willens, diese Möglichkeit in die Erscheinung treten zu lassen, muss durch den Nerven auf den Muskel wirken. Die Gegenwart der Nerven ist also eine nothwendige Bedingung der Abhängigkeit des Muskels von der Seele, nicht aber der Zusammenziehungsfähigkeit überhaupt. Das Herz des Hühnerembryo pulsirt ja schon zu einer Zeit, wo keine Spar von Nerven in ihm zu entdecken ist. - Wird der Nerv eines Muskels durchgeschnitten, so hat der Muskel seine Zusammenziehungsfähigkeit nicht schon im Momente eingebüsst. Sie nimmt aber fortan ab, und nach den Versuchen von Günther und Schön war bei Kaninchen erst am achten Tage nach Durschneidung der Muskelnerven die Irritabilität vollkommen erloschen. - Die Zusuhr des arteriellen Blutes übt, nach Segalas und Fowler, ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf die Irritabilität. Die Irritabilität vermindert sich sogar nach Unterbindung der Arterien schneller, als nach Abschneidung der Nerven. Unterbindung der Aorta abdominalis erzeugte Lähmung schon nach 10 Minuten, und die Ligatur der grossen Stämme der Gliedmassen, welche den Kreislauf nicht einmal vollkemmen aufhebt, äussert eine merkwürdige Einwirkung auf die Bewegungssichigkeit, welche unmittelbar nach der Operation auf ein Minimum reducirt ist, und sich erst mit der Entwicklung des Collateralkreislauses wieder einstellt. Da ein Muskel, wenn er vom Leibe getrenut wird, eine Zeitlang seine Organisation und die davon ausgehenden Kräste behält, bevor er durch die Fäulniss zerstört wird, so wird die Irritabilität auch an ausgeschnittenen Muskeln, oder in der Leiche, kürzere oder längere Zeit sich erhalten.

Ueber das Verhalten der Muskelfasern während der Contraction hat in der neuesten Zeit Ed. Weber die gründlichsten Untersuchungen angestellt, welche in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie niedergelegt wurden. Durch die sinnreichsten, mit mathematischer Präcision angestellten Versuche, wurde bewiesen, dass die von Prevost und Dumas dem Contractionszustande eines Muskels zugeschriebene Zickzackbiegung seiner Fasern, nur während ihrer Erschlaffung eintritt. Die Muskelfaser ist während ihrer Zusammenziehung geradlinig, und wird während ihrer Erschlaffung im Zickzack gebogen, weil die mit ihrer Ausdehnung nothwendig verbundene Reibung auf ihrer Unterlage, keine lineare Verlängerung erlaubt.

Ein contrahirter Muskel wird zugleich dicker. Ist die Zunahme an Dicke gleich der Abnahme an Länge? Wäre dieses der Fall, so bliebe das Volumen des Muskels und seine Dichtigkeit dieselbe. Allein schon das wäh-

rend der Contraction eines Muskels zu fühlende Hartwerden desselben beweist eine Verdichtung, und somit ein Ueberwiegen der Längenverkürzung
über die Zunahme an Dicke. Die Differenz ist jedoch nicht bedeutend,
und kann durch Apparate ausgemittelt werden, wo ein Muskel in einem
mit Wasser gefüllten und mit einer dünnen graduirten Ansatzröhre versehenen Gefässe aufgehangen, und durch Galvanismus gereizt wird. Das
Fallen des Wassers in der graduirten Röhre ist der mathematische Ausdruck für die Volumsverminderung oder Verdichtung des contrahirten
Muskels.

Die quergestreisten und die glatten Muskelfasern zeigen bei Reizung derselben die interessante Verschiedenheit, dass erstere, in demselben Augenblicke, in welchem der Reiz wirkt, sich blitzschnell zusammenziehen, und ebenso schnell erschlassen, letztere dagegen erst eine geraume Zeit nach der Reizanwendung sich langsam zusammenziehen, und ebenso langsam erschlassen. Diese blitzschnelle Contraction des quergestreisten Muskels ist jedoch nicht so buchstäblich zu nehmen, indem Helmholtz fand, dass zwischen Reizung und Contraction eine, wenn auch sehr kurze, dennoch messbare Zeit vergeht. — Die Muskelbewegung ist eine fruchtbare Quelle der Wärmeentwicklung.

Die Empfindlichkeit eines Muskels ist, der geringen Menge seiner sensitiven Nerven wegen, eine geringe. Das Durchschneiden der Muskeln bei chirurgischen Operationen, ihr Auseinanderziehen durch Haken, um zu tieferen Gebilden einzudringen, ist bei weitem weniger schmerzhaft, als der erste Hautschnitt. Die Verhältnisse, in welchen ein Muskel sich befindet, die Reibung, Zerrung, und der Druck, denen er durch seine mechanische Bestimmung fortwährend ausgesetzt ist, wären mit grosser Empfänglichkeit für äussere mechanische Einwirkungen nicht wohl verträglich gewesen. Nichtsdestoweniger besitzt der Muskel ein sehr scharfes und richtiges Gefühl für seine eigenen inneren Zustände, und den Mangel oder Ueberfluss an Bewegungskraft. Es äussert sich dieses Gefühl in seinen beiden Extremen als Ermüdung oder Erschöpfung, und als Krastgefühl. Wir werden uns der Grösse der Contraction in jedem Muskel mit einem solchen, durch Uebung noch zu schärfenden Grade von Sicherheit bewusst, dass wir daraus ein Urtheil über die Grösse des überwundenen Widerstandes - über Gewicht, Härte, Weichheit, Leichtigkeit - abgeben können, und die Muskelbewegung ein nothwendiges Glied des Tastsinnes wird. Unter krankhasten Bedingungen steigert sich die Empsindlichkeit der Muskeln bis zum hestigsten Schmerz, wie bei den tonischen Krämpsen.

Die Ernährungsthätigkeiten, der Stoffwechsel, müssen im Muskelfleische sehr lebhaft von Statten gehen. Der absolute Reichthum der Muskeln an Blutgefässen spricht dafür, und wird dadurch noch bedeutungsvoller, dass er blos dem Ernährungsgeschäfte, und keiner anderen Nebenbestimmung (z. B. der Absonderung, wie bei den Drüsen) gewidmet ist. Häufige Uebung und Gebrauch der Muskeln fördert ihre Ernährungsthätigkeiten. Die Mus-

keln gewinnen dabei an Masse und Gewicht. Ihre Faserzahl wird durch Neubildung vermehrt, während die absolute Dicke der einzelnen Fasern nicht zunimmt. Ein Athlet und ein schwächliches Mädchen lauen in den Dimensionen ihrer Muskelfasern keinen Unterschied erkennen, wenn die Volumsdifferenz der ganzen Muskeln auch das Fünffache beträgt. Von der absoluten Vermehrung der Muskelsubstanz (Hypertrophie) ist die scheinbare wohl zu unterscheiden, welche durch Verdickung der Zellscheiden gegeben wird. Andauernde Unthätigkeit und Rube eines Muskels bedingen dessen Schwund (Atrophie), wie bei Lähmungen und allgemeiner Fettsucht.

Auf die Zusammenziehung eines Muskels folgt dessen Ausdehnung — Expansio, — ein Zustand der Ruhe und Erbolung. Ein Muskel, der mit wechselnder Contraction und Expansion arbeitet, kann viel längere Zeit thätig sein, ohne zu ermüden, als ein anderer, der in einer permanenten Zusammenziehung verharrt. Gehen ermüdet deshalb weniger als Stehen, und ein Mann, der mit seinen Armen einen Tag lang die schwerste Arbeit zu verrichten vermag, wird nicht im Stande sein, das leichteste Werkzeug mit ausgestreckter Hand 10 Minuten lang ruhig zu halten. Soldaten werden durch eine zweistündige Parade mehr ermüdet, als durch einen vierstündigen Marsch.

Die Muskelsubstanz erzeugt sich, wenn sie durch Krankheit oder Verwundung verloren ging, nie wieder, und ein entzwei geschnittener Muskelheilt nicht durch Muskelfasern, sondern durch ein neugebildetes, sehniges Gewebe zusammen.

Dass die zickzackförmige Biegung der Muskelfasern während ihrer Contraction auftritt, wurde schon von Allan Thomson und Bowman bezweifelt, und vielmehr als ein Ausdruck ihrer Erschlaffung angesehen: - durch Ed. Weber's Experimente erhielt dieser Gedanke die Gewissheit eines Lehrsatzes. - Eine besondere Aeusserung der Muskelcontractibiät, die den Anatomen interessirt, ist die sogenannte Todtenstarre, Rigor mortis. Bei allen Wirbelthieren wird sie beobachtet, und stellt sich im Menschen nach Sommer's Beobachtungen nie vor 10 Minuten, und nie nach 7 Stunden post mortem ein. Sie beruht auf einer allmälig zunehmenden Verkurzung der Muskeln mit flortwerden derselben, und mit Rizescenz der Theile, welche ihrem Zuge folgen. Der Unterkiefer, der im Erkischen des Todeskampfes herabsank, wird durch die Todtenstarre gegen den Oberkiefer so fest hinaufgezogen, dass der Mund nur durch grosse Krastanstrengung geöffnet werden kann; der Nacken wird steif, der Stamm gestreckt, die Gliedmassen, welche kurz nach dem Tode weich und beweglich waren, und in jede Stellung gebracht werden kounten, werden starr und unbeugsam, der Daumen wird, wie bem Embryo, unter die zur Faust gebeugten Finger eingezogen, etc., daher de bei ärmeren Leuten übliche Sitte, den Verschiedenen sogleich die Wäsche auszuziehen, da sie einige Stunden nach dem Tode, der Starrheit des Leichnams wegen, nur losgeschnitten werden kann. Selbst Muskeln, welche ge-Lihmt waren, bleiben von der Toltenstarre nicht verschont. Die Dauer ist sehr ungleich. Sie richtet sich, wie es scheint, nach dem früheren oder späteren Eintreten der Starre, in der Art, dass sie desto länger dauert, je später sie sich einstellte. Je schneller Fäulniss eintritt, desto früher schwindet die Todtenstarre. Sie für vital, gewissermassen für die letzte Aeusserung der Irritabilität zu halten (Nysten), geht des Umstandes wegen nicht wohl an, dass von der Todtenstarre befallene Muskeln gewöhnlich auf Reize nicht reagiren, und die Irritabilität bei kaltblütigen Thieren lange (bei geköpsten Schildköten 8 Tage) dauern kann, ohne dass Todtenstarre beobachtet wird. Von der Gerinnung des Blutes kann sie noch weniger abhängen, da sie nach Verblutungen sehr intensiv zu sein pslegt, und bei Ertrunkenen (wo das Blut nicht gerinnt) ebenfalls eintritt. Nach E. Brücke (über die Ursache der Todtenstarre, Müller's Archiv, 1842) ist es am wahrscheinlichsten, dass der im Muskelseische enthaltene Faserstoff durch seine Coagulation die Todtenstarre bedingt. Beginnt die Erweichung des Faserstoffes durch das organische Wasser des Muskels (d. h. bei Beginn der Fäulniss), so schwindet die Starre.

Ein sehr häufig und unter verschiedener Bedeutung gebrauchter Ausdruck ist der Tonus der Muskeln. Wir verstehen darunter einen auch im Zustande der Ruhe dem Muskel zukommenden Spannungsgrad, welcher ihm nicht erlaubt, bei rein passiver Verkurzung (wie sie z. B. bei passiver Beugung eines Gliedes, und bei Knochenbruchen mit Uebereinanderschieben der Bruchenden vorkommt) zu schlottern oder sich zu falten. Man beuge den Vorderarm activ, und fühle das Prallwerden des Biceps brachii. Hierauf fixire man den Vorderarm in seiner Beugung durch die andere Hand. Der Biceps giebt seine Thätigkeit auf wird weich, verlängert sich aber nicht, um sich zu krummen oder zu knicken, er bleibt kurz, ohne prall zu sein, und dieses Vermögen, bei jeder Verkürzung geradlinig zu bleiben, muss auf einer beständig thätigen Contractionstendenz beruhen, welche ein vitales Phänomen ist, und, um ein Wort zu haben, Tonus genannt werden mag. - Ist ein Theil mit mehreren Muskeln ausgestattet, welche in entgegengesetzter Richtung, aber symmetrisch an ihn treten, und würden die Muskeln der Einen Seite plötzlich gelähmt, so wird der Theil, ohne dass wir es wissen und wollen, durch die entgegengesetzten nach ihrer Richtung gezogen, und bleibt in einer durch den Tonus der nicht gelähmten Muskeln bewirkten permanenten Abweichung. Bei halbseitigen Gesichtslähmungen wird der Mund gegen die gesunde Seite verschoben, die Zungenspitze aber nach der kranken. Letzterer Fall ist kein Widerspruch mit dem Gesagten, und wird durch die schiefe Stellung des Zungenbeins erklärt, welches auf der krauken Seite niedriger als auf der gesunden steht. - Wenn ein Beinbruch des Oberarms oder Oberschenkels mit bedeutender Verkürzung heilt, bleiben die Muskeln des Gliedes doch gerade, und wirken so gut, wie vor dem Bruche. Wird ein Muskel entzweigeschnitten, so ziehen sich seine Enden zurück, und der Schnitt wird eine weite Kluft. Alle diese Bewegungen erfolgen ohne Willenseinfluss, und sind die nothwendige Folge des Tonus. - Die Zurückziehung durchschnittener Muskeln ist für den Wundarzt eine hochwichtige Erscheinung. Würde eine Gliedmasse, wie es vor Zeiten geschah, durch einen Beilhieb amputirt, oder abgedrellt, so wird die Schnittsläche des Stumpses eine Kegelsläche sein, an deren Spitze der Knochen vorsteht, und welche durch die gleichfalls sich zurückziehende Haut nicht bedeckt werden kann. Die Amputation kann deshalb nicht in Einem Trennungsacte bestehen, und muss in mehreren Tempo's verrichtet werden, indem sich zurtickziehende Theile tiefer als der Knochen entzweit werden sollen.

§. 30. Verhältniss der Muskeln zu ihren Sehnen.

Die willkürlichen Muskeln (einzelne Kreismuskeln ausgenommen) stehen an ihrem Anfange und Ende mit dichten, sibrösen, metallisch-glänzenden Strängen, oder, wenn sie platte Gestalt haben, mit solchen Häuten in Verbindung, welche als Sehnen, Tendines, und Sehnenhäute, Aponeuroses, bekannt sind. Es soll der nächstsolgenden Gewebeabtheilung, welche die Sehnen behandelt, hier nicht vorgegriffen, sondern blos jenes erwähnt werden, welches auf den Ursprung und das Ende der Muskelfasern Bezug hat.

Damit mehrere Muskeln zugleich von Einem Punkte des Skeletes entspringen, oder an einem solchen enden können, mussten sie an ihrem Anfange und Ende mit Sehnen versehen werden, deren Umfang bedeutend kleiner, als jener der Muskeln selbst ist, und welche die Zugseile vorstellen. durch welche die lebendige Krast des Muskels auf den trägen Knochen Man unterscheidet die Sehnen als Ursprungs- und übertragen wird. Endsehnen (vor Zeiten Caput et Cauda musculi, während das eigentliche Fleisch Muskelbauch, Venter musculi, genannt wurde). Raumersparniss ist somit der letzte Grund der Schnenbildung. Der Uebergang des Muskelsleisches in eine Sehne geschieht nicht allgemach durch Umwandlung der Muskelfasern in Sehnenfasern, wie Ehrenberg behauptete. Jede Muskelfaser geht durch einen scharfen Absatz in mehrere Sehnen-Das Ende einer Muskelfaser ist abgerundet, und wird von den, zu dieser Muskelfaser gehörigen, ungleich feineren Sehnenfasern eingeschlossen, welche sich dicht zusammendrängen, und da sie keine Bindegewebscheiden besitzen, ein festes strangartiges Gebilde vorstellen werden. dessen Ouerschnitt viel kleiner als der des Muskels ist. sich an feinen Längenschnitten der Uebergangsstellen von Muskeln in Sehnen überzeugt, dass die Sehnenfasern aus den Bindegewehscheiden der Muskelfasern entstehen. - Durch langes Kochen kann die Verbindung von Muskel und Sehnen so gelockert werden, dass man beide ohne Gewalt trennen kann. Um den Uebergang von Muskelsleisch in Sehnen nicht durch einen plötzlichen Abschnitt, sondern mit allmäliger Abnahme des Umfanges eines Muskels möglich zu machen, reichen die Sehnen entweder im Fleische. oder an einem Rande desselben weiter hinauf, wodurch sich viele Muskelfasern früher endigen können, und eine gefälligere Form des sich gegen Ursprung und Ende zuspitzenden Muskelbauches resultirt.

Wird der Bauch eines Muskels durch eine eingeschobene Sehne in zwei Theile getheilt, so heisst ein solcher Muskel ein zweibäuchiger, Biventer. Ist die eingeschobene Sehne kein Strang, sondern ein sibröses Septum mit vielen kurzen und zackigen Ausläusern in das Fleisch, so heisst sie sehnige Inschrist, Inscriptio tendinea, weil eine solche Stelle das Ansehen hat, als sei mit Sehnensarbe aus dem rothen Muskel in querer Richtung gekritzelt worden. Es kann nicht als Ursache dieses Unterbrechens

eines Muskels mit Zwischensehnen (welche als Inscriptiones tendineae an demselben Muskel auch mehrfach vorkommen) angesehen werden, dem Muskel grössere Festigkeit zu geben, und sein Entzweigehen bei allzugrosser Dehnung zu verhüten, weil von mehreren Muskeln, welche durch Länge, Dicke und Wirkungsart übereinstimmen, nur Einer diese Einrichtung besitzt, während sie den übrigen fehlt. So hätte z. B. der M. sternohyoideus ihrer nicht weniger bedurft, als der damit versehene, kürzere Sternothyreoideus. Eine Inscriptio tendinea giebt zugleich ein gutes Bild einer Muskelnarbe.

Verläuft die Sehne eines Muskels in seinem Fleische eine Strecke aufwärts, und befestigen sich die Muskelbündel von zwei Seiten her unter spitzigen Winkeln an sie, so heisst der Muskel ein gefiederter, M. pennatus. - Liegt die Sehne an einem Rande des Fleisches, und ist die Richtung der Muskelbündel zu ihr dieselbe schiefe, wie beim gefiederten Muskel. so wird er halbgesiedert, M. semipennatus, genannt. - Hat ein Muskel mehrere Ursprungssehnen, welche fleischig werden, und im weiteren Zuge in einen gemeinschaftlichen Muskelbauch übergehen, so ist er ein 2-, 3-, 4köpfiger, M. biceps, triceps, quadriceps. — Die Stelle, wo die Ursprungs- und Endsehne eines Muskels sich festsetzt, heisst Punctum originis et insertionis. Man hat sie auch Punctum fixum et mobile genannt, wobei jedoch übersehen wurde, dass die meisten Muskeln unter gewissen Umständen das Punctum fixum zum mobile machen können. Es wird dieses von der Stärke des Muskels, und von der grösseren oder geringeren Beweglichkeit seines Ursprungs- oder Endpunktes abhängen. So wird der Jechmuskel immer den Mundwinkel gegen die Jochbrücke, und nicht umgekehrt, bewegen, während der Biceps brachii den Vorderarm gegen die Schulter, oder, wenn die Hand sich an etwas festhält, die Schulter (und mit ihr den Stamm) der Hand nähern wird.

Hat ein Muskel keine Endsehne (wie die Muskeln des Mundes), so fahren die Fasern desselben pinselartig auseinander, und verlieren sich in den Weichtheilen, ohne darstellbares Ende.

§. 31. Benennung und Eintheilung der Muskeln.

In der Nomenclatur der Muskeln herrscht keine Gleichförmigkeit, und kann auch keine herrschen. — Da viele Muskeln einander sehr ähnlich sind, so reicht man mit der Benennung nach der Gestalt nicht aus; da mehrere derselben gleiche Wirkung haben, und auch ihre Ursprungs- und Endpunkte übereinstimmen, so lassen sich weder Benennungen nach der Wirkung, noch zusammengesetzte Ausdrücke (welche Anfang und Ende bezeichnen), allgemein gebrauchen. Wo es angeht, ist ein aus Ursprung und Ende des Muskels zusammengesetzter Name jeder anderen Benennung vorzuzichen, weil er gewissermassen eine Beschreibung des Muskels enthält, und das Erlernen vieler Muskeln am wenigsten erschwert. Chaussier

hat es versucht, die Terminologie der Muskeln von diesem Gesichtspunkte aus umzuarbeiten, ohne dass sein Bemühen Nachahmung gefunden hätte.

Die Eintheilung der Muskeln beruht auf ihrer Form. Wir unterscheiden zwei Hauptgruppen: A) solide, und B) hohle Muskeln.

- A) Solide Muskeln. Sie zerfallen nach den drei cubischen Dimensionen des Raumes in:
- a) Lange Muskeln, mit vorwaltender linearer Ausdehnung. Ihre Fasern lausen in der Regel parallel. Sie sind wieder α . einfach oder β . zusammengesetzt, und werden letzteres dadurch, dass sich mehrere Köpse in einen Muskelbauch vereinigen, oder ein Muskelbauch mehrere Endsehnen (wie an den Beugern und Streckern der Finger und Zehen) entwickelt. Sie kommen vorzugsweise an den Gliedmassen, weniger am Stamme vor, und besitzen in der Regel rundliche, lange oder kurze Schnen.
- b) Breite Muskeln, mit Flächenausdehnung in die Länge und Breite. Sie entspringen entweder ohne Unterbrechung von langen Knochenrändern, oder mit einzelnen Bündeln von mehreren neben einander liegenden Knochen, z. B. den Rippen; diese Bündel heissen Zacken, Dentationes. Sie bilden nie rundliche, strangförmige Sehnen, sondern flache, sehnige Ausbreitungen, Aponeuroses. Sie finden sich nur am Stamme, und eignen sich ganz vorzüglich zur Begrenzung der grossen Leibeshöhlen.
- c) Kurze und dicke Muskeln. Alle kleineren Muskelkörper mit ziemlich gleichen, cubischen Dimensionen heissen so. Sie sind durch ihre Stärke ausgezeichnet, und haben entweder parallele (Glutaeus magnus), oder verfilzte Bündel (Deltoides).

Diesen drei Arten von Muskelformen gesellt sich noch eine vierte bei:

d) Ringmuskeln. Sie umgeben gewisse Leibesöffnungen, und haben entweder gar keinen Zusammenhang mit den Knochen (Sphincter oris), oder nur einen einzigen Ausgangspunkt am Skelet, zu welchem sie auch zurückkehren (Sphincter ani externus, Orbicularis oculi).

Die Knochen, an welchen sich Muskeln inseriren, können als Hebel betrachtet werden, deren bewegende Krast im Muskel, und deren zu bewegende Last im Knochen, und was mit ihm zusammenhängt, liegt. Das nächste Gelenk, in welchem der Knochen sich bewegt, stellt den Dreh- oder Stützpunkt des Hebels dar. Es wird im Verlause der Muskellehre, und durch die praktische Behandlung der Einzelnheiten klar werden, dass ein und derselbe Knochen bald als einarmiger, bald als zweiarmiger Hebel wirken kann. Da die Muskeln sich gerne in der Nähe der Gelenke, und nur selten in grösserer Eutfernung davon an der Hebelstange des Knochens inseriren, so mitssen sie mit grossem Kraftaufwande wirken, welcher noch gesteigert wird durch die schiefe Richtung der Sehne zum Knochen. Wenn auch dem letzteren Uebelstande durch die für Muskelinsertionen bestimmten Knochenfortsätze (Tubercula, Condyli, Spinae), und durch die grössere Dicke der Gelenkenden abgeholfen wird, über welche sich die Sehnen krummen, und somit unter grösseren Winkeln sich besestigen können, so bleibt doch in ersterer Beziehung das mechanische Verhältniss so ungunstig, dass, um eine Last von wenig Pfunden zu bewegen, der Muskel eine Contraction ausführen muss, welche unter vortheilhasteren Gleichgewichtsbedingungen eine vielmal grössere Last bewegen könnte. Wie hätte es aber mit der Gestalt der Gliedmassen ausgesehen, wenn z. B. die Vorderarmbeuger sich in oder unter der Mitte der ossa antibrachii besestigt hätten? welche unformliche Masse hätte der Ellbogen im Beugungszustande dargestellt? und wie langsam wären die Bewegungen der Hand gewesen, während, bei naher Muskelanhestung am Drehpunkte des Hebels, das andere, freie Ende des Hebels schon bei einem geringen Ruck des Biceps einen grossen Kreisbogen beschreibt, und somit die Schnelligkeit der Bewegung reichlich ersetzt, was an Muskelkrast scheinbar vergeudet wurde. Nichtsdestoweniger bleibt es wahr, was schon Galen mit den Worten ausdrückte: musculi cum insigni virium detrimento agunt. Um ein erklärendes Beispiel zu geben, führe ich an, dass die Wadenmuskeln eines Menschen, der. auf einem Fusse stehend, sich auf die Zehenspitzen erhebt, 80mal mehr Kraft entwickeln müssen, als ihre Wirkung eigentlich beträgt, dass sie also statt 140 Pfund, die wir als mittleres Gewicht eines erwachsenen Mannes annehmen, in Wahrheit ein Gewicht von 11200 Pfunden tragen. Das bekannte Gesetz, dass beim zweiarmigen Hebel Krast und Last im verkehrten Verhältnisse der Längen der Hebelarme stehen, findet auch in der Mechanik der Muskeln ungeschmälerte Geltung.

B) Hohle Muskeln. Sie kommen in viel geringerer Menge vor als die soliden, und bilden entweder für sich hohle Organe (Herz, Gebärmutter), oder umgeben als mehr weniger deutliche Muskelhaut, Tunica muscularis, die Höhlen von röhren- oder schlauchförmigen Organen (Darmkanal, Harnblase, Blutgefässe). Sie bestehen, mit Ausnahme des Herzens, durchaus aus glatten, nicht quergestreiften Muskelfasern. Da sie alle solchen Organen angehören, auf welche der Wille keinen, oder nur beschränkten Einfluss übt, so werden sie als unwillkürliche (auch vegetative, oder organische) Muskeln zusammengefasst, während die soliden Muskeln, welche vom Willen bestimmt werden, und als Organe der Ortsbewegung, der Sprache, der Respiration, und der Sinne thätig sind, als willkürliche oder animale Muskeln aufgeführt werden. Die Sonderung ist jedoch weder histologisch noch functionell scharf gezogen. Das quergestreiste Ansehen der animalen Muskelfasern findet sich auch am Herzen und am oberen Drittel der Speiseröhre, und die Athmungsmuskeln, welche willkürlich bestimmbare Bewegungen ausführen, sind im Schlafe, in der Ohnmacht, und im Schlagslusse ebenfalls thätig. Die rothe Färbung der animalen, und die blasse der organischen Muskeln ist nichts Wesentliches, und scheint weniger von einem wirklichen Farbunterschiede der Primitivfasern, sondern von ihrer grösseren oder geringeren Anhäufung abzuhän-Die dünne Muskelschichte des Darmrohrs erscheint deshalb blass, während die dicke Fleischsubstanz des Herzens viel röther ist, als mancher dunne animale Muskel, z. B. das Platysma myoides. Verdickt sich die organische Muskelschichte eines Darmstückes oder der Harnblase durch Krankheit, so wird sie eben so fleischroth, wie ein stark arbeitender animaler Muskel. Der rothe Muskelmagen der körnerfressenden Vögel, und die krankhasten Hypertrophien der Darm- und Blasenmuskelhaut, bestätigen diese Ansicht. - Die organischen Muskeln bilden niemals Sehnen, bedingen niemals Ortsveränderungen, sondern nur Verengerungen, oder Verkürzungen der fraglichen Organe, in oder an welchen sie vorkommen, laufen in gekreuzten Schichten über einander hin, hängen mit dem Skelet nicht zusammen, und haben keine Antagonisten.

Andere mehr weniger geläusige Eintheilungen beruhen auf mehr weniger allgemeinen Eintheilungsgründen. Muskeln, welche gleiche Wirkung haben, oder sich wenigstens in der Erzielung eines gewissen Effectes unterstützen, heissen Coadjutores oder Synergistae; jene Muskeln, deren Wirkungen sich gegenseitig neutralisiren, Antagonistae. Beuger und Strecker, Auswärts- und Einwärtswender, Ausheber und Niederzieher sind Antagonisten, mehrere Beuger dagegen Coadjutoren. Unter Umständen können Antagonisten Coadjutoren werden. So werden alle Muskeln des Armes, wenn es sich darum handelt, ihm jenen Grad von Starrheit und Unbeugsamkeit zu geben, welcher z. B. beim Stemmen oder Stützen nothwendig wird, für diese Gesammtwirkung Coadjutoren sein.

§. 32. Allgemeine mechanische Verhältnisse der Muskeln.

Da jede Muskelfaser die Richtung einer Krast bezeichnet, so sinden die statischen Gesetze der Kräste überhaupt, mit welchen sich die Physik beschästigt, auch auf die Muskeln ihre Anwendung, und lassen sich solgende Punkte mit Sicherheit seststellen:

- 1. Muskeln, deren Fasern mit der Länge des Muskels parallel laufen, erleiden, wenn sie wirken, den geringsten Verlust an bewegender Kraft, und ihre Wirkung ist gleich der Summe der Partialwirkungen ihrer einzelnen Bündel und Fasern. Muskeln mit convergenten oder gekreuzten Bündeln wirken nur in der Richtung der Diagonale des Krästeparallelogramms, dessen Seiten durch die convergirende Richtung der Muskelsasern gegeben sind, und haben somit einen Totalessect, welcher kleiner ist, als die Summe der partiellen Leistungen aller Bündel. Je spitziger der Vereinigungswinkel zweier Bündel, desto geringer ist ihr Krastverlust; je grösser der Winkel, desto grösser.
- 2. Bei Muskeln mit längsparalleler Faserung steht die Grösse ihres Querschnittes mit der Grösse ihrer möglichen Wirkung in geradem Verhältniss, d. h. ein Muskel dieser Art, der zweimal so dick ist, als ein anderer, wird zweimal mehr leisten können. Für Muskeln mit schiefen oder convergenten Fasern gilt dieses nicht, weil ihre Faserrichtung auf dem anatomischen Querschnitt nicht senkrecht steht. Die Länge eines Muskels mit parallelen Fasern hat sonach auf seine Krastäusserung keinen Einfluss, wohl aber seine Dicke. Ein langer Muskel wird nicht krästiger sein, als ein kurzer von gleicher Breite und Dicke. Nur absolute Vermehrung der Muskelsasern steigert die Krast eines Muskels. Lange Muskeln, in welchen die einzelnen Bündel sehr kurz sind, weil sie mehr der Quer- als der Längenrichtung des Muskels entsprechen (z. B. die Pennati, Semipennati), werden somit stärker sein, als gleich lange Muskeln mit zur Sehne parallelen Fasern. Dagegen wird die Grösse der Verkürzung bei letzteren eine

bedeutendere sein. Ein langer Muskel wird, wenn er an seiner Insertion abgeschnitten wird, sich mehr zurückziehen, als ein kurzer, aber die hiebei verwendete Krastmenge ist deshalb nicht bedeutender, als im kurzen.

- 3. Ein Muskel mit längsparalleler Faserung kann sich im Maximum um ⁵/s seiner Länge zusammenziehen. Dieses wurde wenigstens beim Hyoglossus des Frosches beobachtet. Für die menschlichen Muskeln ist bis jetzt noch keine Norm aufgestellt.
- 4. Je weiter vom Gelenk, und unter je grösserem Winkel sich ein Muskel an einem Knochen befestigt, desto günstiger ist für seine Bewegungsleichtigkeit gesorgt. Je länger er wird, und mit je mehr Theilen er sich kreuzt, desto grösser ist sein Krastverlust durch Reibung. In ersterer Hinsicht wirken die aufgetriebenen Gelenkenden der Knochen, die Knochensortsätze, die Rollen, und die knöchernen Unterlagen der Sehnen (Sesambeine) als Compensationsmittel, in letzterer die schlüpsrigen Sehnenscheiden und Schleimbeutel als natürliche Beseitigungsmittel der Reibung, und leisten dasselbe, wie das Schmieren einer Maschine.
- 5. Besteht ein Muskel aus 2, 3, 4 Portionen, welche einen gemeinschaftlichen Ansatzpunkt haben, so wird die Wirkung eine sehr verschiedene sein, wenn alle oder nur eine Portion in Thätigkeit gerathen. Alle Muskeln mit breiten Ursprüngen und convergenten Bündeln (Deltoides, Cucullaris etc.), können aus diesem Gesichtspunkte zu vielen und interessanten mechanischen Betrachtungen Anlass geben, die bei der speciellen Abhandlung dieser Muskeln im Schulvortrage mit Nutzen eingeslochten werden.
- 6. Da von der Stellung des Ursprungs zum Endpunkte eines Muskels die Art seiner Wirkung abhängt, so wird eine Aenderung dieses Verhältnisses auch auf die Muskelwirkung Einfluss haben. Ist der gestreckte Vorderarm einwärts gedreht, so ist der Flexor biceps ein Auswärtswender; bei auswärtsgedrehter Hand der Flexor carpi radialis ein Einwärtswender. Auch in dieser Beziehung kann jeder Muskel Gegenstand einer reichhaltigen Erörterung werden.
- 7. Die angestrengte Bewegung eines Muskels zur Ueberwindung eines grossen Widerstandes rust häusig eine ganze Reihe von Bewegungen anderer Muskeln hervor, welche daraus abzwecken, dem erstbewegten einen hinlänglich sicheren Ursprungspunkt zu gewähren. Man nennt diese Bewegungen coordinirt. Es ist z. B. am nackten Menschen leicht zu beobachten, wie alle Muskeln, welche am Schulterblatte sich inseriren, eine krastvolle Contraction aussühren, um das Schulterblatt sestzustellen, wenn der Deltamuskel sich anschickt, ein Gewicht mit dem Arme auszuheben. Würden die Schulterblattmuskeln in diesem Falle unthätig bleiben, so würde der Deltamuskel, oder der Biceps, das nicht sixirte Schulterblatt, (an welchem sie beide entspringen) lieber bewegen, als die schwer zu hebende Last. Eben so muss, wenn man ausrecht steht, und einen Fuss heben will, das ganze System von Muskeln in Bewegung gerathen, um die

Schwerpunktslinie durch das nicht gehobene Bein gehen zu machen; sonst wäre das Umfallen unvermeidlich.

8. Da die Configuration der Gelenkenden der Knochen, und die sie zusammenhaltenden Bänder, die Bewegungsmöglichkeit eines Gelenkes allein bestimmen, so müssen sich die Muskeln nach der Bildung der Gelenke richten, und es kann deshalb aus der bekannten Einrichtung eines Gelenks, die Lagerung und Wirkungsart seiner Muskeln in vorhinein angegeben werden. So werden z. B. an einem Winkelgelenke, welches nur Beugung und Streckung zulässt, wie die Fingergelenke, die Muskeln, oder deren Sehnen, nur an der Beuge- und Streckseite des Gelenks vorkommen können.

§. 33. Praktische Bemerkungen über das Muskelgewebe.

Ungeachtet des grossen Blutgesässaufwandes im Muskel, ist er doch zur Entzündung sehr wenig geneigt, und wenn sie ihn ergreift, bleibt sie auf die Scheiden des Muskels und seiner Bündel beschränkt. In der eigentlichen Muskelsubstanz lässt sich bei entzündeten Muskeln keine mikroskopisch scharf bezeichnete Veränderung beobachten. — Muskelentzündungen nach Amputationen sind immer mit bedeutenden Retractionen derselben verbunden, und es kann somit geschehen, dass auch nach kunstgemäss vorgenommenen Absetzungen der Gliedmassen, wenn Entzündung den Stumpf befällt, der Knochen über die Schnittsläche hinausragt. - Jeder Muskel verträgt einen hohen Grad passiver Ausdehnung, wenn dieser allmälig eintritt, z. B. durch tiesliegende Geschwülste, oder, wie bei den Bauchmuskeln, durch Bauchwassersucht, und zieht sich wieder auf sein früheres Volumen zusammen, wenn die ausdehnende Potenz beseitigt wird. Dieses ist eine Wirkung des Tonus. — Ein relaxirter Muskel reisst leichter als seine Sehne. wenn z. B. eine Gliedmasse durch ein Maschinenrad ausgerissen oder abgedreht wird; befindet sich dagegen ein Muskel in einer energischen Contraction, so reisst seine Sehne, oder bricht selbst der Knochen leichter entzwei, an welchem sie sich besestigte. Die Risse der Achillessehne, die Querbrüche der Kniescheibe und des Olekranon, entstehen auf solche Art. - Die Verrückung der Bruchenden eines fracturirten Knochens beruht (jedoch nicht allein) auf dem Muskelzuge. Sie lässt sich am Cadaver für jede Bruchstelle und jede schiefe Bruchrichtung in voraus bestimmen, wenn man das Verhältniss der Muskeln in Anschlag nimmt, und erfolgt im vorkommenden Falle immer nach derselben Richtung. An gebrochenen Gliedmassen, welche gelähmt waren, oder es durch die den Bruch bewirkende Ursache wurden, ist wenig oder keine Dislocation zugegen. Derselbe Muskelzug giebt ein schwer zu überwiegendes Hinderniss für die Einrichtung der Verrenkungen ab, und die praktische Chirurgie kann oft durch Flaschenzüge und Streckapparate, durch betäubende und schwächende Mittel nicht zum Ziele kommen. Wäre es nicht gerathen, durch Herabstimmung jener Momente, welche die Irritabilität mit bedingen (Blutzufluss und Innervation), bedeutendere sein. Ein langer Muskel wird, wenn er an seiner Insertion abgeschnitten wird, sich mehr zurückziehen, als ein kurzer, aber die hiebei verwendete Krastmenge ist deshalb nicht bedeutender, als im kurzen.

- 3. Ein Muskel mit längsparalleler Faserung kann sich im Maximum um ⁵/s seiner Länge zusammenziehen. Dieses wurde wenigstens beim Hyoglossus des Frosches beobachtet. Für die menschlichen Muskeln ist bis jetzt noch keine Norm aufgestellt.
- 4. Je weiter vom Gelenk, und unter je grösserem Winkel sich ein Muskel an einem Knochen befestigt, desto günstiger ist für seine Bewegungsleichtigkeit gesorgt. Je länger er wird, und mit je mehr Theilen er sich kreuzt, desto grösser ist sein Krastverlust durch Reibung. In ersterer Hinsicht wirken die aufgetriebenen Gelenkenden der Knochen, die Knochenfortsätze, die Rollen, und die knöchernen Unterlagen der Sehnen (Sesambeine) als Compensationsmittel, in letzterer die schlüpsrigen Sehnenscheiden und Schleimbeutel als natürliche Beseitigungsmittel der Reibung, und leisten dasselbe, wie das Schmieren einer Maschine.
- 5. Besteht ein Muskel aus 2, 3, 4 Portionen, welche einen gemeinschaftlichen Ansatzpunkt haben, so wird die Wirkung eine sehr verschiedene sein, wenn alle oder nur eine Portion in Thätigkeit gerathen. Alle Muskeln mit breiten Ursprüngen und convergenten Bündeln (Deltoides, Cucullaris etc.), können aus diesem Gesichtspunkte zu vielen und interessanten mechanischen Betrachtungen Anlass geben, die bei der speciellen Abhandlung dieser Muskeln im Schulvortrage mit Nutzen eingeslochten werden.
- 6. Da von der Stellung des Ursprungs zum Endpunkte eines Muskels die Art seiner Wirkung abhängt, so wird eine Aenderung dieses Verhältnisses auch auf die Muskelwirkung Einfluss haben. Ist der gestreckte Vorderarm einwärts gedreht, so ist der Flexor biceps ein Auswärtswender; bei auswärtsgedrehter Hand der Flexor carpi radialis ein Einwärtswender. Auch in dieser Beziehung kann jeder Muskel Gegenstand einer reichhaltigen Erörterung werden.
- 7. Die angestrengte Bewegung eines Muskels zur Ueberwindung eines grossen Widerstandes rust häusig eine ganze Reihe von Bewegungen anderer Muskeln hervor, welche darauf abzwecken, dem erstbewegten einen hinlänglich sicheren Ursprungspunkt zu gewähren. Man nennt diese Bewegungen coordinirt. Es ist z. B. am nackten Menschen leicht zu beobachten, wie alle Muskeln, welche am Schulterblatte sich inseriren, eine krastvolle Contraction aussühren, um das Schulterblatt sestzustellen, wenn der Deltamuskel sich anschickt, ein Gewicht mit dem Arme aufzuheben. Würden die Schulterblattmuskeln in diesem Falle unthätig bleiben, so würde der Deltamuskel, oder der Biceps, das nicht sixirte Schulterblatt, (an welchem sie beide entspringen) lieber bewegen, als die schwer zu hebende Last. Eben so muss, wenn man ausrecht steht, und einen Fuss heben will, das ganze System von Muskeln in Bewegung gerathen, um die

und bei einfachen Wunden das Klaffen der Wundränder bestimmt werden, so wäre diese Erörterung für den Wundarzt von Wichtigkeit. — Da in den Zwischenräumen der Muskeln die grösseren Blutgesässe verlausen, so können sie als Wegweiser bei der Aussindung derselben dienen, und da es östers nothwendig wird, Muskeln zu trennen, um zu tiesliegenden Krankheits-Herden oder Producten zu gelangen, so ist selbst die Kenntniss der Faserung eines Muskels von praktischem Werthe, indem die Spaltung eines Muskels, aus leicht begreislichen Gründen, der Faserung desselben paraßel lausen soll.

Bei jeder Muskelpräparation im Vortrage lässt sich eine Fülle praktischnützlicher Bemerkungen an die rein-anatomischen Facta knüpfen, welche ohne alle speciellen Kenntnisse von Krankheiten verständlich sind, und den Werth der Anatomie bei Zeiten schätzen lehren.

Die Literatur über das Muskelgewebe ist sehr zahlreich, aber nur die neueste brauchbar. Siehe Henle's allg. Anat. p. 606 seqq., Todd and Bowman, Physiol. Anatomy. p. 150 seqq., F. Will, Einige Worte über die Querstreisen der Muskeln, in Müller's Archiv. 1843. p. 358 seqq., J. Holst, de musculorum structura in genere. Dorpat, 1846, und M. Barry, in Müller's Archiv, 1850., so wie C. R. Walther, nonnulla de musculis laevibus. Lips., 1851. — Die mechanischen Bewegungsverhältnisse der einzelnen Muskeln können bei Winslow, Exposition anatomique. Amstelod., 1752, und in Falentin's Lehrbuch der Physiologie, 2. Auslage, nachgesehen werden. Eine Zusammeustellung älterer und neuerer Ansichten über Muskelbau enthält: Ficinus, de sibrae muscularis sorma et structura. Lips., 1836. 4. — Ueber die Verbreitung der glatten Muskelfasern siehe A. Kölliker in der Zeitschrist sur wissenschastliche Zoologie, 1. Bd. pag. 48., und dessen Handbuch der Geweblehre, pag. 62—68. — Ueber physiologische Eigenschasten der Muskeln handelt der classische Artikel "Muskelbewegung" von Ed. Weber, im Handwörterbuche der Physiologie.

§. 34. Schnengewebe oder fibroses Gewebe.

Das Sehnen- oder Fasergewebe, Textus sibrosus, besteht aus Bindegewebsaern, welche zu dichten Bündeln vereinigt sind. Auf den Bündeln erscheinen auch umspinnende Fasern. Die Bündel kreuzen sich nie, sondern bleiben der Längenaxe der Sehne parallel. Man könnte mit allem Rechte das Sehnengewebe als eine Species des Bindegewebes, wie Henle, nehmen, oder Binde- und Sehnengewebe als Unterarten eines Genus: Fadencylindergewebe, nach Valentin, betrachten. Hier sosl es als besondere Gewebgattung ausgeführt werden, weil die Formen, in welchen es im Körper vorkommt, mit dem äusseren Ansehen des Bindegewebes nichts gemein haben.

Die fadenförmigen mikroskopischen Elemente des Sehnengewebes liegen so dicht an einander, und halten so fest zusammen, dass sie nur schwer und unter Beihilfe der Fäulniss zu isoliren sind. Alle aus Sehnenfäden zusammengesetzten Organe werden deshalb einen hohen Grad von Härte und Festigkeit besitzen, den mechanischen Trennungen, der Fäulniss und Siedhitze länger und besser widerstehen als gewöhnliches Bindegewebe, und

sich durch diese mechanischen Eigenschaften vorzüglich zu Bindungsmitteln fester Theile (Knochen, Knorpel), und zu verlässlichen Leitern eignen, durch welche eine Kraft, z. B. vom Muskel aus, auf einen Knochen übertragen wird. Ihr Atlas- oder Metallglanz, ihr schillerndes Ansehen (Folge einer leichten Kräuselung ihrer Primitivfasern) zeichnen sie vor allen übrigen Geweben aus.

Alle Gebilde dieser Art sind an ihren Enden und Flächen mittelst Bindegewebe an benachbarte Theile lose oder fest angeliestet, und wenn sie frei zu sein scheinen (wie die durch Schleimbeutel lausenden Sehnen), so besitzen sie doch einen dünnen membranösen Ueberzug, welchem eigentlich die freie Fläche angehört.

Ihre chemischen Eigenschaften stimmen mit jenen des Bindegewebes überein, ihre Vitalität ist sehr geriug, ihre Blutgefässe äusserst ärmlich, jedoch, wie sich an der Achillessehne beweisen lässt, nicht blos der Zellscheide angehörend. Ihre Empfindlichkeit im gesunden Zustande ist kaum des Namens werth (obwohl bei Entzündungen derselben die furchtbarsten Schmerzen wüthen können), und ihre Nerven sind zwar spärlich, aber mit Bestimmtheit nachgewiesen. Sie besitzen keine Contractilität.

§. 35. Formen des fibrosen Gewebes.

Es lassen sich drei Hauptformen des fibrösen Gewebes außtellen:
A) das strangförmige, B) die fibrösen Häute, und C) das cavernöse Gewebe.

- A) Das strangförmige fibröse Gewebe erscheint in Bündeln von rundlicher oder platter Gestalt, als:
- a) Seline, Tendo, am Ursprungs- und Anhestungsende der Muskeln, und
- b) Band, Ligamentum, Verbindungsstrang zweier Knochen, oder Befestigungsmittel beweglicher Theile an stabilere. Ihre kräftigste Entwicklung erfahren sie als Gelenkbänder, und liegen als solche immer an jenen Seiten der Gelenke, gegen welche zu die Bewegung nicht gestattet ist, bei den Winkelgelenken z. B. an deren Seiten. Sie sollten deshalb lieber Seitenoder Hemmungsbänder, als Hilfsbänder heissen.
- B) Die fibrösen Häute, Tunicae fibrosae, Aponeuroses, sind Ausdehnungen des Fasergewebes in der Fläche, welche anderen weicheren Geweben zur Hülle und Begrenzung dienen, und entweder aus dicht verfilzten fibrösen Fäden ohne eine bestimmte, vorwaltende Faserungsrichtung, oder aus derberen, durch Zellstoff verbundenen Faserbündeln bestehen, deren parallele oder gekreuzte Richtung mit freiem Auge abzusehen ist. Die fibrösen Häute bieten dreierlei Formen dar:
- a) Ebene oder flachgespannte Faserhäute. Sie trennen oder begrenzen Höhlen, oder sind zwischen gewissen Muskelgruppen als natürliche Scheidewand derselben eingeschaltet. Hicher gehören: α. das Centrum tendineum diaphragmatis, β. gewisse Fascien, als: Fascia transverse,

hypogastrica, perinei, iliaca, palmaris, plantaris etc., γ . die Zwischenmuskelbänder, Ligamenta intermuscularia, δ . das Trommelfell, ϵ . die Verstopfungsbänder gewisser Löcher und Spalten, Ligamenta obturatoria.

- b) Hohle Cylinder, durch Einrollen einer ebenen Faserhaut zu einem Rohre von grösserem oder geringerem Kaliber. Sie werden allgemein als Scheiden, Vaginae, bezeichnet, und geben Hüllen für strangförmige oder röhrige Organe ab. Nach Verschiedenheit der Theile, welche sie umgürten, zerfallen sie in:
 - Vaginae tendinum, für die Muskeln auch Perimysia fibrosa genannt. Ihre grösste Ausbildung erreichen sie als eigentliche Muskelscheiden, Fasciae, welche besonders an den Extremitäten, als starke glänzende Faserhäute eine allgemeine Hülle für alle Muskeln bilden, und durch Scheidewände, welche sie zwischen gewissen Muskelgruppen, oder zwischen einzelnen Muskeln einschieben, eine genauere Isolirung derselben zu Stande bringen. Sie werden nach den Regionen, wo sie vorkommen, als Fascis humeri, antibrachii, femoris, cruris etc. beschrieben. Die Scheidewände kehren, nachdem sie einen Muskel umgriffen, entweder wieder zur allgemeinen fibrösen Hülle zurück, von welcher sie ausliefen, oder dringen bis auf den Knochen ein, mit dessen Beinhaut sie verschmelzen. In letzterem Falle heissen sie Ligamenta intermuscularia. Die Vaginae tendinum, Sehnenscheiden, sind Fortsetzungen der Muskelscheiden, weil die Sehnen in der Verlängerung des Muskels liegen.
 - β) Die fibrösen Kapselbänder der Gelenke, Ligaments capsularia. Sie stellen hohle Säcke dar, welche die Gelenkenden zweier oder mehrerer Knochen mit einander verbinden, den Höhlenraum der Gelenke bestimmen, und, so wie α , an ihrer inneren freien Fläche mit Synovialhaut (§. 37, B) überzogen sind.
 - γ) Die Beinhaut, Periosteum, und die Knorpelhaut, Perichondrium. Erstere ist sehr reich an Blutgefässen, welche mit zahllosen Fortsetzungen der Beinhaut in die Poren der Knochen eindringen, wodurch das Periosteum als zusammenhängende Membran in grösseren Stücken schwer ablösbar wird. Die Knorpelhaut ist viel gefässärmer. Die wichtige Beziehung beider zur Ernährung ihres Einschlusses ist nicht zu verkennen, und wird durch die tägliche chirurgische Erfahrung hinlänglich constatirt.
 - d) Die Nervenscheiden, Neurilemmata, erscheinen nur an gewissen Nerven (Sehnerv, Rückenmarksnerven in den Intervertebrallöchern etc.) als wahre fibröse Häute, und nähern sich im Verlause der weitverzweigten Nerven auffallend den Zellhäuten.
- c) Geschlossene fibrose Hohlkugeln, welche die Grösse und Gestalt weicher Organe bestimmen, und zum Schutze des von ihnen umschlossenen Inhaltes dienen. Hieher gehören die Faserhaut des Auges (Scleretics), vieler Eingeweide (des Hoden, der Eierstöcke etc.), die harte Hira-

haut, und der fibrose Herzbeutel. Die innere Oberstäche dieser Hohlkugeln ist entweder glatt (Herzbeutel und Sclerotica), oder mit Scheidewänden (Processus, Septula) besetzt, welche gegen das weiche Parenchym des eingeschlossenen Gewebes vorspringen, und es stützen (Faserhaut des Hoden, des Eierstockes).

C) Das cavernõse Gewebe, Textus cavernosus. Man denke sich von einer fibrõsen Hüllungsmembran eine grosse Anzahl Fortsätze, Bälkchen und Fasern nach einwärts ziehen, sich in jeder Richtung kreuzen, und sich zu einem schwammigen Gewebe mit grösseren oder kleineren Interstitien verbinden, so hat man die Grundlage oder das Gerüste eines cavernösen Gewebes, welches durch eine besondere, später zu erwähnende Beschaffenheit der abundanten Blutgefässe, welche diese Interstitien ausfüllen, die Fähigkeit erhält zu strotzen, und wenn es mit einem Ende an eine festere Grundlage gehestet wird, und überdies von cylindrischer Form ist, sich steisen und ausrichten kann, und deshalb auch Schwellgewebe, Textus erectilis, genannt wird, wie es im männlichen Gliede, in der Clitoris, und der Milz vorkommt.

§. 36. Praktische Bemerkungen über das fibröse Gewebe.

Die geringe Vitalität des Sehnengewebes ist der Grund, warum es, mit Ausnahme der Entzündungen, nicht leicht primärer Sitz von Krankheiten wird. Seine Verwendung im Organismus zu rein mechanischen Zwecken unterwirst es vorzugsweise mechanischen Störungen durch Zerrung und Riss, und die oberslächliche Lagerung der Fascien macht ihre Verwundungen häufig. Bei jeder chirurgischen Operation, die in eine gewisse Tiese eindringt, kommt es unter irgend einer Form dem Messer entgegen, und muss getrennt werden, - Grund genug, warum es die Aufmerksamkeit der Chirurgen im hohen Grade fesseln soll. Die Festigkeit der Fascien wird das Wachsthum, die Form und die Richtung von Geschwülsten bestimmen, und es ist die erste Frage, welche sich der Wundarzt bei dem Gedanken an die Exstirpation derselben stellt, diese, ob sie innerhalb oder ausserhalb der Fascia wurzeln. Jede Ausschälung von Geschwülsten extra fasciam ist ein einsacher, jede Entsernung krankhaster Gebilde intra fasciam ein bedeutender Eingriff. - Unter den Fascien ergossene Flüssigkeiten (Eiter, Geschwürsjauche, Blut) werden sich schwer oder gar nicht, je nachdem die Fascia sest oder schwach, solid oder durchlöchert ist, einen Weg nach aussen bahnen, sie werden vielmehr die Fascia in bestimmten Richtungen unterminiren, und weit greifende Verheerungen in der Tiefe anrichten konnen, bevor die Oberstäche merklich leidet. Blutige Ergüsse unter den Fascien, wie sie nach Erschütterungen und Quetschungen vorkommen, können unter einer dicken Fascie sich weithin ausdehnen, ohne äusserlich bemerk-Sind sie an eine Stelle gekommen, wo die Fascie dünner bar zu sein. wird, oder abbricht, so konnen sie nun erst durch blaue Farbung der Haut

sich kundgeben. Die Verfärbung der Haut deutet somit nicht immer die Stelle an, wo die quetschende Gewalt einwirkte. - Die geringe Nachgiebigkeit der Fascien wird bei Anschwellungen tieferer Organe, welche jedesmal mit deren Entzündungen austreten, Einschnürungen, und, in Folge dieser. Steigerung des inslammatorischen Schmerzes bedingen, und kann die Spaltung der Fascie als Palliativmittel nothwendig machen. - Risse der Fascien werden wenig Heiltrieb äussern, und entblösste Stellen derselben eine grosse Neigung zum Absterben zeigen. Letzteres ist besonders der Fall, wenn das Bindegewebe, welches an beiden Flächen einer Fascie aufliegt, und die Ernährungsgefässe zuführt, vereitert oder verbrandet, worauf ganze Stücke der Fascien, so weit das Bindegewebe zerstört wurde, absterben, und losgestossen, oder mit der Pincette hervorgezogen werden. Bei unvollkommener Heilung solcher Risse oder einsacher Trennungen durch Verwundung, werden die tieferen Organe ein Bestreben äussern, aus ihrer Lage zu weichen, welchem nur durch entsprechende Bandagen entgegengewirkt werden kann. - Blossgelegte und ihrer Ernährungsgefässe beraubte Sehnen sterben gerne ab, und ihre Trennung vom Lebendigen (Exfoliation) geht nur allmälig vor sich, wodurch der Heilungsprocess von grossen und tiesen Wunden sehr in die Länge gezogen werden kann. Hiebei ist noch zu bemerken, dass die Sehne selten in ihrem Verlaufe, sondern an der Einpstanzungsstelle in das Muskelsleisch getrennt wird. sah nach einem Panaritium (Wurm am Finger) die lange Sehne des flexor pollicis longus aus der Abscesshöhle als weissen halbmacerirten Faden herausziehen. - Einfache Sehnenschnitte so ausgeführt, dass die Lust keinen Zutritt erhält (subcutane Tenotomie), heilen gern und schnell, besonders wenn die Sehnenscheide nicht gänzlich durchgeschnitten wird. Die glücklichen Resultate, welche die neuere Chirurgie in diesem Gebiete aufzuweisen hat, bestätigen diese lange bezweifelte Wahrheit. Die Resultate waren auch in der That so glücklich, dass man mit den Sehnenschnitten eine Zeitlang sehr freigebig verfuhr. - Die Muskel- und Sehnenscheiden, und die fibrösen Zwischenwände der Muskeln werden auf die Localisirung gewisser Krankheitsprocesse einen mächtigen Einstuss üben; Vereiterungen und pathologische Umwandlungen der Gewebe werden sich nicht nach allen Richtungen ausbreiten; erst wenn der Damm durchbrochen, welchen eine Aponeurose dem Wachsthume eines bösartigen Parasiten, z. B. einer Krebsgeschwulst, nach aussen entgegenstellte, wuchert sie mit tödtlicher Hast. -Die grosse Verbreitung des fibrösen Gewebes, die zahlreichen Brücken, die es zwischen hoch- und tiefliegenden Organen bildet, erklären viele Sympathien entfernter Theile, wie das Wandern und Springen rheumatischer Affectionen, und die oberstächlichen Hautröthungen bei tiesliegenden Knochenleiden.

Literatur. Schon die älteren Schristeller (Leeuwenhoeck und Fontana) hatten über die mikroskopische Textur des fibrösen Gewebes richtige Ansichten, und gaben ziemlich naturgetreue Abbildungen derselben. Das Neuere ist

bei Henle, Gerber, Valentin, Kölliker, und in Gluge's observ. microsc. Berol., 1835, so wie H. Jordan, über das Gewebe der Tunica dartos etc. in Müller's Archiv, 1834, und Donders, Hollandische Beiträge zu den anat. phys. Wissenschaften, 1. Bd., pag. 259, nachzusehen.

Ueber die anatomische Verbreitung der Faserhäute (Fasciae musculares). handeln: Godman, Descriptions of various fasciae etc. Philadelphia, 1824. — Paillard, description complète des membranes fibreuses etc. Paris, 1827. — Velpeau, Abhandlung der chirurg. Anat. 3. Abtheil. pag. 57—73.

Die Handbücher der chirurgischen Anatomie geben die Darstellungen derbei den Leisten- und Schenkelbrüchen interessirten Fascien gewöhnlich in jenem verdickten Zustande, wie sie im speciellen Falle des Bruches gefunden werden. Am gesunden Menschen wird östers als dünne Bindegewebschicht gesehen, was bei veralteten Hernien eine Fascie von der Dicke einer halben Linie darstellt. Die äusserst subtilen Untersuchungen von Thomson in den: Annales de la médecine physiol. haben zu einer Vervielsältigung der Fascien (besonders der Leistenund Schamgegend) gesührt, deren praklischer Werth sehr problematisch ist. Die leichte Umwandlung von Bindegewebschichten in Fascien, und umgekehrt, wird diesen Gegenstand für den Neuling immer verworren erscheinen lassen.

§. 37. Serose Häute.

Als eine besondere Modification des Bindegewebes erscheinen die ser ösen Häute, Membranae serosae. Sie bestehen aus zu breiten Bündeln vereinigten Bindegewebfasern, mit gekreuztem, nicht geschlängeltem Verlaufe, sind dunn, durchscheinend, weissgefärbt oder wasserhell, überziehen die inneren Oberstächen solcher Höhlen, welche mit der Aussenwelt keine Verbindung haben, sind somit geschlossene Säcke (mit Ausnahme der Synovialhaute, wie im Verlauf dieses §. gezeigt wird), besitzen nur spärliche Blutgefässe und Nerven, aber reichliche Saugadern. Die Bindegewebbundel, aus welchen sie bestehen, sind mit sehr zahlreichen Kernfasern (elastischen Fasern) gemischt. Das subseröse Bindewebe entbehrt dieser elastischen Fasern. Die Ausdehnbarkeit der serösen Membranen ist daher sehr bedeutend, ihre Empfindlichkeit dagegen im gesunden Zustande kaum bemerkbar. Ihre Zusammenziehungsfähigkeit beruht nur auf ihrer physischen Elasticität, nicht auf lebendiger Contractilität. - Jede seröse Haut hat eine freie, und eine durch lockeres subseroses Bindegewebe an darunter liegende Organe besestigte Fläche. Die freie Fläche ist bei den meisten mit einer einfachen oder mehrfachen Schichte Pflasterepithelium bedeckt. deshalb eben, glatt und glänzend, und mit einem flüssigen Exhalate (Serum) befeuchtet, wodurch sie schlüpfrig wird. Es kommt auch vor, dass nur das Epithelium ohne eigentliche Bindegewebs-Unterlage beobachtet wird (auf der inneren Fläche der harten Hirnhaut, und auf der freien Fläche der Zwischenknorpel der Gelenke), oder eine seröse Membran ohne Epithelium austritt (in den Schleimbeuteln).

Als innere Auskleidung geschlossener Höhlen (Bauch, Brust) wird jede seröse Membran die Gestalt eines Sackes haben müssen, welcher sich der Gestalt der Höhle genau anpasst. Enthält die Höhle Organe, so bekommen diese durch Einstülpung des Sackes besondere Ueberzüge. Je grösser die Amzahl solcher Organe wird, desto complicirter wird die Gestalt des serösen Sackes. Die Auskleidung der Höhlenwand und der Ueberzug der Organe kehren sich ihre freien glatten Flächen zu, und da diese schlüpfrig sind, können sie leicht und ohne Reibung an einander hin- und hergleiten.

Nach Verschiedenheit des Vorkommens und des Secretes der serösen Häute werden folgende Arten unterschieden:

- A) Eigentliche seröse Häute oder Wasserhäute. Sie kleiden a) die grossen Körperhöhlen aus, und erzeugen mehrere Einstülpungen für die Organe derselben, oder bilden b) um einzelne Organe besondere Doppelsäcke. Zu a) gehören die beiden Brustfelle, das Bauchfell; zu b) die eigene Scheidenhaut des Hoden, der seröse Herzbeutel. Die allgemeine Regel, geschlossene Säcke zu bilden, erleidet nur im weiblichen Bauchfelle eine Ausnahme, da dieses durch die Orificia abdominalia der Muttertrompeten mit der Geschlechtshöhle, und sonach unmittelbar mit der Aussenwelt communicirt.
- B) Synovialhäute. Man hat bis auf die neueste Zeit die Synovialhäute für vollkommen geschlossene Säcke gehalten. Sie kleiden jedoch die Höhlen der Gelenke nicht vollständig aus, und bilden für etwaige Bänder oder Zwischenknorpel, die in der Höhle angebracht sind, keine genau anschliessenden Ueberzüge, indem sich nicht die ganze Synovialhaut, sondern blos ihr Pflasterepithelium auf die freie Fläche dieser Bänder und Zwischenknorpel fortsetzt. Die in die Höhle der Gelenke hineinragenden, mit Knorpel überzogenen Knochenenden entbehren sogar des Epitheliums. Die Synovialhaut eines Gelenks überzieht sonach blos die innere Fläche der fibrösen Gelenkkapsel. An der Befestigungsstelle der fibrösen Kapsel an die Knochen bildet die Synovialhaut häufig kleinere Fältchen, welche körniges Fett und sehr oft kleine Cysten einschliessen. Diese Fettkörner und Cysten wurden für Drüsen gehalten, und Glandulae Haversianae genannt. Man glaubte in ihnen die Absonderungsorgane des schlüpsrigen, eiweissreichen, dickslüssigen Sastes gesunden zu haben, der den Binnenraum eines Gelenks beölt. und Gelenkschmiere, Synovia, genannt wird. Die Synovia ist jedoch ein Secret der ganzen Synovialhaut, wie das Serum einer eigentlichen serösen Haut. — Die erwähnten Falten der Synovialhaut unterscheiden sich durch ihr Gewebe von der eigentlichen Synovialhaut, indem sie nach Gerlach aus lockerem, formlosem Bindegewebe bestehen, und sehr reich an Blutgefässen sind. Die Fasern des Bindegewebes setzen sich in Gestalt von Fransen über den freien Rand der Falte hinaus fort, und schicken zuweilen selbst kurze, zottenartige Verlängerungen ab (die sogenannten dendritischen Vegetationen), welche, so wie die Falte selbst, mit einer Epithelialschichte überzogen sind.

Als besondere Unterarten der Synovialhäute erscheinen:

a) Die Synovialscheiden der Sehnen, Vaginae tendinum synoviales. Sie kleiden die sibrösen Sehnenscheiden aus, sind somit Kanäle, und erleichtern durch ihr schmieriges Secret das Gleiten der Sehnen. Obsie sich auf die äussere Oberfläche der Sehnen umschlagen, also Doppelscheiden bilden, ist nicht mit Bestimmtbeit ermittelt. An jenen Synovialscheiden, wo eine Falte von der Wand der Scheide zur Sehne geht, und ein sogenanntes Schleimband der Sehne, Lig. mucosum, bildet, kann über die factische Einstülpung der Scheide kein Zweifel sein.

b) Die Schleimbeutel oder Schleimbälge, Bursae mucosae. Sie stellen verschieden grosse, abgeschlossene Säcke dar, welche zwischen einer Sehne (oder einem Bande) und einem Knochen, oder zwischen der ausseren Haut und einem von ihr bedeckten Knochenvorsprunge eingeschaltet sind, und deshalb in Bursae mucosae tendinosae und subcutaneae eingetheilt werden. Zuweilen drückt die Sehne ihren Schleimbeutel so sehr ein, dass sie von demselben ringförmig umschlossen wird. Verminderung der Reibung bedingt ihr Vorkommen. Sie communiciren häufig mit den Höhlen nahe liegender Gelenke. — Viele Schleimbeutel sind nach den Untersuchungen von Kölliker, Luschka und Virchow, nicht seröse, abgeschlossene Säcke, sondern nur Hohlräume zwischen sich reibenden Gebilden, welche eines besonderen häutigen Begrenzungsgebildes entbehren, und keine Synovia, sondern eine colloide Substanz absondern. Ich bin der Meinung, dass man den grossen Schleimbeuteln, wie sie unter dem Deltaund Psoasmuskel vorkommen, die Bedeutung selbstständiger membranöser Säcke nicht absprechen kann, gebe dieses jedoch für die kleineren, untergeordneten, und nur zusällig vorkommenden Schleimbeutel zu.

Jede dünne seröse Membran eignet sich zur mikroskopischen Untersuchung. Man bedient sich am besten der durch natürliche Einstülpung gebildeten Falten derselben mit freien Rändern, an welchen der Epithelialbeleg leicht zu erkennen ist. Die Falten der Arachnoidea, welche die Nervenwurzeln zu ihren Austrittsstellen aus der Schädel- und Rückgratshöhle geleiten, das Omentum minus etc. lassen eine bestimmte Faserungsrichtung deutlich wahrnehmen, und an einzelnen Stellen des Bauchfells (äusserer Ballen desselben) bilden die mikroskopischen Fadenelemente desselben ein so deutliches Netzwerk, dass man elastisches Gewebe vor sich zu haben glaubt.

Obwohl die serösen Häute aus Bindegewebssern gewebt sind, so kommt es doch in ihren seinen Maschen nie zur Fettablagerung, selbst wenn diese im ganzen Bindegewebsysteme wuchert, und der Textus cellularis subserosus damit überfüllt ist.

Das Serum der echten Wasserhäute und die Synovia unterscheiden sich durch ihren Eiweissgehalt, welcher im Serum 1 pCt., in der Synovia 6 pCt. in 100 Theilen Wasser beträgt. Salzsaures und phosphorsaures Natron, nebst phosphorsaurem Kalk, findet sich in beiden in sehr geringen Quantitäten. Der Eiweissgehalt bedingt die Gerinnbarkeit beider Flüssigkeiten, welche bei kräftigen Individuen und gut genährten Thieren bedeutender ist, als bei schwächlichen. Bei mikroskopischer Untersuchung der Synovia findet man, ausser abgestossenen Epithelialzellen und Oeltröpfchen, eigenthümliche granulirte Körner, welche viermal kleiner als die Epithelialzellen sind, und entweder für die in Auslösung begriffenen Epithelialzellen, oder für die Ansänge selbstständiger Bildungen gehalten werden können. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, als die Synovia alle chemischen Bestandtheile enthält, welche in

den organisationsschigen Blastemen angetroffen werden. Es wären dann die fraglichen Körner Anstage von Zellenbildungen (Kerne), welche sich aber nicht weiter entwickeln (Gerlach).

§. 38. Praktische Bemerkungen über die serösen Häute.

Die Absonderung der serösen Häute ist die einfachste secretorische Thätigkeit. Da das Blutserum dieselben Bestandtheile wie das seröse Secret einer Wasserhaut enthält, so ist die seröse Absonderung mehr ein Durchschwitzen oder Sintern, dessen Strömung nach der freien Fläche der Wasserhaut gerichtet ist. Diese Strömung geht mit grosser Schnelligkeit und Krast vor sich, wie man an der schnellen Ansammlung von Serum in eben entleerten wassersüchtigen Höhlen (Bauch-, Hodensackwassersucht), und an der eben so schnellen Reproduction des beim Staarstich abgeslossenen Humor aqueus beobachten kann. Die Wiederansammlung des Wassers in der Bauchhöhlenwassersucht (nach geschehener Entleerung durch den Stich) lässt sich selbst durch Einschnürung des Bauches mittelst Bandagen nicht verhüten. - Würden die serösen Membranen an der äusseren Oberfläche des Körpers vorkommen, so könnte ihre thauförmige Absonderung leicht verdampfen; in den Körperhöhlen dagegen muss sie sich ansammeln, und kommt als tropsbare Flüssigkeit: im Herzbeutel (als Liquor pericardii), in der Höhle der Arachnoidea (als Liquor cerebro-spinalis) vor. Krankhafte Vermehrung dieses serösen Secretes bildet die Höhlenwassersuchten. - Man war früher der Ansicht, dass seine Blutgesässe an der freien Oberfläche der Wasserhäute mit offenen Mündungen endigten. Man nannte diese supponirten Ausläuser der Blutgefässe Vasa exhalantia, und legte ihnen eine solche Feinheit bei, dass nur das Blutwasser, nicht aber der feste Bestandtheil des Blutes (die Blutkügelchen) in sie eindringen könne. Ebenso liess man aufsaugende Gefässe (Lymphgefässe, Vasa inhalantia) mit offenen Mäulern an ihnen entstehen. Sie konnten nie anatomisch nachgewiesen werden, und waren überhaupt nur eine willkürliche Annahme, um sich die Absonderung und Aufsaugung der serösen Flüssigkeiten leichter erklärlich zu machen. Eben so wenig existirt ein seröser Vapor oder Dunst in der Höhle einer serösen Membran, da die Höhle selbst nicht als leerer Raum bestehen kann. Die Organe, welche in einer Höhle eingeschlossen sind, füllen diese so genau aus, dass für serösen Dunst kein Platz übrig bleibt. Die Bauchwand, die Brustwand sind mit der Obersläche der Eingeweide in genauem Contact. Würde irgendwo zwischen Wand und Inhalt einer Höhle ein leerer Raum sich bilden, so würde der äussere Lustdruck die Wand so viel eindrücken, als zur Vernichtung des leeren Raumes erforderlich ist. Wasserdunst würde dem Lustdrucke nicht das Gleichgewicht halten können. Hat sich dagegen das wässerige Secret einer serösen Membran als tropfbare Flüssigkeit angesammelt, dann hält das Fluidum durch seine Unzusammendrückbarkeit dem äusseren Lustdrucke das Gleichgewicht, und die Höhle schwillt auf in dem Masse, als die flüssige Absonderung zunimmt (Hydrops). Wird eine solche hydropische Höhle angestochen, so springt die Flüssigkeit im Strahle wie aus einer Fontaine hervor, selbst wenn die Wand der Höhle nicht mit musculösen Schichten umgeben ist. Diese Beobachtung bekräftigt die Elasticität der serösen Membranen, welche selbst nach wiederholten Ausdehnungen durch Wassersucht nicht ganz und gar vernichtet wird.

Der Chirurg hat häufig Gelegenheit, sich von der Unempfindlichkeit nicht entzundeter seröser Häute zu überzeugen. — Da die in einander hineingestülpten Ballen einer serösen Membran (Bichat's Vergleich mit einer doppelten Nachthaube) sich allenthalben berithren, so darf es nicht wundern, wenn durch krankhaste Bedingungen, deren Erörterung nicht hieher gehört, häusig Verwachsungen derselben stattfinden, und da die im eingestülpten Ballen enthaltenen Eingeweide eine gewisse Beweglichkeit haben, welche auf diese Verwachsungen ziehend oder zerrend einwirkt, so wird die Verwachsungsstelle nach und nach in die Länge gezogen, und zu einem sogenannten falschen Bande, Lig. spurium, metamorphosirt werden, wie an den Bauch- und Brusteingeweiden häufig beobachtet wird. Solche Adhäsionen haben dann ganz das Ansehen seröser Häute, und besitzen auch ihre Structur aus Bindegewebsäden. Sie sind eben so gefässarm und unempfindlich, wie die serösen Häute, und der Wundarzt greift ohne Bedenken zur Schere, um sie zu trennen, wenn sie an Eingeweiden vorkommen, welche z. B. in einer Bruchgeschwulst liegen, und der Adhäsionen wegen nicht zurückgebracht werden können. - Die Entzündungen der serösen Membranen greifen nicht leicht auf die Organe über, welche sie umhüllen. Der Textus cellularis subserosus wird dagegen durch Ablagerung gerinnbarer Stoffe (Exsudate) häufig verdickt, und kann in diesem Zustande auf die Ernährung der tieferen Schichten nachtheiligen Einfluss äussern. Da der wässerige Thau, der eine seröse Haut beseuchtet, oder die dunne Schichte Synovia einer Synovialmembran gewissermassen als Zwischenkörper wirkt, der zwei seröse Hautslächen nur in mittelbare Berührung kommen lässt, so kann von Verwachsungen derselben nur dann die Rede sein, wenn dieser Zwischenkörper sehlt, oder durch gerinnbare und organisirbare Exsudate ersetzt wird. Eine gesunde Synovialhaut wird selbst nach jahrelanger Unthätigkeit eines Gelenks nicht verwachsen können. Die Fälle von Kühnholtz, Boyer und Cruveilhier, dienen dieser Behauptung als Beleg. Cruveilhier's Fall verdient, seiner Seltenheit wegen, erwähnt zu werden. Eine wahre Ankylose des rechten Kinnbackengelenks hatte auch das linke zu einer 83jährigen Unthätigkeit verdammt. Die anatomische Untersuchung zeigte weder in den Knorpeln noch in der Synovialhaut dieses Gelenks eine erhebliche Aenderung. — Das accidentelle seröse Gewebe spielt auch durch sein Vorkommen in den sogenannten Balggeschwülsten (Tumores cystici), deren innere Oberstäche mit einer serösen glatten Hautlamelle überzogen ist, eine wichtige Rolle. Dass es durch Verdichtung und Glättung von Bindegewebswänden an jedem Orte entstehen könne, wo die nöthigen äusseren und inneren Umstände zusammentressen, beweist die Einkapselung fremder Körper, welche durch Verwundung in das Bindegewebe und nicht mehr herausgelangten (Schussmaterial, Schrot, Kugeln), die seröse Auskleidung gewisser veralteter Geschwürsgänge (Fisteln), das Wandern lange getragener Fontanellen, und vorzugsweise die serose Ueberkleidung neugebildeter Gelenkhöhlen, wenn ein Knochen seinen alten Aufenthalt durch Verrenkung verliess, und sich nebenan eine neue Gelenkhöhle grub. Gewisse Arten von falschen Gelenken zwischen den Fragmenten gebrochener Knochen gehören auch hieher.

Literatur.

Durch Bichat wurde das seröse System als eine besondere Form des Bindegewebes aufgestellt, und auch dessen Name glücklich gewählt. Man hatte vor ihm keine Ahnung, dass die Arachnoidea und das Bauchfell so nahe verwandte Gebilde wären. Seine Abhandlung über das seröse System in seiner allgemeinen Anatomie 2. Thl. 2. Abtheil., pag. 64—91, ist noch immer das Beste, was die Literatur über diesen Artikel aufzuweisen hat. Henle subaumirt das seröse Gewebe unter das geformte Bindegewebe. Nähere anatomische Erörterungen finden sich nebst den allgemeinen Handbüchern in:

X. Bichat, traité des membranes. Paris, 1802. — N. Gendrin, histoire anat, des inflammations. Paris, 1826. Tom. I. — H. Weber, de cavitatibus corp. hum. etc. Lipsiae, 1838. — Ueber Synovialhäute und Schleimbeutel: G. Janke, de capsulis articularibus. Lips., 1753. — A. Monro, a Description of all the Bursae Mucosae etc. Edinb., 1788. fol. Deutsch von Rosenmüller. Leipzig, 1799. — N. Schreger, commentarius de bursis mucosis cutaneis. Erlang., 1825. fol. — Virchou. Verhandl. der Würzburger phys. med. Genellschaft. Bd. II., p. 281. — H. Luschka, die Structur der serösen Haute. Tübing., 1851, so wie die Recension dieser Schrift von Hessling, in der nied. illustr. Zeitung 1. Bd.

§. 39. Gefässsystem. Begriff des Kreislaufes und Eintheilung des Gefässsystems.

Verzweigte, häutige Rühren, welche Flüssigkeiten führen, heissen Gefäune, Vasu. Nach Verschiedenheit dieser Flüssigkeiten giebt es Luft-, Gallen-, Sannen-, Rlut-, Lymphgefässe u. s. w. Unter Gefässsystem, Systema ensorum, im engeren Sinne, versteht man jedoch blos die Blutund Lymphgefässe, von welchen hier gesprochen wird, und betrachtet die übrigen Gefässe bei den Brüsen, deren wesentlichen Bestandtheil sie hählen.

lus Blut ist jene im thierischen Leibe alleemein verbreitete Flüssigkeit, aus welcher die sum Leben und Wachsthum der Organe nothwendigen Stuffe berogen werden. Das Ethat wird aus den Nahrungsmitteln bereitet, und auf wunderbar verzweigten Wegen, in Rühren, deren Kaliber bis zur mikroskopischen Feinheit abnimmt, in allen Organen, mit Ausnahme der Hurngehalde, vertheilt. Die Bewegung des Blutes in seinen Gefassen hängt ron der Propulsionskraft eines eigenen Triebwerkes ab - Herz. - welthes where l'unerlass Blut emplangt and ausstiest. Die Gelässe, welche das Blut vom Herren zu den nahrungsbedärftigen (bramen leiten, heissen, weil sie das Phinomen des Pulses reigen. Schlagadern oder Pulsadern. Arterior: die beisse, welche des sur Ernihrung nicht mehr taugfiche Bint zum Berzen zurücksichren, Rintadern, Venne. Dem Wortlaufe mach sind such die Arterieu Blutadern, — sie enthalten ja Blut. Da man jedoch in jenen Zeiten, aus welchen diese Beneunungen stammen, nur die Venen für Mutwege hielt, die Arterien dagegen, weil sie nach dem Tode bindeer getroffen werden, für Luftwege ansalt, wie der Name Arterie serro roi dega régen, vom Luk führen ausdrückt, so musste die Bribehaltung

des alten Namens und des alten Begriffes nothwendig zu einer Unrichtigkeit führen.

Die Arterien verästeln sich, nach Art eines Baumes, durch zahllose Theilungen in immer feinere Zweige, welche zuletzt in die Anfange der Venen übergehen. Die mikroskopisch-feinen, und structurlosen Verbindungswege zwischen den Arterien und Venen heissen Capillargefässe, Vasa capillaria. Da das Blut aus dem Herzen in die Arterien, von diesen durch die Capillargefässe in die Venen strömt, und von den Venen wieder zum Herzen zurückgeführt wird, so beschreibt es durch seine Bewegung einen Kreis, und man spricht insofern von einem Kreislaufe, Circulatio sanquinis. Die Capillargefässe lassen gewisse farblose, slüssige Bestandtheile des Blutes durch ihre Wandungen durch, damit sie mit den zu ernährenden Organtheilchen in nähere Beziehung treten können. Die Organtheilchen suchen sich aus jenen flüssigen Bestandtheilen des Blutes, mit welchen sie bespült werden, dasjenige aus, was sie an sich binden und für ihre verbrauchten Stoffe eintauschen wollen; der Rest - Lymphe - kehrt durch besondere Gefässe, welche ihres farblosen, wasserähnlichen Inhaltes wegen Lymphgefässe, Vasa lymphatica, genannt werden, und an gewissen Stellen in die Venen einmünden, aus den Organen zurück. Die Lymphe wird also mit dem Blute der Venen gemischt, und fliesst mit diesem zum Herzen zurück. Als eine Abart der Lymphgesässe erscheinen die Chylusgefässe, welche keinen wasserklaren Inhalt, sondern jenen im Darmkanale aus den Nahrungsmitteln ausgezogenen Sast führen, welcher seiner milchweissen Farbe wegen auch Milchsaft, Chylus, genannt wird. Die Chylusgefässe entleeren sich in die Lymphgefässe, und der Milchsaft wird somit auf demselben Wege wie das Venenblut zum Herzen zurückgeleitet werden. Da aus dem Milchsaste erst Blut gemacht werden soll, und.das Venenblut ebenfalls einer neuen Befähigung zum Ernährungsgeschäste bedarf, diese Umwandlung aber nur durch Vermittlung des Oxygens der atmosphärischen Lust möglich wird, so kann das mit Milchsast gemischte Venenblut nicht alsogleich aus dem Herzen wieder in die Schlagadern des Körpers getrieben werden. Es muss vielmehr zu einem nicht in den allgemeinen Kreislauf einbegriffenen Organ geführt werden, in welchem es mit der atmosphärischen Lust in Wechselwirkung tritt, seine unbrauchbaren Stoffe (Kohlenstoff und Wasserstoff) absetzt, und dafür neue (Oxygen) aufnimmt. Dieses Organ ist die Lunge. Was vom Herzen zur Lunge strömt, ist Venenblut: was von der Lunge zum Herzen strömt, ist Arterienblut. Der Weg vom Herzen zur Lunge, und durch die Lunge zum Herzen ist ebenfalls ein Kreis, der aber kleiner ist, als jener vom Herzen durch den ganzen Körper zum Herzen; man spricht also von einem kleinen und grossen Kreislaufe (Lungen- und Körperkreislauf), welche in einander übergehen, und das Blut somit eigentlich die geschlungene Bahn einer 8 durchläuft. Inwiesern diese Vorstellung richtig ist, wird bei der speciellen Beschreibung der grossen Blutgefässe des Herzens näher besprochen werden.

Das Gefässsystem besteht somit aus folgenden Abtheilungen:

1. Herz, 2. Arterien, 3. Capillargefässe, 4. Venen, 5. Lymph- und Chylusgefässe, von welchen die erste in der speciellen Anatomie des Gefässsystems, der Bau der vier letzten aber hier zur Sprache kommt.

§. 40. Arterien. Bau derselben.

An den Stämmen, Aesten und Zweigen der Arterien, findet sich derselbe Bau. Man unterscheidet eine innere, mittlere und aussere Arterienhaut, welche sämmtlich in einander geschobene Röhren bilden. Die innere Haut gehört allen Abtheilungen des Gefässsystems gleichmässig an, wurde vormals als glatte Gefässhaut, Tunica glabra vasorum, den serösen Häuten beigezählt, stellt aber nur eine an verschiedenen Stellen verschieden dicke Epithelialschichte dar, welche aus kernhaltigen, sehr platten, eckigen, oder häusig an beiden Enden zugespitzten Zellen zusammengesetzt ist. Die äussere Haut besteht aus Bindegewehfasern, mit allen diesem Gewebe zukommenden mikroskopischen Eigenschaften, Tunica s. Vagina cellularis (auch Membrana adventitia); sie geht ohne deutliche Grenze in das Bindegewebe über, durch welches die Arterien ihren Lauf nehmen. Die mittlere Arterienhaut wurde lange und allgemein als Tunica elastica beschrieben. Man liess sie aus longitudinalen und kreisförmigen, oder spiralen, platten, elastischen Fasern bestehen, welche eine innere Längenschichte und eine äussere Kreisfaserschichte bilden. Durch Henle's Entdeckungen wurde die elastische Arterienhaut in vier verschiedene Gewebschichten getrennt, von welchen in der Anmerkung.

Die mittlere Haut bedingt vorzugsweise die Dicke der Arterienwand. Sie nimmt mit der durch fortgesetzte Theilung der Arterien zunehmenden Feinheit derselben ab, und verschwindet in den Capillargefässen gänzlich. Ihre Elasticität und Contractilität erlaubt dem Gefässe sich auszudehnen, und sich wieder auf sein früheres Lumen zu verkleinern (Puls), sich in seiner Scheide zurückzuziehen, und offen oder klaffend zu bleiben, wenn es durchschnitten wurde. Die mittlere Arterienhaut ist an den grossen Arterien so dick, dass sie in mehreren Schichten sich abziehen lässt. Man hat die Nerven der Gefässe bis zu den feineren Ramificationen derselben verfolgt (Purkinje, Pappenheim). Ihre Endigungsweise jedoch ist woch nicht erkannt.

Mikroskopische Untersuchung. Die innere Epithelialschichte der Arterien kann nur an frisch geschlachteten Thieren befriedigend untersucht werden. Durch Abschaben der inneren Oberstäche einer grösseren Arterie erhält man längliche, bandartig schmale, zugespitzte, mit deutlichem Kerne versehene Zellen (Spindelepithelium). Ihre Gruppirung zum Psiaterepithelium erkennt man am Faltungsrande einer dünnen abgezogenen Lamelle, oder noch deutlicher am freien Rande jener natürlichen Falten, welche als Klappen, Faltulae, am Ursprunge der Aorta und der Lungenschlagader vorkommen.

— Die mittlere oder elastische Haut grösserer Arterienstämme muss nach Henle's Beobachtungen als einsache Membran ausgegeben, und statt ihrer

vier differente Häute eingeschaltet werden, welche von innen nach aussen in folgender Ordnung liegen:

- a) Die gefensterte Haut. Sie ist fein, durchsichtig, und aus elastischen Fasern gewebt, welche eine gewisse Steisheit besitzen, und sich zu Netzen mit spitzigen Interstitien verbinden. Ihren Namen erhielt sie von Henle der runden oder eckigen Oeffnungen wegen, welche in grösserer oder geringerer Anzahl zwischen den Fasern außtreten, und welche an abgezogenen Stücken dieser Haut, die sich gerne der Länge nach einrollen, dem Rande derselben ein gekerbtes oder ausgezacktes Anschen verleihen sollen. Mir ist es wahrscheinlich, dass die Grundlage der sogenannten gesensterten Haut eine structurlose, wasserhelle Haut ist, welche mit Fasergittern belegt wird, und die Maschen der Gitter, ihrer Durchsichtigkeit wegen, für Löcher imponiren. (An der inneren Fläche der gesensterten Haut haben Donders und Jansen sehr seine Längensasern, und an der äusseren Fläche eben solche Quersasern beschrieben, welche den elastischen Fasern sehr nahe stehen.)
- b) Die Längenfaserhaut. Sie besteht aus Längenfasern, welche sich, wie im elastischen Gewebe, durch Anastomosen zu rhombischen Maschen verbinden. Essigsäure ändert sie nicht. Man kann sie nicht rein darstellen, und erkennt sie nur entweder an dünnen Arterien, die mit dem Compressorium flachgedrückt werden, oder an vorsichtig abgezogenen Stücken der gefensterten Haut, welchen sie in Fragmenten anhängt.
- c) Die Ringfaserhaut. Sie besteht aus platten, contractilen Faserzellen, die sich der Länge nach an einander reihen (Kölliker), und aus elastischen Fasern. (An den grösseren Stämmen der Arterien prävaliren die elastischen Elemente über die contractilen.) Beide gehen in Spiraltouren um das Gefäss herum, und lassen sich an grossen Arterien, welche in Holzessig gehärtet wurden, schichtweise ablösen. Ihre Richtung begünstigt die Trennung der Arterien in der Quere, durch Reissen, Brechen, oder durch Umschnüren mit einem feinen Faden. Die platten Fasern dieser Haut verhalten sich auch in chemischer Hinsicht ganz wie Muskelfasern.
- d) Die elastische Haut. Sie ist die zunächst an die Zellhaut der Arterien stossende, aus dicht genetzten, elastischen, starken Fibrillen gestochtene Gesässhaut. Ihre Elemente greisen auch vielsältig in die Tunica cellularis und in die Ringsaserhaut über. An kleineren Arterien ist sie nicht darstellbar, an grösseren dagegen sindet man sie leicht, wenn man eine gehärtete, und der Länge nach ausgeschnittene Arterie mit vier Nadeln (an den 4 Ecken) besestigt, und, nach Entsernung der inneren Schichten, mit dem Ablösen der Kreissasern (welche hier als quere Streisen erscheinen) so lange fortsährt, bis man auf eine weisse derbe Haut kommt, von welcher sich weder longitudinale noch transversale Bündel abziehen lassen. Diese ist die elastische Haut.

§. 41. Allgemeine Verlaufs- und Verästlungsgesetze der Arterien.

1. Die grossen Arterienstämme verlaufen, mit Ausnahme des Aortenbogens, meistens geradlinig, die Aeste und Zweige häufig mehr weniger gebogen oder geschlängelt. In Organen, welche ein veränderliches Volumen haben, sich ausdehnen und zusammenziehen, breiter und schmäler werden können (Zunge, Lippen, Gebärmutter, Harnblase u. s. w.), werden, aus begreistichen Gründen, die Gesässkrümmungen zur Norm. Bei alten Individuen werden mehrere sonst geradlinige Arterien geschlängelt getrossen (Art. iliaca, splenica). Die normalen Schlängelungen hängen entweder

von der Umgebung der Arterien ab, z. B. von gekrümmten Knochenkanälen, Löchern oder Furchen, durch welche sie gehen, oder werden dadurch bedingt, dass die Bindegewebscheide der Arterie an einer bestimmten Stelle straffer angezogen ist, als an der gegenüberliegenden. Die Krümmungen der Carotis vor ihrem Eintritte in den Canalis caroticus, die rankenförmigen Schlängelungen der inneren Samen-, Nabel- und Gebärmutterarterien, entstehen auf diese Weise. Sie lassen sich durch Lospräpariren der Zellscheide ausgleichen. An der convexen Seite einer Krümmung ist das Gewebe der Arterienwand dicker, als an der concaven, weil das Anprallen des Blutstromes die convexe Seite mehr als die concave gefährdet. — Die bleibenden abnormen Schlängelungen der Arterien hängen von partiellem Verlust ihrer Elasticität und Contractilität durch pathologische Processe ab, z. B. Ablagerungen, Exsudate, Verknöcherung etc.

- 2. Die grossen Arterienstämme der oberen Körperhälste liegen hinterden Venen, die der unteren Körperhälste vor den Venen. Es gilt diese
 Regel nur für jene Arterien, welche von einer einfachen Vene begleitet
 werden. Die primären und secundären Aeste der oberen Hohlvene liegen
 mehr weniger vor den correspondirenden Arterien, die der unteren Hohlvene (abwärts von den Nierenvenen, welche vor den Arterien lausen) hinter denselben.
- 3. Nie verläuft eine Schlagader grösseren Kalibers ausserhalb der Fascia eines Gliedes, sondern möglichst tief in der Nähe der Knochen. Eben so allgemein gilt es, dass die grösseren Arterienstämme in ihrem Verlaufe sich an die Beugeseiten der Gelenke halten, wo sie während der Beugung weder Zerrung noch Aufheben ihres Lumens durch Druck zu fürchten haben, was beim Verlaufe an der Streckseite unvermeidlich gewesen wäre.
- 4. Die gleichnamigen Aeste grosser und unpaarer Arterienstämme entspringen selten und nur zufällig symmetrisch. Theilt sich ein grösserer Arterienstamm gabelförmig in zwei Zweige, so ist die Summe der Durchmesser der Zweige grösser, als der Durchmesser des Stammes, und muss es sein, da die Lumina cylindrischer Röhren sich wie die Quadrate der Durchmesser verhalten, und die beiden Aeste unmöglich dieselbe Quantität Blut aufnehmen könnten, welche ihnen durch den Stamm zugeführt wird, wenn die Summe ihrer Durchmesser nicht grösser wäre, als jener des Stammes.
- 5. Die Winkel, welche die abgehenden Aeste mit dem Stamme machen, sind sehr verschieden. Spitzige Ursprungswinkel finden sich gewöhnlich bei Arterien, die einen langen Verlauf zu machen haben, um zu ihrem Organe zu kommen (Art. spermatica interna); rechte Winkel unter entgegengesetzten Umständen (Art. renalis). Ist der Winkel grösser als ein rechter, so heisst die Arterie eine zurücklaufende, Art. recurrens (obere Intercostalarterien etc.). Es kann auch eine unter spitzigem Winkel entsprungene Arterie später sich umbeugen und zurücklaufend werden, wiedie Arteria recurrens radialis et ulnaris.

- 6. Verbinden sich zwei Arterien mit einander, so dass das Blut der einen in die andere gelangen kann, so entsteht eine Zusammenmündung, Anastomosis. Sie ist entweder bogenförmig, durch Zusammenlausen zweier Arterienenden (Gefässbogen, Arcus), oder zwei Stämme werden in ihrem Laufe durch einen mehr weniger queren Communicationskanal verbunden (Arteriae communicantes an der Basis des Gehirns), oder aus zwei Arterien wird durch Verschmelzung eine einfache (Art. corporis callosi, vordere und hintere Rückenmarksarterie, mehrfacher Ursprung der Wirbelarterie). Gleichförmige Vertheilung der Blutmasse liegt den Anastomosen überhaupt zu Grunde. Die queren Communicationskanäle gewähren noch den Vortheil, dass, wenn einer der beiden Stämme unter der Anastomose comprimirt wird, der Blutlauf nicht in Stockung zu gerathen braucht, da durch die Anastomose auch Blut in das über der Compres-.sionsstelle befindliche Stück der Arterie gebracht wird. - Die Anastomosen werden um so häusiger, in je seinere Aeste sich eine Arterie bereits theilte. Vereinigen sich zwei Aeste einer Arterie bald darauf wieder zu einem Stamme, so entsteht eine sogenannte Insel, und theilt sich ein Stamm in mehrere oder viele Zweige, die sich wieder vereinigen, oder pinselförmig auseinander fahren, so nennt man diese Vervielfältigung durch Spaltung ein Wundernetz. Es giebt demnach bipolare und unipolare Wundernetze. Erstere kommen im Menschen nur in den kleinen Arterien der Niere, letztere nur in der Choroidea vor. (An den Extremitäten der Edentaten und Halbaffen, so wie an den Intercostalarterien der Delphine und Walfische. an den Gekrösarterien der Schweine, und den Carotiden vieler Wiederkäuer. erreichen die Wundernetze einen erstaunlichen Entwicklungsgrad.
- 7. Da die Arterien nur als Leitungsröhren ihres Inhaltes functioniren, und keine andere höhere Nebenbestimmung auszuführen haben, so werden Varietäten des Ursprungs und Verlauß ohne allen Nachtheil der Verrichtungen vorkommen können. Für viele untergeordnete Arterien (Muskelzweige) giebt es gar keine feststehende Ursprungsnorm, und selbst grosse Arterien lebenswichtiger Organe unterliegen zahlreichen Spielarten.
- 8. Nur die grösseren Schlagaderstämme besitzen in ihren Wandungen ernährende Arterien (*Vasa vasorum*). Sie entspringen jedoch nie aus dem Stamme, welchen sie zu ernähren haben, sondern aus Nebenästen desselben.
- 9. Neben einander liegende Arterien und Venen sind in eine gemeinschaftliche Scheide eingeschlossen, welche für grössere Gefässstämme fibrös, für kleinere nur zellig ist. Eine Zwischenwand der Scheide isolirt die Arterie von der Vene. Die Scheide enthält die ernährenden Gefässe und führt sie der Arterie zu. Ihre Spaltung, und das Freimachen der in ihr eingeschlossenen Arterie, ist der am meisten Aufmerksamkeit erfordernde Act der chirurgischen Arterienunterbindung.

Es liessen sich diese Gesetze sehr vervielsältigen, wenn man Alles aufzählen wollte, was die Arterien nicht thun. Das Gesetz, dass die Arterien der oberen Körperhälste hinter, die der unteren vor den gleichnamigen Venen

liegen, hat selbst für die von doppelten Venen begleiteten Arterien insofern Gültigkeit, als etwa vorkommende Anastomosen der beiden begleitenden Venen in der oberen Körperhälste vor, in der unteren hinter der Arterie weglausen. Dass die Vena jugularis communis nach aussen von der Arteria carotis communis, und die Vena cruralis nach innen von der Arteria cruralis liegt, sind nur scheinbare Ausnahmen. Wenn die Vena jugularis communis von Blut strotzt, deckt sie die Arteria carotis vollkommen zu, wie man bei Vivisectionen, und Unterbindungen der Carotis am lebenden Menschen beobachten kann, und die Vena cruralis liegt immer zugleich etwas hinter der Arterie (der innere Rand der Arterie über dem Musseren der Vene), so dass bei krankhaster Ausdehnung der Arterie (Aneurysma) die Vena cruralis nie auf, sondern immer hinter dem Aneurysma liegend gesehen wurde.

§. 42. Physiologische Eigenschaften der Arterien.

Die Bewegungserscheinungen ergeben sich aus dem Baue der Arterien. Die wichtigste derselben ist der Puls. Die älteren Anatomen erklärten den Puls als die Erscheinung einer selbstthätigen Expansion und Contraction der Arterien, und hielten ihre mittlere Haut für durchaus mus-Später wandte man sich zum anderen Extreme, und erklärte die Arterien für vollkommen passiv, und ihre Expansion und Contraction für die Folge der Ausdehnung bei eindringender, und des Zusammenfallens nach vorbeigegangener Blutwelle. Auch diese Vorstellung musste aufgegeben werden, seit Kölliker contractile Elemente in den Wänden der Arterien nachwies (§. 40, c.), und durch Reizungsversuche an frischen Schlagadern amputirter Extremitäten, und des Mutterkuchens, eine selbstthätige Contraction der Arterien constatirt wurde. Kälte und veränderte Nervenstimmung rufen Zusammenziehung der Arterien nur allmälig hervor. Die bei gewissen Affecten vorkommende Blässe der Haut durch Contraction der Arterien, und die Cutis anserina durch Contraction der glatten Muskelfasern der Haut, gehen Hand in Hand. Der Umstand, dass eine lebende Arterie, wenn sie durchschnitten wird, ihr Lumen verengert, während die todte am Cadaver sich nur der Länge nach retrahirt, bestätigt zur Genüge die Existenz der Contractilität der Arterienwände. Sollte die variable Ausdehnung oder Enge einer Arterie blos vom Drucke der Blutmasse, und somit von der Stosskrast des Herzens allein abhängen, so könnten nie örtliche Verengerungen oder Erweiterungen der Arterie beobachtet werden. Diese müssten, der Continuität des arteriellen Röhrensystems wegen, in jeder Arterie allgemein vorkommen. Man sieht ja auch Arterien, die, nachdem sie im Leben durchschnitten wurden, und sich so sehr zusammenzogen, dass der Blutfluss bedeutend verringert wurde, nach dem Tode durch Erlöschen der lebendigen Contractilität wieder weiter werden. Dass in Henle's Ringfaserhaut das contractile Element der Arterien sich vorfindet, wurde schon früher gesagt. Der Puls ist somit der Ausdruck der durch den Widerstand der Arterienwände modificirten Stosskrast des Herzens. Die Zahl und der Rhythmus der Pulsschläge hängt von der Herz-

thätigkeit ab, - die Härte oder Weichheit von dem grösseren oder geringeren Widerstande der Arterienwände, - die Grösse oder Kleinheit von der Gesammtmenge des Blutes, und von der Grösse der durch das Herz ausgetriebenen Blutwelle. Es kann deshalb der Puls scheinbar entgegengesetzte Eigenschaften darbieten. Ein kleiner Puls kann hart, ein grosser weich sein. - Nebst dem durch den Puls gegebenen Heben und Sinken der Arterie, krümmt sie sich während des Hebens auch seitlich oder schlängelt sich, indem sie sich zu verlängern strebt, aber ihrer Befestigung an nebenliegende Organe wegen, keine lineare Verlängerung gestattet wird. Diese Schlängelungen der Arterien während des Durchgangs der Blutwelle, lassen sich auch durch künstliche Injection von Flüssigkeit erzielen, und sind letztere mit gerinnenden oder erstarrenden Stoffen gemacht worden (wie bei der anatomischen Injection der Gefässe Behufs ihrer leichteren Zergliederung), so kann man die Schlängelungen fixiren. Verlust der Elasticität durch krankhaste Processe (atheromatöse Ablagerungen, Verknöcherungen etc.), und durch hohes Alter, wird sie gleichfalls zu permanenten Erscheinungen machen, wie man an den rankenförmigen Schläsearterien hochbejahrter Greise zu sehen Gelegenheit hat.

Die Empfindlichkeit der Arterien ist unbedeutend, und die Nerven, welche in ihren Wandungen vorkommen, sind gewiss nicht vorwaltend sensitiver Natur. Wenn man bei Unterbindung der Schenkelarterie nach Amputationen, im Momente, wo die Ligatur festgeschnürt wird, ein Zusammenfahren oder Zucken des Kranken beobachtet, so ist dieses erstens nicht bei jeder Unterbindung dieses Gefässes, und an anderen Arterien gar nicht beobachtet worden, und kann zweitens, bei unvollkommener Isolirung der Arterie, durch Nervensilamente bedingt werden, welche die Hast des Operateurs in die Ligaturschlinge aufnehmen machte. Vollkommen unempfindlich sind jedoch die Arterien nicht. Man überzeugt sich davon am deutlichsten an Fröschen, welche, nachdem man sie verbluten liess, und die Krämpse beschwichtigt sind, welche sich hiebei einstellen, einige Stunden darauf von Neuem sich zu bewegen beginnen, wenn man die innere Oberstäche der Aorta mit einem eingeführten Stecknadelkopse reibt. Selbst an Arterien von 1/2" Durchmesser lassen sich durch Behandlung mit Holzessig feine Nerven mikroskopisch nachweisen (Purkinje), und die Beobachtungen über Nerven in den grösseren Gefässstämmen, welche keine andere Bestimmung haben können, als die Gefässhäute selbst zu versorgen, sind so zahlreich, dass über die Abhängigkeit der Contractilitätserscheinungen der Arterien vom Nervensysteme kein Bedenken obwalten kann.

Die ernährende Thätigkeit in den Gefässwandungen äussert sich durch das schnelle Verheilen der Gefässwunden unter günstigen Umständen, und durch die verschiedenen Formen krankhafter Ablagerungen zwischen den einzelnen Hautschichten der Gefässwand.

Sehr merkwürdig ist die Entstehungsweise neuer Blutgefässe, welche im bebrüteten Ei, und beim ausgebildeten Organismus in Organen

beobachtet wird, welche periodische Entwicklungserscheinungen darbieten (wie die Gebärmutter in der Schwangerschaft). Die grossen Blutgefässe entwickeln sich im Embryo aus kernhaltigen Zellen, welche sich zu Strängen gruppiren, worauf die innersten Zellen dieser Stränge sich zu Blutkügelchen, die äussersten sich zur Gefässwand metamorphosiren, indem sie sich zu den verschiedenen Formen von Fasern umwandeln, welche die Wand eines Blutgefässes bilden. Die mittleren behalten ihre ursprüngliche Zellennatur als Epithelium. Die im §. 44 abgehandelten Capillargefässe haben eine andere Entstehung. Sie bilden sich durch lineare Aggregation von Zellen, deren Zwischenwände schwinden, wodurch eine feine Röhre entsteht, und deren Kerne mit der Wand der Röhre verwachsen. Aus den Wänden dieser Röhren sprossen Aeste hervor, welche rasch wachsen. Gleichzeitig werden andere umliegende Zellen ästig, die Aeste verbinden sich mit jenen, welche aus den Röhren hervorwuchsen, und so entsteht ein Netzwerk, welches sich mit den schon fertigen grösseren Gefässstämmen in Verhindung setzt. Dass in pathologischen Neubildungen (Geschwülste, organisirte Exsudate) der Gefässbildungsprocess auf dieselbe Weise eingeleitet werde, ist der Analogie nach zu vermuthen, und wurde bereits durch Autopsie erhärtet.

E. A. Platner, über die Bildung der Capillargesisse, in Müller's Archiv. 1844. pag. 525. — J. Engel, Beiträge zur Anatomie der Gesisse, in der Zeitschrist der Wiener Aerzte. 1847 und 1849. — Zeicky's und Bruck's schon eitirte Abhandlungen. — Remak, in Müller's Archiv. 1850. — M. Schultze, de arteriarum structura. Gryph., 1850.

§. 43. Praktische Anwendungen.

Da der Kreislauf vom Herzen bedingt wird, so muss dieses bei Hindernissen in der Bluthahn kräftiger agiren. Wird aber ein Muskel, und ein solcher ist das Herz, anhaltend stärker verwendet, so nimmt seine Masse zu, — es entwickelt sich Hypertrophie (L'ebernährung). Nehmen die Hindernisse in einem solchen Grade zu, dass die Zunahme des Herzens an Masse dem zu leistenden Geschäfte desselben nicht entspricht, so wird das Herz nicht im Stande sein, die Blutmenge, die es empfängt, ganz aus sich hinauszutreiben. Was zurückbleibt, übt mit der neuanlangenden Blutmenge einen Druck auf die hypertrophische Herzwand, durch welchen das Cavum des Herzens erweitert wird (Hypertrophie und Dilatation). Gewinnt die Erweiterung über die Hypertrophie das L'ebergewicht, so heisst dieser Fall Herzaneurysma.

Es ist eine unrichtige Vorstellung, dass die Schwere des Blutes seine Bewegung fördern oder hemmen könne. Wenn eine Pumpe Flüssigkeit in einem System geschlossener Röhren herumtreiben soll, so ist es ganz gleichgültig, welche Lage die Röhren haben, ob vertical oder horizontal. Die Schwere hemmt nicht die Bewegung in den aufsteigenden, noch fördert sie die Bewegung in den absteigenden Röhren des Systems. Sie hat aber

einen unläugbaren Einfluss auf die gleichmässige Vertheilung der Flüssigkeit im System, wenn dessen Röhren nachgiebig sind, wie die Blutgefässe des Menschen (besonders bei geschwächter oder aufgehobener Elasticität derselben), in welchem Falle die absteigenden Röhren weiter werden müssen als die aufsteigenden.

Der gefahrdrohende Charakter der Blutungen durch Verwundung der Gefässe, und das allgemeine Vorkommen derselben bei jedem chirurgischen blutigen Eingriffe, giebt den anatomischen und physiologischen Eigenschaften der Arterien ein hohes praktisches Interesse. Die allgemein gültige Regel, in jedem vorkommenden Falle so viel als möglich mit Umgehung der grösseren Gefässstämme zu operiren, wird von jedem wissenschaftlichen Wundarzte nach Verdienst gewürdigt. Blutung, die man nicht erwartete, und auf die man nicht gesasst ist, ist für jede Operation ein wichtiger, zuweilen sehr gefährlicher Zufall, und man sucht sich durch Unterbindung oder Compression des Hauptgefässes jener Körperstelle, an welcher operirt werden muss, vor ihrem Eintritte zu bewahren. Die Contractilität der Gefässe bedingt den allgemeinen Gebrauch der Kälte als Blutstillungsmittel, und wie bedeutend der Einfluss ist, welchen die Nerven auf die Zusammenziehungsfähigkeit der Gefässe äussern, zeigt die blutstillende Wirkung der Gemüthsaffecte, Ueberraschung, Schreck, und selbst plötzlich veranlassten Schmerzes (Schnüren des Fingers mit einem Bindfaden beim Nasenbluten. Reiben einer blutenden Wundsläche mit den Fingern etc.). Die wichtigsten Unterbindungs - und Compressionsstellen werden in der speciellen Muskelund Gefässlehre angegeben.

Eine krankhaste Ausdehnung einer Arterie, welche durch Berstung oder Verbrandung lebensgefährlich werden kann, heisst Aneurysma. Sie kommt nur an Schlagadern grösseren Kalibers vor. Die kleinste Arterie, an welcher man bisher ein Aneurysma beobachtete, war die Arteria auricularis posterior (Ch. Bell). Da die Arterienhäute eine verschiedene Structur und somit verschiedene Dehnbarkeit besitzen, so können bei schnell entstandenen Ausdehnungen, die Zellhaut und die elastische Haut, welche in hohem Grade dehnbar sind, ganz bleiben, während die übrigen an einer oder mehreren Stellen gewaltsam getrennt werden. So lange die Arterienwand gesund ist, wird es ihre Elasticität nicht leicht zur Entstehung eines Aneurysma kommen lassen. Damit sich ein solches entwickle, muss die Structur der Arterien durch Nutritionsanomalien alienirt, und dadurch ihre Elasticität und Contractilität beeinträchtigt worden sein. Entzündung und darauf folgende Verdickung der Arterienwand schwächt ihre Elasticität, oder hebt sie auf. Man hat deshalb, bei rohen Einrichtungsversuchen veralteter Luxationen des Oberarms, die Arteria axillaris entzweireissen gesehen (Delpech). - Wird eine Arterie mit einem dunnen Faden unterbunden, welcher fest zugeschnürt wird, so bleibt die Zellhaut und die elastische Haut ganz; die Ringsaserhaut und die übrigen inneren Häute werden kreissörmig durchschnitten. Wird eine lebende Arterie grösserer Art quer angeschnitten, so klafst die Wunde bedeutend, und der Blutverlust ist sehr gross, wenn die Arterienwunde mit der äusseren Hautwunde correspondirt. Wird sie vollends quer durchgeschnitten, so zieht sich das elastische Arterienrohr in seiner Zellscheide stärker zurück, als diese; die Scheide wird durch den Zug der Arterie gesaltet oder eingeschlagen, und der Blutverlust wird geringer sein, als bei incompleter Trennung des Gesässes. Daher der Rath der älteren Chirurgie, angeschnittene Arterien ganz zu trennen (Theden). Dass es wirklich die Scheide ist, welche die Grösse der Blutung bei queren Trennungen der Arterien beschränkt, zeigt der Versuch am lebenden Thiere. Wird die Cruralarterie eines grossen Hundes sammt ihrer Scheide durchschnitten, so stillt sich die Blutung nach kurzer Zeit von selbst, und das Thier erholt sich. Wird aber die Scheide der Arterie in einer grösseren Strecke lospräparirt und entsernt, und hieraus die Arterie durchschnitten, so ist der Verblutungstod gewiss.

Wird eine Arterie unterbunden (einer Blutung oder eines Aneurysma wegen), so verwächst sie von der Unterbindungsstelle bis zum nächst oberen und unteren stärkeren Nebenast. Diese Verwachsung ist ansangs eine blosse Ausfüllung mit geronnenem Blute (provisorische Obliteration), später bildet sich durch gerinnbare Lymphe ein solider Pfropfen (Thrombus), der mit der Arterienwand verwächst, so dass sie in einen festen, nicht hohlen Strang umgewandelt wird, dessen Peripherie viel kleiner als die des Gefässes ist, dessen Fortsetzung er darstellt. - Die Unterbindung einer grösseren Schlagader, z. B. der Brachialis oder Cruralis, hebt den Kreislauf in den Theilen unter der Unterbindungsstelle nicht auf; er findet nur mit sehr verminderter Energie und auf Umwegen statt. Da über und unter der Unterbindungsstelle Aeste abgehen, welche in ihren weiteren Verzweigungen mit einander anastomosiren, so wird durch diese Anastomosen das Blut in das unter der Ligaturstelle befindliche Stück der Arterie, aber mit ungleich schwächerer Triebkraft, gelangen. Haben sich diese Anastomosen so sehr erweitert, dass sie das abgebundene Gefässlumen ersetzen. so geht der Kreislauf ohne weitere Unordnung vor sich, und wird sodann Collateralkreislauf genannt. Ich besass einen Hund, dem ich die Arteria innominata und beide Arteriae crurales in der Frist eines Jahres unterbunden hatte, und der sich, obwohl sein Blut auf ungewöhnlichen Wegen kreiste, ganz wohl befand. Selbst die absteigende Aorta der Brusthöhle kann verwachsen, und durch die Entwicklung der Collateralgefässe supplirt werden. Die von Römer, Meckel u. A. beschriebenen Fälle, und ein im Prager anatomischen Museum befindlicher beweisen es. Letzterer gehörte einem vollkommen gesunden Individuum an, welches an Lungenentzündung starb. Der Collateralkreislauf ging von den Aesten der Subclavia durch ihre Anastomosen mit den Intercostalarterien zu dem unter der Verwachsungsstelle gelegenen Theil der Aorta. Die Intercostalarterien waren zur Grösse eines Schreibfederkiels erweitert, rankenförmig geschlängelt, und erzeugten durch ihr Pulsiren eine continuirliche Erschütterung der

Thoraxwand, welche als schwirrendes Geräusch zu hören und zu fühlen war, und vom Kranken viele Jahre vor seinem Tode gefühlt wurde, ohne die geringste Störung seiner übrigen Verrichtungen nach sich zu ziehen.

Die Befestigung einer Arterie an ihre Umgebung ist sehr locker, sie kann deshalb kleine seitliche Ortsveränderungen ausführen, sie schlüpst unter dem drückenden Finger, und eben so oft und glücklich unter stechenden, oder der Länge nach schneidenden Werkzeugen weg. Nur kranke Arterien sind durch ihre verdickten Scheiden fester an den Ort gebunden. welchen sie einmal inne haben. — Da die Arterienscheiden nicht so elastisch sind, und sich nicht in dem Grade zurückziehen, wie die Arterien selbst, so wird eine durch ihre Scheide hindurch verletzte Arterie eine grössere Wunde darbieten, als in der Scheide gefunden wird. Das Blut wird nicht in der Menge, in welcher es aus der Arterienwunde kommt, durch die kleinere Wunde der Scheide absliessen können; es wird sich somit lieber zwischen Scheide und Arterie einen Weg präpariren, und sogenannte Blutunterlaufungen bedingen. Dasselbe kann bei Verschliessung der äusseren Wunde durch Verbände oder durch Vorschieben anderer Weichtheile, vom Wundkanale aus zwischen andere Gewebe, stattsinden, welche blutrünstig werden (Infiltrationen, Suggillationen). Sie sind nicht zu verwechseln mit den Senkungen des Blutes in seinen Gefässen, welche nach den Gesetzen der Schwere gegen die abschüssigsten Stellen des Leichnams stattfinden (Todtenflecken).

Die Zurückziehung durchschnittener Arterien erschwert ihr Auffinden im lebenden Menschen bei Verwundungsfällen, und erheischt eine Verlängerung oder Erweiterung der Wunde, um das blutende Ende finden und unterbinden zu können. Gefässe, welche wenige oder keine Seitenäste abgeben, ziehen sich sehr stark zurück; solche, welche durch ihre Seitenäste gleichsam an benachbarte Organe befestigt werden', weniger. Man kann diese praktisch-wichtige Erfahrung am Cadaver machen. Wird die Kniekehlenarterie einfach entzweigeschnitten, so beträgt ihre Retraction 1—1½ Zoll; werden aber früher ihre Seitenäste getrennt, und so das Gefäss isolirt, so zieht es sich um 1½—2 Zoll zurück. Ist der Theil, dessen Arterie entzweit werden soll, gespannt, so ist die Retraction grösser, als wenn er sich selbst überlassen wird. An gestreckten und gebeugten Gliedmassen der Leichen lässt sich dieser Satz feststellen.

Ein Umstand, der für die ärztliche Behandlung gewisser Blutungen von Nutzen sein dürste, ergieht sich aus der Betrachtung einer Gliedmassenarterie im stark gebeugten Zustande des Gelenkes, an welchem sie verläust. Wird der Ellbogen in forcirte Beugung gebracht, so wird der Puls der Radialarterie sehr schwach. Bei stark gebeugtem Unterschenkel (durch Anziehen der Ferse mit der Hand) verschwindet der Puls in der Arteria tibialis posterior vollkommen. Es scheint weniger das Knicken der Arterie, als die Compression derselben durch die an einander gepressten Muskelmassen in der Nähe des Gelenkes diese Erscheinung zu bedingen.

Wie wichtig der Verlauf der Arterien zwischen den Muskeln ist, und wie sehr der Muskeldruck abnorme Ausdehnungen derselben hintanzuhalten vermag, erhellt aus der allgemeinen chirurgischen Erfahrung, dass Aneurysmen am häufigsten an solchen Schlagadern entstehen, welche in ihrer nächsten Umgebung blos Zellgewebe und Fett, aber keine Muskeln haben (Arteria cruralis in der Fossa ileo-pectinea, Arteria poplitea, Arteria axillaris etc.). Warum die Aneurysmen in gewissen Arterien häufiger vorkommen als in anderen, wird sich aus den Angaben der speciellen Gefässlehre entnehmen lassen.

Literatur. Die allgemeinen Werke über Gewebslehre, und besonders Henle, pag. 473 seqq., wo die ganze neuere Literatur dieses Gegenstandes zu finden ist. Die physiologischen Verhältnisse werden ausführlich in den Handbüchern von Müller und Valentin besprochen. Kölliker, zur Lehre von der Contractilität menschlicher Blut- und Lymphgesässe, in dem 2. Hest der Zeitschrist für wissenschastliche Zoologie, pag. 257, und J. S. Schultze, de art. notione, structura, etc. Gryphiae, 1850. — Für praktische Anwendungen wären nachzulesen: Letiérce, essai sur quelques points d'anat. etc., de la membrane interne des artères. Paris, 1829. Béclard, recherches sur les blessures des artères. Mém. de la société d'émulation. Tom. VII. pag. 582. Magendie, mémoire sur l'action des artères. ibid. pag. 773. Cruveilhier im Dictionnaire de méd. et chir. Artère.

§. 44. Capillargefässe. Anatomische Eigenschaften derselben.

Die kleinsten, structurlosen Blutgefässe heissen Capillargefässe (Vasa capillaria). Sie bilden zahllose Verbindungswege zwischen den letzten Arterienästchen und den ersten Venenanfängen. Es ist nicht möglich zu sagen, wo ein Capillargefäss beginnt, und wo es endigt, da es allmälig aus den grösseren Blutgefässen durch Verjüngung des Durchmessers hervorgeht. Die Grenzen des Capillargefässsystems sind mehr ideal, als anatomisch festgestellt. Man könnte die Capillargefässe auch als die feinsten Zweige der Blutbahn definiren, welche ihren Durchmesser durch Theilung nicht mehr verkleinern. Eben so wenig ist das Gesetz bekannt, nach welchem die mehrfachen Schichten in der Wand grösserer Arterien, gegen die Capillargefässe zu, verschwinden, und in das einfache structurlose Häutchen übergehen, aus welchem die feinsten Capillargefässe (0,002") gebildet wer-An stärkeren Gefässen dieser Art (0,005") erscheint schon nach einwärts von der structurlosen Gefässhaut eine einfache Lage von Zellenkernen als Epithelium; nach auswärts bildet sich eine Schichte querovaler Kerne, welche um einen Theil der Peripherie des Gefässes herumgehen, und in spitzige Fäden auslaufen, und in der structurlosen Gefässhaut selbst treten theils länglich-ovale Kerne auf, welche sich zu Längenfasern ausbilden, theils querovale, welche zu Kreis- oder Spiralfasern werden.

Die Capillargefässe setzen die Capillarnetze, Retia capillaria, zusammen, welche in jeder Gewebsform charakteristische Eigenschaften darbieten. Diese hängen ab 1. von der Weite der Capillargefässe, welche von 0,002"—0,010" zunimmt, 2. von der Weite und der Gestalt der Maschen des Netzes. Je gefässreicher ein Organ, je mehr Blut es braucht und verarbeitet, je reichlicher es absondert, desto kleiner sind die Maschen. In Organen mit einer bestimmt vorwaltenden Faserrichtung sind die Maschen in derselben Richtung oblong (Muskeln, Nerven), in Häuten und Drüsen kommen kreisförmige, und alle Arten eckiger Maschen vor. In den Tastund Geschmackswärzchen geht die capillare Arterie durch schlingenförmige Umbeugung in die capillare Vene über.

Die feinsten Capillargefässe des Menschen kommen im Gehirne vor (0,002'"), die stärksten im Knochenmark (0,01""). Bei den Thieren fand ich die feinsten in den Kiemen der Cyklostomen, die stärksten in der Kloake der Salamander. — Es giebt auch Organe, in welchen die kleinsten Gefässe nie capillar werden, sondern immer noch relativ weit sind; hieher gehören die sogenannten Schwellkörper (Corpora cavernosa) der männlichen Ruthe und der Clitoris. Die noch mit freiem Auge sehr gut sichtbaren letzten Arterienverzweigungen gehen nämlich im Schwellgewebe in weite Venenanfänge über, welche die Lücken ausfüllen, die durch die Kreuzung des faserigen Grundgewebes eines Schwellkörpers gebildet werden, so dass diese Lücken und Räume als Venengestechte anzusehen sind, welche durch Faserbalken gestützt und in ihrer Lage erhalten werden. Sie können, eben dieser Fixirung wegen, beim Durchschnitt nicht zusammenfallen, woraus die grosse Verblutungsgefahr bei Schwellkörperwunden erklärlich wird.

Nie endigt ein Capillargefäss blind, — nur die in gewissen Schwellkörpern vorkommenden gewundenen Arterienästchen, welche als Vasa helicina Mülleri in der speciellen Anatomie der Geschlechtsorgane beschrieben werden, bilden eine Ausnahme dieser Regel. Eben so wenig geht je ein Capillargefäss in einen absondernden Drüsenkanal über, oder hat Löcher in seiner Wand, oder mündet mit einer Oeffnung auf der Oberfläche einer Membran. Das Capillargefässsystem hängt als Zwischennetz nur mit den zuführenden Arterien und abführenden Venen zusammen, und kann immerhin als intermediäres Gefässsystem (aber ohne bestimmte Grenzen) bezeichnet werden.

Mikroskopische Untersuchung. Die feinsten Capillargefässe haben so dünne und durchsichtige Wandungen, dass sie im lebenden Thiere nur durch das Blut, welches sie enthalten, sichtbar werden. Es gehört grosse Vertrautheit mit mikroskopischen Studien dazu, leere Capillargefässe zu untersuchen. Die Gegenwart länglichrunder Körperchen (Zellenkerne mit Granulationen) in den hellen Wandungen derselben, welche als feine Linien erscheinen, erleichtert ihr Auffinden und Fixiren. Bei stärkeren Capillargefässen, deren Wand schon eine messbare Dicke zeigt, erscheinen die Ränder derselben als Doppellinien. Die Entfernung der Doppellinien eines Randes entspricht der Dicke der Gefässwand.

Das schönste und überraschendste Schauspiel gewährt die Betrachtung lebendiger Capillargesässe in durchsichtigen Organen niederer Thiere. Man wählt hiezu am besten junge Kaulquappen, die im Frühjahr in jeder Psutze

zu haben sind, und in deren durchsichtigem Schweise das Phänomen des Kreislauses stundenlang beobachtet werden kann. Um das Thier, ohne es zu verwunden, zu sixiren, und sein Herumschlagen zu verhindern, bedeckt man es aus einer nassen Glasplatte mit einem einsachen nassen Leinwandläppchen, welches nur die Schwanzspitze hervorragen lässt. Auch die freien Kiemen der Embryonen von Salamandra atra, welche jedoch, da sie nur im Hochgebirge zu Hause sind, nicht immer zu Gebote stehen, können hiezu verwendet werden. Das Phänomen ist bei diesen Thieren noch herrlicher als bei den Quappen. Um an der Schwimmhaut oder dem Mesenterium der Frösche, der Lunge der Tritonen, Beobachtungen anzustellen, werden complicirte Vorrichtungen zur Besettigung des Thieres ersorderlich, und die damit verbundene Verwundung lässt die Erscheinung nie so rein austreten, und nie so lange andauern, wie am unverletzten Thiere.

Beim ausgebildeten Thiere, und im menschlichen Leibe, werden die Blutgefässe mit gefärbten erstarrenden Flüssigkeiten durch Einspritzung gefüllt. Man bedient sich hiezu entweder des gekochten Leimes (Hausenblase), oder harziger Stoffe in ätherischen Oelen, gewöhnlich Terpentinöl, aufgelöst, mit einem Farbezusatze. Man überzeugt sich bei gelungenen Injectionen, welche, von den Arterien und Venen aus, mit verschieden gefärbten Massen vorgenommen werden, dass das Capillargelässsystem den Verbindungsweg zwischen Arterien und Venen abgiebt, nirgends Oeffnungen hat, durch welche der Inhalt desselben in die Gewebe extravasiren könnte (obwohl solche Oeffnungen bei roher Manipulation durch Berstung der Gefässe entstehen können), und kein einziges Capillargefäss in einen Drüsenausführungsgang oder auf einer freien Hautsläche mündet.

§. 45. Physiologische Eigenschaften der Capillargefässe.

Die Permeabilität der Capillargefässwandungen, durch welche der flüssige Bestandtheil des Blutes den Gefässraum verlassen, und mit den umliegenden Gewebtheilen in Ernährungsbeziehung treten kann, ist eine wesentliche Bedingung der Nutrition und des Stoffwechsels. Ist der flüssige Bestandtheil des Blutes über die Grenze des Capillargefässes getreten, so saugt er sich durch Tränkung in den Geweben weiter fort, und kommt zu Stellen, wo keine Capillargefässe verlaufen. Der Mittelpunkt einer Masche des Capillarnetzes kann nur auf diese Weise durch Tränkung seine Ernährungsstoffe beziehen, und Theile, welche keine Blutgefässe besitzen, sind deshalb nicht vom Ernährungsprocesse ausgeschlossen (Horngebilde). Die Bewässerung einer Wiese durch Grähen würde sich zu einem rohen Vergleiche schicken. - Ob die Capillargefässe contractil seien oder nicht, ist auf dem Wege des Versuches mit Bestimmtheit schwer zu eruiren, da die Reizmittel, welche auf capillargefässreiche Theile applicirt werden, ihre Wirkung auch auf die grösseren Gefässstämme äussern, und kaum zu entscheiden ist, ob die Capillargefässe primär erregbar sind oder nicht. Es ist jedoch Thatsache, dass das Lumen lebendiger Capillargefässe sich unter dem Mikroskope zusehends ändert, und Durchschneidung der Nerven einer Gliedmasse beim Frosche, eine bedeutende Erweiterung der Capillargefässe mit Verlangsamung der Blutbewegung setzt. Die mikroskopische Analyse der kleinsten Capillargefässe lässt zwar keine contractilen Elemente erkennen, allein, da die structurlose Wand der Capillargefässe durch röhrenförmige Verschmelzung von Zellenmembranen entstand, und Zellenmembranen contractil sein können (wie die contractilen Faserzellen der organischen Muskeln, und die Zellen des Embryonenherzens beweisen, welche sich zusammenziehen, bevor sie sich noch zu Muskelfasern umbildeten), so ist die Zusammenziehungsfähigkeit der Capillargefässe nicht unbedingt zu verwerfen.

Der Uebergang der Arterien in Venen durch geschlossene Capillarröhren. gab der Lehre vom Kreislaufe erst ihre volle Begründung. Bevor man diesen Uebergang kannte, liess man das Blut sich in die Organe frei ergiessen. stocken und gerinnen, und in ihre Substanz umwandeln. So entstand schon zu Zeiten der Alexandrinischen Schule der noch immer gebräuchliche Ausdruck: Parenchyma (παρεγχύειν, ergiessen) für Organensubstanz. Vor nicht gar langer Zeit wurden den Capillargefässen ihre Wandungen abgesprochen (Döllinger, Wedemeyer u. A.). Man hielt sie für Gänge, die sich das Blut in der organischen Substanz selbst gräbt, und stellte sich vor, dass das Blut an allen Stellen dieser Gänge austreten, sich neue Laufgräben wühlen, und so zu jedem Organtheilchen gelangen könne. Diese für die Erklärung der Nutritionsprocesse sehr bequem eingerichtete Annahme musste, mit all ihrem poetischen Anhang über Umwandlung und Metamorphose des Blutes, der auf dem Wege mikroskopischer Forschung sichergestellten Existenz der Wandungen weichen, deren Permeabilität dem flüssigen Bestandtheile des Blutes den Durchgang gestattet.

Werden die Capillargefässe durch irgend welchen Einfluss erweitert, so muss die Schnelligkeit der Blutbewegung abnehmen, was auch umgekehrt bis zu einem gewissen Grade gilt. Man sieht die Blutkügelchen träger durch die erweiterten Capillarröhren gleiten, und an den Wänden derselben hinrollen, während sie im normalen Mittelzustande der Gefässe in der Axe derselben gleiten, ohne die Gefässwand zu berühren. Bei grösserer Abnahme der Fortbewegungsgeschwindigkeit, tritt Stockung mit dem Maximum der Erweiterung ein, und ein rothes Coagulum, in welchem die einzelnen Blutkügelchen nicht mehr zu unterscheiden sind, verstopst die kleinsten Gefässe. Dieses findet bei jeder Entzündung statt. Die fortdauernde vis a tergo durch die nachdrückende Blutsäule, kann auch Berstungen der Gefässe und Blutextravasation bedingen (Ecchymosis). Bei normaler Weite der Capillargefässe, und bei Verengerung derselben, strömt das Blut nicht stossweise, wie in den grösseren Arterien, sondern mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Nur wenn Unordnungen im Kreislaufe entstehen, das Thier ermattet, oder seinem Ende nahe ist, schwankt die Blutsäule unregelmässig hin und her, oder ruht in einzelnen Gefässen, während sie in anderen noch fortrückt.

Jene Capillargefässe, deren Durchmesser kleiner ist als eine Blutsphäre, werden nur das durchsichtige Plasma des Blutes ohne Blutkügelchen einlassen, und nur dann sichtbar werden, wenn eine abnorme Erweiterung derselben auch dem rothen Blutbestandtheile Eintritt gestattet. Sie werden Vasa serosa genannt, und der Streit über ihre Existenz ist noch nicht definitiv beigelegt. Jedes gewöhnliche Capillargefäss kann durch vorübergehende Verengerung ein Vas serosum werden. In solchen Organen, welche durchsichtig sein müssen, wie die Hornhaut des Auges, scheint die angeborene Enge der Capillargefässe durch Ausschluss der Blutsphären diesem physiologischen Zwecke zu entsprechen. Sonderbar ist es jedoch immer, dass die Injection dieser Vasa serosa weder mit Injectionsmassen, deren färbende Partikelchen viehnal kleiner als Blutsphären sind, noch mit chemisch-gefärbten Flüssigkeiten, gelingen will, und wir ihre Existenz überhaupt erst im entzündeten Auge wahrnehmen, wo auch ihre Injection möglich wird. Es ist deshalb noch nicht vollkommen sichergestellt, ob die Vasa serosa wirklich existiren, oder ob ihr Bemerkbarwerden in Entzündungskrankheiten nicht vielmehr eine Neubildung sei.

Ich kann nur die Bemerkung beifügen, dass man namentlich am Rande der Cornea, bei glücklichen mikroskopischen Injectionen, seine Gestsschen nicht nur in das Conjunctivablatt, sondern selbst in die Substanz der Cornea eindringen sieht, welche niemals umbiegen, um als Venen zurückzulausen, sondern wie mit abgeschnittenen Enden ausschienen. Es ist kein Grund vorhanden, anzunehmen, dass gerade in diesen Gestsschen die Injection in die venöse Fortsetzung derselben nicht überging, da der Uebergang doch bei derselben Injection in allen Capillargestssen des Kopses ohne Ausnahme stattsand. Sie scheinen vielmehr sich als wirkliche Vasa serosa noch weiter zu erstrecken, als sie injicirt wurden, und mit anderen ihnen entgegenkommenden zusammenzumünden. Gerlach versichert dagegen ausdrücklich, die in den Rand der Cornea eindringenden Capillargestsse durch schlingensörmige Umbeugung in Venen übergehen gesehen zu haben. Kölliker scheint sür die Zulässlichkeit der Vasa serosa in der Cornea zu stimmen (Gewebslehre, pag. 559).

Die Literatur der Capillargesässe ist sehr zahlreich. Es genüge hier zu erwähnen: J. Döllinger, über die Vertheilung der feinsten Blutgesässe, in Meckel's deutschem Archive. 6. Band. - J. Berres, Beobachtungen über die peripherischen Gesässverbreitungen, in den österr. med. Jahrb. 14. Band. 1833, mit Abbildungen, und dessen Anatomie der mikrosk. Gebilde. Nimmt den Uebergang der Capillargefässe in die Drüsenausführungsgänge an. -C. Nagel, Fragmente aus der gesammten mikroskopischen Anatomie. Wien, 1839. 4. Enthält genaue und zahlreiche Messungen. — Ch. A. Voigt, de systemate intermedio vasorum. Vindob., 1840. 4. Geschichtlicher Ueberblick der Schriftsteller über das Capillarsystem. - G. Valentin, über die Gestalt, Grösse und Dimensionen der feinsten Blutgestässe, in Hecker's Annalen der gesammten Heilkunde. 1834. März. - Hasse und Kölliker, über Capillargefässe in entzundeten Theilen, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. 1. Band. -A. Platner, über Bildung der Capillargefässe, in Müller's Archiv. 1844. -A. Kölliker, in den Mittheilungen der naturforschenden Versammlung in Zurich. Nr. 2. - Donders und Jansen, im Archiv für phys. Heilkunde. VII. Band. - J. Engel, in der Zeitschrift der Wiener Aerzte. 1847. - Ueber Injectionsmethoden schrieben Sue, Bogros, Monro d. Aelt. und Lieberkühn. In Prochuska's disquisitio anatomico-phys. corp. hum. Vindob., 1812, ist den Capillargestassen das IX. cap. gewidmet.

§. 46. Venen. Anatomische Eigenschaften derselben.

Die Venen unterscheiden sich von den Arterien durch ihre dünneren Wände, durch welche das Blut durchscheint, und ihnen eine dunkelblaue Farbe giebt. Sonst finden sich in ihnen alle histologischen Elemente der Arterien. Sie besitzen das Epithelium und die sogenannte gesensterte Haut der Arterien. Die Längensaserhaut der Venen ist sogar stärker und allgemeiner verbreitet, als in den Arterien; allein die Ringsaserhaut ist viel dünner, und aus Bindegewebsasern zusammengesetzt, welchen glatte Muskelfasern eingestreut sind (Kölliker). Die elastische Haut der Arterien kommt den Venen gleichfalls zu, nur mit geringerer Entwicklungsstärke. Alle besitzen die äussere oder Zellhaut.

Die geringe Dicke der Wandungen bedingt das Zusammenfallen durchschnittener Venen. Die Dicke einer Arterienwand beträgt gewöhnlich das Drei- bis Vierfache einer gleich grossen Vene. Die Schwäche der elastischen Haut erlaubt ihnen nur einen sehr geringen Grad von Zurückziehung. In vielen Venen der Gliedmassen, und im Verlause der unteren Hohlvene. finden sich Klappen, Valvulae, welche man sich durch Faltung der inneren Venenhaut entstanden denkt. Sie stehen entweder einfach am Einmundungswinkel eines Astes in den Stamm, oder doppelt (selten dreifach) im Verlause eines Stammes, werden daher in Astklappen und Stammklappen eingetheilt, und sind so gerichtet, dass ihr freier Rand gegen das Herz sieht. Sie beschränken somit die centripetale Bewegung der Blutsäule nicht, und treten erst in Wirksamkeit, wenn das Blut eine retrograde Bewegung machen wollte. Es lassen sich deshalb klappenhaltige Venen vom Stamm gegen die Aeste nicht injiciren. In Venen von 1/2" Durchmesser kommen sie schon vor, fehlen jedoch allen Capillarvenen, so wie unter den grösseren Venenstämmen der Pfortader, der Nabelvene, den Gehirn- und Lungenvenen, und allen Venenverzweigungen. welche das Parenchym der Drüsen bilden helfen. Jener Theil der Venenwand, welcher von der anliegenden Klappe bedeckt wird, ist durchgehends etwas ausgebuchtet, wodurch gefüllte Venen knotig erscheinen, und die gleichsormig cylindrische Rundung, wie sie den Arterien zukommt, verloren geht. Man findet die Klappen häufig dicker als die übrige Venenwand. und untersucht man ihren Bau, so stösst man gewöhnlich auf dickere Bindegewebsbündel, welche dem sibrosen Gewebe gleichen, und dem freien Klappenrande parallel laufen.

§. 47. Verlaufs- und Verästlungsgesetze der Venen.

Die anatomische Verbreitung der Venen richtet sich nach folgenden Gesetzen:

1. Die Verbreitung der Venen und ihre Verästlung stimmt mit jener der Arterien nicht genau überein. Es lassen sich folgende Unterschiede Lehrbuch der Anatomie. 5. Auß.

namhast machen: α . An den Gliedmassen treten eigene oberslächliche oder Hautvenen, Venae subcutaneae, aus, welche extra fasciam verlaufen, und von keinen Arterien begleitet werden; nur die tiesliegenden Venen solgen ihren gleichnamigen Arterien. β . Die Venen des Halses, Kopses und Gehirns, haben andere Verästlungsnormen als die entsprechenden Arterien. γ . Die grossen Stämme der oberen und unteren Hohlvene, das Pfortaderund Lungenvenensystem, die Herzvenen, begleiten nur streckenweise ihre gleichnamigen Arterien. δ . Das System der Vena azygos und die Venae diploëticae haben im arteriellen Systeme keine Analogie.

- 2. An den Extremitäten und in der harten Hirnhaut begleiten zwei Venen eine Arterie; an anderen Stellen bleiben auch die Venen einfach, werden sogar am männlichen Gliede und im Nabelstrange von doppelten Arterien begleitet. Nimmt man nun zugleich darauf Rücksicht, dass das Volumen einer Vene immer grösser als jenes der begleitenden Arterie ist, so wird die Capacität des Venensystems jene des Arteriensystems leicht übertreffen können. Nach Haller verhalten sie sich wie 9:4, nach Borelli wie 4:1.
- 3. Anastomosen kommen im Venensystem häufiger und schon zwischen den grösseren Stämmen vor. Regelmässig anastomosiren die hoch- und tiefliegenden Venen mit einander. Das Anastomosennetz ist so weit verzweigt, dass selbst vollkommene Obliteration der unteren Hohlvene, das Blut derselben durch Zweigbahnen in die obere zu leiten vermag.

Treten mehrere und zugleich gewundene Venen durch zahlreiche Anastomosen in Verbindung, so entstehen die Venengestlechte, Plexus venosi. Sie sind um gewisse Organe (Blasenhals, Prostata, Mastdarm, Rückenmark, Gelenkenden der Knochen etc.) so dicht genetzt, dass ihre freien Lücken im injicirten Zustande kaum zu bemerken sind. Ihre höchste Entwicklung erreichen sie in den Schwellkörpern, welche, nach dem bereits Erwähnten (§. 44), nichts Anderes sind, als von sibrösen und musculösen Balken gestützte, und von sibrösen Häuten umschlossene Plexus venosi. An Stellen, wo die Arterien geschlängelt verlausen, bleiben die Venen mehr gestreckt (z. B. im Gesicht).

- 4. Das Kaliber einer Vene nimmt nicht nach Massgabe der Aufnahme von Aesten zu. Häufig wird auch eine Vene plötzlich weiter, um sich gleich wieder zu verengern (constant an der *Vena jugularis communis*); auch ist die Inselbildung häufiger als an den Arterien.
- 5. Die Varietäten der Venen verhalten sich zu jenen der Arterien so, dass in gewissen Bezirken die Venen, in anderen die Arterien häufiger anomal verlausen oder sich verzweigen, und eine Arterienvarietät keine entsprechende Abweichung ihrer Vene bedingt (gilt auch umgekehrt). Venen, denen keine Arterien correspondiren (Subcutanvenen, Azygos), variiren häufiger als die übrigen.

§. 48. Physiologische Eigenschaften der Venen.

Die Ausdehnbarkeit der Venen ist grösser, die lebendige Contractilität derselben kleiner als in den Arterien. Aus diesem Grunde sind die Volumsänderungen einer Vene durch Stockungen des venösen Kreislauses, oder durch stärkeren Blutantrieb, auffallender als an den Arterien, wie an den Venen des Halses bei stürmisch aufgeregter Respiration, oder Anstrengungen, zu beobachten ist. Auch sind Zerreissungen von Arterien nicht mit Zerreissung der in derselben Scheide verlaufenden Vene begleitet. Die Contractilität der Venen reagirt auf äussere Reize nicht so auffallend, wie die der Arterien. Mechanische Irritation, Blosslegung und Galvanismus, bedingen zwar nach den Beobachtungen von Tiedemann und Bruns Verengerungen der Venen, und der Einfluss der Kälte auf das Abfallen strotzender Hautvenen ist durch die tägliche ärztliche Erfahrung nachgewiesen; allein die auf diese Weise erhaltenen Zusammenziehungen erfolgen langsamer, und erreichen nie jenen Grad, wie er bei Arterien vorkommt, wo die Contraction bei Verblutung das Gefässlumen ganz aufzuheben (Hunter, Hewson), oder bis auf ein Drittel zu vermindern vermag (Schwann, Parry, Fowler). Die Zusammenziehungen, welche nach Anwendung von Terpentingeist (Hastings), Schwefelsäure (Marx), Weingeist, und kaustischen Kalilösungen, in den Venen entstehen, sind, abgesehen von dem Schrumpsen, welches die Venenhaut in Folge der schnellen Entziehung ihres Wassergehaltes erleidet, wenigstens theilweise Erscheinungen einer lebendigen Contraction, welche durch Kölliker's Versuche an der Vena saphena major et minor, und tibialis postica (frisch amputirter Gliedmassen) unbezweifelbar festgestellt wurde. Ein pathologischanatomisches Factum spricht meines Erachtens sehr zu Gunsten der Zusammenziehungsfähigkeit der Venen. Krankhaste Geschwülste (Krebs, Markschwamm) sind, so lange sie mit dem Organismus in Verbindung stehen, auf welchem sie wuchern, oberflächlich mit starken strotzenden Venen durchzogen, welche durch die verdünnte äussere Haut als blaurothe Streifen durchscheinen. Wird nun eine solche Geschwulst abgetragen, so hat man Mühe, die zwischen ihren Lappen verlaufenden, im Leben fingerdicken Venen, als leere und zur Fadendicke zusammengezogene, ausserst dünnwandige Kanäle zu erkennen. An den Hohlvenen und Lungenvenen sind auch selbstthatige, rhythmische Contractionen schon seit Haller bekannt. — Jene Venen, deren Wand mit benachbarten Gebilden verwachsen ist (Knochen-, Leber-, Schwellkörpervenen u. a. m.), werden, wenn sie verwundet wurden, weder zusammenfallen, noch sich selbstthätig contrahiren, woraus die Gefährlichkeit der Verwundungen solcher Organe, und die Schwierigkeit der Blutstillung sich ergiebt. -- Man hat den mechanischen Nutzen der Venenklappen früher darin gesucht, dass sie in Venen, in welchen das Blut gegen seine Schwere strömt, wie an den unteren Extremitäten, der Blutsäule als Stützen dienen sollen, um ihr Rückgängigwerden zu verhindern. Da jedoch nicht alle Venen, in welchen das Blut gegen seine Schwere aufsteigt, Klappen haben, z. B. die Pfortader, und da andere Venen, in welchen die Richtung des Blutstromes mit der Gravitationsrichtung übereinstimmt, Klappen besitzen, z. B. die Gesichts- und Halsvenen, so kann die Schwerkrast allein das Vorkommen der Klappen nicht erklären. Es ist vielmehr der Druck, welchen die dunne Venenwand von ihrer Umgebung, und namentlich von den Muskeln, auszuhalten hat, das einzige haltbare Erklärungsmoment der Klappenbildung. Die Blutsäule einer durch die angrenzenden Muskeln comprimirten Vene, sucht nach zwei Richtungen auszuweichen, centripetal und centrifugal. Die centrifugale Richtung wird durch den geringen Druck der nachdrückenden Blutsäule nicht ausgeschlossen. Um sie aufzuheben, muss das Lumen der Vene durch das Einstellen der Klappen geschlossen, und die Möglichkeit des Zurückstauens abgeschnitten werden. Die Klappen schliessen auch in den meisten Venen wirklich so genau, dass der Rückfluss unmöglich wird, und somit der Muskeldruck zugleich als bewegende Kraft in der Theorie des Kreislauses in Anschlag zu bringen ist. Aus dem Gesagten lässt sich das anatomische Factum erklären, dass nur die tiesliegenden, dem Muskeldrucke ausgesetzten Venen, vollkommen schliessende Klappenpaare besitzen. — Das hier Gesagte gilt auch von den Klappen der Lymph- und Chylusgefässe (§. 49).

Wunden von Venen, welche dem chirurgischen Verbande oder den Compressionsmitteln zugänglich sind, heilen schnell und leicht. Die Heilung der Aderlasswunden dient als Beleg. Durchschnittene Venen bluten nur aus dem vom Herzen entfernteren Stücke. Wird jedoch eine Vene, in welcher das Blut gegen seine Schwere fliesst, und die zugleich abnormer Weise einen insufficienten Klappenverschluss besitzt, entzweit, so entsteht die Blutung auch aus dem oberen Stücke der Vene. Bei Amputationen im oberen Drittel des Oberschenkels, wo die Vena cruralis den angegebenen Modalitäten unterliegt, und nur niedrige Klappen besitzt, kommt sie öfters vor, und erfordert sogar, wo sie gefahrdrohend wird, die Unterbindung der Vene. - Die häufigen Anastomosen hoch- und tiefliegender Venen unter einander werden bei Verengerungen, Verwachsungen, und Compressionen einzelner Venendurch krankhaste Geschwülste oder physiologischen Muskeldruck, dem Venenkreislause eine Menge von Nebenschleusen öffnen, durch welche dem Stocken vorgebeugt, und der Rückfluss zum Herzen auf anderen Wegen eingeleitet wird. Nur werden sich solche Aushilfskanäle, der Grösse des übertragenen Geschästes entsprechend, ausdehnen müssen, und da in der Regel die tiesliegenden Venen das Hemmniss erfahren, so werden die hochliegenden hiebei vorzugsweise in Anspruch genommen werden. Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch die bisher übersehene Einrichtung der Klappen an den Communicationsvenen bewährt, indem die, an der Abgangsstelle einer Verbindungsvene aus einer tiefliegenden, befindliche Klappe niemals genau schliesst, und häufig (wie im Ellbogenbug) vollkommen fehlt, dagegen an der Insertionsöffnung in die hochliegende Vene ganz genau-

deckt. Ausdehnungen subcutaner Venen sind somit für den denkenden Arzt ein Fingerzeig auf Verengerungen (Stenoses), oder Verwachsungen (Obliterationes) tiefer gelegener Venenstämme. — Krankhaste Erweiterungen (Varices) kommen in solchen Venen häufig vor, in welchen der Seitendruck der Blutsäule ein grosser ist, und durch den Druck der Umgebung nicht aufgehoben wird, also in hochliegenden Venen, in welchen das Blut gegen die Schwere strömt, und in längeren häufiger als in kürzeren. entweder einfache sackartige Ausdehnungen einer bestimmten Stelle der Venenwand, oder befallen einen längeren oder kürzeren Abschnitt eines Venenrohrs. Die Vergrösserung des Lumens ist sehr häufig auch mit einer Zunahme der Länge der Vene verbunden, welche sich durch Schlängelung, ja sogar Aufknäuelung, besonders an den subcutanen Venen der unteren Extremität (sogenannte Krampfadern) ausspricht. Vielleicht erklärt die alternirende Stellung der Astklappen, welche der Ausdehnung weniger Folge leisten, als die den Klappen gegenüberliegenden Wände einer Vene, die geschlängelten Krümmungen einer varikösen Vene. — Da die Entzündung der Venen (Phlebitis) durch ihre Producte das vitale Contractionsvermögen derselben eben so beeinträchtigt, wie in den Arterien, so darf es nicht wundern, Varices in Folge von Entzündungsprocessen entstehen zu sehen, ohne jedoch in der Entzündung das einzige veranlassende Moment derselben zu suchen. — Die durch die Entzündung bedingte Verdickung der Venenwand ist die Ursache, warum solche Venen nicht zusammenfallen. wenn sie durchschnitten werden, und (besonders wenn sie bluten) für Arterien gehalten, und irrig der Unterbindung unterworfen werden können. Fälle dieser Art kamen bei Amputationen und Gefässunterbindungen an kranken Extremitäten nicht eben selten vor. Sehr achtbare Chirurgen haben solche Missgriffe gemacht (Dupuytren, Wilhelm). - Die Entzündung der Venen, und die mit ihr austretende, vielleicht durch sie bedingte Blutentmischung (eiterige Zersetzung des Blutes, Pyaemia), ist die häufige Ursache des tödtlichen Ausganges von Verwundungen und operati-Wie sehr diese Krankheit von den Chirurgen gefürchtet ven Eingriffen. ist, mag der Ausspruch eines der grössten englischen Wundärzte beweisen (A. Cooper), der in seinen Vorträgen über diese mörderische Krankheit die Worte aussprach: er wollte sich lieber die Cruralschlagader als die Saphenvene unterbinden lassen.

Die Literatur ist dieselbe wie bei den Arterien.

§. 49. Lymph - und Chylusgefässe. Anatomische Eigenschaften derselben.

Das Lymphgefäss- oder Saugadersystem ist ein Anhang des Venensystems. Die Hauptstämme der Lymphgefässe münden in Venenstämme, und selbst kleinere Lymphgefässe sollen in Venen übergehen. — Die Structur der grösseren Lymphgefässe stimmt mit jener der Venen in vielen Punkten

überein. Sie besitzen das Epithelium und die Längensaserhaut der Venen und Arterien; die Ringfaserhaut ist aus deutlichen, oft durch grössere Zwischenräume getrennten Bündeln musculöser Fasern (welche besonders im Hauptstamme des Lymphgefässsystems - im Ductus thoracicus - sehr deutlich entwickelt sind) zusammengesetzt; die elastische Haut und die äussere Zellhaut stimmt mit jener der Venen vollkommen überein. Die feinsten Lymphgefässe verhalten sich wie Capillargefässe, ohne jedoch je mikroskopisch zu werden. Die Wände der Lymphgesässe sind dünner als jene von gleich starken Venen, aber fester, und, wie es scheint, ausdehnbarer. Alle grösseren Lymphgefässe sind mit Klappen versehen, welche, wie in den Venen, in einfache Ast- und doppelte Stammklappen eingetheilt werden. Ueber einem Klappenpaare ist das Kaliber des Gefässes nach zwei Seiten ausgebaucht, weshalb in den älteren Abbildungen die Lymphgefässe als Schnüre herzförmiger Erweiterungen erscheinen. Die seinsten Lymphgefässe scheinen keine Klappen zu besitzen, und in gewissen Verzweigungen derselben (in der Leber) werden sie durch ringförmige niedrige Vorsprünge ersetzt (Lauth), welche bei grösserer Ausdehnung des Gefässes eine rückgängige Bewegung des Inhaltes nicht verhindern können. Die Entsernung der auf einander solgenden Klappen Eines Gesässes variirt von 1"-6". Im Hauptstamme des Ductus thoracicus schliessen sie nie vollkommen, und können auch nach Schwann und Müller in kleineren Gefässen, wo sie sufficient sind, durch den Druck der Quecksilbersäule überwunden werden. Es ist dieses jedoch nicht als ein Umschlagen der Klappen zu verstehen, sondern vielmehr als ein Ausgleichen (Abslachen) derselben, welches durch starke seitliche Ausdehnung des Lymphgefässes nothwendig eintreten muss. -- Der Anfang der Lymphgefässe ist noch nicht über alle Einsprache festgestellt. Die Schwierigkeit, das Lymphgefässsystem von den grösseren Stämmen aus durch Einspritzung zu füllen, und die äusserst unsichere mikroskopische Untersuchung der seinsten Lymphgefässe im nicht injicirten Zustande, lassen den Vermuthungen und theoretischen Vorstellungen einen grossen Spielraum. Die verschiedenen Ansichten, welche über dieses Problem herrschen, zu prüsen, ist keine Ausgabe dieses Buches, und es kann genügen zu erwähnen, dass die annehmbarste von allen, welche zugleich am meisten Beobachtungen für sich hat, jene ist, dass die Lymphgefässe in gewissen Membranen (z. B. den serösen) aus geschlossenen Netzen von viel grösserem Durchmesser als die Capillargefässnetze entstehen, im Bindegewebe dagegen mit freien offenen Mündungen in den Interstitien desselhen beginnen. Diese Ansicht habe ich seit Jahren festgehalten, und gebe sie jetzt um so weniger auf, als Brücke's Arbeiten über die Darmzotten einen sehr gewichtigen Beleg für dieselbe geliesert haben. — Die netzsörmigen Ursprünge der Lymphgesässe lassen sich bei kaltblütigen Thieren, deren Lymphgefässe klappenlos sind, durch Injection von den Stämmen aus ohne Mühe darstellen, wie Rusconi's treffliche Untersuchungen und Abbildungen über Rana und Salamandra

zeigen. Der Ursprung aus den Interstitien des Bindegewebes ist nach den Injectionsmethoden von Fohmann, Arnold, und Panizza, leicht zu beweisen, indem das durch eine kleine Hautwunde in das subcutane Bindegewebe gebrachte Quecksilber, durch methodischen Druck in die Lymphgefässe getrieben werden kann. Bei Injectionen der Samengefässe des Hoden macht man auch öfters die Erfahrung, dass das durch Platzen eines Samengefässes in das umgebende Bindegewebe extravasirte Quecksilber, die Lymphgefässe des Samenstrangs füllt.

Die Ursprünge der Lymphgesisse in den parenchymatösen Organen (Dräsen, Gehirn, Muskeln) sind noch nie durch künstliche Mittel dargestellt worden, und im Gehirnmarke, in der Medulla ossium, im Auge, und im inneren Gehörorgan, hat man selbst gröhere Lymphgesisse noch nicht ausgefunden. — Die Chylusgesisse (§. 39), welche sich nur durch ihren Inhalt, nicht durch ihren Bau von den Lymphgesissen unterscheiden, können bei Thieren, die man kurz nach der Verdauung schlachtet, in ihrer natürlichen Füllung durch den milchweissen Chylus, Gegenstand der Beobachtung werden.

§. 50. Verlaufsgesetze der Lymph - und Chylusgefässe.

Folgende allgemeine Gesetze gelten für den Verlauf der Lymphgefässe:

- 1. Der Durchmesser der Lymphgesässe bietet nicht die grossen Disserenzen von Weite und Enge dar, wie die Blutgesässe, d. h. die kleinsten Lymphgesässe sind bedeutend stärker als die kleinsten Blutgesässe, die stärksten Lymphgesässe dagegen (Ductus thoracicus) vielmal schwächer als die Hauptstämme des Blutgesässsystems (Aorta, Venae cavae).
- 2. Die Lymphgesasse begleiten grösstentheils die Venen, zerfallen somit, wie diese, in hoch- und tiesliegende, sind aber immer schwächer an Kaliber und zahlreicher, und machen weder Schlängelungen noch Umwege, sondern ziehen geradlinig von ihrem Ursprunge zu ihrer Insertion in andere Lymphgesasse oder Venen. Schon aus diesem Grunde müssen sie dehnbarer sein, als die mehr weniger gebogen verlausenden Venen. Nur der Hauptstamm des Systems, der Ductus thoracicus, bildet vor seiner Einmündung in die Vena innominata sinistra einen stärkeren, nach oben convexen Bogen.
- 3. Sie durchlaufen oft lange Strecken, ohne Aeste aufzunehmen, theilen sich aber öfter gabelförmig, um sich wieder zu Einem Stämmchen zu vereinigen (Inselbildung), oder die Gabeläste in nachbarliche Lymphgefässe einmunden zu lassen.
- 4. An gewissen und immer an denselben Stellen des Körpers, welche gewöhnlich grössere Bindegewebslager enthalten (Beugeseiten der Gelenke, Zwischenmuskelgruben am Halse etc.), äussern die Lymphgefässe ein Bestreben, sich durch Reduction ihrer Zahl zu vereinfachen. Mehrere derselben treten nämlich in eine sogenannte Lymphdrüse, Glandula lymphatica, ein, um in geringerer Anzahl wieder herauszukommen. Mehrere Lymphdrüsen liegen in demselben Bindegewebslager. Die Gestalt der Drüsen

ist meist oval, ihre Grösse von 1"—1" im längsten Durchmesser. Je weiter vom Mittelpunkte des Leibes entfernt, desto kleiner sind sie, je näher demselben, desto grösser. Die aus einer Drüse heraustretenden Lymphgefässe suchen eine entlegenere zweite, dritte, vierte auf, bevor sie in den Hauptlymphstamm übergehen. Während den Blutgefässen ihr Verlauf so leicht und kurz als möglich gemacht wurde, scheint die Natur durch Anbringen der zahlreichen Lymphdrüsen mit den Lymphgefässen die entgegengesetzte Absicht zu verfolgen, und die Lymphe so langsam als möglich und durch die complicirtesten Labyrinthwege dem Blute zuströmen zu lassen.

Man stellte sich lange Zeit vor, dass die eintretenden Gestasse sich in der Drüse in Netze auslösen, welche den austretenden ihren Ursprung geben. Noll und Ludwig zeigten aber, dass die Lymphgestasse in die Substanz der Lymphdrüsen nicht eingehen, sondern sich in kleine Hohlräume der Drüse öffnen, welche durch bindegewehige, von der äusseren Hülle der Drüse entspringende Scheidewände von einander getrennt werden. Diese Hohlräume enthalten eine grauweisse Pulpa, in welcher man Kerne und vollständige Zellen antrifft, welche jenen der Peyer'schen Drüsen des Darmkanales gleichen. Ein Epithelium besitzen die Hohlräume nicht, was sie doch haben müssten, wenn sie wirkliche Fortsetzungen und Erweiterungen der eintretenden Lymphgestasse wären.

Die in früheren Zeiten oft ventilirte Frage, ob in den Lymphdrüsen die Lymphräume mit den Venen communiciren, muss, bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, verneinend beantwortet werden. Ob es aber ausser dem Ductus thoracicus noch andere kleinere Lymphgefässe gäbe. welche sich mit Venen vereinigen, ist auch heute noch nicht entschieden. Bei kaltblütigen Thieren ist der Zusammenhang kleinerer Lymphgestasse mit dem Venensysteme nicht zu bezweiseln. Ich besitze die überzeugendsten. nicht durch Quecksilber injicirten Präparate hierüber. Auch bei warmblütigen Thieren haben Lauth (bei der Gans: Lymphgestasse des Schenkels zur Vena crurulis) und Fohmann (beim Sechund: Lymphgestsse des Mesenterium zur Hohlvene) solche Einmundungen gesehen, welche allerdings, da sie durch Quecksilberinjectionen aufgefunden wurden, etwas verdächtig erscheinen. A priori erscheint es nicht als Unmöglichkeit, dass kleinere Lymphgefässe dieselbe Einmundung in Venen darbieten, wie die grössten, und somit letzteren nur vorgriffen. Es würde dann die Insertion eines kleineren Lymphgestsses in eine Vene, nur als Anomalie zu betrachten sein, ungestahr wie eine frühzeitige Theilung eines Arterienstammes. Da es ferner durch Versuche bewiesen ist, dass die Capillarvenen ebenfalls absorbiren, und Unterbindung einer grösseren Vene, so wie pathologische Verengerung oder Obliteration derselben, Ansammlung seröser Flüssigkeiten im Bindegewebe und in den Körperhöhlen bedingt, so erscheint die fragliche Communication um so annehmbarer. Ich habe an warmblütigen Thieren hierüber keine Erfahrungen, betrachte dagegen in kaltblütigen Thieren, und ganz besonders in der Klasse der Fische, wo ich die Lymphgestasse des Bauchsells von den Nierenvenen aus auf die überzeugendste Weise und ohne alle Extravasationsspuren fullte, den Uebergang als ausgemachte Sache. Die Lymphgestasse der Amphibienleber (Ophidii) füllen sich bei den vorsichtigsten Injectionen der Pfortader sehr regelmässig. Inwiefern man berechtigt ist, aus solchen Prämissen einen Schluss auf die höheren Wirbelthiere und den Menschen zu machen,

müssen spätere Erfahrungen nachweisen. So lange man mit Quecksilber operirt, wird die Entscheidung einer so subtilen Frage schwebend bleiben. Unter Jenen, welche sich praktisch mit Lymphgesäss-Injectionen beschästigten, stimmen Fohmann, Lippi, Lauth, Rossi, Luchtmanns, Valentin stür, — Haller, Panizza, Rosenthal, Sömmerring, Fox, J. Müller gegen die Einmündung kleinerer Lymphgesässe in Venen. Mascagni gesteht selbst, dass, um Quecksilber in die Venen übergehen zu machen, ein grösserer Druck erfordert würde. Einmündungen grösserer Lymphgesässstämme in Venen wurden von Duvernoy, Abr. Kaaw, Kulmus, Hebenstreit, Mertrud, Wutzer und von Patruban (Müller's Archiv. 1845. 1. Hest) beschrieben. Beim Schweine soll nach Panizza eine constante Verbindung zwischen der Vena azyges und dem Ductus thoracicus vorkommen. Ist unrichtig.

§. 51. Physiologische und praktische Bemerkungen.

Die Contractilität der Lymph- und Chylusgefässe ist allgemein aner-kannt. Nach J. Müller stellten sich am entblössten Ductus thoracicus einer Ziege, auf starken galvanischen Reiz Zusammenziehungen ein. Henle sah Contractionen des Ductus thoracicus eines mit dem Schwert gerichteten Verbrechers, durch Anwendung des Rotationsapparates entstehen, und an den mit Chylus gefüllten Saugadern des Gekröses eines lebenden Thieres wurden sie von vielen Beobachtern gesehen. Die pulsirenden Lymphgefässerweiterungen (Lymphherzen) der Amphibien und Vögel, besitzen sehr deutlich entwickelte Muskelfasern.

Die physiologische Bestimmung der Lymphgefässe geht dahin, die aus den Capillargefässen ausgetretenen flüssigen Bestandtheile des Blutes, nachdem sie den Ernährungszwecken gedient, durch Aufsaugung (Absorptio) wieder in den Kreislauf zu bringen. Ausscheidung durch die Capillargefässe, und Aufsaugung durch Lymphgefässe müssen gleichen Schritt halten. Es ist leicht einzusehen, auf wie vielerlei Weise dieses Gleichheitsverhältniss gestört werden könne. Führen die Lymphgefässe weniger ab, als die Capillargefässe ausschieden, so entsteht in dem Ausgeschiedenen Stagnation und Anhäufung, welche in der Sprache der Medicin wässerige Anschwellung (Oedema), oder in höheren Graden Wassersucht (Hydrops) heisst. — In der absorbirenden Thätigkeit der Lymphgefässe liegt eine fruchtbare Quelle ihrer häufigen Erkrankungen. Nehmen sie reizende. schädliche Stoffe auf, gleichviel ob sie im Organismus erzeugt, oder durch Verwundung demselben einverleibt wurden (vergistete Wunden, wohin auch die bei Leichenzergliederung entstandenen Verwundungen gehören), so können sie sich entzünden, die Entzündung den blutgefässreichen Lymphdrüsen, welchen sie zuströmen, mittheilen, und Anschwellungen, Verstopfungen und Verhärtungen derselben bedingen, welche in den Leichen so oft gefunden werden. Da sich zu solchen vergisteten Wunden auch häufig Entzündung der Venen gesellt, deren Folgen so oft lethaler Natur sind, so ist ihre Gefährlichkeit evident. Mehrere Anatomen, wie Hunter, Hunczovski.

und mein verehrter, der Wissenschaft zu früh entrissener College Kolletschka, starben in Folge von Sectionswunden.

Ein merkwürdiger und in praktischer Beziehung noch nicht gewürdigter Antagonismus herrscht zwischen der Absorption der Lymph- und Chylusgefässe. Bei Thieren, welche lange hungerten, findet man die Lymphgefässe von Flüssigkeit strotzend, die Chylusgefässe dagegen leer, und bei einem nach reichlicher Fätterung getödteten Thiere zeigt sich das Gegentheil. Interstitielle Absorption kann sonach durch Hunger gesteigert werden; während in jenen Krankheiten, wo sie herabgestimmt werden soll, karge Diät zu vermeiden ist. Bei Thieren, welche durch reichliche Blutentziehung getödtet werden, findet man die Lymphgefässe voll, und die Vermehrung der Absorption durch Aderlässe, ist auch in der medicinischen Praxis bekannt. Es scheint, als beeilten sich die Lymphgefässe den Verlust zu ersetzen, welchen das Gefässsystem durch Blutentziehungen erlitt. Dass die Blutentziehungen zugleich das Austreten des Blutplasma aus den Capillargefässen erschweren, ist eine nothwendige Folge der verringerten Gefässcapacität und der damit verbundenen Dichtigkeitszunahme ihrer Wände.

Der flüssige Inhalt der austretenden Gefässe einer grösseren Lymphdrüse in der Nähe des Ursprunges des Ductus thoracicus, unterscheidet sich von jenem der eintretenden durch seine röthere Färbung und grössere Neigung zur Coagulation. Die Lymphe muss somit während ihres Durchganges durch eine Lymphdrüse faserstoffreicher geworden sein, und rothes Pigment aufgenommen haben. Dass beides durch Vermittlung der Blutgefässe geschieht, bedarf keines Beweises. Man bezeichnet diese Veränderung mit dem Namen der Assimilation.

Literatur. Ueber die Structur der Lymphgesasse: Henle, allgemeine Anatomie. pag. 542 seqq., und dessen Symbolae ad anat. vill. intest. pag. 1. - Valentin, über das Gewebe des Ductus thoracicus und der Lymphgesisse, in dessen Repertorium. II. Bd. 1837. - Ueber die Communicationen der Lymphgestasse mit Venen, siehe E. H. Weber's Ausgabe der Hildebrandt'schen Anat. 3. Bd. pag. 131 seqq. - V. Fohmann, anatomische Untersuchungen über die Verbindungen der Saugadern mit den Venen. Heidelberg, 1821. -G. Brechet, le système lymphatique, considéré sous ses rapports anat., physiol. et pathol. Paris, 1836. — G. Herbst, das Lymphgesasssystem und seine Verrichtungen. Göttingen, 1844. - J. Goodsir und H. D. S. Goodsir, Anat. and Path. Observations. Edinb., 1845. pag. 44. - H. Weyrick, de structura vasorum lymphaticorum. Dorpat, 1851. - F. Noll (und Ludwig) in Henle's Zeitschrift. IX. pag. 52. - J. Engel, Prager Vierteljahrschrift. 1850. pag. 111. - O. Heyfelder, über den Bau der Lymphdrusen. Breslau, 1851. -Die physiologischen Verhältnisse siehe in dem Artikel "Aufsaugung" von Kürschner in Wagner's Handwörterbuch der Physiologie, und Bidder, über die Chylusmenge, die durch den Ductus thoracicus dem Blute zugeführt wird, Müller's Archiv. 1845. pag. 46-59.

Inhalt des Gefässsystems.

§. 52. Blut. Mikroskopische Analyse desselben.

Das Blut, Sanguis, ist die rothe, gerinnbare, salzig schmeckende Flüssigkeit, welche die Höhle der Gefässe ausfüllt, und in beständiger Bewegung zu und von den Organen strömt. Die heilige Schrift nennt es den flüssigen Leib, welcher Ausdruck nicht actu, sondern potentia zu nehmen ist, indem das Blut, als allen Organen gemeinschaftlicher Nahrungsquell, die Stoffe enthält, aus welchen die Organe sich erzeugen und ernähren.

In seinem lebenden Zustande beobachtet, was nur an durchsichtigen Theilen kleiner Thiere möglich ist, zeigt es eine gewisse Mischung fester und flüssiger Bestandtheile, welche nach dem Tode, oder im gelassenen Blute, sich unter den Erscheinungen der Gerinnung, Coagulatio, ändert.

a) Fester Blutbestandtheil.

Der feste Bestandtheil des menschlichen Blutes erscheint als eine zahllose Menge röthlicher Körner (Zellen), welche im flüssigen, schwach gelblichen und durchsichtigen Blutliquor, Plasma sanguinis, schwimmen. Die Blutkörner werden unpassend Globuli s. Sphaerulae sanguinis genannt, indem sie keine Kugeln, sondern Scheiben darstellen, welche, vom Rande gesehen, 2-4 mal schmäler als bei der Flächenansicht erscheinen. Der Durchmesser derselben beträgt im Mittel 0,0028". Der von Einigen in den Blutkörnern gesehene Kern (Nasse) existirt in der That an ganz frischen Blutkörnern der Säugethiere und des Menschen nicht. Bei den übrigen Wirbelthieren ist er sehr deutlich zu sehen. Die Hülle der Blutkörner ist ein einfaches structurloses Häutchen, dessen chemische Grundlage Eiweiss (Globulin) ist. Die Hülle umschliesst eine Höhle, in welcher der rothe Färbestoff des Blutes, welcher aus Globulin und Hämatin besteht, enthalten ist. Dieser Färbestoff ist in Wasser löslich, und da die Hülle der Blutkörner für Wasser permeabel ist, so kann er durch dieses ausgezogen Die Blutkörner sind also Bläschen oder Zellen.

Nebst den gefärbten Blutkörnern findet sich noch eine geringe Menge zweimal grösserer, farbloser Kügelchen, von 0,005" Durchmesser, mit granulirtem Inhalt. Ein Kern, und zwei bis drei Kernkörperchen sind entweder gleich anfangs, oder bei beginnender Gerinnung, oder durch Behandlung mit Essigsäure erkennbar. Sie zeigen die grösste Uebereinstimmung mit den Lymph- und Chyluskörperchen, und mit den im frischen Eiter vorkommenden Körnern (Eiterkörperchen), weshalb auf den mikroskopischen Nachweis von Eiter im Blute nicht viel Werth zu legen ist. Sie sind wahre Lymphkörperchen, aus welchen farbige Blutkörner werden sollen.

b) Flüssiger Blutbestandtheil.

Der flüssige Bestandtheil des Blutes ist eine Auflösung von Fibrin und Albumin in Wasser, welche nebstdem geringe Quantitäten von Casein (vorzüglich im Blute Schwangerer und Säugender), Extractivstoffe, Fett und Salze enthält, unter welchen das Chlornatrium am meisten vorwaltet. Spuren von Harnstoff und Gallenpigment sind ebenfalls im Blute nachgewiesen. Ein flüchtiger Bestandtheil, der aus dem eben gelassenen Blute mit Wasser in Dampsform davongeht, bestimmt den eigenthümlichen animalischen Geruch des Blutdunstes, Vapor s. Halitus sanguinis. Dass das Blutplasma auch Träger für die fremdartigen Stoffe wird, welche mit den Nahrungsmitteln oder durch Medicamente in den Körper gelangen, und durch die verschiedenen Absonderungsorgane wieder aus dem Körper ausgeschieden werden müssen, ist aus den Beziehungen des Blutes zur Verdauung und zu den Absonderungen leicht begreislich. Auch Lustarten sind im Blute (ungefähr wie die Gase in den Mineralwässern) gebunden vorhanden, und entwickeln sich grossentheils schon unter der Lustpumpe. Kohlensäure, Sauerstoff und Azot sind bereits desinitiv nachgewiesen.

§. 53. Gerinnung des Blutes.

Wird das Blut aus der Ader gelassen, so gerinnt es (Coagulatio sanguinis). Das Wesentliche dieses Vorganges, welcher auch bei gewissen pathologischen Umständen innerhalb (bei Entzündung) oder ausserhalb der Gefässe (bei Blutextravasaten) stattfinden kann, ist folgendes:

Die Gerinnung des Blutes ist eigentlich nur eine Gerinnung seines Faserstoffes. Der Faserstoff gerinnt jedesmal von selbst, wenn das Blut aus seinen Gefässen tritt, mag dieses innerhalb des Organismus durch Berstung der Gefässe, oder nach aussen, durch Verwundung der Gefässe, stattfinden. Die übrigen gerinnbaren Bestandtheile des Blutes (Albumin, Globulin) können nur durch besondere Mittel, z. B. durch Erwärmung oder chemische Zusätze, zum Gerinnen gebracht werden.

Frisch gelassenes Blut fängt binnen 2-5 Minuten an zu stocken. bildet anfangs eine weiche, gallertige, zitternde Masse, die sich immer mehr und mehr zusammenzieht, und eine schmutzig-gelbliche Flüssigkeit aus sich auspresst, in welcher der fest gewordene Blutklumpen schwimmt. Dieser Klumpen wird Blutkuchen, Placenta s. Hepar s. Crassamentum sanquinis, genannt; das gelbliche Fluidum, in welchem er schwimmt, ist das Serum sanguinis. Woraus besteht der Blutkuchen? - Der im Blutplasma aufgelöst gewesene Faserstoff scheidet sich durch das Gerinnen in fester Form aus, und schliesst die rothen Blutkörner durch seine Contraction in sich ein. Blutplasma minus Faserstoff ist somit Serum sanguinis, Faserstoff plus Blutkörner ist Placenta sanguinis. Gerinnt der Faserstoff langsam, so haben die Blutkörner Zeit genug, sich durch ihre Schwere einige Linien tief zu senken, bevor der Faserstoff sich zu einem festeren Coagulum formte. Die oberen Schichten des Blutkuchens werden sodann gar keine Körner enthalten, also weiss erscheinen, und eine mehr weniger dichte und zähe Lage bilden, welche Speckhaut, Crusta placentae, ge-

nannt wird. Je langsamer das Blut gerann, desto dicker, und je reicher an Faserstoff es war, desto dichter wird die Speckhaut sein. Da bei Entzündungskrankheiten, und vorzugsweise beim hitzigen Rheumatismus, diese Bedingungen vorherrschen, so wird die Speckhaut auch Crusta inflammatoria s. pleuritica, und ihrer Zähigkeit wegen auch Crusta lardacea genannt. Das Blut von Schwangeren und Wöchnerinnen zeigt ebenfalls eine starke Speckhaut. Setzt man dem Blute solche Stoffe zu, welche sein Gerinnen verlangsamen, so wird die Speckhaut natürlich dicker ausfallen, als bei schnell gerinnendem Blute. Benimmt man dem Blute seinen Faserstoff durch Peitschen desselben mit Ruthen, so coagulirt es nicht mehr. Da manche Aerzte noch immer viel auf die Dicke der Speckhaut halten, und sie für ein Zeichen entzündlicher Blutmischung nehmen, so mögen sie bedenken, welchen Einfluss die dem Kranken verabreichten Arzneien (besonders die Mittelsalze, welche man so häufig den an Entzundung Leidenden verordnet) auf die Verlangsamung der Gerinnung, und somit auf die Dicke der Speckhaut ausüben. - Die Gerinnung des Blutes ist der Ausdruck seines erlöschenden Lebens, und die Veränderungen, die es von nun an erleidet, sind durch chemische Zersetzungsprocesse bedingt - Fāulniss.

§. 54. Weitere Angaben über chemisches und mikroskopisches Verhalten des Blutes.

Das Serum sanguinis ist sehr reich an Eiweiss, welches nicht von selbst, sondern durch Erhitzen gerinnt, und das Wasser mit seinen Salzen und Extractivstoffen zurücklässt. — Der Blutkuchen kann durch Auswaschen von dem Färbestoffe der eingeschlossenen Blutkörner befreit, und als feste, zähe, weisse, aus fadenförmigen Elementen zusammengesetzte Masse (Faserstoff) dargestellt werden. Dieser ist jedoch nicht rein, sondern schliesst noch die Reste der durch das Auswaschen und Kneten unter Wasser zerstörten Hüllen der Blutkörner ein.

Zur mikroskopischen Analyse des Blutes eignet sich vorzugsweise das Blut der nackten Amphibien, deren Blutkörner bedeutend grösser als die der Säugethiere sind. Die ovalen und platten Blutkörner des gemeinen Frosches haben 0,010" im längsten, 0,006" im kleinsten Durchmesser, die des Proteus sind absolut die grössten, und schon mit freiem Auge zu sehen. Da das aus einer Wunde des Thieres erhaltene Blut bald gerinnt, wodurch die mikroskopische Untersuchung vereitelt wird, so muss die Coagulationstendenz des Blutes durch Beimischung einer sehr geringen Quantität von aufgelöstem kohlensauren Kali hintangehalten, oder das von einem grösseren Thiere gesammelte frische Blut durch Schlagen mit Ruthen seines Faserstoffes (dieser ist ja die Ursache der Gerinnung) befreit werden. Wird Blut mit Ruthen gepeitscht, 50 hängt sich der Faserstoff in Streifen und Fetzen der Ruthe an, und was zurückbleibt, ist Serum mit Blutkör-

nern, welche ihre Form und Grösse mehrere Stunden unverändert beibehalten. Wenn in den letzten Lebensmomenten die Blutmasse sich zur Entmischung anschickt, werden die inneren Muskelbündel des Herzens, und die sehnigen Besestigungssäden der Klappen, deren mechanische Einwirkung auf das Blut während der Zusammenziehung des Herzens dem Schlagen mit Ruthen vergleichbar ist, eine ähnliche Trennung des Faserstoffes und Anhängen desselben an die losen Fleischbündel und Sehnensäden der inneren Herzobersläche bedingen, wodurch die sogenannten sibrösen Herzpolypen (nach älterem Ausdruck) entstehen, welche man in grösserer oder geringerer Menge in jeder Leiche, deren Blut gerann, sindet, und welche ihre Entstehung rein mechanischen Verhältnissen in den letzten Lebensacten verdanken.

Im Serum des Blutes behalten die Blutkörnchen ihre Eigenschaften lange unversehrt bei. Durch Wasserzusatz schwellen die platten Gestalten zu Kugeln auf, und erleiden eine Veränderung, die mit ihrem Ruine endigt. Man darf deshalb Blutkörner nur im Serum, oder im frischen Eiweiss, oder in Zuckerwasser, der mikroskopischen Beobachtung unterziehen.

Im Froschblute zeigt jedes Blutkorn bei dieser Behandlung einen Kern, welcher, so lange das Blut in den Adern kreist, nur ausnahmsweise zu sehen ist. Dieser Kern sitzt an der inneren Oberstäche der Hülle des Blutkorns, nicht in der Mitte der Höhle desselben; denn man sieht, wenn sich ein Blutkorn wälzt, den Kern nicht im Centrum der Bewegung. — Durch vorsichtige Behandlung lässt sich das Serum von den Körnern mittelst nicht zu seinen Filtrirpapiers abseihen. Die Körner bleiben auf dem Filtrum zurück, und sammelt man sie in einem Uhrglase, welches Wasser enthält, so zieht dieses ansangs den Färbestoss derselben aus, wodurch sie so durchsichtig werden, dass der Kern derselben nur von einem seinen, blassen Hose umgeben erscheint, — die sarblose Hülle. Zusatz von Jodtinctur macht die Begrenzung dieses Hoses wieder deutlich. Da sich die Hülle mit Wasser vollsaugt, wird es endlich zum Platzen derselben kommen. Sie sinkt nach dem Risse zusammen, und der Kern tritt hervor; dieser wird vom Wasser nicht verändert.

Dass mehrere Autoren auch von einem Kerne menschlicher Blutkügelchen sprechen, mag darin seinen Grund haben, dass die platten Blutkörner unter dem Mikroskope sich häufig napfartig krümmen (convex-concave Scheiben oder Schüsselchen darstellen). Liegt eine solche Scheibe so, dass sie von der Fläche gesehen wird, so kann der höchste oder tiefste Punkt ihrer Krümmung bei jener Stellung des Focus nicht gesehen werden, bei welcher der Rand deutlich erscheint. Es wird somit ein heller Ring mit dunklerem Centralfleck gesehen werden müssen, und dieser Fleck ist für einen Kern gehalten worden. Die napf- oder scheibenförmigen Blutkörner äussern ein merkwürdiges Bestreben, sich wie auf einander gestellte Teller zu Säulen zu vereinigen.

Für die chemische Zusammensetzung des Blutserums dient folgende Analyse von Denis. Es finden sich in 100 Th. Serum	Die Zusammensetzung des ganzen Blu- tes nach Le Canu ist folgende. In 1000 Theilen finden sich					
Wasser	Wasser 780,15—785,59 Faserstoff 2,10— 3,56 Eiweiss 65,09— 69,42 Blutkörperchen 133,00—119,63					
Flüchtige Fettsäure 3,0 Gallenpigment 3,0 Serolin 1,0	Krystallinisches Fett 2,43— 4,30 Flüssiges Fett 1,31— 2,27 Alkoholextract 1,79— 1,92					
Schwefelsaures Kali 0,8 Schwefelsaures Natron 0,8 Natron 0,5 Phosphorsaures Natron 0,4	Wasserextract 1,26— 2,01 Salze mit alkalischer Basis 8,37— 7,30 Erdsalze u. Eisenoxyd 2,10— 1,41					
Phosphorsaures Natron 0,4 Phosphorsaurer Kalk 0,3 Kalk 0,2 1000	Verlust					

Die Asche der Blutkörner besteht nach Berzelius aus Eisenoxyd, Kalkerde, phosphorsaurem und kohlensaurem Natron, phosphorsaurem Eisenoxyd, wobei der Eisengehalt allein auf Rechnung des Hämatins kommt. — Im vorgerückten Alter, so wie in der Bleichsucht, und nach wiederholten Aderlässen nimmt die Zahl der Blutkörner ab.

Venöses und arterielles Blut unterscheiden sich nicht durch messbare Verschiedenheiten der Gestalt und Grösse der Blutkörner, sondern durch ihren Gasgehalt. Nach Magnus soll im arteriellen Blute mehr Sauerstoff im Verhältnisse zur Kohlensäure vorkommen. — Die farblosen Kügelchen kommen im Venenblute häufiger als im Arterienblute vor.

§. 55. Physiologische Bemerkungen über das Blut.

Das Blut bedingt durch seine lebendige Beziehung zu den Organen die lebendige Thätigkeit derselben, indem es die für ihre Existenz nothwendigen Materialien liefert. Die Blutkörner sind beim Ernährungsgeschäfte nicht zunächst interessirt, d. h. man sieht bei mikroskopischer Beobachtung lebendiger und durchsichtiger Theile keine Blutsphären aus den Gefässen in die Gewebe eingehen, um sich in sie zu verwandeln. Nur das Plasma tritt aus, und verbreitet sich durch Tränkung (Imbibitio) zwischen den kleinsten Massentheilchen, woran die physische Capillarität einen gewissen Antheil zu haben scheint. Die früher gangbaren Ansichten, die fadenförmigen Gewebtheile für Aggregationen von Blutkörnern zu erklären, sind schon längst aufgegeben, da die Durchmesser der fadenförmigen Gewebtheile von jenen der Blutkörner in plus oder minus abweichen. -Organe, welche intensive Ernährungs- oder Absonderungsthätigkeiten äussern, bedürfen eines reichlicheren Zuslusses von Plasma, und da mit der Zahl und Feinheit der Capillargefässe, die das Plasma aussickernde Fläche wächst, so wird der Reichthum oder die Armuth an Capillargefässen ein

anatomischer Ausdruck für die Energie der physiologischen Thätigkeit eines Organs sein. Wie nothwendig das Blut für die Ausrechthaltung der Functionen ist, wird am schönsten im Gehirne beobachtet, welches im Momente, wo die Blutzufuhr abgeschnitten wird, seine Thätigkeit einstellt. Es ist dieses um so merkwürdiger, als gerade das Gehirn, und namentlich dessen Marklager, sehr arm an Capillargefässen ist, und man fast unwillkürlich zur Annahme der Vasa serosa geführt wird. Selbst in Organen mit sehr wenig energischem Stoffwechsel kann eine reiche Capillargefässbildung eine abundante Blutzufuhr nothwendig machen, wenn nämlich der Stoff, aus welchem das Organ besteht, und welchen es vom Blute erhalten soll, im Blute nur in sehr geringer Menge vorhanden ist. Um das nöthige Quantum davon zu liefern, muss viel Blut dem Organe zugeführt werden. erklärt z. B. der geringe Gehalt des Blutes an Kalksalzen den Gefässreichthum der Knochensubstanz. — Wenn das Plasma sich durch Tränkung zu entfernten Gewebstheilen fortsaugt, so dürfen Gewebe, welche keine Blutgefässe enthalten, wenn sie nur mit gefässreichen Geweben in Contiguität stehen, nicht für ernährungslos gehalten werden, wie man vor nicht gar langer Zeit von den Horngeweben glaubte.

Die Beobachtung des Kreislaufes in den lebenden Capillargefässen lehrt, dass a. die Blutkörnchen die Innenwand derselben nicht berühren, sondern in der Axe des Gefässes im schnellen Strome dahingeführt werden. Nur in den Lungen (wie beim Wassermolch zu sehen) berühren die Blutsphären die innere Gefässobersläche. Höchst wahrscheinlich tritt diese bisher übersehene Differenz des Lungen- vom Körperkreislause deshalb ein, um den Blutkörnern die Aufnahme des durch die Gefässwand nach einwärts dringenden Sauerstoffes zu erleichtern.

6. Es findet keine stoss weise, sondern eine gleichförmige Blutbewegung im Capillarsysteme statt. v. Aendern die Capillargefässe ohne Einwirkung von Reizmitteln ihren Durchmesser nicht, wohl aber die Blutkörner, welche, um durch engere Gefässe zu passiren, sich in die Länge dehnen, ohne jedoch die Gefässwand zu berühren. d. An den Theilungswinkeln der Capillargefässe, welche einem gegen den Strom vorspringenden Sporn zu vergleichen sind, bleibt häusig eine Blutsphäre querüber hängen, biegt sich gegen beide Aeste zu, und scheint zu zaudern, welchen sie wählen soll, bis sie zuletzt in jenen hineingerissen wird, in welchen sie mehr hineinragte. ε. Die Lymphkörperchen (farblose Blutkörperchen) rollen an der Gefässwand dahin, und bewegen sich mit merkbar geringerer Geschwindigkeit, als die Blutkörner. Dieses hat seinen Grund in dem allgemein bekannten Factum, dass in einem Strome die Bewegung an den Usern langsamer, als in der Mitte ist. ζ. Das Austreten des Plasma durch die Capillargefässwand ist kein Object mikroskopischer Anschauung. η . Ist das Thier seinem Ende nahe, so geräth der Capillarkreislauf in Unordnung, die Blutsäule schwankt stossweise hin und zurück, bevor sie in Ruhe kommt, das Gefässlumen erweitert sich. die Blutkörner drängen sich auf Hausen zusammen, und verschmelzen zu

einer formlosen Masse, welche ihren Färbestoff nach und nach sich zur Serum auflösen länst.

Das Heraustreten des Plasma durch die Gelisswand, und das Envirmgen desselben in die Gewebe, wird mit dem von Futroche: rnerst eingeführten Namen der Exosmose und Endosmose bezeichnen ist und δνωθέω, hinaus- und hineintreiben.

Das Plasma ist wasserhell, kann aber unter krankhalten Beinnrmuren gefärbt erscheinen. Wenn nämlich der Wassergehalt des Bostes bei beidepischem Zustande desselben zunimmt, oder sein Selzzehaft bei Seurbut und Faulsiebern) abnimmt, wird der Crose sich im Plasma und isen, und eine röthlichgefärbte Tränkung der Gewebe bedaren. Die bestrichen Petechien, die falschen Blutunterlaufungen. die sosebutischen Striemen Vilvices), die fleischwasserähnlichen hydropischen Erzüsse in die Kieperbihlen. entstehen auf diese Weise. - Ist der gelbe Färlestoff durch Nieung oder Unterdrückung der Gallenabsonderung: im Blute quantitativ vorwaltend, so wird die Trankung der Gewebe mit gelbem Plasma eine allgemeine werden können, und gefässlose oder gefässarme Gehöde werden 40 zut, wie gesässreiche, ihr unterliegen. - Wird das Blut saserstoffreicher, wie bei Entzündungskrankheiten, so kann das Plasma, wenn es einmal die Gefässe überschritten hat, in den Geweben gerinnen, und wird dadurch jene Härte bedingen, welche Entzündunesgeschwissen eigen ist. - Ita das Blutplasma. an der äusseren Oberfläche der Blutzeläuse zum Vorscheine gekommen, reicher an Nahrungsstoffen ist, als jenes, welches sich sehon eine Strecke weit durch die Gewebe fortsaugte, und bereits viel von seinen plastischen Bestandtheilen verlor, so ist bezreitlich, warum zerade in der Nähe der Blutgefasse die Ernährung lebhafter als an davon entfernteren Punkten sein wird. Die Fettablagerung folgt deskaib ausschliesslich den Blutgefässramificationen, und wo diese weite Netze bilden, werden auch die Fettdeposita diese Form darbieten. Man hat auch nur aus diesem Grunde jene Bauchfellsfalten, welche sich zerne mit Fett beisden. Netze genannt.

Die Vermehrung der Blutkörperchen im Embryo geht, ausser der Rüdung neuer Blutkörperchen aus Zellen, durch Theilung der sehon vorhaudenen vor sich. Dass auch die Leber des Embryo neue Blutkörperchen bilde, wie Weber, Reichert, Kölliker, Gerlach und Fahrner annehmen, ist eben nur eine Annahme. Im Erwachsenen sind es die Lymphkörner des Blutes, welche sich durch Schwinden des Kerns, Verkleinerung der Hälle, und Füllung derselben mit Blutroth, in Blutkörperchen unswandeln.

Da also die Lymphkörperchen des Blutes junge Blutkörner sund, und die Zufahr von Lymphe zum Blute ununterbrochen stattfindet, so nubsste sich die Zahl der Blutkörner fortwährend vermehren. Dieses kann jedoch nur zu einem gewissen Maximum steigen, und wir sind deshalb nothgezwungen, eine Rückbildung oder Verslüssigung der alten Blutkörner anzunehmen. Dass die Ausscheidung derselben durch die Leber geschehe, wo Lebrech der Aussene. 3 Aus.

sie zur Gallenbereitung verwendet werden sollen (Schultz), ist nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen. Henle's sehr zurückhaltend geäusserte Meinung, dass die Blutkörner schwimmende Drüsenelemente sind, die aus dem Plasma des Blutes Stoffe anziehen, sie umwandeln und veredeln, und durch ihre Berstung und Auflösung dem Blute wiedergeben, dass sie somit der belebende Bestandtheil des Blutes sind, von dessen Thätigkeit die Mischung des Plasma abhängt, ist so einnehmend, dass man ihre factische Nachweisung nur ungern vermisst. Neuester Zeit hat Kölliker in der Milz das Organ gefunden, in welchem die alten und unbrauchbaren Blutkörnchen ihre Rückbildung und Auflösung erfahren.

Literatur. Die von Malpighi entdeckten Blutkörner wurden von Hewson zuerst einer genauen Untersuchung gewürdigt. Experimental Inquiries. London, 1774-1777. Seine richtigen und naturgetreuen Schilderungen wurden durch Home, Bauer, Prévost und Dumas theilweise entstellt, und die Lehre vom Blute durch die abenteuerlichen Auslegungen, welche ungeübte Beobachter ihren Anschauungsweisen gaben, in eine wahre Polemik der Meinungen umgestaltet. Das Geschichtliche hierüber enthalten die betressenden Kapitel von E. H. Weber und Henle. Siehe nebstdem: R. Wagner, zur vergleichenden Physiologie des Blutes. Leipzig, 1833. H. Nasse, das Blut in mehrfacher Beziehung physiologisch und pathologisch untersucht. Bonn, 1836. — Le Canu, études chimiques sur le sang humain. Paris, 1837. — C. Fahrner, de globulorum sanguinis in mammalium embryonibus atque adultis origine. Turici, 1845. — Landis, Beiträge zur Lehre über die Verrichtungen der Milz. Zürich, 1847. - E. H. Weber, über die Bedeutung der Leber für die Bildung der Blutkörperchen. Zeitschrift für ration. Medicin. 4. Bd. pag. 160. - Kölliker, ebenda. - Donders und Moleschott, Holland. Beiträge, III, p. 360. — Friedberg, Histologie des Blutes. Berlin, 1852. — Die Artikel "Blut" von Nasse in Wagner's Handwörterbuche der Physiol. und von M. Edwards in Todd's Cyclopaedia of Anat. and Physiology, und die kurze, treffliche Abhandlung "Blut" in Gerlach's Gewebelehre, 2. Aufl. pag. 34 seqq.

Die mikroskopische und chemische Zusammensetzung des Blutes wird in jedem ausführlichen Handbuche der Physiologie umständlich erörtert, und die pathologischen Verhältnisse in *Valentin's* Handbuche der Physiologie, wo die weiteren Literaturquellen zu finden sind, berücksichtigt.

§. 56. Lymphe und Chylus.

A. Lymphe.

Reine Lymphe, wie sie aus den Saugadern frisch getödteter Thiere zu erhalten ist, stellt eine wässerige, alkalisch reagirende, zuweilen gelblich oder röthlich (in der Nähe des Milchbrustganges) gefärbte Flüssigkeit dar, welche, wie das Blut, Körner enthält, aber in viel geringerer Menge. Diese Lymphkörner sind grösser als Blutkörner (0,002"—0,005"), rund, glatt oder höckerig, und schliessen einen durch Essigsäure, selbst durch Wasser deutlich zu machenden Kern mit 1—3 Kernkörperchen ein. Nebst diesen Lymphkörnern enthält die Lymphe noch kleinere Körnchen (Elementarkörnchen), welche sich hin und wieder zu Klümpchen vereinigen, und sich

ohne Zweisel durch die Bildung einer Hülle in die grösseren Lymphkörner umwandeln.

Die Lymphe gerinnt wie das Blut, und enthält also Faserstoff, nur ist der Kuchen bei weitem nicht so consistent, und erscheint zuerst als wolkige Trübung, welche sich nach und nach zu einem weichen, fadigen Knollen contrahirt. Das Serum der Lymphe ist eiweissreich, und führt dieselben Stoffe, die im Blutserum suspendirt oder aufgelöst gefunden wurden, nebst Eisenoxyd, von welchem es jedoch noch nicht entschieden ist, ob es nicht auch an die Lymphkörner gebunden vorkommt, wie das Eisen des Blutes an die Blutkörner.

B. Chylus.

Der Milchsaft, Chylus, ist wie das Blut eine Mischung flüssiger und sester Bestandtheile (Plasma und Kügelchen). — Er gerinnt aber, wenn er rein ist, nicht. Um ihn rein zur mikroskopischen Untersuchung zu erhalten, muss man ein strotzendes Chylusgesass im Mesenterium eines eben geschlachteten, gesütterten Thieres, bevor es noch durch eine Drüse ging, anstechen, und das hervorquellende Tröpschen auf einer Glasplatte aussangen. Um ihn in grösserer Menge zur chemischen Prüsung zu sammeln, handelt es sich darum, den Ductus thoracicus eines grossen Thieres nach reichlicher Fütterung zu öffnen. Man erhält jedoch nie dadurch reinen Chylus, da der Milchbrustgang zugleich Hauptstamm für das Lymphsystem ist.

Frischer und möglichst reiner Chylus hat eine milchweisse Farbe, welche von der reichlichen Gegenwart ausserordentlich kleiner, und deshalb unmessbarer Fettkügelchen (Fetttröpschen) abhängt. Das Wort Fetttröpschen ist hier nicht so zu nehmen, dass das Fett in kleinen Theilen in dem flüssigen Vehikel des Chylus schwimme; es muss vielmehr jedes Fetttröpschen mit einem Häutchen umgeben sein, dessen Existenz freilich nicht durch Beobachtung dargethan ist, aber welches angenommen werden muss. weil sonst nicht zu begreisen wäre, warum die einzelnen Fetttröpschen nicht zu grösseren Massen zusammensliessen. Die Farbe des Chylus ist um so weisser, und der Gehalt an Fetttröpschen somit um so bedeutender. je reicher an Fett das genossene Futter war (Milch, Butter, fettes Fleisch, Knochenmark). Ist der Chylus bereits durch mehrere Drüsen passirt, so nimmt die Menge obiger Fettkügelchen bedeutend ab, dagegen zeigen sich andere kleine Körnchen in grosser Menge, welche mehr weniger unregelmässig, höckerig, und nicht so dunkel gerandet sind, wie die Fettkügelchen. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,0005"-0,0008" (im Kaninchenchylus). Sie äussern ein grosses Bestreben, sich in Häufchen, zu 3 oder 4, zu gruppiren, und so mit einander zu Klümpchen zu verschmelzen, dass sie durch Essigsäure nicht mehr trennbar sind. Die höckerigen Klümpchen sind die sogenannten Chyluskörperchen, deren Durchmesser beim Menschen 0,00264" beträgt. Durch Zusatz von Wasser wird eine Hülle am Chykuskörperchen sichtbar, welche sich durch Einsaugen von Wasser immer mehr und mehr von dem Kerne des Körperchens entfernt.

Verhältniss des Chylus zur Lymphe und dieser zum Blute. Da die Chylusgestsse im Darmkanale nicht mit offenen Mündungen ansangen, so kann das nahrungsfähige Extract der Speisen nur durch Endosmose, also als Fluidum, in die Höhle der Chylusgesisse gelangen. Finden sich Körperchen im Chylus, so mussen sie sich erst in den Chylusgestssen gebildet haben. — Im Hauptstamme des lymphatischen Systems (Ductus thoracicus) zeichnet sich der Inhalt durch prompte Coagulation und deutliche Röthe aus. Die Coagulationssthigkeit kann nur vom Faserstoffe hergeleitet werden, die Röthe nur von Hämatin. Faserstoff und Hämatin finden sich im Chylus in um so grösserer Menge vor, durch je mehr Gekrösdrüsen er bereits wanderte. Da auch die Venen des Darmkanals absorbiren, so trifft man auch deutliche Chylusstreisen im Blute der Pfortader bei Thieren, welche nach reichlicher Fütterung getödtet wurden. — Das faserstoffreiche Plasma des Chylus und der Lymphe ist der Stoff, in welchem durch Neubildung die Chylus- und Lymphkörner entstehen. Die Chylus- und Lymphkörner, welche aus Kern und Hulle bestehen, verhalten sich zum Plasma wie Zelle und Zellenkern zum Cytoblastem. Der Kern muss früher gebildet werden, und schafft sich später seine Zelle. Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass die Fettkügelchen des Chylus sich zu den ursprünglichen Kernen der Lymphkörner aggregiren, und dass, wenn diese Kerne sich mit einer Zelle umgeben, in welcher Blutroth abgesondert wird, und in welcher der Kern schwindet, aus dem Lymphkorn ein Blutkorn wird. Der Formunterschied der Lymph- und Blutkörner ist, wie Henle bemerkt, nichts Wesentliches, da auch die platten kleinen Blutkörner durch Wasser zu Kugeln werden und anschwellen. - Marchand und Colberg gaben folgende Analyse menschlicher Lymphe (menschlicher Chylus wurde noch nicht untersucht). In 1000 Theilen Lymphe finden sich:

Wasser				•					969,26
Faserstoff									5,20
Eiweiss									4.34
Extractive									
Flussiges	une	ł k	rys!	talli	nisc	hes	Fe	ett	2,64
Salze .									
Eisenoxyd									

Da die ganze Discussion über Lymphe und Chylus vor das Forum der Physiologie gehört, so sind die physiologischen Lehrbücher über die näheren Verhältnisse dieser beiden Flüssigkeiten nachzuschlagen, und nebstdem: Tiedemann und Gmelin, Versuche über die Wege, durch welche Substanzen aus dem Magen und Darmkanale in das Blut gelangen. Heidelberg, 1820. — Marchand und Colberg, über die chem. Zusammensetzung der Lymphe, in Müller's Archiv. 1838. — H. Nasse, über die Lymphe, in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift. V. Bd., und dessen Artikel "Chylus" in R. Wagner's Handwörterbuch. — H. Nasse, und F. Nasse, Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie. Bonn, 1840. — H. Müller, zur Morphologie des Chylus und Eiters, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. 1845.

§. 57. Nervensystem. Eintheilung desselben.

Die gangbarste, wenn auch nicht physiologisch streng durchführbare Eintheilung des Nervensystems ist die von Bichat aufgestellte: in ein animales und vegetatives. Das animale Nervensystem besteht aus dem Gehirn und Rückenmark, und den Nerven beider; wird deshalb auch Sustema cerebro-spinale genannt. Es ist das Organ des psychischen Lebens, und vermittelt die mit Bewusstsein verbundenen Erscheinungen der Empfindung und Bewegung. Das vegetative (Systems vegetativum s. sympathicum) steht vorzugsweise den ohne Einfluss des Bewusstseins waltenden vegetativen Thätigkeiten der Ernährung, Absonderung, und den damit verbundenen unwillkürlichen Bewegungen vor, und wird auch sympathisches, organisches oder splanchnisches Nervensystem genannt. Beide Systeme sind mehr durch ihre anatomischen Eigenschaften, wenn sie als Ganzes betrachtet werden, als in der Art ihres Baues von einander unterschieden, greisen vielfach in einander, verbinden sich häufig durch Faseraustausch, und sind insofern von einander abhängig, als das vegetative Nervensystem einen grossen Theil seiner Elemente aus dem animalen bezieht, und bei niederen Wirbelthieren ganz und gar durch das animale Nervensystem vertreten werden kann. Die physiologische Sonderung ist nicht weniger prekär, als die anatomische, da der Einfluss des animalen Nervensystems auf die vegetativen Processe sich in vielen Einzelheiten deutlich herausstellt.

Man unterscheidet an beiden Systemen einen centralen und peripherischen Theil. Der Centraltheil des animalen Nervensystems ist das Gehirn und das Rückenmark, der peripherische die weissen, weichen, verästelten Stränge und Fäden, welche die verschiedenen Organe mit dem Centrum des Nervensystems in Verband bringen, und Nerven genannt werden. Der centrale Theil des vegetativen Nervensystems ist nicht so einfach, wie jener des animalen. Er erscheint in viele untergeordnete Sammel- und Ausgangspunkte von peripherischen Nerven getheilt, welche als graue, mehr weniger gerundete, isolirte, und an vielen, aber bestimmten Orten zerstreute Massen vorkommen, und Nervenknoten, Ganglia, genannt werden.

§. 58. Mikroskopische Elemente des Nervensystems.

Sie sind zweierlei Art: Fasern (Röhren), und Zellen.

A. Nervenfasern.

a) Fasern der Gehirn- und Rückenmarksnerven.

Jeder Gehirn- und Rückenmarksnerv, an was immer für einem Punkt seines Verlauß er untersucht wird, erscheint als ein Bündel zahlreicher, sehr feiner Fasern, — der Primitivfasern. Diese laufen ohne Unterbrechung vom Ursprunge bis zum Ende des Nerven, ohne an Dicke zuoder abzunehmen, geben während ihres Verlaußes keine Aeste ab, durch welche mehrere benachbarte sich verbinden könnten (theilen sich aber wohl am peripherischen Ende), und werden durch ähnliche Scheidenbil-

dungen, wie die secundaren Muskelfasern, zu grösseren Bündeln, und mehrere dieser zu einem Nervenstamme vereinigt. Der Durchmesser der Primitivfasern ist in verschiedenen Nerven ein verschiedener, und beträgt zwischen 0,0006"—0,0085". In einem und demselben Nerven kommen schon Fasern verschiedener Dicke vor, in solcher Mischung, dass die dicken oder die dünnen die Oberhand behalten. Die Nerven der Sinnesorgane und die Nerven der Empfindung sind feiner gefäsert, als die Nerven der Muskeln (Emmert).

Jede primitive Nervensaser besteht aus einer Hülle, einem halbsüssigen Inhalté, und dem Axencylinder.

Die Hülle ist ein ungemein seines, vollkommen structurloses, krystallhelles Häutchen, welches im srischen Zustande weder körnig noch faserig erscheint, mit scharsen und dunklen, geradlinigen Rändern, welche durch Einwirkung von Wasser und durch ungleichsörmiges Gerinnen des Inhaltes buchtig werden, und dadurch die srühere Annahme rosenkranzsörmiger Nervensasern veranlassten (Fibrae monilisormes).

Der Inhalt der Nervensasern — das Nervenmark — ist ein im möglichst frischen Zustande opalartiges, durchscheinendes, fettig-albuminöses Fluidum, welches am Querriss einer Nervensaser nicht ausstiesst, sondern sich nur als abgerundeter Pfropf, oder als spindelförmiger Tropfen, vordrängt. Durch Gerinnen verliert dieser Inhalt sein homogenes Ansehen, zieht sich von der Hülle zurück, erhält zugleich wellensormig gebogene Contouren, welche innerhalb der geradlinigen Contour der Faser deutlich gesehen werden (als sogenannte doppelt contourirte Nervensaser), und zerklüstet nach längerer Zeit in kleine, unregelmässige Fragmente. Der mikroskopisch nachweisbare Unterschied von Hülle und Inhalt giebt der Primitivfaser die Bedeutung eines Rohres, und man spricht deshalb von Nervenröhrchen in demselben Sinne als von Nervenprimitivfasern. Im Marke eines Nervenröhrchens bemerkt man noch eine centrale, lichte, bandartige Faser, rundlich oder platt, welche jedoch vom Mark so umhüllt wird, dass sie nur an Rissstellen eines Nervenröhrchens, oder durch Reagentien (Chromsaure, Jod) zur Anschauung kommt. Sie ist, obschon weich und biegsam, doch ziemlich sest und elastisch, und wurde von Remak Primitivband, von Purkinje Axencylinder genannt. Ihre chemische Grundlage ist nach Lehmann eine dem Muskelfibrin ähnliche, albuminose Substanz, ohne Fett. —

Die Primitivsasern eines Nerven liegen nicht geradlinig, sondern wellenförmig neben einander, wodurch eine bedeutende Dehnung des Nerven, ohne Zerrung desselben, möglich wird.

Nervenröhrchen, welche Hülle, Inhalt, und Axencylinder deutlich erkennen lassen, heissen markhaltige oder auch dunkelrandige. Sie bilden die überwiegende Mehrzahl. Fehlt das Mark, und wird der Axencylinder von der Hülle dicht umschlossen, so nennt man diese Röhrchen: marklose. Sie kommen als Verlängerungen der markhaltigen Röhrchen, sowohl gegen deren peripherisches Ende, als auch am Ursprunge derselben aus den Fortsätzen der Ganglienzellen vor. Bei Embyronen prävaliren sie an Zahl, weshalb man sie auch embryonale Fasern zu nennen pflegt.

b) Vegetative, grave, oder sympathische Nervenfasern.

Es findet sich im vegetativen Nervensystem (Sympathicus) noch eine zweite Art von Fasern, welche eine leicht granulirte, streifige, seltener homogene Substanz besitzen, und von Stelle zu Stelle spindelformige Kerne tragen, deren Längenaxe der longitudinalen Richtung der Faser folgt. Ihr auf den Sympathicus beschränktes Vorkommen liess ihnen den Namen graue, auch organische oder sympathische Fasern geben (Remak, J. Müller, Bidder, Volkmann). Henle nennt sie, ihres Ansehens wegen, gelatinose Fasern. Sie sind viel feiner als die Cere-Ihr Durchmesser beträgt im Mittel 0,002". Nerven, welche sich durch gewisse physiologische Zustände der Organe, in welchen sie vorkommen, verdicken, z. B. die Nerven des schwangeren Uterus, verdanken ihre Faserzunahme nur einer numerisch zunehmenden Bildung von grauen Fasern (Lee und Remak). Valentin und Kölliker erklären sie für Bindegewebsäden, welcher Ansicht ich nicht beipslichten kann, da ich sie wiederholt aus den Fortsätzen der Ganglienzellen (siehe B dieses 4) entstehen sah. Uebrigens bestehen die vegetativen Nerven nicht einzig aus diesen Fasern. Es treten vielmehr auch zahlreiche Cerebrospinalfasern in sie ein, und mischen sich mit den grauen.

c) Weisse Fasern des Gehirns und Rückenmarks.

Mehrere Anatomen stellen diese Fasern als eine von den übrigen beiden verschiedene Art auf. Sie finden sich in der weissen Substanz des Gehirns und Rückenmarks, und in den Riech-, Seh- und Hörnerven, welche, wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, ursprünglich Ausstülpungen der drei embryonalen Gehirnblasen sind. Sie bestehen aus Hülle, Mark, und Axencylinder, aber letzterer ist sehr schwer darzustellen. An Feinheit übertreffen sie die Primitivfasern gewöhnlicher Nerven. Durch die Gerinnung des Markes bekommen sie nie doppelte Contouren, sondern werden perlschnurartig mit einfachen Rändern. Diese Gestalt nehmen sie so rasch an, dass man lange der Meinung war, sie komme ihnen normgemäss zu.

B. Nervenzellen.

Sie sind runde, ovale oder birnförmige, öfters auch eckige, meistens etwas plattgedrückte, kernhaltige Zellen. Ihre Grösse schwankt zwischen 0,003" und 0,050". In grösseren Massen angehäuft, kommen sie in den Ganglien (daher auch Ganglienzellen genannt) und in der grauen Gehirnsubstanz vor, deren Farbe von diesen Körpern abhängt. Sie wurden aber auch in den peripherischen Ausbreitungen gewisser Nerven (z. B. Sehnerv. Hörnerv) gefunden. Jede Nervenzelle besteht 1. aus einer structur-

tosen Umhüllungsmembran, welche sich in die Hülle der aus der Zelle hervortretenden Primitivfaser fortsetzt, 2. aus einem rundlichen Kern, welcher in der Regel nur ein, selten zwei Kernkörperchen enthält, 3. aus einem zwischen Hülle und Kern befindlichen körnigen, blassen oder pigmentirten Inhalte.

Die Ganglienzellen sind entweder glatt und frei, d. h. ohne Fortsätze, oder mit Fortsätzen besetzt, welche mit den früher erwähnten marklosen Nervenröhrchen völlig übereinstimmen, und sich in dunkelrandige, markhaltige Nervenröhrchen, oder in graue, vegetative Nervenfasern verlängern. Einzelne Fortsätze einer Zelle verbinden sich auch häufig mit denen einer zweiten. Die Zahl der Fortsätze giebt ihnen den Namen der unipolaren, bipolaren, multipolaren Zellen. Die Fortsätze erscheinen oft selbst wieder verästelt. — Freie Ganglienzellen (auch insulare genannt, weil sie zwischen den Primitivfasern wie Inseln eingeschlossen liegen) finden sich in grosser Anzahl in allen Ganglien. Man ist jedoch nie ganz gewiss, ob man es nicht mit einem Kunstproduct zu thun hat, da die Fortsätze bei der rohen Behandlung so feiner Objecte mit Nadeln leicht abreissen.

Unipolare kommen in den Ganglien des Sympathicus vor; bipolare hat man in den Spinalganglien gesehen, und multipolare in den grauen Centralorganen des Gehirns und Rückenmarks.

Jedes Ganglion, und jeder Nervenstamm als Ganzes, besitzt eine aus Bindegewebfasern gebildete Scheide — das Neurilemma. Diese schickt Fortsätze in die Substanz des Ganglion, und zwischen die Faserbündel der Nerven hinein.

Das Zerfasern eines Nerven mit Nadelspitzen ist für Gebilde von solcher Feinheit, wie die Primitivfasern der Nerven, eine rohe Vorbereitung zur mikroskopischen Untersuchung. Um die Primitivfasern zu sehen, thut man besser, lieber die feinsten natürlichen Nervenramificationen, als grössere, durch Kunst zerfaserte Bündel unter das Mikroskop zu bringen. Die feinen Nerven durchsichtiger Theile (Bauchfellsduplicaturen, die freien Nervenfäden, welche man beim Abziehen der Haut der Frösche zwischen dieser und den Muskeln ansgespannt findet, die durchsichtigen Augenlider der Frösche etc.) eignen sich zu solchen Untersuchungen sehr gut. Die besten Reagentien, deren man sich zur Darstellung der Axencylinder bedient, sind concentrirte Essigsure, Chromsäure, Sublimat (Czermak), Jod (Lehmann), und Aether (Kölliker).

§. 59. Verhältniss des vegetativen Nervensystems zum animalischen.

Die Frage über die Selbstständigkeit des vegetativen Nervensystems ist Gegenstand eines Streites von Volkmann und Bidder contra Valentin geworden, der durch Kölliker auf vermittelnde Weise beigelegt wurde. Volkmann und Bidder erklären die im Sympathicus vorkommenden.

feinen, und um die Hälfte als gewöhnliche Cerebrospinalfasern dünneren Fåden, für dem Sympathicus ausschliesslich zukommende, und seine Selbstständigkeit bedingende Elemente, während Valentin in ihnen nichts weiter als gewöhnliche, zufällig feinere Cerebrospinalfasern zu erkennen glaubt. Kölliker's Beobachtungen weisen dem Sympathicus eine mittlere Stellung zwischen vollkommener Unabhängigkeit und absoluter Dependenz vom Corebrospinalsysteme an. (Die vollkommene Unabhängigkeit wurde selbst von Volkmann und Bidder nur für die feinen vegetativen Fasern angespro-Die deutlichen Cerebrospinalfasern in den vegetativen Nerven lassen ia an eine absolute Unabhängigkeit der letzteren gar nicht denken.) Selbstständig und unabhängig vom Systems cerebrospinale ist der sympathische Nerv durch die in seinen Ganglien entspringenden feinen Nervenfasern. welche jedoch sich nur durch ihre geringere Dicke von gewöhnlichen Nervenfasern unterscheiden. Unselbstständig ist er durch die ihm regelmässig zuströmenden Cerebrospinalfasern, und durch die feinen Fasern, welche ihm aus gewissen Ganglien des Cerebrospinalsystems zugeführt werden. Was den Sympathicus anatomisch und formell vom animalen Nervensysteme unterscheidet, ist der auf so viele Ganglien vertheilte Ursprung seiner mikroskopischen Elemente, und die häufige Mischung derselben mit Fasern des Gehirn- und Rückenmarksystems. Jedes Ganglion ist für ihn dasselbe. was das Gehirn oder Rückenmark für die Cerebrospinalnerven ist, - ein Ausgangspunkt neuer Fasern, die im Ganglion entstehen, und sich den durch das Ganglion blos hindurchgehenden beigesellen. — In anatomischer Hinsicht sind die feinen Fasern des Sympathicus von den dickeren Cerebrospinalfasern eben nur durch ihr Volumen, sonst durch nichts Anderes unterschieden, ja es nimmt eine dicke Cerebrospinalsaser, wenn sie sich an ihrem peripherischen Ende in seinere Fasern spaltet, ganz das Ansehen einer sympathischen Faser an.

F. Bidder und A. W. Volkmann, Selbstständigkeit des sympathischen Nervensystems. Leipzig. 1842, und in Müller's Archiv, 1844, pag. 359. — R. Remak, neurologische Erläuterungen, chendaselbst, pag. 463, und der geistreiche Artikel "Nervenphysiologie" in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. Aussührlich über die oben erwähnte Controverse handelt Kölliker in seinem Handbuch der Gewebslehre, p. 325 seqq.

§. 60. Ursprung (centrales Ende) der Nerven.

Da es a priori einleuchtet, dass der Ursprung der Nerven auch der Ausgangspunkt ihrer Thätigkeiten ist, so bleibt es eine der wichtigsten Aufgaben der Anatomie, die Stellen nachzuweisen, an welchen die mikroskepischen Elemente der Nerven ihre Entstehung nehmen.

Der Ursprung der Primitivsasern der Nerven ist theils im Gehirn, theils im Rückenmark, theils in den Ganglien zu suchen. Sie gehen sämmtlich aus den Zellen der grauen Substanz hervor. Aus welcher Zelle jede einzelne Faser entspringt, wird wohl ewig unbekannt bleiben! - Die Schlingen der Primitivfasern, welche von Valentin (im Gehirn des Pferdes und der Taube), von Remak und von mir (im kleinen Gehirn der Vögel) beobachtet wurden, können nicht definitiv als Nervenursprünge angesehen werden, da sie auch durch wellenformige Biegung Einer Nervenfaser (deren wahrer Ursprungsort unbekannt ist) entstehen könnten. Auch wären meines Dafürhaltens die centralen Schlingen der Nervensasern im Gehirn, wenn man in ihnen den wahren Ursprung der Primitivfasern gefunden zu haben meinte, für die Physiologie der Nervenleitung etwas in der That sehr Missliches. Denn wodurch entsteht eine Schlinge? Sie entsteht a. entweder dadurch, dass eine Faser an einem bestimmten Punkte des Gehirns umbiegt, und zu einem unbekannten anderen Punkte des Gehirns hingeht (womit nichts erklärt ist), oder β. dadurch, dass zwei Nervensasern zu demselben Punkte des Gehirns gelangen, wo sie in einander übergehen (was dem aprioristischen Postulate entgegen ist, dass jede Nervenfaser für sich einen besonderen Ursprungs- oder Endigungspunkt im Gehirn in Anspruch nimmt). "Kurz," sagt Volkmann, "wir kennen die Ansange der Nervensasern nicht, und werden sie wahrscheinlich niemals kennen." - Ob es im Gehirne eigenthümliche Fasern, welche nicht als Fortsetzungen von Nervenfasern austreten, gebe, ist leichter zu vermuthen, als bei den gegenwärtigen Untersuchungsmethoden des Gehirns zu beweisen. Die absolute Massenvermehrung der Nervensubstanz im Gehirne nöthiget gewissermassen zur Annahme eigener Gehirnfasern.

Der Ursprung von Primitivfasern in den Ganglien ist mit aller Evidenz nachgewiesen. Es wurde schon durch Kölliker (die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des sympathischen Nervensystems. 1845, p. 17) bewiesen, dass die Hülle und der gelatinos-körnige Inhalt der Ganglienkugeln sich in Hülle und Mark der Primitivfasern fortsetzt. Diese Beobachtung wäre jedoch nicht hinreichend, den Ursprung von Primitivfasern aus der Ganglienkugel festzustellen, da, wenn eine Ganglienkugel an ihren beiden Polen mit zwei Primitivsasern zusammenhängt (R. Wagner, Robin, Bidder u. A.), diese wohl auch eine eintretende (anderswo entsprungene) und eine austretende Faser vorstellen können, wo dann das Ganglion blos eine Unterbrechung des Verlauses einer alten Faser, keinesweges aber einen erwiesenen Ursprungsplatz einer neuen abgiebt. Dass die Ganglien wirkliche Erzeugungsstätten neuer Primitivfasern sind, kann nur dann als ausgemacht angesehen werden, wenn in ihnen Ganglienkugeln beobachtet werden, welche nur mit einer peripherisch auslausenden Faser zusammenhängen. Kölliker hat nun auch die Existenz dieser nur an Einer Seite mit einer Nervensaser zusammenhängenden Ganglienkugeln nachgewiesen. (Siehe dessen reichhaltigen, mit Rücksichtsnahme auf alle in dieses Beobachtungsgebiet einschlagenden Daten geschriebenen Aufsatz in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. I. Bd. 2. und 3. Heft.) Die Frage: ob es auch Ganglienzellen ohne Faserursprünge gebe, wurde von

Kölliker dahin beantwortet: dass solche freie oder selbstständige Zellen nicht blos im Gehirn und Rückenmark, sondern auch in den Ganglien des Sympathicus und der Cerebrospinalnerven so constant und häufig vorkommen, dass die Frage eigentlich die ist, ob überhaupt ein Ganglion existirt, in welchem dieselben gänzlich mangeln.

Welchen Antheil der Kern und das Kernkörperchen einer Ganglienkugel an der Bildung neuer Nervensasern besitzen, darüber enthalten die neuesten Leistungen der Mikroskopie Folgendes: 1. Man hat die Primitiv-saser aus dem Kern der Ganglienkugel hervorgehen gesehen (Axmann, G. Wagener, Lieberkühn jun., Harless); ihre Scheide erhält sie erst nach ihrem Austritte aus der Ganglienkugel, von der Hülle derselben. 2. Der centrale Faden (Purkinje's Axencylinder §. 58) hängt mit dem Kernkörperchen zusammen, so dass er entweder aus ihm einsach hervorgeht, oder durch dasselbe hindurchgeht, wo dann das Kernkörperchen mit zwei Centralsäden in Verbindung steht. 3. Enthält ein Kern zwei Kernkörperchen, so geht durch jedes derselben ein besonderer Centralsaden. 4. Es kommen Ganglienkugeln vor, bei welchen an der einen Seite eine Nervensaser in den Kern, auf der anderen ein Centralsaden in das Kernkörperchen übergeht.

Durch die den Gegenstand dieses §. betreffenden zahlreichen Arbeiten von Bidder, Volkmann, Kölliker, Reichert, Schiff, Harless, Robin, R. Wagner, Lieberkühn, C. Bruch, Hessling u. A., welche theils an kaltblütigen Wirbelthieren, theils an Wirbellosen vorgenommen wurden, ist zwar eine reiche Ernte von vereinzelten Thatsachen über den fraglichen Gegenstand eingebracht, die aber bei weitem noch nicht hinreicht, die Untersuchungen über das Verhältniss der Ganglien zu den Nerven als abgeschlossen zu betrachten. Wer die Schwierigkeit dieser Art mikroskopischer Forschungen kennt, wird es zugeben, dass noch sehr viel zu thun übrig ist, um auch nur von einem einzigen Ganglion sagen zu können, dass das Wechselverhältniss seiner ein – und austretenden Nerven genügend aufgeklärt ist. Dass hierin kein Vorwurf für das bereits Geleistete liegt, wird man mir gerne einräumen.

§. 61. Peripherisches Ende der Nerven.

Ueber das peripherische Verhalten der feinsten Nervenenden verdanken wir gleichfalls der vergleichenden Anatomie bei weitem mehr Aufschlüsse als der menschlichen. Vor Allem ist zu bemerken, dass die bisherigen Annahmen eines unverästelten Verlaufes, und einer an allen Punkten des Verlaufes sich gleichbleibenden Dicke einer Primitivfaser, nicht mehr statthaft sind. Der unverästelte Verlauf gilt nur für jene Strecke, welche eine Nervenfaser bis zu ihrem peripherischen Endigungsbezirke zurücklegt. (Selbst hier nicht als allgemeine Regel, da Stannius bei Fischen Theilungen von Primitivfasern in den Stämmen und Zweigen motorischer und gemischter Nerven entdeckte, 1850). An der Peripherie angelangt, kann sich die Primitivfaser successive in kleinere Fasern theilen, welche mit

nachbarlichen anastomosiren. Die Dicke der Nervenfaser kann sich entweder vermehren oder vermindern, - beides jedoch nur in ihrem peripherischen Endigungsrayon. Verdickung kommt gewöhnlich an der Theilungsstelle einer Faser, - Verdünnung natürlich an ihren Aesten vor. Theilungen von Primitivsasern wurden in motorischen Nerven so häusig gesehen, dass sie ein Normalverhalten daselbst bilden. Sie gelten gegenwärtig für alle Muskelnerven. Im elektrischen Organe der Rochen hat R. Wagner ein Zerfallen der Primitivsasern in viele (im höchsten Grade in 25) Fibrillen beobachtet (Fibrillen erster Ordnung), welche sich fortan dichotomisch theilen, und zuletzt gabelförmig, stark gespreizt, in zwei Zweige auslösen (Fibrillen zweiter Ordnung), an welchen Hülle und Mark nicht mehr deutlich zu unterscheiden sind, und welche, ohne mit anderen Fibrillen zweiter Ordnung zu anastomosiren, im Parenchyme des elektrischen Organs spurlos verschwinden. Dieses "spurlos" ist freilich keine Erklärung des gesuchten Endverhaltens der Nervenfaser, und gilt leider auch, ausser dem elektrischen Organe, noch für die meisten übrigen. -Vor Kurzem haben Joh. Czermak und Molin peripherische Verästlung auch an den sensitiven Nervenfasern (ersterer in der Haut der Frösche, im Gehörnerv des Störs, und in den Schwimmblasennerven des Hechtes. - letzterer in den Geschmackspapillen der Frösche), und Gegenbaur in den Nerven der Tasthaare der Säugethiere aufgefunden. Auch in der Conjunctiva, in den Zahnkeimen, in der Beinhaut, harten Hirnhaut, im Bauchsell, in den Thränen- und Speicheldrüsen etc., wurde sie beschrieben, und täglich mehrt sich die Zahl der Beobachtungen peripherischer Theilungen von Primitivsasern. Ich habe sie so eben in der lungenähnlichen Schwimmblase von Gymnarchus niloticus gesehen. — Eine entschiedene und über alle Zweisel erhobene Endigungsweise einer Nervensaser kennen wir bisher nur in den Pacini'schen Körperchen, als knopsförmige, ringsum abgeschlossene, in keine Nachbarstheile ausstrahlende Verdickung. Die von Gerber, Hannover, Krause, Emmert als allgemeines Gesetz angenommenen peripherischen Nervenschlingen (d. i. bogenförmiger Uebergang zweier Primitivsasern an ihrem peripherischen Ende) ersreuten sich nur kurze Zeit ihrer allgemeinen Geltung, indem viele jener Beobachtungen, welche die Existenz der Schlingen nachwiesen, durch entgegengesetzte aufgewogen wurden, und vom theoretischen Standpunkte aus die Schlingen, um mit Volkmann's Worten zu reden, "nicht blos etwas Räthselhaftes, sondern etwas Unbrauchbares, man möchte sagen, etwas Absurdes sind." Die Schlinge lässt sich mit unseren Vorstellungen über Nervenleitung nicht vereinbaren. Volkmann hat dieses auf wahrhaft geniale Weise dargethan, und wenn man hierauf erwiederte, dass möglicher Weise unsere Vorstellungen über Leitung, nicht aber die Schlingen etwas Irriges seien, so lässt sich nur entgegnen, dass selbst in jenen Organen, in welchen die Schlingen für evident gehalten wurden, ihre factische Existenz theils sehr problematisch erscheint, theils gänzlich aufzugeben ist (so

in den Gefühlswärzchen, in der Zahnpulpe, in den Ampullen und dem Spiralblatte des Gehörorgans).

Wir müssen also bekennen, dass unsere Kenntniss der peripherischen Nervenendigungen nicht weiter her ist, als jene der Nervenursprünge, und dass, wenn wir den alten und vielgebrauchten Ausdruck: die Nerven verlieren sich im Parenchym der Organe, wiederholen, wir nicht einmal eine Ahnung haben, was aus Hülle und Mark derselben wird. Confessio ignorantiae primus ad veritatem inveniendam gressus est, Baco.

§. 62. Pacini'sche Körperchen und Wagner's Tastkörperchen.

a) Pacini'sche Körperchen.

Es finden sich an den feineren Ramificationen vieler Nerven weisse, kleine, elliptische Körperchen, seitlich anliegend, oder durch Stiele mit ihnen zusammenhängend. Ihre Länge variirt von 1½-2 Millimeter. Am häufigsten und grössten kommen sie an den Hohlhand - und Fingerästen des Nervus ulnaris und medianus, beiden Nervi plantares, seltener und kleiner am Plexus sacralis und epigastricus, Nervus cruralis, und einigen Hautnerven der oberen und unteren Extremität vor. In einer Handsläche finden sich deren 60-200 (600 nach Herbst). Sie bestehen aus concentrischen, häutigen Kapseln, welche durch serumhaltige Zwischenräume von einander getrennt sind. Auch der Stiel ist ein System in einander geschobener Röhren. Die innerste Kapsel bildet eine kleine Höhle, in welcher ein Primitivnervensaden, der durch die Axe des Stieles, in Begleitung eines Capillargefässes, eindrang, frei liegt. Er trägt das Gepräge eines marklosen Primitivsadens an sich, indem das Mark, welches er vor seinem Eintritte enthält, nach seinem Eintritte fehlt, der Faden somit sich plötzlich fast bis zur Feinheit eines Axencylinders verdünnt. mitivsaden ist zuweilen in der Kapselhöhle etwas eingerollt, bildet keine Umbiegungsschlinge, um aus der Kapsel wieder herauszugehen, sondern endet entweder mit einer einfachen knopfförmigen Anschwellung, oder theilt sich gabelförmig, um mit kleineren Knöpschen aufzuhören. Ihre physiologische Bedeutung ist gänzlich unbekannt. Ich habe sie kürzlich am Nervus infraorbitalis, und Kölliker an Knochennerven aufgefunden.

Aussührlicheres siehe bei F. Pacini, nuovi organi scoperti nel corpo umano. Pistoja, 1340, und J. Henle und A. Kölliker, über die Pacini'schen Körperchen. Zürich, 1844, wo auch das Historische zusammengestellt ist. Nach Langer's geschichtlicher Nachweisung (Oesterr. medicin. Wochenschr. 1845) waren diese Körperchen, über deren physiologische Bedeutung noch nicht entschieden ist, schon A. Vater als Papillae nerveae bekannt. Sie wurden von Henle, Kölliker und Osann in allen Säugethierordnungen, von Herbst auch an der inneren Fläche der Mittelhandknochen bei Vögelngefunden. Niemals sind die Nerven, an welchen sie vorkommen, motorischer Natur. Schon an Embryonen von 22 Wochen wurden sie, obwohl im un-

entwickelten Zustande, gesunden. Beim Erwachsenen sind sie am zahlreichsten da, wo die Nervenäste für die Finger und Zehen abgehen, und zwar weniger an den Hauptstämmen, als an den feinen Aestchen, die sich unmittelbar in die Haut, namentlich der Fingerspitzen einsenken. Am schönsten zeigen sie sich, wenn man Haut und Fleisch einer Fusssohle hart an den Knochen loslöst, und dann von innen her die Nervenstämme verfolgt. So lange die Nerven noch über der Fascia plantaris liegen, zeigen sie nur wenig Körperchen; haben sie aber die Fascia durchbohrt, und sind sie in das fettreiche Unterhautzellgewebe gelangt, so findet man sie mit zahlreichen Körperchen ausgestattet, selbst bis zu ihren feinsten Verästlungen hin (Henle und Kölliker, pag. 10). Bei der Katze finden sie sich auch an den sympathischen Geslechten im Mesenterium, Mesokolon, und auf dem Pankreas, und sind hier am leichtesten, fast ohne alle Praparation, dem Ansanger zugänglich. — Die eigenthümliche Endigungsart der Nervensäden in den Pacini'schen Körperchen macht sie anatomisch und physiologisch gleich interessant. An einen pathologischen Ursprung dieser Körperchen ist gar nicht zu denken.

Purkinje, über die Pacini'schen Körperchen, in Casper's Wochenschrist. 1846. Nr. 48. — Pappenheim in den Comptes rendus. Tom. XXIII. p. 68. — J. C. Strahl, zu den Pacini'schen Körperchen, Müller's Archiv. 1848. pag. 165. — G. Herbst, die Pacini'schen Körperchen. Göttingen, 1848 (besonders reich an vergl. anat. Angaben). Ebenso Fr. Osann in Kölliker's Bericht über die zootom. Anstalt zu Würzburg. 1849. pag. 90. — F. Leydig (über die Pacini'schen Körperchen der Taube), in der Zeitschrist für w. Zoologie, 5. Bd. 1. Hest. — Will, Sitzungsberichte der Wiener Akad. 1850. Febr. — A. Kölliker, Bemerkungen über die Pacini'schen Körperchen in der Zeitschrist für w. Zoologie, 5. Bd. 1. Hest.

b) Wagner's Tastkörperchen.

G. Meissner und R. Wagner in Göttingen machten jungst den merkwürdigen Fund, dass gewisse Tastwärzchen der Haut, gewöhnlich die niederen und dicken, besonders in der Volarstäche der Finger und Zehen, einen elliptischen, selten sphärischen, quergestreisten Körper einschliessen, in welchen das letzte Ende eines oder zweier feinsten Tastnervensäden eintritt. Wagner nannte diese Körper, deren Bedeutung noch sehr räthselhaft, Corpuscula tactus. Durchschnittlich sind sie 0.02" lang, und 0.008-0.01" breit. Die übrigen längeren und konischen Tastwarzen enthalten blos Capillargefässschlingen, aber weder Tastkörperchen, noch Nervenschlingen, haben also mit dem Tastsinne nichts zu schaffen. Wie die Tastnervenfäden im Wagnerschen Körperchen endigen, ist zur Zeit noch nicht ausgemacht. Meissner (Beiträge zur Anat. und Phys. der Haut. Leipz., 1853. pag. 16) erklärt die Querstreisen der Körperchen für die in Spiraltouren um das Körperchen herumgehenden Endäste der durch Theilung zerfallenden Nervenprimitivfasern. Die Tastkörperchen wären demnach eine eigene, höchst merkwürdige Form von spiraler Ausknäuelung einer oder zweier, durch Spaltung zerfallender Nervensasern, um den centralen Kern gewisser Nervenpapillen.

Die Literatur dieser neuesten anatomischen Entdeckung besteht grossentheils in Streitartikeln, zwischen R. Wagner, G. Meissner, und Kölliker. Die erste Bekanntmachung derselben findet sich in den Göttinger Nachrichten. 1852. Nr. 2. — Neueste Angaben von Gerlach und Nuhn, in der illustr. medic. Zeitschrift, 2. Bd.

§. 63. Verlaufsweise der Nerven.

Die specielle Neurologie führt zu folgenden allgemeinen Normen:

- 1. Die grösseren Nervenstämme bilden rundliche oder platte Stränge mit äusserer derberer Hülle (Neurilemma), und faserigem, weichem Inhalte. Stärke oder Schwäche, und Straffheit des Neurilemma bedingt die grössere Härte oder Weichheit des Nerven. Das Neurilemm enthält die Ernährungsgefässe des Nerven, und führt sie seinen Bündelabtheilungen zu. Der Gefässreichthum der Nerven ist, wie schon ihre weisse Farbe beurkundet, kein bedeutender, und die seinsten Capillargesässnetze bilden in ihnen langgestreckte Gitter oder Maschen.
- 2. Das scheinbare Dickerwerden der Nerven nach ihrem Austritte aus der Schädel- oder Rückgratshöhle beruht nicht auf einer Vermehrung der Fasern, sondern auf dem Austreten der Scheide, welche innerhalb der genannten Höhlen viel dunner ist. Oertliche Verdickungen im Verlaufe der Nerven entstehen auf zweisache Weise. a. Durch Divergenz der Primitivfasern, welche auseinander weichen, wie die Flachsfäden eines ausgedrehten Strickes, sich verketten, neuerdings an einander legen, und in den dadurch gebildeten Zwischenräumen Ganglienkugeln aufnehmen, welche selbst wieder neue Nervensasern erzeugen. Diese Verdickungen oder Anschwellungen, welche gewöhnlich eine gefässreichere Hülle als der Nerv selbst erhalten. und durch mehr weniger graue Färbung sich von der Farbe des Nervenstammes unterscheiden, heissen Nervenknoten, Ganglia. 3. Durch Anlagerung eines anderen Nervenstammes, also durch Verbindung zweier. Diese Verdickung ist nie knotenartig, sondern mehr gleichartig, erstreckt sich auf längere oder kürzere Stellen, je nachdem der hinzugetretene Nerv sich srüher oder später wieder entsernt. Man könnte sie die cylindrische Verdickung nennen.
- 3. Die Primitivsasern der Nerven sind, wie oben bemerkt wurde, nicht verästelt, und hängen nicht durch Anastomosen (ausser an ihren centralen und peripherischen Enden) zusammen. Verästelt sich nun ein Nerv, so kann der Ast des Nerven nicht als eine Summe von Aesten der Primitivsasern genommen werden. Er entsteht vielmehr nur dadurch, dass von vielen, in einem Nervenstamme parallel neben einander liegenden, nicht anastomosirenden Primitivsasern ein Bündel sich ablöst, und seitwärts abtritt. Dieses Abtreten von Fasern aus dem Gesammtbündel kann sich öster wiederholen, bis die letzten Aestchen nur aus einer einzigen Primitivsaser bestehen werden.
- 4. Verbinden sich zwei Nerven (nicht Nervenfasern) durch Zwischenbogen, so heisst diese Verbindung Nervenanastomose. Alle Nerven,

nur die drei höheren Sinnesnerven des Geruchs, Gesichts und Gehörs nicht, bilden Anastomosen, welche gegen die Endigung der Nerven hin zahlreicher werden. Aus dem in 3. Gesagten ist leicht zu entnehmen, dass Nervenanastomose etwas Anderes ist als Gefässanastomose. Gefässanastomose ist wahre Höhlencommunication, - Nervenanastomose nur Austritt eines Faserbundels aus einem, und Eintritt in einen zweiten Nervenstamm. Das Faserbündel kann an dem Stamme, zu welchem es trat, vor- und zurücklaufen: Anastomosis progressiva et regressiva. Es kann bei dem Nerven bleiben, welchen es außuchte, oder ihn wieder verlassen, um zu seinem Mutterstamme zurückzukehren, oder zu einem dritten, vierten etc. Nerven zu treten. Veränderte Association der Faserbündel ist also die Idee der Nervenanastomose. — Giebt der Nerv, der ein Faserbundel aufnimmt, dafür eines an den Abgeber zurück, so ist dieses eine wechselseitige Anastomose, Anastemosis mutua; nimmt er nur auf, ohne abzugeben. eine einfache Anastomose, Anastomosis simplex. - Theilen sich mehrere Nerven Faserbündel mit, so dass ein vielseitiger Austausch entsteht, so heisst dieses ein Nervengeslecht, Plexus nervesus. Die aus einem Geflechte heraustretenden Nerven können somit Faserbundel aus allen eintretenden Nerven besitzen. Werden die Maschen eines Gestechtes mit Ganglienkugeln ausgefüllt, was übrigens nur an kleinen Geslechten geschieht. so entsteht ein Gangliengeslecht, Plexus gangliosus.

- 5. Die Nerven verlausen in der Regel geradlinig, und machen nur im Kopse und in den Gliedmassen leichte Biegungen um gewisse Knochen herum. Schlängelungen, wie sie an den Blutgesässen vorkommen, werden an den Nerven nicht beobachtet. Jede grössere Arterie hat einen oder mehrere Nerven zu Begleitern. Sie liegen aber nicht in der Scheide der Arterie, obwohl die Nervenscheide mit der Gesässscheide organisch zusammenhängen kann. Die grössten Nervenstränge haben dagegen nicht immer grosse Gesässe in ihrem Gesolge (Nervus ischindicus).
- 6. Die Stärke und Dicke der Nerven steht weder mit der Masse des Organs, noch mit der Intensität seiner Wirkung in Verhältniss. Ein häufig gebrauchter und kraftvoll entwickelter Muskel hat keine stärkeren Nerven, als derselbe Muskel eines schwachen Individuums. Kleine Muskeln haben oft stärkere Nerven als zehnmal grössere. Der Nervus trochleuris, obducens, oculomotorius, und die Nerven der Gesichtsmuskeln sind im Verhältniss viel ansehnlicher, als die Nerven der Rücken- oder Gesässmuskeln. Die Nerven der Organe treten an ihrer inneren, d. h. der Mittellinie des Stammes oder der Axe der Gliedmassen zugekehrten Seite ein. Dass dieses Gesetz nicht für die röhrenförmigen Organe Gefässe. Drüsenkanäle, Darmkanale gelten könne, versteht sich von selbst.
- 7. Die Verlaufsrichtung eines Nerven variirt nur selten. Dagegen ist die Folge seiner Aeste, seine Theilungsstelle, und seine Anastomose mit benachhorten Nerven, häufigen Spielarten unterworfen, welche in chirurgischer Hinsicht von Belang sind. Du die Primitivfacern eines Astes schon im

Stamme präsormirt sind, so wird eine höhere oder tiesere Theilung eines Nerven in seiner physiologischen Wirkung nichts ändern.

8. Die zwei Hauptstränge des vegetativen Nervensystems (Nervus sympathicus) laufen mit der Wirbelsäule parallel, und ihre peripherischen Verbreitungen (Gefässnerven) halten sich an die Ramificationen der Gefässe, vorzugsweise der Arterien, und da diese häufig unsymmetrisch sind, so kann das für das Cerebrospinalsystem geltende Gesetz der Symmetrie auf den Sympathicus nicht anwendbar sein.

§. 64. Physiologische Eigenschaften des animalen Nervensystems.

Es ist noch nicht lange her, dass man die physiologischen Eigenschaften der Nerven auf experimentellem Wege kennen zu lernen versuchte. Bevor Ch. Bell den ersten nachwirkenden Impuls zur genaueren physiologischen Prüfung eines in seinen Lebensäusserungen so gut als unbekannten Systems gab, war die Lehre von den Gesetzen der Nerventhätigkeit ein vollkommen brach liegendes Feld. Die Ehrfurcht vor den Lebensgeistern. welche in den wundersam verschlungenen Bahnen des Nervensystems ihr Wesen treiben sollten, schien jeden Versuch hintangehalten zu haben, diese geheimnissvollen Potenzen vor das Forum der Wissenschaft zu citiren, und Alles, was man nicht zu erklären wusste, erklärte die stehende Formel des "Nerveneinflusses". Was das eigentlich wirksame Agens der Nerven sei, wissen wir zwar eben so wenig, als wir die Natur des Lebens verstehen. Wir werden es auch schwerlich je erfahren, und die Wissenschaft hat das Ihrige gethan, wenn sie die Gesetze kennen lehrt, welchen die Lebensthätigkeiten der Nerven gehorchen, und die Erscheinungen analysirt, um sie auf einsache Principien zu reduciren. Da es sich hier nur darum handelt, einen kurzen Umriss der vitalen Verhältnisse dieses Systems zu geben, so kann Folgendes genügen.

1. Die Nerven sind, wie die Telegraphendrähte, nur Leiter, niemals Erreger von Eindrücken. Die Eindrücke werden entweder von den Centralorganen gegen die peripherischen Gebilde, oder von der Peripherie gegen die Centralorgane, mit grosser Schnelligkeit fortgepflanzt. Die Leitung erfolgt sonach in zwei Richtungen. Jene Nerven, welche centripetal leiten, beissen sensitive oder Empfindungsnerven, — welche centrifugal leiten, motorische oder Bewegungsnerven. Das Gehirn und das Rückenmark sind die Centra für das animale, die Ganglien für das vegetative Nervensystem. Jeder Reiz, der im Verlause eines Nerven angebracht wird (mechanischer, chemischer oder dynamischer Art), wird, wenn der Nerv ein Empfindungsnerv ist, Empfindungen, wenn er ein Bewegungsnerv ist, Contractionen in den Muskeln, zu welchen er läuft, aber niemals Empfindung veranlassen. Schmerz, als eine Art von Empfindung, kann niemals durch motorische Nerven vermittelt werden.

- 2. Her Unterschiede zwischene centriftsgalere und centripetalere Richtungder Leitung ist jedocht nur siehe inbax. Jode Primitisfaser leitet, wennnie an irgend einem Punkte ihres Verlaufes gereizt wird, den Reiz nach
 heiden Richtungen fort. Da jedoch die empfindenden Fasern nur an ihrem
 centralen Ende mit Nervenelementen zusammenhängen, welche fähig sind:
 den Reiz wahraunehmen, und die motorischen Fasern nur an ihrem peripherischen Ende mit einem Organe verbunden sind, welches auf den Reiz
 sich zusammenzicht, so wird die physiologische Wirkung der Erregung
 einer Nervenfaser in dem einen Falle Empfindung, in dem anderen Bewegung sein. Nicht die Faser, sondern die Organe, mit welchen sie an beiden Enden zusammenhängt, bedingen somit die Verschiedenheit des Reizrefolgen. Nichts deute weniger sind die in 1. gebrauchten Ausdrücke so
 gung und gebe, dass man sie füglich beibehalten kann.
- 3. Man hat die Leitung der Errogung durch den Nerven, bis auf die tiegenwart, für ummesshar schnell gehalten. Dieses ist sie nicht. Sie ist im Verhältniss zur Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Imponderabilien eine träge zu mennen, ohnohl an und für sich eine schnelle. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des elektrischen Stromes beträgt 61.(htt), jeme des Lichten under als 40.000 Meslen in der Secunde, während sie, nach den sämmeichen Versuchen von Helmholz, im Nervus ischischens des Froschen und 32 Meter in der Secunde durchläuft. Sie variirt selbst in einem und denselben Nerven nach Verschiedenheit seiner Temperatur, und Kälte versigert zu augenfähr, oder hebt sie gant auf.
- I has broughed typhindungen order throughnessing also in bridge in eine angeborene minimiente Eigensechaft der Nerven, und kommt jeder übrer Name of the second section of the sect communities, and other l'interference was throm Animer les some Emisin L is private relative tribuse describerable sie an unual or primaries were transcen perspherenden Brands und ein bestimmer fentraliente entiples here, and the durch their bedingte Energyments and entire States there were un beriebte des Aerren mennes auf eine benechture übermanden fir grandens. In Contracords decrees the rain and the m & A Grague, and in the resphension becomes installing the former minute wer was suicht brotheilung der Erwegung mit bronnenburge Paren amediane, which decides not de paren reciper a managemenow bedieber adon. In Destinant de menumen 4 mangang ma Kerema imi ene was menus reliking. In muilking habite Prompting with the Executed the Emphasizations of the contract of and elements where a reason to expensive a first over the content fact. papersonal by Broad an independ by monthly facial ill bet STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Went at Will state Modes a Renging season will are available. But went on that makes thing would not a R near Release to the market was a R near Release to the market was a Renging to a state of the season of the

- rioser Zahm versnlasst, sich mit Ohrenschmerz vergesellschaftet, so ist dieses Mitempfindung. Wenn auf Kitzeln sich Lachen und krampfinafte Verzerrung des Gesichtes einstellt, wenn auf Tabakschnupfen Niessen entsteht, oder auf Kratzen des Zungengrundes Würgen und Erbrechen auftritt, wenn man vor Schmerz die Lippe beisst, wenn die Gliedmasse des Kranken unter dem chirurgischen Messer zuckt, so sind dieses Reflexbewegungen.
- 5. Jeder Nerv, der in centripetaler Richtung zum Gehirn leitet, wird seinen Erregungszustand nur dann zur Anschauung, zum Bewusstwerden kommen lassen, wenn die Seele in Mitwissenschaft des Vorganges gezogen wird (Ausmerksamkeit). Der Erregungszustand des Nerven ist dessen Reaction gegen den Reiz, somit ein Ausdruck seines Lebens. Warum ein Nerv durch Bewegung, ein anderer durch Empfindung auf Reize reagire, kann durch die anatomische Structur der motorischen und sensitiven Nerven nicht erklärt werden, da beide Nervenarten sich mikroskopisch gleicht verhalten. Die Empfindungsnerven bewirken nicht alle dieselbe Gefühlswahrnehmung. Einige derselben bedingen specifische Sinneswahrnehmungen (Sinnesnerven), andere allgemeine Gefühle (Lust, Schmerz, Hitze, Kälte, Druck, Widerstand etc.).
- 6. Ein mit einer specifischen Empfindlichkeit versehener Nerv wird, er mag durch was immer für Reize afficirt werden, nur solche Gefühle hervorrufen, welche er überhaupt zu veranlassen vermag, z. B. der Sehnerv wird, er mag durch Druck, oder durch den Reiz des Rotationsapparates, oder durch jenes unbekannte Agens, welches wir Lichtstoff nennen, gereizt werden, nur auf die Eine Weise, nämlich durch Lichtempfindung, reagiren.
- 7. Das Vermögen der Nerven, auf Reize Empfindungen oder Bewegungen zu veranlassen, Reizbarkeit wird durch die Einwirkung der Reize nicht blos erregt, sondern auch geändert. Mässige Reize steigern es dadurch, dass sie es in anhaltender Uebung erhalten, stärkere Reize schwächen es, und ein gewisses Maximum der Erregung hebt es sogar auf. Ist die Reizbarkeit durch einen Reiz bestimmter Art erschöpft, so kann sie doch für Reize anderer Art, oder für einen stärkeren Reiz derselben Art, noch empfänglich sein. Ein Nerv z. B., der auf die Wirkung einer kleinen galvanischen Säule zu resgiren aufgehört hat, ist durch eine kräftigere Säule, oder durch mechanische oder chemische Reizung noch immer erregbar. Wechsel der Reize wird es somit nicht zu einem solchen Grade von Erschöpfung kommen lassen, als andauernde Wirkung eines bestimmten kräftigen Reizes. Die durch mittlere Reize geschwächte oder erschöpfte Reizbarkeit stellt sich durch Ruhe wieder ein. Das Bedürfniss der Erliolung und des Schlase erklärt sich hieraus.
- 8. Ein vom Gehirne oder Rückenmarke getrennter Nerv behält noch eine Zeitlang seine Reizbarkeit, verliert sie aber, wenn seine Continuität durch Verwachsung nicht wieder hergestellt wird, vollkommen. Jene Stoffe, welche das Vermögen besitzen, durch ihre Einwirkung auf Nerven

ihre Reizbarkeit zu vermindern oder zu tilgen, heissen narkotische Stoffe. Sie setzen den Verlust der Reizbarkeit entweder geradezu, wie die Blausäure, oder nach einer vorhergegangenen hestigen Erregung, wie das Strychnin. Durch die wissenschastliche Anwendung der Reizmittel auf die Nerven hat man die physiologischen Eigenschasten der letzteren auf dem Wege des physikalischen Experiments kennen gelernt, und jener Theil der Physiologie, welcher sich mit der Feststellung der Lebenseigenschasten der Nerven und ihrer Wirkungsgesetze besast, heisst deshalb Nervenphysik. Ch. Bell, Marshall-Hall, J. Müller, und Du Bois Reymond haben sie geschassen, und zur Würde einer höchst bedeutungsvollen Wissenschast erhoben. Letzterer entdeckte die elektrischen Ströme in den Nerven.

- 9. Die sensitiven und motorischen Eigenschaften der Nerven erscheinen getrennt am reinsten in den hinteren und vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven. Die vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven sind ausschliessend motorisch, die hinteren ausschliessend sensitiv (Bell'scher Lehrsatz). Wie sich die Gehirnnerven in dieser Beziehung verhalten, wird am betreffenden Orte in der speciellen Nervenlehre bemerkt.
- 10. Die Nerven besitzen nur wenig Elasticität. Ein nicht gespannter Nerv zieht sich, wenn er durchschnitten wird, nur im geringen Grade zurück, und selbst dieses Minimum von Retraction scheint mehr seiner aus Bindegewebe gebildeten Scheide, als den Primitivsasern selbst zuzuschreiben zu sein. An der Schnittsläche von Amputationsstümpsen werden die Nerven deshalb zwischen den stark zurückgezogenen Muskeln und Gefässen Vorsprünge bilden, welche den Missgriff, sie für Gefässe zu halten und zu unterbinden, kaum möglich erscheinen lassen, obwohl er vorkam (Dupuytren).
- 11. Der Stoffwechsel scheint im Nerven nicht mit grosser Energie zu walten. Die relativ geringe Menge von Capillargefässen im Nervenmark lässt es vermuthen. Nichtsdestoweniger regenerirt sich ein getrennter Nerv durch Bildung neuer Nervenfilamente, und übernimmt wieder theilweise seine frühere Function. Je geringer das Vacuum zwischen den Schnittenden eines getrennten Nerven ist, desto schneller heilt er wieder zusammen. Man hat noch zolllange Trennungen an den grossen Extremitätennerven der Thiere durch Regeneration ausfüllen gesehen (Swan). Die neugebildeten Nervenelemente waren den normalen vollkommen isomorph, obgleich weniger zahlreich, und mit Bindegewebfasern gemischt (Stein-rück, Nasse, Günther, Schön). In den specifischen Sinnesnerven ist die Wiederherstellung der Function nach Durchschneidung nicht beobachtet.

§. 65. Physiologische Eigenschaften des vegetativen Nervensystems.

Hierüber weiss die Wissenschaft nur wenig zu sagen, da bei diesem System die Schwierigkeiten des Experimentirens ungleich grösser, als bei den Hirn- und Rückenmarksnerven sind.

Der Sympathicus ist durch die in seinen Ganglien entspringenden Nervenfasern ein selbstständiges, durch die zahlreichen, vom Gehirn und Rückenmark zu ihm tretenden, und mit ihm sich verzweigenden Nerven, ein vom Cerebrospinalsysteme abhängiges Nervengebilde. - Man hielt ihn bis auf die neueste Zeit für den Vermittler der Ernährungsprocesse. vegetatives Nervensystem entsprang aus dieser Ansicht. Die Fortschritte der Physiologie, welche Leben und Wachsthum auch in vollkommen nervenlosen Geweben (Horngebilde, Knorpel, Krystalllinse) nachwies, beschränkten die Vorstellungen von der Abhängigkeit der vegetativen Processe vom Nervensysteme überhaupt. Mehrere secernirende, oder in lebhaster Stoffbildung begriffene Organe (Milchdrüse, Synovialhäute, Zahnsäckchen) besitzen keine nachweisbaren sympathischen Nervenfasern, dagegen aber ansehnliche Fäden vom Cerebrospinalsystem, und es ist eine reine Vermuthung. dass die Gefässe dieser Organe sympathische Fasern enthalten. Der Sympathicus ist nur insofern bei den Ernährungs- und Secretionsprocessen betheiligt, als er Bewegungen veranlasst, die auf diese Processe Einfluss nehmen. Diese Bewegungen gehen ohne Willensintervention von Statten, und wir wissen durch das Gefühl nichts von ihrer Gegenwart (Herzbewegung. Bewegung des Magens, der Gedärme, Kreislauf des Blutes). Die Centra, von welchen diese Bewegungen ausgehen, sind die Ganglien des Sympathicus. welche insofern als motorische Apparate anzusehen sind. Die in den Ganglien entspringenden, dem Sympathicus eigenthümlichen grauen oder Remakschen Nervenfasern, leiten die Bewegungsimpulse zu den betreffenden Organen. Das Gehirn und das Rückenmark können durch die Nervensäden, welche sie an den Sympathicus absenden, nur einen modificirenden Einfluss auf diese Bewegungen äussern, der sich in Leidenschaften und Affecten, welche im Gehirne als Seelenorgan wurzeln, kund giebt. klopfen, die Brustbeklemmung, die wechselnde Röthe und Hitze. welche gewisse Seelenzustände begleiten, bestätigen den modificirenden Einfluss des Cerebrospinalsystems auf die vegetativen Acte. Das Cerebrospinalsystem kann aber seine Thätigkeiten einstellen (Schlaf, Ohnmacht, Schlagfluss), es kann auch durch Missbildung ganz oder theilweise fehlen (bei hemicephalen und aencephalen Missgeburten), die vegetativen Thätigkeiten werden deshalb nicht unterbleiben, und die Verdauung, Ernährung, Absonderung, der Kreislauf, gehen ohne seine Einwirkung ihren Gang fort. Die genannten Arten von Missgeburten sind deshalb in der Regel ganz gut genährt. Selbst ein aus dem Leibe herausgeschnittenes Eingeweide wird, wenn es nur Ganglien und Gangliennerven besitzt, seine Bewegungen eine Zeitlang

ections, we as essential least us laminar pains with the statement in Tomas producted from the Saturday in Tomas producted from the Saturday, in it is no normalisation in the statement of the s

de as en impia antonomen beva su sus pres, vir ger de transportation. His de automote santa desida ANNOY THE L LAND WE AND AND I OR LANDS. WHEN on an incin we ha son a si diamon accompa bide. with the framebook trained terms, in histograph annihe side angen. Le mes er finanz en liere, er men en samben. Services on Service service was not an assessment Nothe standard descriptions of the standard standard with the anne inver er hwent, some me, ur isom me bissenat. Infrance. le comme Empire au de Lagine verte a dens at in morrows being or books where it is not use brance game. In the commerc. In hoper war gains. Maria de la maria de la compania de sale de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de lamouren, une de de lamourennes lons, un urous de annos bronners erecira, vara un ilregas em impia. an wante de commune. Indicate. In include directors de la-NUMBER AND OF MORNINGER POPPER. THE 4 WITH MY GARNES MARRIED. elimes accominge from an instant in instant on lines assertion in. In house or humanismus and on grown like strains. som distreture no lumes Burraum. Tim ne has so moras. AND PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY AND ADDRESS. appropriately for the size states for a service of the disconnected descriptions and where sometimes, we store inliner met demanden menen, werde went der den wer debt war. and and decimally designed. They wan an account lutinospecture, and service an income fair representate on minute income des us marrier from de representation des se unite de Salestrange and Machinesista Principles where we de de deliche allethe finance of sentential and sentent moves. In the in the suit will be in the treet of the latter of hereigness of THEREPS TYPE SERVER METERS AND AND THE SERVER SERVE * THE WINDS & THE 2780 MINUS.

the same successed that he becomes an experience which the

schon seit Jahren in meinen physiologischen Vorlesungen entwickelt. In der Abhandlung Kölliker's (die Selbstständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nervensystems. 1845.) wird sie ausführlich erörtert. Dass die im Cerebrospinalsysteme vorkommenden Ganglien auf dieselbe Weise wirken, ist sehr wahrscheinlich; von der grauen Substanz des Rückenmarkes ist es durch die Reflexphänomene bewiesen. Schon diese Aehnlichkeit der Wirkung reicht allein hin, den Sympathicus nicht dem Cerebrospinalsysteme als etwas wesentlich Verschiedenes gegenüber zu stellen.

§. 66. Praktische Anwendungen.

Einen Nerven durchschneiden, heisst eben so viel, als das Organ vernichten, für welches er bestimmt ist. Es braucht nicht mehr Worte, um die hohe Bedeutung dieses Systems dem Wundarzte im Allgemeinen einleuchtend zu machen. - Der Unterschied sensitiver und motorischer Nerven ist für die praktische Chirurgie von grosser Wichtigkeit. Die Pathologie der Neuralgien (andauernde, schmerzhaste Assectionen gewisser Organe oder ganzer Bezirke), so wie die Tilgung derselben durch chirurgische Hilfeleistung, erhielten erst durch die Feststellung dieses Unterschiedes ihren wissenschaftlichen Gehalt. Als man noch die Empfindlichkeit für eine allgemeine Eigenschaft aller Nerven hielt, musste der Sitz der Neuralgien nothwendig verkannt werden, und es wurden deshalb bei den Heilungsversuchen (durch Entzweischneiden der Nerven) auch solche Nerven zerschnitten, welche als rein motorische Nerven niemals Schmerz veranlassen können. Die Geschichte des Gesichtsschmerzes (Prosopalgia, Dolor Fothergili), und die zu seiner Heilung vorgenommenen Trennungen des Nervus communicans faciei, der als ein motorischer Nerv nie schmerzen kann, geben ein trauriges Zeugniss dieser Wahrheit. Die Unterscheidung der Empfindungslähmungen (Anaesthesiae) und der Bewegungslähmungen (Paralyses) beruht auf festgestellten physiologischen Eigenschaften der Nerven.

Der eben erwähnte Gesichtsschmerz, dessen höchste Hestigkeit die daran Leidenden schon zur Verzweislung, zum Selbstmorde trieb, hat seinen ausschliesslichen Sitz in den Gesichtszweigen des sünsten Nervenpaares (Stirnzweig, Unteraugenhöhlenzweig, Kinnzweig). Die Ursache dieses traurigen Vorrechtes der genannten Nerven liegt, wie ich glaube, in dem Umstande, dass kein anderer Empsindungsnerv durch so viele Knochenkanäle und Löcher passirt, wie sie, und somit Auslockerung und Verdickung ihrer Scheide, der Enge und Unnachgiebigkeit der Knochenössnungen wegen, eine drückende Wirkung auf sie äussern muss, die den Schmerz auf seine surchtbarste Höhe steigern kann.

Die bekannte sensitive oder motorische Eigenschaft eines Nerven wird bei der Vornahme chirurgischer Operationen an gewissen Gegenden Berücksichtigung verdienen, um die Summe der Schmerzen so gering als möglich ausfallen zu lassen. Dass dieses wenigstens theilweise in der Macht des Wundarztes liegt, mag daraus erhellen, dass, im Falle ein sensitiver Nery, einer nicht zu beschwichtigenden schmerzhaften Affection wegen, abgeschnitten, und, um seine Wiederverwachsung zu verhindern, ein Stück ausgeschnitten werden soll, das auszuschneidende Stück nicht von jenem Nervenende, welches noch mit dem Gehirne zusammenhängt, sondern vom peripherischen abgetragen werden soll. Im ersteren Falle würde die Summe der Schmerzen das Doppelte betragen. Hätte man eine Geschwulst oder ein nervenreiches Organ abzutragen, so soll der erste Schnitt auf jener Seite geführt werden, wo die Nerven eintreten. Sind diese getrennt, so wird jede fernere Beleidigung des Organs durch Druck oder Schnitt schmerzlos sein, während sie im hohen Grade schmerzhaft sein muss, wenn die Trennung der Nerven zuletzt folgt (Castration). Es ware kein geringer Triumph der wissenschaftlichen Chirurgie, wenn der Versuch mit Erfolg gekrönt wurde, hartnäckige und unerträgliche Nervenschmerzen in gewissen Organen, nicht durch die Amputation oder Ausrottung der Organe, sondern durch Resection ihrer sensitiven Nerven zu heilen. Die Fälle sind in den Annalen der Wundarzneikunde nicht gar so selten, wo man nicht zu besänstigende, chronische Schmerzen der Brust oder der Hoden, durch die Abtragung dieser Organe geheilt zu haben sich rühmt. In den Handbüchern der Operationslehre wird unter den Anzeigen zur Vornahme der Abtragung eines Gliedes oder Organs der incurable Nervenschmerz noch immer angeführt.

Die Zähigkeit der Nervenscheiden und der mechanische Reiz der Empfindungsnerven erklärt es, warum bei der Abbindung krankhast entarteter Organe, und bei der Unterbindung der Gefässe (wenn Nervenzweige mit in die Ligatur gefasst werden), Schmerzen entstehen können, welche mit der geringen Grösse des chirurgischen Eingriffs im schreienden Missverhältniss stehen. Diese Schmerzen werden so wüthend, und können durch Reflex so gefährliche allgemeine Zusälle veranlassen, dass sie das Lüsten der Ligaturen nothwendig machen, wie, um nur einen illustren Fall anzusühren, die geschichtlich bekannte Gefässunterbindung am amputirten Arme Nelson's beweist. Handelt es sich darum, ein entartetes Organ abzubinden, oder den Samenstrang nach Abtragung des Hoden im Ganzen (statt jedes seiner Blutgefässe einzeln) zu unterbinden, so muss die Ligatur so krästig als möglich zugeschnürt werden, um die Nerven der unterbundenen Partien nicht blos zu drücken, sondern zu zerquetschen. Der Druck unterhält eine fortwährend wirksame und hestig schmerzende mechanische Irritation, während die Ouetschung die Structur des Nerven und mit ihr seine Empfindlichkeit aufhebt. - Die Festigkeit der dem fibrosen Bindegewebe angehörenden Nervenscheiden wird die Ursache sein, warum eine Gefässligatur, welche zugleich einen Nervenast umfasste, länger zu ihrer Abstossung braucht, als eine gut angelegte, und das geringe Vermögen der Nerven, sich zurückzuziehen, wenn sie durchschnitten wurden, kann es bedingen, dass sie in dem sich bildenden Narbengewebe tieferer Wunden (besonders Amputationswunden) eingeschlossen, und durch die jedem Narbengewebe eigenthümliche

Zusammenziehung eingeschnürt, dauernde Nervenschmerzen hervorrusen, die die Excision der Narbe, ja sogar die nochmalige Vornahme der Amputation erheischen. Wäre es nicht zu versuchen, die an der Amputationswunde vorstehenden Nervenenden, statt sie abzutragen, und dadurch den Schmerz der Resection zweimal empsinden zu lassen, einsach umzubeugen, und zwischen die Muskeln hineinzuschieben, und könnte diese Methode nicht in jenen Fällen ebensalls angewendet werden, wo ein durch Exsection eines Nervenstückes zu heilender Nervenschmerz durch Wiederverwachsung Recidiven befürchten lässt?

Die Methode, zu amputirende Gliedmassen mit einem Bande über der Amputationsstelle einzuschnüren, und durch Pelotten, welche dem Verlause der Hauptnervenstämme entsprechen, Taubwerden und Einschlasen der Gliedmasse zu bewirken, und sie in diesem Zustande abzunehmen, hat unter den praktischen Wundärzten keinen Eingang sinden können. Es möge hier die Ersahrung Hunter's über diesen Gegenstand angeführt werden. Ein Mann wurde am Schenkel, dessen Crural- und Hüstnerv durch Pelotten (Druckpolster) taub gebunden waren, amputirt. Er äusserte verhältnissmässig wenig Schmerz, obwohl er ein sehr empsindliches Individuum war, und eben deshalb der Versuch mit dem Druckverbande zur Probe bei ihm gemacht wurde. Nach gemachter Gesässligatur wurde die Druckbinde entsernt. Ein kleines Gesäss blutete, und musste unterbunden werden. Der Kranke klagte über den unbedeutenden Unterbindungsact der kleinen Arterie ohne die Druckbinde mehr, als über die Amputation des Schenkels mit der Binde.

Ich sehe wohl ein, dass sich auf theoretischem Wege die Speculation sehr ergiebig erweisen, und die Praxis das Dementi des Raisonnements enthalten könne. Es soll dieses jedoch nie den Nutzen aprioristischer Deductionen in vorhinein verdächtigen, und es würde der chirurgischen Operationslehre gewiss nur nützen, wenn ihre Technik einer strengen anatomisch-physiologischen Revision unterzogen würde. - Da die Nerven an sehr vielen Orten die grossen Gestsse der Gliedmassen begleiten, und bei der Aussuchung und Isolirung der Gesässe wohl umgangen werden müssen, so hat man versucht, allgemeine Regeln aufzustellen, denen das Verhältniss der Nerven zu den Arterien unterliegt, um in jedem vorkommenden Falle, wie aus einer Formel, die Lage des Nerven bestimmen zu können. Die Lagerung der Nerven ist allerdings eine sehr bestimmte, lässt sich aber nie im Allgemeinen ausdrücken. Velpeau (Chirurg. Anat. 3. Abth. p. 144) behauptete, eine allgemeine Regel gefunden zu haben, nach welcher Nerv, Arterie und Vene so liegen, dass, vom Knochen aus gezählt, die Arterie das erste, die Vene das zweite, der Nerv das dritte sei. Von der Haut aus gezählt, wäre dann die Ordnung umgekehrt. Es ist nicht begreiflich, wie ein achtbarer Chirurg und Anatom auf diesen kaum für zwei Körperstellen geltenden Gedanken kommen konnte. Etwas genauer ist die Angabe von Foulhioux (Revue méd. 1825. p. 68). Ueber dem Zwerchfelle soll der Nerv immer an jener Seite der Arterie liegen, welche von der Medianlinie des betreffenden Körpertheiles oder der Axe des Gliedes abgewendet ist; unter dem Zwerchselle dagegen an der der Axe zugewendeten Seite. Es ist nicht zu läugnen, dass etwas Wahres an der Sache ist, und dass

das Verhältniss für die obere Extremität, für den Oberschenkel und den Unterschenkel gilt, allein in der Kniekehle findet sich eine solenne Ausnahme, weshalb Foulhioux in seiner Abhandlung diese seinem Systeme gefährliche Stelle ganz übergeht. So lange es Arterien gieht, die an allen Seiten von Nerven umgeben (Achselarterien), oder von Nerven gekreuzt werden, wird es immer gerathener sein, sich lieber auf die Angahen der speciellen Anatomie, als auf allgemeine Regeln zu verlassen.

Literatur. Sie ist in Henle's Gewebslehre und in Valentin's Bearbeitung der Sümmerring'schen Nervenlehre vollständig gesammelt. Da jedoch diese Sammlung nur bis 1841 reicht, so kann das Uebrige in Valentin's Lehrbuch der Physiologie, II. Bd., nachgeschen werden. Die wichtigsten neueren Arbeiten deutscher Forscher über Neuromikrographie sind: A. W. Volkmann, fiber Nervenfasern und deren Messung, in Müller's Archiv. 1844. p. 9. Hierauf Vatentin's Erwiederung, ebendaselbst, p. 395. — Purkinje, mikrosko-pisch-neurologische Beobachtungen. Müller's Archiv. 1845. pag. 281. — Rosenthal, de numero et mensura sibrillarum syst. corebro-spinalis. Vratislaviae, 1845. - Remak, über ein selbstständiges Darmnervensystem. Berlin, 1847. — C. F. Axmann, de gangliorum structura penitiori. Berol., 1847. 4. - E. Harless, briefliche Mittheilung über die Ganglienkugeln, in Müller's Archiv. 1846. — R. Wagner, neue Untersuchungen über Bau und Endigung der Nerven. Leipzig, 1847. - R. Wagner, sympathische Nervenganglienstructur und Nervenendigungen, in dessen Handworterbuch der Physiologie. 3. Bd., so wie mehrere kleine Aufsätze in den Göttinger gelehrten Anzeigen vom Jahre 1851 an. - F. H. Bidder, zur Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkörper zur Nervenfaser. Dorpat, 1848. — A. Kölliker, neurologische Bemerkungen, im 2. Heste des 1. Bds. der Zeitschrift sur wissenschaftl. Zoologie. p. 135. - A. Ecker, über die Entwicklung der Nerven des elektrischen Organs etc. im 1. Hefte derselben Zeitschrift. - N. Lieberkühn, de structura gangliorum penitiori. Berol., 1849. 4. - Joh. Czermak, über die Hautnerven des Frosches, in Muller's Archiv. 1849. 3. Heft, und im 1. Heft des 2. Bandes der Zeitschrist für wissenschaftliche Zoologie. - Brücke, über eine Beobachtung des H. Malin, von Verzweigung der Primitivsasern, in den Sitzungsberichten der kais. Akademie der Wissenschaften. Wien, 1849. October. - Frantzius, Beiträge zur Entwicklung des peripherischen Nervensystems, in der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. 1852. 4. Heft. - C. Axmann, Beiträge zur mikroskopischen Anatomie und Physiologie des Gangliennervensystems. Berlin, 1853.

Ueber physiologische und praktische Anwendungen der anatomischen Verhältnisse des Nervensystems siehe: Ch. Bell, physiologische und pathologische Untersuchungen des Nervensystems. Uebersetzt von Romberg. Berlin, 1832. — Romberg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten des Menschen. Berlin, 1840. — Magendie, Vorlesungen über das Nervensystem etc. A. d. Franz. von Krupp. Leipzig, 1841. — F. A. Longet, anatomie et physiologie du système nerveux. Paris, 1842. — Marshall-Hall, Abhandlungen über das Nervensystem. A. d. Engl. von Kürschner. Marburg, 1840. — W. Arnold, die Lehre von den Reflexfunctionen für Physiologen und Aerzte. Heidelberg, 1842, und zahlreiche Artikel in den letzten Jahrgängen von Müller's Archiv, und Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie, welche der enge Raum eines Lehrbuches hier nicht aufzuführen erlaubt.

§. 67. Knorpelsystem. Anatomische Eigenschaften.

Die Knorpel, Cartilagines, gehören, mit den Horngebilden und Knochen, zu den festesten Bestandtheilen des menschlichen Körpers. Festigkeit besteht zugleich mit einem hohen Grade von Elasticität und Biegsamkeit. Viele derselben können geknickt und gebogen werden ohne zu brechen, andere sind spröder, und zeigen, wenn sie gebrochen werden, glatte oder faserige Bruchflächen. Sie sind sämmtlich mehr weniger durchscheinend, in dunne Scheiben geschnitten opalisirend, von gelblich oder bläulich weisser Farbe, werden, wenn sie trocknen, bernsteinfarbig und brüchig, schrumpfen ein, schwellen im Wasser wieder auf, widerstehen der Fäulniss lange, und lösen sich in kochendem Wasser entweder ganz zu einer gelatinösen Masse (Chondrin) auf, oder lassen einen mehr weniger saserigen Rückstand. Durch Fäulniss werden sie gewöhnlich roth, wegen Tränkung mit aufgelöstem Blutroth. Die meisten Knorpel besitzen eine fibröse Umhüllungshaut, das Perichondrium, welches bei den die Gelenkenden der Knochen überziehenden Gelenkknorpeln sehlt, und an den Zwischenknorpeln der Gelenke durch eine Epithelialschichte ersetzt wird.

Man unterscheidet an jedem Knorpel 1. eine Grundsubstanz, 2. Höhlen in dieser, 3. Kerne oder wirkliche Zellen (sogenannte Knorpelkörperchen) in den Höhlen. Die Grundsubstanz ist entweder homogen und glasartig durchscheinend, oder gefasert. Hierauf beruht die Eintheilung der Knorpel in hyaline oder echte, und in Faserknorpel. Zwischen beiden giebt es Uebergänge. Zu den echten Knorpeln gehören die Kehlkopfund Luströhrenknorpel (mit Ausnahme der Cartilagines Santorinianae und der Bpiglottis), die Nasenknorpel, die knorpeligen Ueberzüge der Gelenkflächen der Knochen, und alle ossificirenden Knorpel des Fötus. - Zu den Faserknorpeln gehören die Knorpel des äusseren Ohres, der Eustachischen Trompete, Theile der Zwischenwirbelbänder, die Knorpel der Synchondrosen und Symphysen, die auf den Rändern der Gelenkgruben außitzenden Knorpelringe (Labra cartilaginea), die in gewissen Sehnen eingewebten Sesamknorpel, die Cartilagines Santorinianae, Wrisbergii, und die Epiglottis. — Den Uebergang von den echten zu den Faserknorpeln bilden die Rippenknorpel, die Cartilago thyreoidea und xiphoidea, welche bei jungen Individuen echte, bei alten faserige Knorpel darstellen. - Die netzartig verfilzten Fasern gewisser Faserknorpel sind von den elastischen und Bindegewebfasern durch ihre rauhen, unebenen Ränder unterschieden. In den übrigen Faserknorpeln stimmen sie mit den Bindegewebsasern überein, und entwickeln sich wie diese. - Alle Faserknorpel zeichnen sich durch Biegsanıkeit aus.

Gehört es zur Entwicklungsnorm eines Knorpels, dass er sich früher oder später in Knochen umwandelt, so wird er ein verknöchernder Knorpel, Cartilago ossescens, genannt, wo nicht, ein bleibender, Cartilago perennis s. permanens.

Die echten Kaorpei Erwichsener haben guns bestimmt heine ernährenden Selfane, abwahl diese in der Millimgsmeindenn der Kaorpel (Perighandrium) vorhammen.

Dus Chondrin. die eigentliche chemische Grundluge der Knorpel, unterscheidet sich vom gewöhnlichen Leim durch seinen Schwefelgehalt, und durch seine Fällbarkeit mittelst Alaum und Emigsäure. Die Knorpel enthalten arbeiten noch auszumische Solne, unter welchen, nach den Analysen von Frommherz und Gugert, hoblenmures und schwefelsaures Natron prävaliren.

Mikraskspische Lutersuchung. Bereitet und einen feinen Schnitt emen erhiten Kauspels, so bemerkt man in ihm, bei einer Vergrösserung von 316. Lariez seier Bibles, welche wa der bellen, durchschemenden Grundgehotzez emgeben werden. Diese Schotzer, welche, ihrer Durchsichtigkeit wegen. Eralinsabstanz, oder der Benebung m den Kaurpeliellen wegen Intercellularsubstanz genomt wird, ist entweder williammen homogen and structuries, oder sie ist fein grandet. Die grandetes Anochen ist nicht the Police einer Lersetzung oder Gerinnung, da sie auch an mielichst frischen Lanerein eben geschischteter Thiere oder amputirter Chedmassen beslochtet ward. Der Läcken oder Bilden sind in sehr variabler Menge verhanden, öfters auf Haufen zusammengeskängt, von der mannigfschaten Gestalt, und haben 4.44/" - 4.1116 " Durchmesser. Sie schliessen mestens einen grandirten Kern via 4.442" - 0.405" Durchmeiner ein, welcher zuweilen von einer besonderen LeBenmembern umschlossen wurd. Nicht seiten enthält eine Höhle awa, seltenes des sebs von Lebenkerne. Der Kern schliest selbst wieder 2—3 Bernt-leperchen, und ausnahmsweise auch Fetttrioßehen ein, welche letztere as den l'ascrimorpela und bei alteren ladivaluen latuiger, als an echtes Kanepeln junger Leichen besbachtet werden. Sind die Kerne von Zellen umerhausen, in maen betrtere meist eine rundliche oder beilbernige Gestalt, wege nie albeit eine Biale des Hvalmkniepels austillen. Enthält eine solche Bible mehrere Dellen, so sind diese so gestaket, dass sie in ihrer Nebenemanderfagerung zasammen die Form eines Kreises büllen. — 06 die Höhlen des Konepels von einer eigenen Membran ausgehlendet sind oder nicht, ist sehr schwer zu entscheuben. Gestern gelingt es, bei Biblien mittlerer Grösse, durch Application 240 Econgstore, emer Auskleidungsmembran ausschite zu werden. Sie erschent als hopelte Contour der Höhle, welche aber mit der umgebenden Brafmundstatz nach und nach verschmiltt, und dann durch kein Mittel ab schebtlicher Ausbiedungenenbem nachgewiesen werden bann. Es verhilt sich deue Anthentungsmeinbrau der Knorpelhilde zu den eingeschlossenen Kasepelsellen birkst wahrsrivenlich als Mutterzelle, welche durch Verschmelzen nt den Britiskauspel schwadet, wenn die eingeschlessenen jendigenen: Zellen den gebiergen Grad 140 Entwecklung erreichten. Hat man einen Gelenkknorpel pur l'atersuchung gentalit, so findet man an feinen senkrechten Schnitten desselben die länglichen Knorpelbiblen, welche der Oberfliche des Knorpels nahe hopen, transversal gelagert, the tiefen vertical stehend. — I'm eine Ansicht 142 l'ebergragskasspele zu erhalten, d. h. 102 solchen, in welchen die homogene Hydinsubstanz durch fasernes Gewebe verdrängt zu werden beginnt, wildt man am besten die Cartilago thyrroiden, oder einen Knoepel der 11. seler 12. Rope. Die Faserung der Intercellularsubstanz erunnert hier durch shren Glazz und Parallelismus an das eigenthümliche Ansehen des Bergflachses. in ennern Faserknorpein minut die Entwicklung der faserigen intercellularsubstanz so zu, dass die Knorpelhöhlen und Zellen ganz verschwinden, wie in den Zwischenknorpeln des Knie- und Handwurzelgelenks.

Die schon früher als Netzknorpel erwähnte Unterart der Faserknorpel wurde von Valentin aufgestellt. Ihre faserige Grundsubstanz bildet ein Netzwerk, dessen Maschen von Knorpelzellen eingenommen werden. Ich habe diese Unterart nicht bei der Eintheilung der Knorpel angenommen, da viele Faserknorpel stellenweise genetzte, stellenweise parallele Faserung der Intercellularsubstanz aufweisen, wie die Epiglottis und die knorpelige Tuba Eustachii. Bei embryonischen Knorpeln prävalirt die Zellenbildung über die Grundsubstanz, und man überzeugt sich leicht von der Gegenwart einer tropfbaren Flüssigkeit im Innern der Zellen. In jenen pathologischen Neubildungen, welche Enchondrome genannt werden, finden sich auch sternförmige Knorpelzellen (wie in den Knorpeln der Haie nach Leydig). Es giebt auch Knorpel, welche blos aus Zellen, ohne wahrnehmbare Zwischensubstanz, bestehen, wie die Chorda dorsalis der Embryonen und mehrerer Knorpelfische.

§. 68. Physiologische Eigenschaften der Knorpel.

Die Knorpel sind unempfindlich. Man kennt keine Nerven in ihnen. Die physiologischen Bestimmungen, welchen sie gewidmet sind, erfordern es so. Die knorpeligen Ueberzüge der Knochen, und die Knorpel, welche die Form gewisser Organe bestimmen (Ohrknorpel, Augenlid-, Nasenknorpel etc.), würden ihrem Endzwecke weit weniger entsprechen, wenn sie für die mechanischen Einwirkungen, denen sie ausgesetzt sind, und welche in den Gelenken einen hohen Intensitätsgrad erreichen, empfindlich wären. Im kranken Zustande steigert sich ihre Empfindlichkeit auf eine furchtbare Höhe, wie die Erweichung der Knorpel bei gewissen Gelenkkrankheiten lehrt. Gesunde Knorpel können geschnitten oder abgetragen werden, ohne Schmerzen zu erregen. Diese Beobachtung machte schon die ältere Chirurgie (Heister), welche es als Grundsatz aufstellte, nach der Amputation der Gliedmassen in den Gelenken (Enucleation), die überknorpelten Knochenenden abzuschaben, um den Vernarbungsprocess zu beschleunigen.

Die Elasticität der Knorpel ist ebenfalls auf ihre mechanische Bedienstung und auf ihre Blossstellung berechnet. Schwindet sie durch Alter oder Ossification, so können mechanische Einwirkungen selbst Brüche der Knorpel erzeugen, wie sie am Schildknorpel beobachtet wurden. Man überzeugt sich am besten von der Elasticität der Knorpel, wenn man ein Scalpell oder einen Pfriemen in eine Symphyse oder in ein Zwischenwirbelbeinband stösst, wo es nicht stecken bleibt, sondern wie ein Keil wieder herausspringt. — Die Federkraft der Rippenknorpel erleichtert wesentlich die respiratorischen Bewegungen des Brustkorkes, und die Elasticität der Zwischenwirbelbeinbänder und der Symphysen, ist das beste Schutzmittel gegen die Stösse, die das Becken und das Rückgrat beim Sprung und Lauf, und bei so vielen körperlichen Anstrengungen zu gewärtigen haben. Die Knorpel vertragen deshalb anhaltenden Druck viel besser, als selbst

die Knochen, und man kennt Fälle, wo Aneurysmen der Brustaorts die Wirhelkörper atrophirten, ohne den Schwund der Zwischenwirbelbänder erzwingen zu können.

Da die ausgebildeten Knorpel keine Blutgesässe besitzen, so können ihre Nutritionsthätigkeiten nur durch Tränkung mit Blutplasma vermittelt werden. Der Umsatz der Ernährungsstoffe ist so träge, und das plastische Leben so wenig activ, dass die Ernährungskrankheiten der Knorpel sich durch leutescirenden Verlauf auszeichnen, und die Uebernährung (Hypertrophie) der Knorpel noch nie beobachtet wurde. Das Perichondrium wird als gefässbegabte Membran sich zum Knorpel als Ernährungsorgan verhalten. Wird es entsernt, so stirbt der Knorpel ab (wenn er nicht von einer anderen Seite her Blut zugeführt erhält), und wird als Ganzes aus dem Bereiche der lebendigen Umgebung ausgestossen. Dasselbe geschieht mit den Knorpelüberzügen der Knochenenden, wenn der Knochen primir erkrankt. Da der Gelenkknorpel seine Nahrungszufuhr vom Knochen aus erhält, so muss, wenn letzterer durch Krankheit zerstört wird, die knorpelige Kruste seiner Gelenkflächen ganz oder stückweise abfallen, und man tindet in den durch Beinfrass angegriffenen Gelenken sehr bäufig kleine Fragmente der Gelenktnorpel in dem jauchigen Ausflusse der Fisteln, oder grissere kinorpelschalen in der Höhle des Gelenks.

Die Substanzverluste, welche im Knorpel durch Verwundung oder Geschtribt bedingt werden, regeneriren sich niemals durch wahre Neuhäldung von Knorpelmasse, sondern durch Fasergowebe ohne Knorpelzellen. Eins aus dem Schildknorpel eines Hundes herausgeschnittenes dreieckiges Stück wurde nicht wieder ersetzt, sondern die Oeffung durch eine fibrise Membrun (wahrscheinlich Verlängerung des Perichondrium- ausgefüllt. — Dass Knorpelmasse abnormer Weise an ungewihnlichen Stellen des Organismusgehöltet werden könne, beweisen, nebst den Knorpelbäldungen, welche den Obsüligstinnen seriser Häute vorausgehen, die sogenannten Gelenkmänse und das Enchondroma Mälleri.

Literatur

J. Miller, ther de Structur and die chemischen Eigenschaften der Konspel und Knochen, in Progrander 7's Annahm. 3's M. 1836. — M. Meckaure, de penalure carallegaum suractura. Ventschung. 1836. 4. Unter Parlangua Andreiung verlaut. — Schwere smicrostop. Untersuchungen. 2. 17 L. — Menn allgem. Annomie. p. 731. — Schmann, ther Gebrukkberrei. Tallangen. 1846. — Madde, ther die Eutstehung des Knochen und Knochelgensbes. in Frender Schwen. — A. Melarei. In systeme undlagenenz. Pares, 1846. — A. Valencauman. Untersuchungen über die Schwen der Eutschen pei, in Frender und Namen. 1843. Nr. 114 enthält und Angeben tängt theresche Knochel. — Merin. Maper. der Knochel und sonne beständigen rung, in Maler 2 Archie. 1846. — Bergmann, die entelligenisses. Mannah. 1836.

Pathologische Beskurkeungen und Versuche über des Kronnebysteum enthält: Johann Besturkeiten, de gewinebus qualessium carathagenum musiktionibus: Tubingae, 1798. 8. — Schumer; de cartilaginum articularium ex morbis matatione. Groningae, 1836. — Weber in Hildebrandt's Anatomie. 1. Bd. p. 305.

§. 69. Knochensystem. Allgemeine Eigenschaften der Knochen.

Die Knochen, Osea, sind nebst den Zähnen die härtesten Bestandtheile des menschlichen Körpers. Sie bilden durch ihre wechselseitige Verbindung ein Gerüste, von mehr weniger beweglichen Platten, Balken und Sparren aufgebaut, welches sämmtlichen Weichtheilen zur Unterlage und Besetigung dient, ihnen Hedt und Stütze giebt, geräumige Höhlen zur Sicherung der edlen Eingeweide der Empfindung, der Ernährung, und des Kreislaufes erzeugt, den Muskeln, die der Ortsbewegung dienstbar sind, feste Angriffspunkte anweist, den Blutgefassen und Nerven die Bahnen ihres Verlauses vorschreibt, und als verlässliche Richtschnur dient, die Lage und räumlichen Verhältnisse der Organe zu beurtheilen und festzustellen. Härte, Festigkeit, Undurchdringlichkeit, geringe Elasticität, gelblich weisse Farbe, kommen jedem Knochen in verschiedenem Masse zu. Sie verlieren durch Trocknen an Gewicht, aber nicht an Gestalt und Grösse, und widerstehen der Fäulmss so beharrlich, dass sich selbst die Knochen der Thiere, die die antedihrvianische Welt bevölkerten, und die die Revolutionen des Erdballs aus dem Buche der Schöpfung strichen, noch zum Theil unversehrt erhalten haben.

Die genannten Eigenschaften der Knochen sind die natürliche Folge ihrer Zusammensetzung aus organischen und anorganischen Bestandtheilen. Nur der organische Bestandtheil unterliegt der Zerstörung durch Fäulniss, der anorganische nicht. Letzterer - die sogenannte Knochenerde - bildet beiläusig die Hälste des Gewichtes eines jungen. ²/₂ des Gewichtes eines ausgewachsenen, und ⁷/₈ eines Greisenknochen (Davy, Hatchett). Die langen Knochen der Extremitäten enthalten mehr anorganische Substanz als die Stammknochen, die Schädelknochen mehr als beide (Rees). Bei einem rhachitischen Kinde fand Bostock in einem Wirbel 79,75 thierische, und nur 20,25 erdige Substanz. — Der organische Bestandtheil der Knochen ist eine ziemlich seste, biegsame und elastische, durchscheinende, knorpelähnliche Substanz, welche Knochenknorpel genannt wird, obwohl der Bau des Knorpels ihr nicht zukommt. Der anorganische Bestandtheil ist eine Mischung von mineralischen Salzen in folgendem Verhältnisse. Nach Bibra's Analyse enthielt der Oborschenkel eines 25jährigen Mannes:

Basisch phosphorsaure	Kalkerde		mit Fluorcalcium				59,63
Kohlensaure Kalkerde							7,33
Phosphorsaure Talkerde							1,32
Lösliche Salze							0,69
Knochenknorpel mit Fe	tt und	Was	sser				31,03

Dem Knochenknorpel verdanken die Knochen ihren Elasticitätsgrad. ihr Verwittern an der Luft, und ihre theilweise Verbrennlichkeit. (Kameelknochen werden in den Wüsten als Brennmaterial benützt.) Die mineralischen Bestandtheile bedingen ihre Härte und Sprödigkeit, ihre Dauerhaftigkeit, und ihre Beständigkeit im Feuer, welche nur durch hobe Schmelzhitze und durch beigegebene Flussmittel überwunden wird (Knochenglas). Eine richtige Proportion beider Bestandtheile verleiht dem Knochen seine Tracfāhigkeit, und seine Widerstandskraft gegen alle Einflüsse, welche seine Cohasion und seine Form zu andern streben. Das Verhältniss des Knochenknorpels zur anorganischen Substanz variirt in verschiedenen Knochen desselben Individuums, und in verschiedenen Altersperioden. Die Knochen der Embryonen und Kinder enthalten mehr Knochenknorpel, die Knochen Erwachsener mehr mineralische Bestandtheile, und im hohen Alter können letztere so überhandnehmen, dass der Knochen auch seinen geringen Grad von Biegsamkeit verliert, sprode und brüchig wird, wie das häußgere Vorkommen der Fracturen bei bejahrten Greisen beurkundet. Es hängt jedoch diese grüssere Brüchigkeit der Knochen bei hochbejahrten Individuen, wie später gezeigt wird, nicht von diesem Umstande allein ab. — Im kindlichen Alter, wo mit der Prävalenz des Knochenknorpels auch die Biegsamkeit der Knochen grösser ist, kommen Brüche selten, dagegen Knickungen an den langen Knochen, und Einbüge (an den Schädelknochen) öfter vor. Durch Krankheit kann das Verhältniss der organischen zu den anorganischen Bestandtheilen so geändert werden, dass das Ueberwiegen der einen oder der anderen abnorme Biegsamkeit oder Brüchigkeit der Knochen setzt. Die Verkrämmungen sonst geradliniger Knochen in der englischen Krankheit (Rhachitis, wo die Knochenerden durch den Harn abgeben), so wie die merkwürdige Fragilität der Knochen (Osteopsathyronis) bei gewissen Ernährungskrankheiten, sind das nothwendige Resultat der Mischaugänderung.

Der organische Bestandtheil der Knochen kann durch Kochen extrahirt werden, und bei boher Siedhitze im Papiniani schen Pigester bleibt
nur die morsche, leicht zerbrickelnde, wie wurmstichige, ausganische
Grundlage als Rest zurück. Der organische Bestandtheil thierischer Knochen stellt, in kochendem Wasser aufgebist, eine gelatinisse Masse —
Leim, Gluten s. Colla — dar. welche, in grösseren Massen aus Thierknochen (besonders aus den schwammigen Theilen derselben: gewannen,
als Nahrungsmittel verwendet wird Rumford sehe Suppen: Was die
Siedhitze leistet, leistet auch die verdanende Thitigkeit des Magens, welche
den Knochen ihren Knorpel auszieht, und den Kalk als albem pravam
mit den Excrementen entleert (weisser Koth der Beischlerssenden Thorres.
Durch Glüben wird der Knochenknorpel unter Entwickelung von Ammeniak verbrannt, und die Salze bleiben nic Besbehaltung der Knocheni-

Die Knochenerde ist nicht an bestammten Stellen un Lauchen abge-

lagert, sondern der Knochenknorpel durch und durch mit ihr imprägnirt,
— aber nicht chemisch verbunden.

Der organische Bestandtheil der Knochen geht durch das Verwittern derselben nur zum Theil verloren. Ein nicht unansehnlicher Rest desselben wird, wahrscheinlich durch die Art seiner Verbindung mit dem erdigen, vor der Zerstörung durch Fäulniss geschützt. So fand Davy in einem Stirnknochen aus einem Grabe zu Pompeji noch 35½ Procent animalische Substanz, und in einem Mammuthzahne 30,5.

§. 70. Eintheilung der Knochen.

Nach Verschiedenheit der Gestalt unterscheidet man lange, breite, kurze (und dicke), und gemischte Knochen.

Die langen Knochen, Röhrenknochen, mit Ueberwiegen des Längendurchmessers über Breite und Dicke, besitzen ein prismatisches oder cylindrisches, mit einer Markhöhle versehenes Mittelstück, Corpus s. Diaphysis, und zwei Enden, Extremitates s. Epiphyses (ἐπι-φύω, anwachsen). Die Enden sind durchaus breiter und aufgetriebener als das Mittelstück, und mit überknorpelten Gelenkflächen versehen, durch welche sie mit benachbarten anstossenden Knochenenden beweglich verbunden werden. Die langen Knochen erscheinen in den Extremitäten am entwickeltsten, und sind niemals vollkommen geradlinig, sondern nach einer Richtung gebogen, oder um ihre Axe etwas gedreht.

Die breiten Knochen mit prävalirender Flächenausdehnung sinden sich an jenen Körperstellen, wo es sich darum handelt, Höhlen zur Aufnahme wichtiger Organe zu bilden, wie am Kopse, an der Brust, und am Becken. Sie bestehen meistens aus zwei compacten Taseln, die durch eine zellige Zwischensubstanz (Diploë) von einander getrennt sind. Sollen auch lange Knochen zu Höhlenbildung verwendet werden, so wird ihr prismatisches oder cylindrisches Mittelstück slachgedrückt, und sie werden ihrer Länge nach, entsprechend dem Umsange der Höhle, gekrümmt (Rippen).— Lange und zugleich breite Knochen enthalten keine Markhöhlen. Die Ebene der breiten Knochen ist entweder plan (Pslugscharbein), oder im Winkel gebogen (Gaumenbein), oder schalensörmig gebogen (mehrere Schädelknochen), oder es treten viele breite Knochenlamellen zu einem einzigen grosszelligen Knochen zusammen, welcher bei einer gewissen Grösse eine bedeutende Leichtigkeit besitzen wird (Siebbein).

Die kurzen Knochen sind entweder rundlich, oder unregelmässig polyëdrisch, und kommen in grösserer Zahl, über oder neben einander gelagert, an solchen Orten vor, wo eine Knochensäule nebst bedeutender Festigkeit zugleich einen gewissen Grad von Biegsamkeit besitzen musste (Wirbelsäule, Hand- und Fusswurzel), was nicht zu erreichen gewesen wäre, wenn die Säule aus einem einzigen ungegliederten Knochenschafte bestehen würde. Man hat die kurzen Knochen auch vielwinkelige genannt, welche Benennung darum nicht entspricht, weil mehrere kurze Kno-

chen gar keine Winkel haben (Sesambeine), und auch viele breite und lange Knochen vielwinkelig sind.

Die gemischten Knochen sind Combinationen der drei genannten Knochenformen.

Die specielle Osteographie beschreibt die Flächen, Winkel, Ränder, Erhabenheiten und Vertiefungen, welche an jedem Knochen vorkemmen. Um apatere Wiederholungen zu vermeiden, sollen die Namen und Begriffe dieser Einzelheiten hier festgestellt werden. Fläche, Superficies, ist die Begrenaungsebene eines Knochens. Sie kann eben, convex, concav, winkelig geknickt, oder wellensormig gebogen sein. Ist sie mit Knorpel überkrustet, und dadurch glatt und schlüpfrig gemacht, so heisst die Gelenkstäche Super-Acies articularis s. glenoidea. Winkel, Angulus, ist die Durchschneidungslinie zweier Flächen, oder ihre gemeinschaftliche Kante. Die Winkel sind scharf (kleiner als 90°), oder stumpf (grösser als 90°), oder abgerundet, geradhing oder gebogen. Rand, Margu, heisst die Begrenzung breiter Knochen. Er ist breit oder schmal, gerade oder schief abgeschnitten, glatt, ranh, oder mit Zacken besetzt, gewulstet oder zugeschärft, aufgekrempt oder in zwei, auch in drei Lefzen gespalten. Fortsatz, Processus, heisst im Allgemeinen jede Hervorragung eines Knochens. Unterarten der Fortsätze sind: Der Höcker, Tuber, Protuberantia, Tuberositas, ein rauher, niedriger, mit breiter Basis aufsitzender Knochenhügel. Im kleineren Massstabe wird er aum Tuberrulum. Der Kamm, Crista, ist eine ganz willkürlich angewendete Bezeichnung für gewisse scharfe oder stumpfe, gerade oder gekrummte Knochenränder. Stachel, Spina, ist ein langer spitziger Fortsatz. Gelenkkopf, Caput articulars, ist jeder couvex begrenzte, überknorpelte, mehr weniger kugelige Fortsatz, welcher gewöhnlich auf einem engeren Halse, Collum, am Ende eines Knochens aufsitzt. Wird die Kugelform mehr in die Breite gezogen, so spricht man von einem Knorren, Condydus. (Sehr hiulig werden stumple, nicht überknorpelte Processus ebenfalls Condyli genannt, wie denn überhaupt im Gebrauche der osteologischen Terminologie sehr viel Willtur herrscht.) Bei den Alten bedeutet Condyfus nur die Knoten an einem Rohre, und metaphorisch auch die Knoten der Fingergelenke. Der von den Alten ausgestellte Unterschied zwischen Apophysis und Epiphysis wird selbet von den besten neueren Schriftstellern nicht beschiet. Apophysis, was man mit knochenauswuchs übersetzen könnte, ist jeder Fortsatz, der aus einem Knochen herauswächst, und zu jeder Zeit seiner Axistenz einen integrirenden Bestandtheil desselben ausmacht. Epiphysis, Anwuchs, ist ein Knochenende oder Fortsatz, welcher zu einer gewissen Beit mit dem Mittelettliche nur durch eine zwischenliegende Enorpelplatte zusammenhängt, und erst nach vollendotem Wachsthome des Knochens mit ihm verschundet.

Die Vertiefungen bessen, wenn sie überknorpelt sind, Gelenkgruben. Forose articulares s. glenoidales (von piefer, glatte, concave Flächet, nicht überknorpelt überhaupt Gruben. In die Länge gezogene Gruben sind: Runnen, und seichte Rinnen: Furchen, Sodei. Sehr schmale und tiefe Rinnen heissen Spalten. Fissuras, welcher Ansdruck auch für jede langtuchnale Verhindungsöffung zweier Höhlen gehraucht wird. Löcker. Forumina, sind die Mündungen von Kanālen: kurze und weite Kanāle bessen Ringe. Kanāle, welche in den Kasecken, aber nicht wieder zus ihm führen, sind Ernährungskauäle, und ihr Anfang an der Oberfläche der Kasechen ein Bruthrungsloch. Foroswen nutritika. Höhlen in den langen

Knochen werden Cava medullaria, Markhöhlen, genannt; enthalten sie kein Mark, sondern Luft, wie im gewissen Schädelknochen, so werden sie als Sinus s. Antra unterschieden. Sind viele kleine Räume statt eines grossen vorhanden, so entstehen Zellen. Viele grössere Zellen bilden die schwammige, sehr viele kleine die netzförmige Knochensubstanz.

§. 71. Knochensubstanzen.

Die Knochensubstanz hat nicht an allen Punkten des Knochens dieselbe Dichtigkeit und Härte. Wir unterscheiden a. compacte, b. schwammige, und c. netzförmige Knochensubstanzen.

- a. Die Oberfläche der Knochen wird, bis auf eine gewisse Tiele, von compacter Knochensuhstanz gebildet. Sie erscheint dem freien Auge homogen, von dichtem oder faserigem Gefüge, polirbar, ohne grössere Lücken, aber mit seinen, an der Obersläche der Knochen beginnenden Kanälchen (Gefässkanälchen) durchzogen, welche kaum mit freiem Auge wahrzunehmen sind. Die Möglichkeit, die ausseren Mündungen dieser Kanälchen durch Druck und Reibung verschwinden zu machen, bedingt das zu technischen Zwecken dienende Poliren der Knochen. Die compacte Substanz ist im Mittelstücke der Röhrenknochen besonders mächtig, nimmt gegen die Enden derselben allmälig ab, und geht zuletzt in ein dünnes Knochenblatt über, welches die ausserste Schale der Gelenkenden der Knochen bildet. An den breiten Knochen bildet sie zwei Tafeln, eine äussere und eine innere, und an den kurzen Knochen existirt sie nur als dunner Beleg derselben, oder sehlt, wie an den Körpern der Wirbel, ganzlich.
- b. Die schwammige Knochensubstanz besteht aus vielen sich in allen möglichen Richtungen kreuzenden Knochenblättchen, wodurch ein System von Lücken und Höhlen entsteht, welche unter einander communiciren, und mit dem Ansehen des gemeinen Badeschwammes Aehnlichkeit haben. Die compacte Knochensubstanz geht, gegen die Axe des Knochens zu, allmälig und ohne scharfe Grenze, durch Auflockerung in die schwammige Substanz über.
- c. Sind die Lücken der schwammigen Substanz klein, so heisst sie auch zellige Substanz, Substantia cellularis, und haben die sich kreuzenden Blättchen die Feinheit von Knochenfasern angenommen, so wird sie Netzsubstanz, Substantia reticularis, genannt. In den Gelenkenden der langen, und in den kurzen, dicken Knochen, prävalirt die zellige und die Netzsubstanz. Viele grössere und kleinere Oeffnungen führen von der Oberfläche in dieses Zellenlabyrinth. Die zwischen den Tafeln der platten und breiten Knochen befindliche schwammige Substanz heiset Diploë (von διὰ und πλέω, dazwischen füllen, nicht διπλόος, doppelt). Die aufgetriebenen Gelenkenden der Knochen werden vorzugsweise aus zelliger und genetzter Knochensubstanz gebildet. Fliessen meh-

rere im Miteistiche eines Ribenhauchens befoliche Ribben der schwarnigen Substanz zu einer grünneren Ribb zumannen, so ist diese die Varkhühle.

§ 72. Printer und Knochennerk.

Fresche Kauchen besitzen einen übrüsen, häntigen Ueberung — die Beinhaut, Periodom, - und fott in den Billen, - des Knochenmark. Neinila samm. Beile minen durch Finlaise serstürt werden, um des Konches troches authobienderen. In des Calentendes und an den Mesterinebestreiten der Krochen ficht die Brindent. Sie ist nur der jageneilichen knävelten sehr gesteuten, eine bei weiten nicht in dem Crair, we do Schlembine. Her Colleman and welcouring and quadestrobre wire chamberchen Averchenchungs, und schichen durch die Ge-Bestanileiten & 75. Feresettungen ins in ün vanttele Meckhilde der Differential chart . We say mut then Continuenteen the Koncinements another marine, weiche was den grieberen, direit die Fernance aufritie som Luciennat gingenin Emilienzquiaen gibiet veries. In des Epolyssa der Biltruitmehm, und sa des ver samuet sanahanden burum Kanchen, denne die sumpaste Substant prinstenthuis fehit, hingt sie, der mintensben Gallion wegen, die sie iner in den Konsten abschickt, viel destre sa, sie sa dar gastru deserva Flande sumpostur federate. Versucht min die Bemaint von suren nache Kanchen mentering, so sieht una de belleruringerungen av maninge feur Finen a de Celischewithin manager, and his min ones on aparers many Enches dans interes beiseiten. 2 3. aus Ripes sier aus Arnepaine. darch Boltomikus, and revolution Substitute neutralization production and interest prerouters to sum that that that for the American of the other Reservations. integration and an annual Vancoulous interrupted. The France September 1 an their de Attenen, we is not approximent America. Desir vertables ar quiet, une u desaurera doires our donieu sur-estocesa, un a. den breiten disection des Elleschungs, qui un sur fame appointer bestehn. Parent mente de Bentant, mit wie autrembungen wie ?angenanen. me Talbertsma, mostretter, his some indicates and sind ment men serve des ment de Forman mortes men Veren m de Manufactus est financia estados um des maticas esta Veranprings the manufactured principles about the first Superficient n de uniques une acresment babane de inschen entrant. A and Burge, Lint. Bone, Ber a Land. Lands. mi Lie-TRUE DESIGNATION - WINDER BRITANDE CHARGE HERE OF Bennet had in he was remains unrecounted. He disser bestill mention as Imagenese an estat in Angelon an beres. In denter infrare States as the details. Natural substitute facility ance mean Marche de vie ar marcen Schielle Commencia Raigeline a de linear de lineare modes.

C. Beck, anat. phys. Abhandlung über einige in Knochen verlaufende, und an der Markhaut verzweigte Nerven. Freiburg, 1846. (Im Oberarm und Oberschenkel, in der Ulna und im Radius durch Präparation dargestellt.)

— Kölliker, über die Nerven der Knochen, in den Verhandlungen der Würzburg. Gesellschaft, I. — Luschka, die Nerven der harten Hirnhaut, des Wirbelkanals und der Wirbel. Tübingen, 1850.

Das Knochenmark, dessen bereits bei Gelegenheit des Fettes §. 22 erwähnt wurde, nimmt die Markhöhle der Knochen ein. Es sendet keine Fortsetzungen in die Gefässkanälchen der Rindensubstanz, durch welche die Markhöhle mit der Oberfläche der Knochen in Verbindung gebracht wird. Nur wenn man einen seiner Beinhaut beraubten, frischen und fetten Knochen in warmer Luft aufhängt, so sickert alles Knochenfett (Mark) an der Oberstäche aus, und der Knochen erscheint fortwährend wie beölt. Dieses geschieht jedoch nur, weil, durch das allmälige Eintrocknen der in den Gefässkanälchen enthaltenen Blutgefässe, dem von innen herausschwitzenden Fette eine Abzugsbahn geöffnet wird. - Das Knochenmark ist allenthalben mit Bindegewebe durchzogen, welches an der Obersläche des Markklumpens dichter erscheint, als im Inneren desselben. jedoch diese verdichtete Bindegewebschichte nicht als Markhaut (Endoosteum s. Periosteum internum) bezeichnen, da sich dieselbe nicht als zusammenhängende Haut abziehen lässt. Die Diploë der breiten, und die schwammige Substanz der Gelenkenden der Knochen, enthält statt Mark ein röthliches, gelatinoses Fluidum, welches nach Berzelius aus Wasser und Extractivstoffen, und nur äusserst geringen Spuren von Fett besteht. Die alte Ansicht, dass das Knochenmark der Nahrungsstoff der Knochen sei: μύελος τροφή οστέων, medulla nutrimentum ossium (Hippocrates), ist durch die fettige Natur des Markes gebührend widerlegt, und es scheint die Fettablagerung im Knochen keinem weiteren physiologischen Zwecke zu entsprechen, als an allen anderen disponiblen Orten, wo Fett bei Nahrungsüberschuss deponirt wird. Dass es den Knochen leichter mache. kann nicht die einzige Ursache seiner Gegenwart sein. Er wäre ja noch leichter, wenn gar kein Fett in ihm abgelagert wurde, wie in den luftgefüllten Knochen der Vögel. Es scheint vielmehr die Fettmasse des Markes den Blutgefässen als Schutz- und Fixirungsmittel zu dienen, und die Gewalt der Stösse zu brechen, welche bei den Erschütterungen der Knochen leicht Veranlassung zu Rupturen der Gefässe geben könnten, ähnlich wie das Fett in der Augenhöhle für die feinen Ciliararterien und Nerven eine schützende Umgebung bildet. In den schwammigen Gelenkenden der Knochen befindet sich kein settes Mark, sondern eine röthliche, gelatinöse Flüssigkeit, welche in chemischer Beziehung mit dem Fleischextracte übereinstimmt. — Man findet die Markhöhle der Röhrenknochen zuweilen durchaus mit compacter Knochensubstanz gefüllt, ohne dass im Leben irgend eine abnorme Erscheinung Kunde von solcher Obliteration der Höhle gegeben hätte. Der berühmte niederländische Anatom, Frid. Ruysch,

sich eines Essbesteckes bedient haben, dessen Griffe aus seliden Menwheskeschen gedrechselt waren. —

Die von Gelenkknorpeln überzogenen Knochenstellen entbehren der

§. 73. Verbindung der Gelenkenden der Knochen mit den Gelenkknorpeln.

Wenn man einen senkrechten Durchschnitt eines überknorpelten Knochen aufderendes betrachtet, so sieht man an der Stelle, wo der Knochen aufdert, und der Knorpel beginnt, eine scharfgezeichnete Linie, welche aber nicht gerade ist, soudern, der rauben Knochenfläche entsprechend, unzählige Biegungen besitzt. Was diese Linie (die eine gewisse, nicht unansehnliche Breite besitzt) ist, weiss man nicht. Sie ist nicht Knochen, und nicht Knorpel, und wird, wie mir scheint, durch eine Substanz gebildet, welche das eigentliche Bindungsmittel zwischen Knochen und Knorpel ist. — Die länglichen Knorpelkörperchen eines Gelenkknorpels sind an den tiefen, mit dem Knochen zusammenhängenden Schichten des Knorpels, in der Intercellularsubstanz in Längsreihen geordnet, während an der freien Fläche desselben (Reibfläche) die Intercellularsubstanz durch grosse Vermehrung der Knorpelkörperchen fast ganz verdrängt wird, letztere überdies eine Querlage annehmen, und durch ihre Aneinanderlagerung einer Schichte von Pflasterepithelium gleichen.

Wie der Gelenkknorpel mit dem Knochen zusammenhängt, ist noch nicht zur Genüge erforscht. Hat man einen Gelenkknorpel durch langes Kochen erweicht und weggeschafft, so zeigt die von ihm bedeckte Knochenfläche ein rauhes, mit kleinen Höckerchen wie übersäetes Anschen. Es ist kaum denkbar, dass das blosse Hineinragen dieser Höckerchen in kleine Grübchen des Knorpels, der einzige Grund des so merkwürdig festen Zusammenhaltens sei-Die Gelenkknorpel für nicht ossisieirten Knochenknorpel zu halten, geht nicht an, da auch an Knochen, welchen die Kalkerde durch Salzsäure ausgezogen wurde, der oben erwähnte Streif die Stelle bezeichnet, wo der Knochenknorpel aufhört, und der Gelenkknorpel anfängt. — Bei sehr jungen Individuen, und vorzüglich gut bei neugeborenen Kindern, sieht man feine Blutgefässe 1/2"-1" weit in den Knorpel, vom Rande aus, eindringen, welche nicht weiter zu verfolgen sind, und wahrscheinlich in l'asa serosa übergehen (?). Merkwürdig ist es, dass die Blutgestasse, welche im Knochen gegen die Verbindungsstäcke desselben mit dem Geleukknorpel hinlaufen, sich namhast erweitern, und ohne capillar geworden zu sein, in die Venen übergehen. - Bei gewissen Ernährungskrankheiten der Gelenke, z. B. Gicht, werden auch die Knorpel allmälig abgenützt, sie schwinden, die nackte Knochenfläche wird durch die Reibung glattgeschlissen, und erhält Wachsglunz (wie im Morbus coxae senilis).

§. 74. Verbindungen der Knochen unter sich.

Die Verbindungen der Knochen bieten, von der festen Hast bis zur freiesten Beweglichkeit, alle möglichen Zwischengrade dar. Absolut unbe-

weglich ist wohl keine einzige Knochenverbindung zu nennen, aber die Beweglichkeit sinkt in einigen derselben auf ein Minimum herab, welches ohne Anstand — 0 genommen werden kann. Die festesten Knochenverbindungen, die Näthe, Einkeilungen und Symphysen, können unter besonderen Umständen sich lockern, und Verschiebungen gestatten, — sie müssen also beweglich sein. Nichtsdestoweniger spricht man allgemein von beweglichen und unbeweglichen Knochenverbindungen, und versteht unter ersteren die Gelenke, unter letzteren alle übrigen Arten von Verbindungen.

- A) Die beweglichen Verbindungen, Gelenke, Articulationes, sind Vereinigungen zweier oder mehrerer Knochen, welche durch überknorpelte, congruente Flächen an einander stossen, und durch Bänder derart zusammengehalten werden, dass sie ihre Stellung zu einander ändern, d. h. sich bewegen können. Die Bänder sind α. ein fibröses Kapselband, Ligamentum capsulare, vom rauhen Gelenkumfang eines Knochens zu jenem eines anstossenden gehend, und an seiner inneren Oberfläche mit einer Synovialmembran ausgekleidet, welche, wie oben (§. 37, B.) gezeigt wurde, sich nicht auf die überknorpelten Knochenenden umschlägt, wie bisher fälschlich angenommen wurde. β. Hilfsbänder, Ligamenta accessoria s. auxiliaria, um die Verbindung zu kräftigen, oder die Beweglichkeit einzuschränken. y. Zwischenknorpel, Cartilagines interarticulares, welche nur an gewissen Gelenken vorkommen, und freie, mit den Knochenenden nicht zusammenhängende, sondern zwischen sie eingeschobene, und nur an die Kapsel befestigte Faserknorpelgebilde vorstellen. Von der Form der Gelenkenden der Knochen, der Lagerung der Hilfsund Beschränkungsbänder, hängt die Grösse der Beweglichkeit eines Gelenkes ab. Selbst beim freiesten Gelenke kann der zu bewegende Knochen sich nicht in gerader Linie von jenem entfernen, mit welchem er articulirt, so dass ein Zwischenraum entstünde. Der Lustdruck gestattet es nicht, wie in der Anatomie des Hüstgelenks gezeigt wird. - Man unterscheidet folgende Arten von Gelenken:
- a. Freie Gelenke, Arthrodiae (ἀρθρώδια bei Galen, seichtes Gelenk). Sie erlauben die Bewegung in jeder Richtung. Sphärische, convexe und concave, genau an einander passende Gelenkslächen, und laxe oder dehnbare Kapseln, mit wenig oder gar keinen beschränkenden Seitenbändern, sind nothwendige Attribute dieser Gelenkart. Wird die sreie Beweglichkeit dadurch etwas limitirt, dass eine besonders tiese Gelenkgrube einen kugeligen Gelenkkopf umschliesst, so heisst das Gelenk ein Nussoder Pfannengelenk, Enarthrosis.
- b. Winkelgelenke oder Charniere, Ginglymi (γιγγλυμὸς, Thūrangel), gestatten nur Beugung und Streckung, also Bewegung in einer Ebene. Eine Rolle, Trochlea, an dem einen, und ein entsprechender Ausschnitt, Incisura sigmoidea, am anstossenden Gelenkende, charakterisiren das Winkelgelenk. Auch Gelenke mit sphärisch convexen und

concaven Gelenktheilen werden, wenn von zwei entgegengesetzten Seiten derselben Beschränkungsbänder (Seitenbänder) angebracht sind, ihre freie Beweglichkeit einbüssen, und Winkelgelenke werden.

- c. Dreh- oder Radgelenke, Articulationes trochoidese (12020), Rad), kommen dadurch zu Stande, dass ein Knochen, der an einen anderen stösst, sich um diesen oder um seine eigene Axe dreht.
- d. Straffe Gelenke, Amphiarthroses (ἀμφὶ, halb oder unvellständig), finden dort statt, wo sich zwei Knochen mit geraden, ebenen, oder mässig gebogenen, überknorpelten Flächen an einander legen, und durch straff angezogene Bänder so fest zusammenhalten, dass sie nur wenig an einander hin und her gleiten, oder sich an einander drehen können.
- B) Unbewegliche Knochenverbindungen. Sie bilden nie Gelenkhöhlen, und erscheinen in folgenden Unterarten:
- α. Wahre Näthe, Suturae verae, wechselseitiges Eingreisen zweier zackiger Knochenränder (engrenure der Franzosen, Syntaxis serrets der Alten).
- β. Falsche Näthe, Suturae spuriae s. nothae, Verbindungen von Knochenrändern ohne vermittelnde Zacken, sondern entweder durch Uebereinanderschiebung derselben, wodurch eine Schuppennath, Sutura squamosa, entsteht, oder durch Anlagerung, Harmonia (ἄροι, кизам-menpassen). In den wahren und falschen Näthen existirt ein Verbindungsknorpel als Vermittler der Vereinigung.
- γ. Fugen, Symphyses und Synchondroses (χόνδρος, Knorpel). Breite und rauhe Knochenslächen werden durch Faserknorpelscheiben oder wahre Knorpel zusammengelöthet. Die Dehnbarkeit des Knorpels erlaubt eine geringe Beweglichkeit, wie an den Symphysen der Wirbelbeine, und an der Schamfuge der Beckenknochen im schwangeren Weibe zu sehen ist.
- δ. Bandverbindungen, Syndesmoses (δεσμός, Band), sind Vereinigungen zweier Knochen durch fihrüse Bandmassen. Jedes Gelenk, jede
 Symphysis und Synchondrosis ist zugleich, der Verstärkungsbänder wegen,
 eine Syndesmosis. Sie kommt aber auch allein vor, z. B. zwischen dem
 Zungenbeine und dem Schädel.
- ε. Einkeilungen, Gomphoses (γόμφος, Pflock), finden sich nur zwischen den Zähnen und den Kiefern. Eine konische Zahnwurzel steckt im Knochen, wie ein eingeschlagener Keil.

Die Alten erwähnen noch der σχινδύλησις, einer Art von Knochenverbindung, wo der scharfe Rand des einen Knochens zwischen doppelten Leften eines anderen (wie bei Schindeln) steckt. Zwischen Pflugscharbein und Keilbein zu beobachten.

§. 75. Structur der Knochen.

Die compacte Knochensubstanz ist von feinen Kanälchen durchzogen, welche vorzugsweise Blutgefässe, vielleicht auch Mark enthalten (Markkanāle, besser Gefāsskanāle). Sie werden auch Canales Haversiani genannt, nach Clopton Havers, einem englischen Anatomen des 17. Jahrhunderts, der ihrer zuerst erwähnt. Nur in sehr dünnen Knochen fehlen sie, z. B. in der Lamina papyracea des Siebbeines, und stellenweise am Gaumen- und Thränenbein. Sie lausen in den Röhrenknochen mit der Längenaxe derselben parallel, hängen aber auch durch Querkanäle zusammen, und bilden somit ein Netzwerk von Kanalen, welches an der ausseren und inneren Oberstäche der Knochen mit freien, aber seinen Oessnungen In den breiten Knochen laufen sie entweder den Flächen derselben parallel (Brustbein), oder ihre Richtung ist sternformig, von bestimmten Punkten ausgehend (Tuber frontale, parietale, etc.). In den dünnen Knochenblättchen der schwammigen Substanz fehlen sie. Stärke schwankt zwischen 0,002" - 006". Hat man feine Ouerschnitte von Röhrenknochen mit verdünnter Salzsäure ihres Kalkgehaltes beraubt, und sie durchsichtig gemacht, so sieht man folgende Begrenzung der Gefässkanälchen. Jedes Gefässkanälchen ist von concentrischen, cylindrischen Scheiden oder Lamellen eingeschlossen, zu welchen das Kanälchen die Axe vorstellt. Die Zahl der Scheiden variirt von 4 - 10. Jede Scheide ist ein äusserst dunnes Blättchen einer gleichartigen, structurlosen Substanz von 0,0016" - 0,0025" Dicke, welche die Grundlage des Knochens bildet, und Knochenknorpel genannt wird. Mehrere Gefässkanälchen mit ihren Scheiden werden von grösseren concentrischen Scheiden umschlossen, welche zuletzt in einer mehrblätterigen grössten Scheide stecken, welche so gross ist, wie der Umfang des Knochens selbst. Parallel den äussersten Scheidenlamellen ziehen auch ähnliche um die Markhöhle der Knochen zunächst herum. Die Structur der Knochen ist also vorzugsweise lamellös. - Zwischen den Lamellen der concentrischen Scheiden, und in ihnen selbst, bemerkt man mikroskopisch kleine, runde oder oblonge, gegen die Axe des Kanälchens concave, mit Aesten besetzte Körperchen eingeschaltet, deren Grösse sehr verschieden erscheinen muss, je nachdem der Durchschnitt zufällig durch die Mitte eines Körperchens, oder näher an seinem Rande lief. Diese Körperchen sind so wie ihre Bei Beleuchtung von oben erscheinen sie unter dem Mikroskope kreideweiss, bei Beleuchtung von unten dunkel. Längere Einwirkung von Salzsäure macht sie durchsichtig, indem die Säure die in der Wand derselben enthaltene Knochenerde auflöst. Die Aeste der Körperchen stossen theils mit jenen der benachbarten zusammen, und bilden ein fein genetztes Gestrippe, oder sie münden in die Gefässkanälchen, ja auch in die Zellen der schwammigen Substanz ein, oder sie endigen frei an der Obersläche der Knochen. Ist aber die Obersläche eines Knochens mit

Knorpel incrustirt (wie an den Gelenkenden), so gehen die gegen den Knorpelüberzug gerichteten Aestchen der Knochenkörperchen bogenförmig in einander über (Gerlach). Der Entdecker dieser mikroskopischen Bestandtheile der Knochen, J. Müller, nannte sie Corpuscula chalcophora, da er meinte, dass sie das vorzüglichste Depot der in den Knochen befindlichen Kalksalze seien. Sie enthalten jedoch nur eine helle, durchsichtige, etwas zähe Flüssigkeit (als Secret der Blutgefässe des Knochens), in welcher ein Zellenkern liegt (Donders, Virchow, Kölliker). Knochenerde enthalten sie nie, welche vielmehr im Knochenknorpel selbst eingetragen ist, wie man sich durch mikroskopische Untersuchung von feinen calcinirten Knochenschnitten überzeugen kann. Im Grunde genommen sind diese Körperchen nur sehr kleine, ästige Lücken in der Knochensubstanz (Lacunae et canaliculi ossium), welche mit den Gefässkanälchen (Markkanälchen) ein den ganzen Knochen durchziehendes System von Röhren und Räumen bilden, durch welches der aus den Blutgefässen der Knochen stammende Ernährungssaft (Plasma) zu allen Theilchen des Knochens geführt wird, - Lessing's plasmatisches Gefässsystem. Gerlach hat dieses verwickelte System von der Markhöhle der Knochen aus durch Injectionen sehr glücklich gefüllt. - Es ist begreislich, dass sehr dünne Knochen (also auch die feinen Blättchen der schwammigen Knochensubstanz), zu deren Ernährung die Gefässe ihres Periosts genügen, keine Gefässkanälchen benöthigten, welche dagegen in den dicken Knochen zu einer unerlässlichen Nothwendigkeit werden, um ihre Masse allenthalben mit Ernährungsstoffen zu durchdringen.

Mikroskopische Behandlung. Um die Knochenkörperchen zu sehen, werden feine Schnitte senkrecht auf die Längenaxe von Röhrenknochen geführt, und die dinnen Knochenplatten durch Schleisen auf Sandstein so fein gemacht, dass sie durchscheinend werden. Natürlich sieht man an solchen Schliffen nicht die ganzen Knochenkörperchen, sondern nur ihre Durchschnitte, welche längliche, spindelförmige, an beiden Enden zugespitzte, und mit ästigen Strahlen besetzte Figuren darstellen. Die Länge eines solchen Körperchens verhält sich zu seiner Breite wie 5-7:1. Die Durchschnitte der Markkanälchen erscheinen als runde Oessnungen. Die concentrischen Ringe von Knochenknorpel, von welchen sie umschlossen werden, werden bei dieser Behandlungsart nicht geschen. Es muss das Knochenblättchen durch verdunnte Salzsäure seines Kalkgehaltes beraubt werden, worauf es in reinem Wasser ausgewaschen wird. Würde es mit Salzsäure getränkt zur Beobachtung verwendet, so witrde die fortdauernde Gasentwicklung (da der kohlensaure Kalk seine Kohlensäure entweichen lässt, um sich mit der Salzsäure zu verbinden) störend einwirken. — Hat man die Plättchen der Längenaxe des Knochens parallel geschnitten, so erscheinen die Markkanälchen als longitudinale Streisen, welche mittelst Querästen communiciren. Die concentrischen Ringe erscheinen nicht mehr; dagegen erblickt man longitudinale, den Kanälchen parallele Linien, - die Schnittränder der concentrischen Röhren.

An ganzen Knochen, welche durch verdünnte Salzsäure erweicht wurden, lassen sich von der Oberfläche derselben concentrische Blätter mit Vorsicht ablösen. Langsames Verwittern der Knochen lässt ihre Oberfläche eben-

falls, der sich abschilfernden Rinde wegen, wie schuppig erscheinen. Die blätterige Structur der thierischen Knochen (besonders Rinderknochen) war früher als die der menschlichen bekannt.

Dass die Gefässkanälchen von der Oberstäche bis in die centrale Markhöhle eindringen, wird durch einen einfachen Versuch bewiesen, wenn man Quecksilber in die Markhöhle eines quer durchschnittenen Röhrenknochens giesst. Man sieht die Metalltröpschen an unzähligen Punkten der Knochenoberstäche hervorquellen. Gerlach hat zu demselben Zwecke Injectionen der Markhöhlen mit gesärbten und erstarrenden Flüssigkeiten angewendet. — Die Knochenkörperchen sühren dem oben Gesagten zusolge ihren Namen mit Unrecht, indem sie keine Organe sui juris, sondern nur Lücken in oder zwischen den Knochenlamellen, die ein Markkanälchen umgeben, darstellen, und keine ihnen eigene Wand besitzen. In srischen Knochen sind die Knochenkörperchen und ihre Aeste mit Ernährungsstüssigkeit (Blutplasma) gesüllt. In getrockneten Knochen sind sie leer, und enthalten nur Lust.

§. 76. Physiologische Eigenschaften der Knochen.

Die Knochen sind im gesunden Zustande unempfindlich, und vertragen jede mechanische Beleidigung, ohne Schmerzgefühl zu veranlassen. Das Sägen, Bohren, Schaben und Brennen gesunder Knochen vermehrt, laut Zeugniss der Versuche an Thieren, die Summe der Schmerzen nicht, welchedurch die Blosslegung der Knochen hervorgerufen wurden. Die Knochensplitter, welche nach schlecht gemachten Amputationen am Knochenstumpfe zurückbleiben, so wie die Zacken am Rande der Trepanationswunden, konnen eben so schmerzlos mit der Zange abgezwickt werden. Contractilität besitzen die Knochen ebenfalls nicht, obwohl sie im Stande sind, langsam ihre Gestalt zu ändern, ihre Oeffnungen und Kanäle zu verengern, wenn die Theile, welche durch sie durchgehen, zerstört wurden. So zieht sich der amputirte Knochenstumpf zu einem soliden marklosen Kegel zusammen, so verengert sich die Zahnlücke nach Ausziehen eines Zahnes, die Augenhöhle nach Verlust des Augapfels, das Sehloch nach Atrophie des Nervus opticus, der durch Wassersucht ausgedehnte Hirnschädel durch Resorption oder Entleerung des ergossenen Serums, und die Gelenkhöhlen (namentlich die Hüstpfanne) nach Verrenkungen, welche nicht wieder eingerichtet wur-Diese Verengerungen sind jedoch nicht Folge einer thätigen Contraction, sondern ein mit Resorption verbundenes Einschrumpsen.

Die Festigkeit der Knochen ist die Folge der Verbindung ihrer organischen und anorganischen Stoffe. Reine Kalkerde hätte sie zu spröde, und reiner Knochenknorpel viel zu weich gemacht. Wie glücklich ein hoher Grad von Festigkeit und Tenacität durch die Mischung der Knochenmaterialien erzielt wird, zeigen die von Bévau gemachten Versuche, wo ein Knochen von 1 Quadratzoll Querschnitt erst bei einer Belastung von 368—743 Centnern entzwei ging. Ein Kupferstab von demselben Querschnitte riss bei 340 Centner, und schwedisches Schmiedeeisen bei 648. Die besondere physiologische Bestimmung eines Knochens wird es mit sich bringen, wie die

organischen Materien sich zu den anorganischen quantitativ verhalten. Lange Knochen, welche elastisch sein müssen, um dem Drucke und den Stosskräften, welche sie treffen, etwas nachgeben zu können, und kurze Knochen, welche nie in die Lage kommen, gebogen zu werden, werden sich durch dieses Verhältniss von einander unterscheiden, und Knochen, welche sehr elastisch sein müssen, ohne Festigkeit zu benöthigen, können sogar, wie man an den Rippen sieht, durch Ansätze von Knorpeln verlängert werden.

Knochen, die der Gefahr des Splitterns unterliegen würden, wenn sie vollkommen geradlinig wären, haben wohlberechneter Weise eine gewisse Krümmung im weiten Bogen (alle Röhrenknochen), wodurch sie in geringem Grade federnd werden. Es ist ein bewiesener physikalischer Lehrsatz, dass bei einem soliden Stabe, während er gebogen wird, die Theilchen der convexen Seite aus einander weichen, die der concaven wenigstens im Anfange der Krummung sich einander nähern; die grössere oder geringere Schwierigkeit dieses Auseinanderweichens und Näherns ist der Grund der schwereren oder leichteren Brechbarkeit. Eine mittlere Axe, d. i. eine Reihe von Theilchen, wird weder verlängert noch verkürzt, sie ist indifferent, und kann nebst ihren nächstliegenden Theilchen, bei welchen das Auseinanderweichen und das Nähern unbedeutend sind, herausgenommen werden, ohne dass der Stab merklich an seiner Festigkeit verliert, welche im Gegentheile vermehrt wird, wenn die herausgenommenen Theilchen an der Obersläche des Stabes angebracht werden. Dieses scheint der Grund des Hohlseins der langen Knochen zu sein.

Der Stoffwechsel im Knochen ist nicht so langsam oder träge, als es auf den ersten Blick aus der Festigkeit der Knochen zu vermuthen wäre. Werden nach Chossat's Versuchen Hühner oder Tauben längere Zeit mit rein gewaschenem Getreide, ohne Sand und erdige Anhängsel, gefüttert, so ist die im Getreide enthaltene Erdmenge nicht hinreichend, den Stoffwechsel im anorganischen Bestandtheile der Knochen zu unterhalten. Die Knochenerde wird fortwährend durch die rückgängige Ernährungsbewegung aus den Knochen entfernt, und die neue Zufuhr bietet keinen genügenden Ersatz. Die Knochen erweichen sich deshalb, werden dünn und biegsam, und verschwinden theilweise, wie die Löcher beweisen, welche im Brustbeinkamme und an den Darmbeinen entstehen. Wird das Futter mit Kreide oder Kalk gemengt, so verschwinden die Erscheinungen der Knochenerweichung, und die normale Festigkeit kehrt zurück. — Je jünger der Knochen, desto rascher seine Ernährungsmetamorphose.

Es ist physiologisch von höchster Wichtigkeit, dass das Casein, ein Hauptbestandtheil der Milch, unter allen Proteinverbindungen (§. 14) am meisten phosphorsauren Kalk enthält. Es wird hieraus verständlich, woherdas rasche Wachsthum der Knochen im Säuglingsalter, sein wichtigstes Material zum Ausbau des Skeletes bezieht.

Werden junge Thiere mit Färberröthe gefüttert, so werden die Knochen

roth (bei jungen Tauben schon binnen 24 Stunden). Die erste Ablagerung einer rothen Schichte erfolgt zunächst unter der Beinhaut, das Mark wird nicht verändert. Setzt man mit der Fütterung durch Färberröthe aus, so entfernt sich der rothe Ring vom Periost. Es hat sich um ihn ein neuer weisser Ring gebildet; je dicker dieser wird, desto mehr nähert sich der rothe Ring der Markhöhle, und verschwindet endlich vollkommen. Dieses kann nicht anders erklärt werden, als dadurch, dass an der inneren Oberfläche der Knochen fortwährend resorbirt, an der äusseren fortwährend neugebildet wird. So lange mehr neugebildet als fortgeschafft wird, nimmt der Knochen an Dicke zu. Das Periost steht demnach in einer innigen Beziehung zum Wachsthum der Knochen; seine Blutgefässe liefern den Nahrungsstoff der Knochen. Es folgt daraus jedoch keineswegs, dass Entblössung eines Knochens sein Absterben zur Folge haben müsse, da die zur Markhöhle durch die Foramina nutritia eindringenden Ernährungsarterien, welche durch seine Zweigchen sich im ganzen Röhrensysteme der Markkanälchen verbreiten, die mangelnde Blutzusuhr von der Beinhaut her ersetzen kön-Im Falle auch diese Ernährungsarterien der Markhöhle aufhörten, Blut zuzuführen, stirbt der Knochen theilweise oder ganz ab (Necrosis, νεκρός, todt), und wird als sogenannter Sequester ausgestossen. Dass auch die das Knochenmark umgebende Zellgewebschicht, welche von den älteren Anatomen unrichtig als Periosteum internum, von einigen neueren als Membrana medullaris beschrieben wurde, an der Bildung und Regeneration des Knochens definitiv Antheil habe, beweist folgender Versuch. An einem lebenden Thiere wurde das Oberarmbein im Mittelstücke von seinen weichen Umgebungen isolirt, seine Beinhaut abgeschabt, und ein Loch in die Markhöhle gebohrt. Um die den Knochen umgebenden Weichtheile von der Theilnahme an der Ausfüllung dieses Loches durch Neubildung von Knochensubstanz zu hindern, wurde die angebohrte Stelle mit einem Leinwandbande umgeben. Das Loch füllte sich von der Markhöhle aus, also gewiss durch Vermittlung der sogenannten Membrana medullaris, mit neu gebildeter Knochensubstanz aus, welche, wenn das Thier jung ist, so rasch zunimmt, dass der Knochenpfropf selbst über die äussere Bohröffnung herausragt.

§. 77. Entstehung und Wachsthum der Knochen.

Jeder Knochen ist (mit Ausnahme gewisser Schädelknochen) in den frühesten Perioden seiner Bildung ein Knorpel; der Knochenknorpel existirt somit vor der Knochenerde. Der embryonische Knochenknorpel ist sehr reich an Knorpelkörperchen. Im Anfange der Verknöcherung lagern sich die Knorpelkörperchen reihenweise, und die sie umschliessenden Knorpelhöhlen verlängern sich. Durch Schwinden der Zwischensubstanz der verlängerten Knorpelhöhlen gehen letztere in einen Kanal über, und dieser ist ein Gefässkanälchen (§. 75). Im Inneren dieser Kanälchen bilden sich Blut-

gefässe, welche sich durch mittlerweile entstandene neue Kanälchen bis an die Oberstäche des werdenden Knochens erstrecken, und dort mit den Blutgefässen der Beinhaut anastomosiren. Die zwischen den Markkanälchen besindliche Knorpelmasse wird lamellös, und scheidet sich in die den Markkanal concentrisch umgebenden Blätter. Die Knochenerde lagert sich in Körnchensorm (sogenannte Kakkrümel, Schwann) in diesen Blättern ab, und während dieses geschieht, sellen sich die noch übrigen (nicht zu Kanälchen gewordenen) Knorpelzellen zu Knochenkörperchen umwandeln. Der Umwandlungsprocess besteht darin, dass die Knorpelzellen durch Verdickung ihrer Wand und nachsolgende Kalkablagerung, unter gleichzeitiger Bildung von seinen Kanälchen in ihr, die mit dem Ueberreste der Zellenhöhle zusammenhängen, zu ästigen Knochenkörperchen werden. Die Bildungsweise der Knochenkörperchen hat, diesem zusolge, eine grosse Uebereinstimmung mit dem Verholzungsprocesse psanzlicher Zellen und der Entstelsung der sogenannten Poren- oder Tüpselkandie.

Der Knorpel wird nicht en allen seinen Punkten gleichzeitig in Knochen umgewandelt. Die Verknöcherung geht von gewissen Stellen aus, welche Puncta ossificationis heissen. Die Puncta ossificationis entstehen in verschiedenen Knochen zu verschiedenen Zeiten, niemals jedoch vor dem zweiten embryonischen Lebensmonate. Das Schlüsselbein und der Unterkiefer erhalten ihren Verknöcherungskern am frühesten. --- schon am Beginne des zweiten Monats; das Erbsenbein dagegen am spätesten, --- erst zwischen dem 8. und 12. Lebensjahre. -- Breite Knochen besitzen einen oder mehrere Verknöcherungspunkte, kurze in der Regel nur einen, lange gewöhnlich drei, deren einer dem Mittelstücke, die beiden anderen den Extremitaten des Knochens angehören. Der Ossificationspunkt des Mittelstücks entsteht früher als jene in den Endstücken. Haben sich die Ossificationspunkte durch Grössenzunahme so weit ausgebildet, dass sie die bleibende Form des Knochens angenommen baben, so ist die Trennungsspur zwischen Mittelstück und Endtheilen noch immer als nicht verknöcherter Knorpel kepnbar. In diesem Zustande heissen die Knochenenden: Epiphysen. Von den Knorpeln der Epiphysen aus wird immer fort, bis zur gänzlichen Verschmelzung der drei Stücke eines Röhrenknochens, Knochenmasse neu gebildet, und an die Enden des Mittelstücks angesetzt, wodurch Zwei in das Mittelstück eines Röhrendas letztere immer länger wird. knochens gebohrte Löcher ändern deshalb durch das Wachsthum des Knochens ihre Entsernung nicht, sondern entsernen sich nur von den Die Verschmelzung des Mittelstücks mit den Epiphysen bezeichnet den Schlusspunkt des Wachsthums eines Knochens in die Länge. -

Es ist dieses nicht so zu verstehen, als ob nicht auch in jedem Theilchen der Knochensubstanz eine Zunahme durch Wachsthum stattsände. Eben die Versuche mit Färberröthe, die neuerer Zeit vorgenommen wurden, beweisen, dass jedes von den Gestsskanälchen, welche die compacte Knochensubstanz in allen Richtungen durchziehen, und welche feine Blutgefässe enthalten, mit einem rothtingirten Ringe sich umgiebt. — Die Verwendbarkeit der Färberröthe zu Versuchen dieser Art beruht auf einer ehemischen Affinität zwischen dem färbenden Principe und dem phosphorsauren Kalk, welche durch folgendes, von Rutherford angestelltes Experiment anschaulich gemacht wird. Giebt man in eine Abkochung von Färberröthe salzsaure Kalklösung, so geschieht dadurch keine Aenderung. Setzt man eine Lösung von phosphorsaurer Soda hinzu, so entsteht durch doppelte Wahlverwandtschaft phosphorsaurer Kalk und salzsaure Soda, von welchen der erstere, seiner Unlöslichkeit wegen, sich niederschlägt, und den färbenden Bestandtheil der Lösung mit sich nimmt.

Man hat es erst in neuester Zeit erkannt, dass nicht alle Knochen aus Knorpeln hervorgehen. Bei einzelnen Schädelknochen kann man nie eine Entwickelung aus präformirtem Knorpel, sondern aus einem weichen Blastem beobachten, während andere eine wirkliche knorpelige Grundlage besitzen. (Siehe §. 110 der Knochenlehre.)

Ueber das Wachsthum der Knochen ist besonders lehrreich nachzulesen Kölliker's Handbuch der Gewebslehre, Leipz. 1852. pag. 233.

§. 78. Praktische Bemerkungen.

Gebrochene Knochen heilen, wenn schwere Complicationen fehlen, in der Regel leicht zusammen, und um so schneller, je jünger das Individuum. Die Bruchenden werden durch neu gebildete Knochensubstanz (Callus), deren Erzeugung den nämlichen Gesetzen unterliegt, wie die normale Knochenbildung, zusammengelöthet. Hat ein Knochenbruch ohne bedeutende Verrückung der Bruchenden stattgefunden, so ergiesst sich anfangs Blut zwischen die Knochenenden, und die sie umgebenden Weichtheile. Dieses Blut gerinnt, und mischt sich mit einem weichen, halbdurchsichtigen Exsudate, welches von den Blutgefässen der Beinhaut, des Markes, und der Markkanälchen geliefert wird. In der zweiten und dritten Woche nach dem Bruche organisirt sich dieses Exsudat zu Knorpelsubstanz (Vötsch), welche sich auf die früher (§. 77) erwähnte Weise zu Knochensubstanz (Callus) umwandelt. — Dieser erstgebildete Knochencallus füllt den Zwischenraum zwischen beiden Fragmenten vollkommen aus, und hält die Knochenenden so fest zusammen, dass selbst Gebrauch des gebrochenen Knochens von nun an möglich ist. Dupuytren nannte diesen Callus: cal provisoire. Er enthält keine Markhöhle. Erst wenn sich durch Außaugung seiner innersten Masse eine Höhle bildete, die die Markhöhlen des oberen und unteren Fragmentes mit einander verbindet, wird er zum cal défini, welcher unter günstigen Umständen an Umfang so viel abnimmt, dass nur eine geringe Wölbung an der Oberfläche des Knochens die Stelle andeutet, wo der Bruch stattgefunden hatte. War die Verrückung der Bruchenden gross, oder ein Stück des Knochens durch Splitterung zerstört, und die Splitter ausgezogen oder abgestossen, so müssen alle die Bruchstelle umgebenden Weichtheile concurriren, um den Callus zu bilden, der dann eine dicke, unförmliche Knochenwulst, eine Art Zwinge bildet, durch welche die Bruchenden zusammengehalten werden. Dass die Bildung des neuen Knochens nicht nothwendig von den Resten des alten ausgehen müsse, sondern die weichen Umgebungen der Knochen, Aponeurosen, Muskeln und Zellgewebe, durch ihre Blutgefässe hiebei activ interveniren, beweisen Heine's schöne Beobachtungen, nach welchen bei Hunden das Wadenbein und die Rippen, nach vollkommener Exstirpation mit der Beinhaut, reproducirt wurden (obwohl, so viel ich an Heine's Präparaten sah, auf sehr unvollkommene Weise).

Zufällige Knochenbildung erscheint: α. als Verknöcherung von Weichtheilen, Ossificatio, und β. als Knochenauswuchs, Exostosis. Nicht Alles, was für Verknöcherung gilt, ist es auch. Die sogenannten verknöcherten Arterien, Venen, Bronchialdrüsen, Schilddrüsen etc. besitzen nicht die Structur der wahren Knochen; sie sind vielmehr anorganische Deposita ohne bestimmten Bau, und werden besser Verkalkungen genannt. Die Verknöcherungen der harten Hirnhaut, der Sehnen, der Knorpel, der Muskeln (im Glutaeus des Rindes nicht gar selten, und häufig beim Spath der Pferde) besitzen nach Miescher wahren Knochenbau.

Die praktische Wichtigkeit des Knochensystems ergiebt sich aus seinen bedingenden Verhältnissen zu den Weichtheilen, und aus seinen häufig vorkommenden, rein mechanischen Krankheiten, welche einen der wichtigsten Theile der praktischen Chirurgie bilden. Die Ernährungskrankheiten der Knochen sind, mit Ausnahme der Entzundung und Hypertrophie, ihrem Wesen nach grösstentheils noch unbekannt. Die Störungen der mechanischen Verhältnisse dagegen, Brüche und Verrenkungen, welche die innere Organisation der knochen nicht beeinträchtigen, wurden viel genauer studirt, und die kunsthilse erfreut sich in diesen Fällen einer Präcision und Sicherheit, welche nur durch die mechanischen Principien, auf welche sie basirt wird, erreichbar war. Die innige, und sich stets gleichbleibende Beziehung der Muskeln, Gefässe, Nerven und Eingeweide zu den Knochen, dient uns als verlässliche Richtschnur bei der topographischen Untersuchung der Organe, und die Osteologie bietet deshalb das Fundament des ganzen anatomischen Lehrgebäudes. Hippocrates hat seinem Sohne Thessalus die Lehre gegeben, sich eifrigst mit dem Studium der Knochenlehre zu beschästigen, und Galen hat seine Schüler nach Deutschland geschickt, um an den Leichen erschlagener Germanen sich jene Kenntnisse zu holen, welche bei der Sitte der Römer, ihre Leichen zu verbrennen, zu Hause nicht erworben werden konnten. - Bei keinem Systeme bietet sich die Gelegenheit, den Nutzen der Anatomie anschaulich zu machen. so reichlich dar, wie im Knochensysteme, und die wichtigsten praktischen Wahrheiten können, ohne alle specielle Kenntniss der chirurgischen Krankheitslehre, an die Schilderung der Knochen angeknüpst werden. Es lässt sich vor dem Skelet oder auf dem Secirtische bestimmen, welche Knochen häufig oder selten, unter welchen I'mständen sie brechen, welche Gelenke den Verrenkungen, und welchen Arten von Verrenkungen unterliegen, welche Verschiebung der Muskelzug an gebrochenen und verrenkten Knochen bedingen wird, und welche mechanische Hilfe in Anwendung zu bringen ist.

Literatur. Nebst den Dissertationen von Deutsch, de penitiori ossium structura. Vratisl., 1834., und Miescher, de inflammatione ossium, accedunt J. Mülleri observationes etc. Berol., 1836., verdienen nachgeschlagen zu werden: Valentin, Repertorium. L.; J. Müller, Archiv. 1836. Vl. 1841. p. 210;

1842. p. 202 und p. 372; 1843. p. 336; 1849. p. 292; Virchow, Verhandl. der Würzburger phys. med. Gesellschaft. I. N. 13. — C. Bruch, Beiträge zur Entwicklung des Knochensystems, im 11. Bde. der schweiz. naturforschenden Gesellschaft, und die Gewebslehren von Henle, Gerber, Bruns, Gerlach und Kölliker.

Anwendungen. Macdonald, dissertatio de ossium necrosi et callo. Edinb., 1795. — Chaussard, recherches sur l'organisation des vieillards. Paris, 1822. — Monod, thèse sur l'anat. pathol. des os. Paris, 1830. — Malgaigne, essai sur l'inflammation des os. Archiv. génér. de méd. T. XXX. — Mercier, sur les fractures du femur. Gaz. méd. 1835. — Meding, de regeneratione ossium. Lips., 1823. — Béclard, über die Ostose, in Meckel's deutschem Archive. VI. Bd. — Voetsch, die Heilung der Knochenbrüche. Heidelberg, 1847. — Flourens, Théorie expérimentale de la formation des os. Paris, 1847.

§. 79. Schleimhäute. Anatomische Eigenschaften derselben.

Schleimhäute, Membranae mucosae, werden gefäss- und nervenreiche, aus mehreren Schichten zusammengesetzte Häute genannt, welche jene Höhlen und Schläuche auskleiden, die an der äusseren Körperoberfläche münden. Sie setzen sich in alle Kanäle und Drüsenausführungsgänge fort, welche mit diesen zusammenhängen. Wenn man die Schleimhäute als Fortsetzungen der äusseren Haut betrachtet, so ist dieses nicht im einfachen Sinne des Wortes zu nehmen, denn die Schleimhäute entwickeln sich selbstständig, unabhängig von der äusseren Haut, und gehen nur in letztere an den Körperöffnungen über.

Die eigentliche Grundlage jeder Schleimhaut, welche sich in den feinsten Ausbreitungen derselben erhält, besteht aus einer sehr dünnen, structurlosen, höchstens etwas granulirten Grundlage (Henle, - die Basement Membrane der englischen Mikrologen), welche an ihrer äusseren Fläche mit einer verschieden dicken Schichte geformten Bindegewebes, und an ihrer inneren, der Höhle der Schleimhaut zugekehrten Fläche, mit einer Epithelialschichte zusammenhängt. Auf die Bindegewebschicht folgt eine noch zur Schleimhaut gehörige Schichte glatter Muskelfasern, mit queren und longitudinalen Verlauf. — An vielen Abschnitten von Schleimhäuten wird die structurlose Grundlage derselben durch stärkere Entwicklung der auf sie folgenden Bindegewebschichte verdrängt, und kommt nicht zur mikroskopischen Anschauung. In den letzten Verzweigungen der Drüsenausführungsgänge erhält sich dagegen nur die structurlose Grundlage der auskleidenden Schleimhaut. Nach Verschiedenheit der Organe, welchen eine Schleimhaut angehört, modificiren sich ihre mikroskopischen Eigenschaften verschiedentlich, wie in der speciellen Anatomie an seinem Orte erwähnt wird. Beispielsweise sei hier blos gesagt, dass die zur Schleimhaut gehörige Schichte glatter Muskelfasern in der Schleimhaut des Oesophagus eine überwiegende Entwicklung zeigt, so dass sie durch das Messer darstellbar wird (Wiener Museum), und in der Schleimhaut des unteren Mastdarmendes wird sie so erstaunlich dick, dass Kohlrausch sie jängst als einen besonderen Muskel besohrieb, den er Sustentator membranae mucosae nannte.

Alle Schleimhäute haben eine freie und eine angewachsene Fläche. Die freie Fläche ist mit einer Epithelialschichte bedeckt, deren Zellen an bestimmten Stellen sehr constante Eigenschasten haben (Pslaster-, Platten-, Cylinder-, Flimmerepithelium). Die angewachsene Fläche ist mittels Bindegewebe (Textus cellularis submucosus) entweder an Knochenwände (wie in den meisten Kopshöhlen), oder an ein Muskelstratum gehestet. Die Schleimhäute sind in weiten Schläuchen dicker, als in engen, besitzen mit wenig Ausnahmen zahlreiche Blutgefässe und Nerven, sind dehnbar, ohne besonders elastisch zu sein, müssen sich also, wenn der Kanal, den sie auskleiden, sich zusammenzieht, mehr weniger falten. Diese Falten sind von jenen zu unterscheiden, welche auch bei der grössten Ausdehnung des Kanals nicht verstreichen, und an gewissen Orten (z. B. im Dünndarme) so häutig sind, dass die Schleimhautsläche bedeutend grösser ist, als die Fläche des Schlauches, welche von ihr überzogen wird. Falten an Oeffnungen heissen Valvulae, - Falten im Verlause eines Schlauches Plicae, - Falten, welche brückenfürmig von einem Organe zum anderen gehen, Frenula s. Ligamenta mucosa.

Auf der freien Fläche der Schleimhäute zeigen sich zahlreiche Hervorragungen und Vertiefungen. Die ersteren sind entweder Warzen, Papillae, oder Flocken. Flocci, oder Zotten. Villi; die Vertiefungen erscheinen als grüssere Gruben. Forcolae, Lacunae, oder kleine, selbst mikroskopische Grübchen, die sich zu längeren oder kürzeren Kanälen ausziehen. Schleimdrüschen. Glandulae muciparae. In der speciellen Anatomie wird von diesen Gebilden am geeigneten Orte gesprochen. — Man unterscheidet drei Schleimhautsysteme, welche unter einander nicht ausammenhängen:

1. Das Systema gastro-pulmonale für die Verdauungs- und Athmungseingeweide. 2. das Systema uro-genitale für die Harn- und Geschlechtsorgane, und 3. das Schleimhautsystem der Brüste.

Mikroskopische Untersuchung. Die Structur der Schleimhäute wurde zuerst durch Heinle genauer erforscht. Das merkwürdigste Resultat seiner Untersuchungen ist, dass die Zellstoffschicht der Schleimhaut an vielen Stellen, wo sie bisher, den Begriffen der Continuitas membransrum zu Folge, angenommen wurde, fehlt, und nur die structurkese Schichte überg bleibt, wie in den Endstücken der Luftwege und vieler Brüsenausfährungsgänge. — Nimmt man ein Stück Barm. Idisst es etwas mocernen, um sein Epithelium abinischaben, und befestigt man es so auf einer schwarzen Wachs- oder Holztafel, dass es mit seiner freien uneren Fläche auf der Tafel aufliegt, so kann man die Jusseren Schichten successive so abtragen, dass nur die Schleinhaut bleibt. Wird dese nun abgenommen, und unter das Mikroskop gebracht, so überseugt man sich von der Zusammensetzung der Schleimhaut aus Bradegewichfabern, welche sich in allen Bichtungen kreuzen. — Die Bindegewichfabern

der Schleimhaut setzen sich in jene des Textus cellularis submucosus ununterbrochen fort.

Die Nerven der Schleimhäute stammen theils vom Cerebrospinalsystem, theils vom Sympathicus. Sie bilden in der Schleimhaut subtile Gesiechte, sogenannte Endplexus, von welchen sich einzelne Nervensäden in etwa vorhandene Warzen der Schleimhaut erheben, sich in denselben ein- oder mehrmal dichotomisch theilen, und sich dabei um das Doppelte verseinern. Wie sie endigen, ist nicht bekannt. Die srüher angenommenen Endschlingen existiren in keiner einzigen Schleimhaut. — Die Blutgestsse sind in der Schleimhaut des Verdauungssystems, der Nasenhöhle, der weiblichen Geschlechtstheile, der männlichen Harnröhre, der Bindehaut der Augenlider sehr zahlreich, und bilden reiche, engmaschige Capillargestssnetze. Die Capillargestsse der übrigen Schleimhäute sind schwächer an Kaliber, und ihre Netze so sein, dass Injectionen derselben weit schwieriger als im Verdauungskanal gelingen. In den Schleimhäuten der Nebenhöhlen des Geruchorgans ist mir die Füllung seingenetzter Capillargestsse noch niemals gelungen.

§. 80. Physiologische Eigenschaften der Schleimhäute.

Die am ersten in die Augen fallende Thätigkeit der Schleimhäute ist die Schleimabsonderung. Die Schleimabsonderung kommt nicht allein den Schleimdrüsen zu, sie findet auf der ganzen Fläche einer Schleimhaut statt, und viele für Schleimdrüsen gehaltene Drüschen secerniren ganz andere Stoffe als Schleim (z. B. die Magendrüsen). Der Auswurfsstoff, welchen man gewöhnlich Schleim, Mucus, nennt, ist ein Gemenge verschiedener Stoffe. Er wird aus Wasser, Epitheliumzellen, Schleimkörperchen (von welchen in der Anmerkung), zufälligen Beimischungen von Staub (in den Athmungsorganen), Speiseresten (im Verdauungssystem), und aus den specifischen Secreten der Schleimhäute, über welche er vor seiner Ausleerung hingleitete, und die er mechanisch mit sich führt, zusammengesetzt. Bei Reizungszuständen und Entzündungen der Schleimhäute ist das sehleimige Secret derselben reich an Eiterkügelchen: eiteriger Schleim, Materia puriformis. — Der Schleim ist eine graue, zähe, fadenziehende Masse, welche die freie Schleimhautsläche gegen äussere Einwirkungen in Schutz nimmt. Mit Lust in Berührung vertrocknet er, zum Theil schon innerhalb des Leibes an Stellen, wo Lust durchstreist, wie in der Nasenhöhle, wo er zu halbharten Krusten eingedickt wird. Wenn er krankhafter Weise in grösserer Menge abgesondert wird (Schleimfluss, Blennorrhoe, von Blervog Schleim, und δέω fliessen), ist er dünnflüssig; zuweilen, wie beim Schnupfen, wässerig. Der Schleim der Luströhre und des Kehlkopss erscheint im Auswurse gesunder Menschen als eine graue, schwarz gesprenkelte Masse, welche aus kleineren Klümpchen — dem Secrete der einzelnen Schleimdrüschen - zusammengeballt ist. Die chemische Analyse (Simon) lehrt eine gewisse Uebereinstimmung zwischen Schleim und Hornstoff.

Die Empfindlichkeit der Schleimhäute tritt an gewissen Stellen sehr scharf hervor, wird jedoch nur durch gewisse Reize hervorgerusen.

So ist weder die Schleimhaut der Harnröhre für die Säure des Harns, noch die Schleimhaut des Darmkanals für die scharfe Galle empfindlich, dagegen erregen Harn und Galle auf der Schleimhaut der Augenlider intensive Schmerzempfindung. Schleimhäute, welche vom Cerebrospinalsystem ihre Nerven erhalten, sind empfindlicher als jene, welche vom Sympathicus versorgt werden. So wird die gekaute Nahrung in der Mundhöhle und im Pharynx durch Vermittlung der hier vorhandenen Cerebrospinalnerven gefühlt, gleitet aber unbemerkt durch die Gedärme, welche mit sympathischen Nervenzweigen ausgestattet sind, und die schärfsten Gewürze, reizende Substanzen aller Art, Essig, Alkohol, Säuren, verhalten sich ebenso. Auf zwei Schleimhäuten wird die Sensibilität sogar zu einer specifischen Sinnesenergie gesteigert, zum Geschmack und zum Geruch. — Die Eingangsund Ausmündungshöhlen der Eingeweide (Atria) sind durchaus empfindlicher, als die entlegeneren Abtheilungen derselben. Die Nebenhöhlen der Nasenhöhle sind für Geruchseindrücke unempfindlich; ein fremder Körper im Kehlkopse erregt den hestigsten Reiz zum Husten, während er in den Luströhrenästen jahrelang verharren kann, ohne Beschwerde zu erregen. Die Einführung einer Sonde oder eines Schlundstossers erregt im Isthmus faucium Würg- und Brechbewegung; im Oesophagus wird sie nicht einmal gefühlt. Die Erregung der Empfindlichkeit in den Atrien der Schleimhautsysteme ist mit mehr weniger hestigen Reactionsbewegungen gewisser Muskeln begleitet, welche sich nur einstellen, wenn sie durch Empfindungsreize der betreffenden Schleimhaut herausgefordert wurden (Reflexbewegungen). Das Niessen, der Husten, das Erbrechen nach Kitzeln des Racheneinganges, die Schlingbewegung, die Samenejaculation, die Austreibung des Kothes und Harns, sind solche Reslexbewegungen.

Contractilität besitzen die Schleimhäute nur auf Rechnung der glatten Muskelfasern, mit welchen sie dotirt sind. Besässen sie selbst Contractilität, so würden sie sich nicht bei Verengerung ihrer Höhlen in Falten legen. Der leere Magen, die leere Harnblase und Harnröhre haben Schleimhautfalten, welche im vollen Zustande sehlen. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass die Schleimhäute ein gewisses, wenn auch sehr unvollkommenes Bestreben aussern, sich, wenn sie ausgedehnt wurden, wieder zusammenzuziehen. Dieses beruht jedoch nur auf der Elasticität ihres Gewebes. Pathologische Erscheinungen bestätigen ihr Dasein. Jede in Folge von Entzündungen verdickte Schleimhaut verliert dieses Vermögen, und hat sie es verloren, so kann sie nicht mehr dem Drucke entgegenwirken, welchen in einer Schleimhauthöhle angesammelte Flüssigkeiten auf sie ausüben. Sie wird vielmehr durch diesen Druck ausgebuchtet, durch die Maschen der Muskelgitter, welche sie von aussen bedecken, beutelförmig vorgedrängt, wodurch die sogenannten Diverticula entstehen, welche am häufigsten an den Harnblasen von Steinkranken und Säufern (nach vorausgegangenen Blasenentzündungen) beobachtet werden.

So lange Schleimhäute, welche sich mit ihren freien Flächen berühren,

mit Epithelium überzogen sind, kann ihre Berührung nie in eine Verwachsung übergehen. Der Schleim, welchen sie absondern, wirkt hier zugleich mit dem Epithelium als fremder Zwischenkörper, der den Coalitus ausschliesst. Ist aber das Epithelium verloren, und die Schleimhaut in einem kranken Zustande, der keine Regeneration desselben erlaubt (entzündet, verschwärt, in Eiterung begriffen), so können auch Schleimhautslächen ganz oder theilweise verwachsen. Das Ankylo- und Symblepharon, die Obliteration oder Verengerung eines Nasenloches nach Menschenblattern, der Lippen mit dem Zahnsleisch nach Geschwüren, die Stenosen des Oesophagus nach Vergistung durch Schweselsäure, des Mastdarms durch Ruhr, der Harnröhre und Scheide durch syphilitische Geschwüre, bestätigen das Gesagte.

Die Schleimhäute des Systema gastro-pulmonale und uro-genitale äussern, trotz ihrer gleichartigen Structur, wenig Sympathien für einander, und es ist nur ein Fall von Mitleidenschaft beider Systeme durch Civiale näher beleuchtet worden, nämlich die gastrischen Störungen, welche nach längerem Manövriren mit Steinzerbohrungsinstrumenten in den Harnwegen sich einzustellen pslegen. Dagegen sind einzelne Abschnitte desselben Systems in näherem Rapport. Die Zunge ändert z. B. ihr Aussehen bei gastrischen Leiden (lingua speculum primarum viarum), — die Bindehaut des Auges röthet sich bei Katarrhen der Nasenschleimhaut, — die Harnröhrenschleimhaut juckt bei Gegenwart eines Steines in der Harnblase, — öfteres Ziehen am männlichen Gliede bei Kindern ist dem Chirurgen ein sicheres Zeichen von Steinkrankheit, — Kitzel in der Nase, Niessen, und Asterzwang (Tenesmus) deuten auf Würmer im Darmkanale, und diese Gestühle werden zuweilen so hestig, dass Kinder instinctmässig mit den Fingern in der Nase und dem Aster herumbohren.

Substanzverluste der Schleimhaut werden, wenn sie blos oberflächlich waren, durch Regeneration der verlorenen Schleimhaut getilgt; tiefgehende Destructionen derselben, durch Verbrennung oder Geschwür, werden nur durch Narbengewebe ausgefüllt, welches, seiner Zusammenziehung wegen, Verengerung des betreffenden Schleimhautrohres setzt. Nur im Darmkanale erscheint an der Stelle, wo typhöse und atonische Geschwüre heilten, ein glänzendes, glattes Gewebe von serösem Ansehen, auf welchem sich selbst neue Darmzotten entwickeln sollen.

Noch eine physiologische Eigenschaft der Schleimhäute, welche wenig gewürdigt wurde, verdient Erwähnung. Ich will sie die respiratorische Thätigkeit derselben nennen. In jeder Schleimhaut, die mit der atmosphärischen Luft in Berührung steht, findet Oxydation des Blutes in den Capillargefässen statt, — daher ihre Röthe. Würde sie nicht vorhanden sein, so müsste die Farbe dieser Schleimhäute schwarzblau sein. Der Gefässreichthum allein ist nicht und kann nicht die Ursache der Röthe sein, da viele Schleimhäute eben so gefässreich sind, wie die Mund - oder Nasenschleimhaut, ohne so roth zu erscheinen, wie diese. Je mehr der Luftzu-

tritt zu einer Schleimhaut vermindert wird, desto mehr nimmt ihre Röthe ab. Daher ist der Scheideneingang, das Orificium der männlichen Harn-röhre lebhafter geröthet, als die Schleimhaut der Tubs Fallopiana, oder der Verlauf der Harnröhre. Schleimhäute, welche blass gefärbt sind, werden roth, sobald sie an die Atmosphäre kommen, wie die Vorfälle des Mastdarms, der Scheide, der widernatürliche After beweisen.

Schleimkörperchen sind, nebst den Epithelialzellen, die nie fehlenden Vorkommnisse im Schleime. Sie sind runde, ovale, seltener eckige, granulirte, scheinbar solide Körperchen, von durchschnittlich 0,005" Durchmesser. Durch Einwirkung von Wasser wird Kern und Hülle deutlich. Durch Behandlung mit Essigsäure löst sich die Hülle auf, und der Kern zerfällt in 2—4 kleinere Körner von 0,001" Durchmesser. Sie verhalten sich also wie Eiter- und Lymphkörperchen, und sind, wie diese, Ansänge von Zellenbildungen, welche wahrscheinlich auf der Schleimhaut hasteten, und unreif abgestossen wurden.

Literatur. Billard, de la membrane gastro-intestinale dans l'état sain et dans l'état d'inflammation. Paris, 1825. — Rousseau, des différents aspects que présente la membrane gastro-intestinale. Arch. gén. de méd. Tom. VI. — Vogel, physiologisch-pathologische Untersuchungen über Eiter etc. Erlangen, 1838. — Henle, über Schleim- und Eiterbildung etc. Hufeland's Journal. 1838. — Ueber die Eigenschaften verschiedener Schleimhäute siehe die betreffenden Paragraphe der speciellen Anatomie.

§. 81. Drüsensystem. Anatomische Eigenschaften desselben.

Häutige Schläuche oder Bläschen, welche gewisse Stoffe aus dem Blute absondern, bilden das anatomische Element der Drüsen (Glandulge). Die Schläuche sind immer an einem Ende offen, und munden auf einer freien Hautsläche aus. Die Bläschen sind entweder offen, communiciren mit einem Ausführungsgange, und heissen in diesem Falle Acini, oder sie sind geschlossen (Folliculi clausi), und entleeren ihren Inhalt durch Berstung. oder lassen denselben durch ihre Wand hindurchsickern. In ihrem einfachsten Vorkommen bestehen die Drüsenschläuche und Drüsenbläschen aus einer einfachen, structurlosen Grundmembran, welche bei höherer Entwicklung einen faserigen Charakter annehmen kann. Bleibt der Drüsenschlauch einfach und unverästelt, so heisst die Drüse tubulös; — gruppiren sich aber um den Schlauch Drüsenbläschen, welche sich in ihn öffnen. so wird die Drüse acinos oder traubenformig genannt. tubulöse Drüsen sind meist nur Gegenstand mikroskopischer Anschauung; - acinose Drüsen können auch einfach bleiben, d. h. einen unverästelten Ausführungsgang besitzen (z. B. Talgdrüsen, Meibom'sche Drüsen), oder es verbinden sich viele einfache acinose Drüsen zu einer mehr weniger zusammengesetzten, welche einen baumförmig verästelten Ausführungsgang besitzen wird, und eine bedeutende Grösse erreicht. Solche Drüsen erscheinen dann entweder als gerundete, mehr weniger glatte, oder aus Lappen ausammengesetzte, mit Furchen und Einschnitten (Grenzen der Lappen) versehene Massen, welche von einer bindegewebigen, fibrösen, oder serösen Hüllungsmembran umgeben, und in ihrer Lage besestigt werden. Ihr Ausführungsgang bildet einen langgezogenen, aus Bindegewebe bestehenden, häufig mit glatten Muskelfasern verschenen und vielfach verästelten Kanal. Das Bindegewebe einer Drüse, welches den Ausführungsgang der Drüse und seine Verästlungen umgiebt, und mit ihnen zusammen das sogenannte Parenchym der Drüse bildet, ist sehr gefässreich. Die Blutgefässe betreten die Drüse entweder an einem, oder an mehreren Punkten. Ersteres ist bei mehr compacten Drüsen mit glatter Obersläche, welche nur einen Einschnitt besitzen, letzteres bei Drüsen mit mehreren Einschnitten und mit gelappter Oberstäche der Fall. Die Blutgesässe umspinnen mit ihren Capillarnetzen die Verzweigungen der Ausführungsgänge, und liesern den Stoff (Plasma sanguinis), der durch die Lebensthätigkeit der Drüse umgearbeitet, und als bestimmte Secretionsslüssigkeit, Speichel, Galle, Magensaft etc., zum Vorschein kommen soll. Die Lymphgefässe der Drüsen sind noch nicht genau bekannt, ebensowenig als die letzten Verzweigungen ihrer Nerven. Die Nerven der Drüsen begleiten die Blutgefässe und die Ausführungsgänge, welche sie mit Geslechten umgürten. In der Niere und Leber halten sie sich mehr an die Blutgefässe, in den Speicheldrüsen mehr an die Ausführungsgänge. Sie sind sensitiver und motorischer Natur. und stammen aus dem Cerebrospinal- und sympathischen Nervensysteme, so dass in verschiedenen Drüsen bald das eine, bald das andere System die Oberhand behält.

Ueber die chemische Zusammensetzung der Drüsen lässt sich im Allgemeinen nichts sagen, da die Materialien verschiedener Drüsen sehr verschieden sind, und die chemische Analyse Einer Drüse eine Menge von Educten liefert, von welchen man nicht weiss, welchen anatomischen Bestandtheilen der Drüse, Bindegewebe, Gefässen, Nerven, Ausführungsgängen etc., sie angehörten.

Da alle Drüsenausführungsgänge auf der äusseren Haut oder den inneren Schleimhäuten münden, so mag die Vorstellung immerhin beibehalten werden, als seien sie Ein- oder Ausstülpungen dieser Häute; nur ist die Sache nicht im genetischen Sinne zu nehmen, da nach den Ergebnissen der Entwicklungsgeschichte, die Verästlungen eines Ausführungsganges nicht als röhrige Auswüchse einer Haut entstehen.

Die letzten Ramisscationen der Aussührungsgänge stehen mit dem Capillargesässsysteme nirgends in Anastomose, sie sind vielmehr vollkommen unabhängig, und enden auf dreisache Weise: α . als abgerundete, blindsackförmig geschlossene Kanälchen, β . als bläschensörmige Erweiterungen der Kanälchen, — Endsäckehen, Endbläschen, Vesiculae terminales, γ . als netzsörmige Anastomosen mehrerer Kanälchen unter einander. Bei einigen Drüsen sind sie noch nicht mit völliger Sicherheit bekannt (Leber).

Die Verästlungen und der Stamm eines Ausführungsganges besitzen an ihrer inneren Oberstäche eine Epitheliumschichte, welche in den Stäm-

men aus mehrfachen Lagern von Zellen (geschichtetes Pflaster-Epithelium), in den feineren Verästlungen aus einer einfachen Zellenschicht besteht.

Ursprünglich hiessen nur kleine, oliven – oder eichelförmige Drüsen: Glandulae (d. i. Eichelchen), gleichviel ob sie Ausführungsgänge haben, oder nicht. So sind denn mehrere Organe damals in die Sippe der Drüsen aufgenommen worden, welche es unseren gegenwärtigen Begriffen zusolge nicht mehr sein können, z. B. Glandula pinealis, pituitaria cerebri; und umgekehrt wurden, durch die Aussindung der Aussührungsgänge, viele Organe den Drüsen einverleibt, über deren Bedeutung und Verrichtung man früher keine Vorstellung hatte, und ihnen deshalb Namen gab, welche nur ihre Lage ausdrücken, Parotis, Parastata, Paristhmia (Mandeln).

§. 82. Eintheilung der Drüsen.

Jede Drüseneintheilung hat etwas Gezwungenes, und eine von allen Histologen aufgestellte Abtheilung, welche den Namen der Glandulae spuriae s. dubiae führt, wohin die sogenannten Drüsen ohne Ausführungsgänge (Milz, Schilddrüse, Thymus, Nebennieren, und der vordere Lappen der Hypophysis cerebri, über deren Structur nicht hier, sondern in der speciellen Anatomie gehandelt wird) gehören, ist eben kein logischer Vorzug des künstlichen Drüsensystems. Uebergänge einer Drüsenform in eine andere kommen auch so häufig vor, dass es für einzelne Drüsen immer schwer bleiben wird, ihnen einen Platz im Systeme anzuweisen. Was mit der Leber zu machen ist, weiss ich nicht.

Die Form und das Ende des Ausführungsganges geben den Anhaltspunkt ab, die Drüsen zu classificiren.

Man unterscheidet einfache und zusammengesetzte Drüsen.

- A) Einfache Drüsen. Sie bestehen nur aus einem einfachen Drüsenelemente, Schlauch oder Bläschen, und zerfallen somit in:
- a. schlauchförmige (oder tubulöse) Drüsen. Hieher gehören die Schweissdrüsen, Ohrenschmalzdrüsen, die Drüsen der Gebärmutterschleimhaut, die Pepsin- und die Lieberkühn'schen Drüsen.
- b. Geschlossene Follikel, d. i. häutige, aus Bindegewebe bestehende, mit Epithelium ausgekleidete Bläschen, welche entweder solitär, oder in Gruppen vereinigt vorkommen, und, um ihren Inhalt zu entleeren, entweder bersten müssen (Graaf'scher Follikel, Ovula Nabothi des Gebärmutterhalses), oder denselben durch ihre Wand hindurchtreten lassen (solitäre Follikel des Magens und Darmes, Peyersche Drüsen des Darmkanels). Die grossen Balgdrüsen der Zungenwurzel, des Rachens, und der Mandeln enthalten gleichfalls in ihren Wandungen eine Anzahl geschlossene Follikel.
- c. Einfache traubenförmige Drüsen, bei denen ein unverästelter Ausführungsgang mit einer einfachen Gruppe von Drüsenbläschen zusammenhängt. Hieher gehören die Schleimdrüsen, die Talgdrüsen, und die Meibom'schen Drüsen.

- B) Zusammengesetzte Drüsen. Sie bestehen aus einem Systeme verzweigter Ausführungsgänge, deren letzte Enden entweder mit seitlichen Endbläschen (Acini) besetzt sind, und im gefüllten Zustande traubig erscheinen, oder Netze bilden, welche die Lücken der Capillargefässe ausfüllen. Jede Ausbuchtung eines traubigen Kanalendes ist gewissermassen als einfaches Drüsenbläschen und darum jede zusammengesetzte Drüse als ein Conglomerat vieler einfacher zu betrachten. Man nennt sie deshalb auch Glandulas conglomeratas. Unterarten derselben sind:
- a. Glandulae acinosae. Sie bestehen aus mehreren, ja vielen Lappen, und jeder Lappen aus Acini (Speicheldrüsen, Milchdrüsen, Thränendrüsen). Die Drüsenkanälchen benachbarter Läppchen gehen in grössere Kanäle, und diese nach wiederholter Verbindung in den Hauptkanal oder Ausführungsgang über. Sie werden deshalb auch Drüsen mit baumförmig verzweigtem Ausführungsgange genannt. Die Ausführungsgänge der acinösen Drüsen vereinigen sich entweder zu einem einzigen, oder die Vereinigung bleibt unvollkommen, und es existiren mehrere, getrennt mündende Ausführungsgänge, was in der Thränen- und Vorsteherdrüse der Fall ist.
- b. Glandulae tubulosae. Dem Wortsinne nach sind auch die Drüsen mit baumförmig verzweigtem Ausführungsgange Glandulae tubulosae, indem sie aus verzweigten Röhren bestehen. Im engeren Sinne dagegen werden zu den Glandulis tubulosis nur jene gerechnet, bei welchen die Drüsenkanälchen weniger durch Astbildung, als durch ihre Länge ausgezeichnet sind. Die langen Drüsenkanäle (Röhrchen) verlaufen entweder gerade, oder in vielfachen Krümmungen. Auch gerade Drüsenkanälchen müssen sich zuletzt krümmen und schlängeln, um in dem beengten Raume, welchen der Körper einer Drüse darbietet, eine bedeutende Länge erreichen zu können. Man zählt zu diesen Drüsen die Nieren und die Hoden. — Um den Unterschied zwischen den acinösen und tubulösen Drüsen einsichtlich zu machen, sei gesagt, dass der Ausführungsgang einer acinösen Drüse, bevor er sein blindes Ende erreicht, sich successiv in zahllose kurze Zweige spaltet, während in den tubulösen die Spaltung ungleich seltener erfolgt, und die langgezogenen Spaltungsäste entweder Endschlingen (Hoden), oder aber Endbläschen bilden (Nieren).

Wenn die in der speciellen Anatomie gegebenen Beschreibungen der einzelnen Drüsen bekannt geworden sind, wird es dem Anfänger leicht sein, sich ein umfassendes Schema zu construiren, dessen Hauptrubriken hier blos angegeben wurden.

Die Lymphdrüsen gehören eben so wenig als die sogenannten Glandulae spuriae (Milz, Schilddrüse, Nebenniere, Thymusdrüse) zu den wahren Drüsen; stehen ihnen jedoch viel näher als letztere, da man die aus ihnen tretenden Lymphgefässe als ihre Ausführungsgänge betrachten kann. —

Mikroskopische Behandlung. Man studirt den Bau der Drüsenkanälchen am besten an solchen Drüsen, wo sie in dichten Bündeln oder Knäueln, ohne viel Zwischensubstanz, beisammenliegen, wie im Hoden und in der Niere. Die organischen Muskelfasern sind in den meisten Drüsenausführungsgängen als an beiden Enden zugespitzte, mit aufsitzenden länglich runden Kernen versehene Faserzellen nicht schwer zu erkennen. Die Epithelialschicht erscheint am deutlichsten an feinen, mit dem Doppelmesser bereiteten Querschnitten der Lustwege des Lungenparenchyms, oder rings um die Mündungen der Drüsen des Darmkanals (§. 232). Die structurlose Grundmembran liegt unmittelbar unter dem Epithelium. Die äussere Umhüllungshaut der Hauptausführungsgänge ist eine mit elastischen Fasern gemischte Bindegewebshaut.

Die Anordnung der letzten Enden, oder vielmehr der ersten Ansange der Drüsenkanälchen, und die dreierlei Formen derselben, werden am besten nach vorausgegangenen Injectionen derselben mikroskopisch examinirt. Es gehört sehr viel Gewandtheit in mikroskopischen Arbeiten dazu, sie auch im nicht injicirten Zustande zu erkennen. Die so häufig gebrauchten Quecksilber-Injectionen geben nur zu oft ungenügende Aufschlüsse, indem entweder das flüssige Metall, nachdem es die langen und gewundenen Kanälchen durchlaufen hat, bei der angewendeten Druckgrösse nicht bis in die letzten Enden vordringt, oder durch sein Gewicht, und durch Steigerung des Injectionsdruckes, die feinen Kanälchen zersprengt, und in die Zellgewebräume oder in andere Kanale (Blutgefasse) sich gewaltsame Bahn bricht. Anfullung mit flüssigen und später erhärtenden Injectionsstoffen, wozu man sich nicht des momentanen und gar nicht zu regulirenden Spritzendruckes bedient, sondern das durch sein Gewicht eingedrungene Fluidum durch Fingerdruck oder Blasen langsam weiter befürdert, werden selten eines gewiinschten Erfolges ent-Injectionen lehren jedoch nur die Form der Drüsenkanäle, nicht ihre Structur kennen. Um letztere zu studiren, müssen sehr schwierige und subtile Präparationen vorgenommen, oder Durchschnitte kunstlich gehärteten Drüsengewebes gemacht werden.

§. 83. Physiologische Eigenschaften der Drüsen.

Der in den Drüsen stattfindende Vorgang, durch welchen aus dem Blute neue Flüssigkeiten gebildet werden, heisst Absonderung, Secretio. Die Leitung der secernirten Flüssigkeiten zu ihren Bestimmungsorten durch die Aussührungskanäle, ist die Aussonderung, Excretio. Nach anderen Begriffen (J. Müller) wäre Secretio die Bildung neuer Flüssigkeiten aus dem Blute, deren Stoffe als solche im Blute nicht präexistiren, z. B. Secretion des Samens; Excretio dagegen die Absonderung von Flüssigkeiten, deren charakteristische Mischungsbestandtheile als solche schon im Blute vorgebildet sind, und von ihm getrennt werden müssen, z. B. Galle- und Harnabsonderung.

Jede freie Fläche einer Membran sondert ab, und jedes kleinste Theilchen irgend eines Gewebes kann nur dann leben und sich nähren, wenn ihm Ernährungsstoffe dargeboten werden, welche alle aus dem Blute abgesondert werden. Die Permeabilität der Gefässwandungen ist somit nothwendige Bedingung der Ernährung und der Secretion. Bei der Ernährung

brauchen jedoch die flüssigen Bestandtheile des Blutes nur aus den Gefisswandungen herauszutreten (Exosmosis), um ihren Nutritionszweck zu erfüllen, bei der Secretion dagegen müssen die Stoffe, welche durch Exosmosis aus den Capillargefässen traten, neuerdings die Wand von Drüsenkanälchen oder Drüsenzellen durchdringen, um in den Höhlen derselben als Secreta zu erscheinen (Endosmosis). Würden alle Secreta aus Stoffen bestehen, welche im Blute vorräthig sind, so könnte man sich die Secretion als eine Art Seihungsprocess denken, für welchen die Wände der Capillargesässe und der Drüsenkanälchen doppelte Filtrirapparate wären. Die alte Medicin hatte diese rohe Ansicht von allen Secretionen, und nannte deshalb die Drüsen: Colatoria (colare, durchseihen). Die Gegenwart von so vielen Mischungsbestandtheilen der Secrete, welche im Blute nicht vorkommen, heisst diese mechanische Vorstellung aufgeben, obwohl sie keine bessere an ihre Stelle setzt. Wir sind gezwungen anzunehmen, dass die Bestandtheile des Blutes, während sie durch die doppelten Filtra gehen, solche chemische Veränderungen erleiden, welche ihnen den Charakter des neuen Secretionssluidum geben, aber worin diese Veränderung bestehe, und wie es mit ihr hergehe, ist durchaus unbekannt. Die genauesten Kenntnisse, die wir von dem Baue so vieler Drüsen haben, konnten und werden uns nie hierüber Außschluss geben, um so weniger, als gleichgebaute Drüsen häufig sehr verschiedene Secrete liesern, wie die Speichel- und Milchdrüsen. Dass die Epithelialzellen der Drüsenkanälchen beim Secretionsprocesse betheiligt seien, vielleicht Stoffe in ihren Höhlen bilden, um sie, wenn sie fertig sind, durch Dehiscenz in die Höhle des Drüsenkanälchens zu entleeren, ist eine durch Henle und Goodsir angeregte Vermuthung, welche sehr wahrscheinlich ist. In der Leber scheint wenigstens die Gallenbereitung blos auf die sogenannten Leberzellen beschränkt zu sein, deren Verhältniss zu den Anfängen der Gallengefässe freilich noch nicht ausgemittelt ist. — Die chemische Umwandlung der Blutflüssigkeit, während des Durchströmens durch die Wand der Drüsenkanälchen, gewinnt an Bedeutung und Gewicht, wenn man bedenkt, dass der Eiweiss- und Faserstoffgehalt des Blutplasma ein sehr grosser ist. während in keinem normalen Secrete Faserstoff erscheint, und der Eiweissgehalt in allen Absonderungen geringer als im Blute ist.

Die Fortbewegung der secernirten Flüssigkeiten in den Ausführungsgängen ist theils eine nothwendige Folge des Offenseins der letzteren nach einer Richtung hin, theils eine Wirkung der Contractilität der Kanalwandungen, welche durch mikroskopische Untersuchungen, und durch physiologische Experimente constatirt ist. Gallen-, Harn-, Samenwege zeigen, wenn sie gereizt werden, sogar wurmförmige Bewegungen. Keine Drüse liegt in einer vollkommen harten Knochenkapsel, ihre Umgebung besteht vielmehr aus mehr weniger beweglichen Organen, welche durch ihre Verschiebung auf die Drüse drücken, und somit ebenfalls ein thätiges Excretionsmoment abgeben. Bei den Speicheldrüsen, welche von den Kaumus-

keln, bei den Darmdrüsen, welche durch die wurmförmige Bewegung der Gedärme gedrückt und dadurch entleert werden, ist dieser mechanische Umstand in die Augen springend. Die Abschüssigkeit der Ausführungsgänge, und besondere Krümmungen derselben, erleichtern ebenfalls die Fortbewegung des Secretes. Die korkzieherartige Krümmung der Schweissdrüsen ist offenbar hierauf berechnet, da sie dadurch den Bewegungsweg in eine lange schiefe Ebene umwandelt, welcher leichter zurückgelegt wird, als ein gerade ansteigender.

Viele Secrete haben keine weitere Verwendbarkeit im Organismus, und werden so bald als möglich entleert. Sie heissen Humores excrementitii (Harn, Schweiss). Andere werden nur gebildet, um zu gewissen Zwecken zu dienen. Sie heissen Humores inquilini. Diese Zwecke werden entweder noch innerhalb des Körpers erreicht, oder ausserhalb. Speichel und Magensaft wirken innerhalb, Milch und Same ausserhalb des Körpers. Erstere werden deshalb in den Anfang oder in den weiteren Verlauf eines Systems (Verdauungssystem) entleert, letztere nur in das Ende, oder direct an die Leibesobersläche abgeführt (Milch). — Es giebt auch Secrete gemischter Art, von welchen ein Theil noch verwendet wird, ein Theil aber Auswurfsstoff ist, z. B. die Galle, deren Harz- und Pigmentgehalt in den Fäces vorkommt, während die übrigen Bestandtheile derselben zur Dünndarmverdauung beitragen, und im Darmkanal wieder aufgesogen werden. - Die complicirte Structur der Drüsen, und ihre darauf basirte hochgestellte Lebensthätigkeit, machen sie zu sehr wichtigen Organen des thierischen Haus-Erhaltung der Individuen (Ernährung), und Erhaltung der Art (Fortpflanzung) ist an ihre Thätigkeit gebunden. Je grösser eine Drüse wird, und je mehr sie schon im Blute vorhandene Auswurfsstoffe absondert, desto wichtiger ist ihre Function, und desto gefährlicher ihr Erkranken. Unterbleiben der Nierensecretion führt zum gewissen Tode, und die unterbrochene Thätigkeit der Lunge setzt Erstickung, während beide Hoden ohne Nachtheil der Gesundheit eingebüsst werden können. - Sind Secretionsorgane paarig, und wird das eine durch Krankheit oder Verwundung in Stillstand versetzt, so übernimmt das andere das Geschäst seines Gefährten, und gewinnt in der Regel auch an Volumen und Gewicht. Jede gesteigerte Secretion, welche den Schaden gut macht, der durch das Unterbleiben einer anderen gesetzt werden könnte, heisst vicariirend. -Exstirpirte Drüsen werden nicht regenerirt.

Literatur. Hauptwerk: Müller, de glandularum secernentium structura penitiori etc. Lips., 1830, fol. Die blinden Enden der Drüsenkanäle und ihre Nichtanastomose mit den Capillargestssen wurde durch diese classische Arbeit constatirt. Der noch von Einigen angenommene Uebergang der Capillargestsse in die Anstinge der Ausstührungsgänge ist mit dem gegenwärtigen Zustande der Physiologie nicht mehr vereinbar. Wenn man, bei Injectionen der Capillargeste einer Drüse, den Injectionsstoff in die Drüsenkanäle übergehen sieht, die der Injectionsdruck meistens grüsser, als der Widerstand der

Capillargestsswände ist. H. Meckel, in Müller's Arch. 1846. Leydig, in der Zeitschrist sur wiss. Zool. 1850. — Henle, allgem. Anat., p. 889. — Valentin's Artikel "Absonderung" in Wagner's Handwörterbuche, Bruecke, de diffusione humorum per septa mortua et viva. Berol., 1842, und die schon oft citirten Gewebslehren enthalten das Wichtigste in anatomischer und physiologischer Beziehung.

§. 84. Gesetze der Absonderungen.

- 1. Das Quale oder Quantum einer Absonderung hängt von dem Blute und von dem Baue des Absonderungsorgans ab. Verschieden gebaute Drūsen können nie gleiche Secrete liefern. Je reicher das Blut an Secretionsstoffen ist, desto reichlicher werden diese in den Secreten erscheinen. Hat deshalb eine Drüse durch Erkrankung eine Zeitlang ihre secretorische Thätigkeit eingestellt, so häufen sich die Stoffe, welche durch sie hätten entleert werden sollen, im Blute an, und beginnt die Drüse später wieder ihren regelmässigen Geschäftsgang, so wird ihre Absonderung copiöser sein müssen. Hierauf beruhen die von den Aerzten sogenannten kritischen Ausleerungen. — Je dünner das Blutplasma ist, desto leichter wird dessen Exosmose und Endosmose. Die Secretionen werden deshalb durch alle Umstände vermehrt, welche eine grössere Verslüssigung der Blutmasse bedingen (Trinken, Baden). Dass die Secretionen in diesem Falle an ihren specifischen Stoffen nicht gehaltreicher werden, versteht sich von selbst. Eindickung des Blutes durch Wasserverlust mittelst Schweiss und copioser seröser Absonderungen', wird auf den Gang der Secretionen auf die entgegengesetzte Weise einwirken, also Verminderung derselben, und relatives Ueberwiegen der specifischen Secretionsstoffe herbeiführen. Bei Kranken, welche viel schwitzen und wenig trinken, ist der Harn wie eingedickt (Urina cruda).
- 2. Die Zahl, Weite, und Verlaufsrichtung der Capillargefässe einer Drüse haben insofern auf die Secretion Einfluss, als sie die Menge des Blutes, welches zur Absonderung dient, die Geschwindigkeit seiner Bewegung, und den Druck, unter welchem es strömt, bedingen. Drüsen, welche reich an weiten Capillargefässen sind, werden copiösere Absonderungsmengen liefern, und je gekrümmter der Verlauf der Capillargefässe ist, desto länger wird das Blut in der Drüse verweilen, und desto grösser wird auch der Druck sein müssen, der den Austritt seines Plasma bestimmt. Das blutgefässarme Parenchym des Hoden und der Vorsteherdrüse lässt keine reichlichen Secretionen erwarten, während der Reichthum an Capillargefässen, durch welchen sich die Leber, die Niere, die Speicheldrüsen auszeichnen, mit den grossen Secretionsmengen dieser Drüsen innig zusammenhängt. (Da zu jeder Drüsen verschiedene Stoffe entzogen werden, so kann die Mischung des venösen Blutes nicht in allen Drüsen dieselbe sein. Da dasselbe auch für

das Venenblut der verschiedenen Organe des thierischen Leibes gilt, deren jedes einzelne dem Blute nur solche Bestandtheile entzieht, welche es zu seiner individuellen Ernährung benöthigt, so ist begreiflich, dass in den Hauptstämmen des Venensystems sehr verschieden beschaffene Blutströme zusammenlaufen, welche gleichförmig gemischt werden müssen, bevor sie in die Lunge gebracht werden. Vermuthlich erklärt sich hieraus die stärkere Entwicklung der genetzten Muskelschichte der rechten Herzvorkammer, deren die linke, als Sammelplatz des gleichförmig gemischten arteriellen Lungenblutes, nicht bedurfte.) — Zu den meisten Secretionen wird nur arterielles Blut verwendet; die Theilnahme des venösen Blutes am Absonderungsgeschäfte ist beim Menschen nur in der Leber evident. — Unterbindung der zuführenden Arterie einer Drüse bedingt nothwendig Stillstand ihrer Function.

3. Alle Secretionen stehen unter dem Einflusse des Nervensystems. Wir kennen diesen Einfluss schon im Allgemeinen durch die tägliche Erfahrung, dass Gemüthsbewegungen und krankhaste Nervenzustände die Menge und Beschaffenheit der Absonderungen andern. Es ist bekannt, dass Aerger einer Säugenden, durch die veränderte Beschaffenheit der Milch, dem Säuglinge Bauchzwicken und Abweichen zuziehen kann, und ebenso, dass Furcht oder ängstliche Spannung des Gemüths die Harnsecretion, Appetit die Speichelsecretion, wollüstige Vorstellungen die Absonderung der Geschlechtsfitssigkeit vermehren. - Besondere Nervenerregungen wirken auf besondere Drüsen. der Zorn auf die Leber, die Geilheit auf die Hoden, Furcht auf die Nieren, Appetit auf die Speicheldrüsen, Trauer auf die Thränendrüse. während Heiterkeit und Frohsinn, wie sie der Wein erzeugt, auf alle Secretionen bethätigend einwirken. In letzterer Hinsicht ist noch der Alkoholgehalt des Blutes ein besonderer Reiz für die einzelnen Secretionsorgane, denn alle Reize steigern die organischen Thätigkeiten. Wie so Gemüthsbewegungen eine plötzliche qualitative Aenderung der Secreta, und schädliche, ja gistige Eigenschasten derselben setzen können, liegt jenseits aller Vermuthungen. Die quantitativen Aenderungen der Secretionen, Vermehrung und Verminderung, oder Unterdrückung, sind leichter erklärbar. wenn man bedenkt, dass die Porosität der Gefässwandungen, und die auf ihr beruhende Möglichkeit des Durchschwitzens, von dem Einflusse der motorischen Drüsennerven abhängt. Da die Ganglien, welche Nerven zu den Drüsen schicken, wie früher gezeigt wurde, durch die in ihnen entspringenden Nervensasern als selbstständige Nervencentra der Drüsen gelten, so werden die Erfahrungen erklärbar, laut welchen, nach Zerstörung des Cerebrospinalsystems bei Thieren, die Secretionen, wenn auch vermindert, noch fortdauerten (Bidder, Valentin, Volkmann). - Im Leben sind die Häute, also auch die Drüsenkanälchen, nur für bestimmte Stoffe permeabel, nach dem Tode schwitzt Alles durch, was im Wasser löslich ist. Einen guten Beleg hiefür liefert die Gallenblase, welche im lebenden Thiere ihren Inhalt nicht durch Exosmose austreten lässt, während im Cadaver die ganze Umgebung derselben, Bauchfell, Darmkanal, Netz, gelb getränkt wird.

- 4. Jede Reizung vermehrt den Blutandrang zur Drüse (ubi stimulus, ibi congestio) und dadurch ihre Absonderung. Wird der Blutandrang bis zur Entzündung gesteigert, welche die Capillargefässe durch Blutcoagula verstopst, so muss die Secretion in dieser Drüse unterbleiben. Findet sich eine andere Druse van gleichem Baue vor, so kann sie vicariirend wirken. Wird die Gallenbereitung in der Leber unterbrochen, so kann der im Blutplasma aufgelöste Farbestoff der Galle in allen übrigen Geweben, welche ihrer Ernährung wegen mit Blutplasma getränkt werden, zum Vorschein kommen, und Gelbsucht entstehen, so wie, nach Unterbrechung der Harnsecretion, die Schweiss- und Serumbildung den urinösen Charakter, der schon durch den Geruch erkennbar ist, annehmen. Wirkt die Steigerung Einer Secretion vermindernd auf eine andere ein, so sagt man, beide stehen in einem antagonistischen Verhältnisse. So wird die Milchsecretion durch vermehrte Darmabsonderung (Diarrhöe), die Harnsecretion durch Schweiss, die Serumausschwitzung im Zellgewebe (Wassersucht) durch urintreibende Mittel vermindert, und die ärztliche Behandlung so vieler Absonderungskrankheiten geht von dem Antagonismus der Secretionen als oberstem Principe aus.
- 5. Die Absonderung findet nicht blos in den blinden Enden der baumförmig ramificirten Ausführungsgänge statt, sie ist an der ganzen inneren Obersläche des verzweigten Aussührungsganges thätig. - Die Secrete erleiden während ihrer Weiterbeförderung durch die Ausführungsgänge eine Veränderung ihrer Mischung, die zunächst als Eindickung oder Concentration erscheint. In den Nieren tritt dieses am deutlichsten hervor, da der Harn um so concentrirter wird, je näher er der für ihn bestimmten Ausfuhrsröhre kommt. Ebenso ist der Same der Samenbläschen dicker als jener der Hodenkanälchen, in welchen sich noch keine Samenthierchen vorfinden. - Viele Drüsen, welche fortwährend absondern, haben an ihren Hauptausführungsgängen grössere Reservoirs angebracht, in welchen die abgesonderten Flüssigkeiten entweder blos bis zur Ausleerungszeit aufbewahrt, oder auch durch Absorption ihrer wässerigen Bestandtheile, und durch Hinzufügung der Absonderungen des Reservoirs selbst, in ihrer Zusammensetzung verändert werden (Gallenblase, Samenblase, Harnblase). Wird die Aussonderung des Secretes längere Zeit unterlassen, so sind die Drüsenkanāle damit überfüllt, und es kann keine fernere Absonderung vor sich gehen. — Langer Secretionsstillstand hebt die Absonderungsfähigkeit der Drüse ganz und gar auf, wie im Gegentheile häufigere naturgemässe Entleerungen derselben ihre secretorische Thätigkeit durch Uebung stärken. So kann das anfangs einem gesunden Menschen gewiss schwer fallende Gelübde der Keuschheit, mit der Zeit leicht zu halten sein, während andererseits häufige Begattung eine Gewohnheit, und wohl eine Nothwendigkeit werden kann. - Krankhaste Vermehrung der Absonderung kann auf zwei-

fache Weise bedingt sein, durch Reizung, oder durch örtliche Schwäche (Atonie, Lähmung der Drüsenkanälchen). Im ersten Falle wird das Secret keine Mischungsänderung erleiden, im zweiten dagegen werden seine wässerigen Bestandtheile prävaliren. So ist häufiges Schwitzen Folge örtlicher Schwäche, und die Mischung aller krankhaften Profluvien (Samen-, Speichel-, Schleimflüsse etc.) ist arm an plastischen, reich an wässerigen Bestandtheilen. — Bei Krankheiten, welche mit Abzehrung, allgemeinem Verfalle, und Entmischung der Blutmasse einhergehen, können alle Secretionen zugleich profus und wässerig werden. Ein solennes Beispiel davon giebt die Lungensucht mit ihren erschöpfenden Schweissen, Durchfällen, und örtlichen Wassersuchten.

ZWEITES BUCH.

Vereinigte Knochen- und Bänderlehre.



§. 85. Object der Knochen- und Bänderlehre.

Die vereinigte Knochen- und Bänderlehre, Osteo-Syndesmologia, beschäftigt sich mit der Beschreibung der Knochen, und der sie zu einem beweglichen Ganzen — Skelet — vereinigenden organischen Bindungsmittel, der Bänder. Ihr Object ist das natürliche Skelet (Sceleton naturale), zum Unterschiede vom künstlichen (Sceleton artificiale), dessen Knochen nicht durch natürliche Bänder, sondern durch beliebig gewählte Ersatzmittel derselben, Draht, Leder- oder Kautschukstreisen, mit einander verbunden sind. Da weder die Knochen, noch die sie vereinigenden Bänder, einer selbsthätigen Bewegung sähig sind, und sie nur durch die von aussen her auf sie wirkenden Muskelkräste veranlasst werden, aus dem Zustande des Gleichgewichtes zu treten, so können sie auch als passive Bewegungsorgane ausgesasst werden.

Die im gewöhnlichen Leben übliche Bezeichnung der Hauptformbestandtheile des menschlichen Leibes: als Kopf, Rumpf, obere und untere Gliedmassen, ist auch in die Wissenschaft übergegangen, welche von den Knochen des Kopfes, des Rumpfes, der oberen und unteren Gliedmassen, als Hauptabtheilungen des Skelets, handelt.

Die Gesammtzahl der Knochen beträgt, mit Einschluss der Zähne und Gehörknöchelchen, aber ohne Sesambeine, 240. Ein alter Gedächtnissvers giebt sie auf 228 an:

"Ossibus ex denis, bis contenisque novenis "Constat homo."

Das Wort Skelet stammt nicht von $\sigma x \ell \lambda \lambda \omega$ (austrocknen), wie man im Sinne des Plutarch annahm (sole aridum et exsiccatum cadaver, welches die Aegypter bei ihren Festgelagen, als Sinnbild der Vergänglichkeit, aufstellten, und mit dem Rufe begrüssten: edite bibite, — post mortem tales eritis), sondern von $\sigma x \ell \lambda \sigma \varsigma$, Schenkelbein, welches dem Ganzen, als der grösste Bestandtheil desselben, seinen Namen gab. Daher ist es richtiger Skelet, anstatt Skellet oder Skelett zu schreiben.

A. Kopfknochen.

§. 86. Eintheilung der Kopsknochen.

Die Grösse und Gestalt des Kopfes — der wahren Hauptsache der Osteologie — wird durch den Zusammentritt von 21 Knochen bedingt, welche, mit Ausnahme eines einzigen — des Unterkiefers — fest und unbeweglich zusammenpassen, und, weils sie grösstentheils in die Kategorie der breiten und flachen Knochen gehören, die Wandungen von Höhlen bilden, die zur Aufnahme des Gehirns und der Sinnesorgane dienen. Es ergiebt sich schon hieraus die Eintheilung des Kopfes in den Hirnschädel oder die Hirnschale (Cranium, calvaria, olla capitis, theca cerebri), und in das Gesicht (Facies). Ersterer wird durch 7 Schädelknochen (Ossa cranii), letzteres durch 14 Gesichtsknochen (Ossa faciei) gebildet, welche Unterscheidung mehr praktisch geläufig, als wissenschaftlich ist, indem gewisse Schädelknochen auch an der Zusammensetzung des Gesichtes Theil nehmen, und einer derselben — das Siebbein — mit Ausschluss eines sehr kleinen Theiles seiner Oberfläche, ganz dem Gesichte angehört.

Calvaria stammt von calvus, der Glätte des Schädeldaches wegen.

a) Schädelknochen.

§. 87. Allgemeine Eigenschaften der Schädelknochen.

Man unterscheidet am Schädel das Schädeldach und den Schädelgrund (Fornix und Basis cranii), welche beide, als hohle, mehr weniger unregelmässige und oblonge Halbkugeln, das knöcherne Gehäuse für das Gehirn zusammensetzen. Die Schädelknochen werden in die paarigen und unpaarigen eingetheilt. Erstere — die Scheitelbeine und Schläfebeine — liegen symmetrisch rechts und links von der verticalen Durchschnittsebene des Schädels, und bilden den grössten Theil der oberen und seitlichen Wand desselben; letztere — das Grundbein, Stirnbein, und Siebbein — bilden die hintere, die vordere, und die untere Wand des Schädels.

Die paarigen Schädelknochen erzeugen durch ihre Vereinigung einen, von einer Seite zur anderen über den Scheitel weggehenden Bogen, dessen Concavität nach unten sieht. Die unpaarigen setzen dagegen einen von vorn nach hinten unter der Schädelhöhle laufenden Bogen zusammen, dessen Concavität nach oben gerichtet ist. Beide Bogen schliessen durch ihr Ineinandergreifen die Schädelhöhle vollkommen ab, und bilden die ovale Schale derselben Hirnschale). Jedes Stück dieser Schale, oder jeder Schädelknochen, wird somit einen convex-concaven, breiten Knochen darstellen, dessen convexe Fläche nach aussen, dessen concave Fläche nach dem Gehirne sieht. Beide Flächen laufen selten parellel, wodurch die Dicke eines Schädelknochens an verschiedenen Querschnitten ungleich ausfällt. An allen

Schädelknochen, deren Substanz sich an bestimmten Stellen zu Höckern (Tubera) verdickt, entsprechen letztere den ersten Ablagerungsstellen von Knochenerde im embryonischen Leben (Puncta ossificationis). Die Höcker werden deshalb von den englischen Anatomen passend Processus primigenii genannt.

Jeder Knochen der Hirnschale besteht aus zwei dichten, durch Einschub schwammiger Knochenmasse - Diploë - getrennten Platten oder Tafeln, deren aussere, dickere, die gewöhnlichen Merkmale compacter Knochensubstanz besitzt; deren innere, dünnere, und an Knochenknorpel ärmere. ihrer Sprödigkeit und dadurch bedingten leichteren Brüchigkeit wegen, den bezeichnenden Namen der Glastafel, Tabula vitrea, erhielt. Die Diploë der Schädelknochen ist wohl den Markhöhlen langröhriger Knochen analog, enthält aber nicht, wie diese, consistentes Mark, sondern ein dunnes, mit Fetttröpschen gemischtes Fluidum, welches von vielen Blutgesässen. Venae diploëticae, durchzogen wird, und deshalb roth tingirt erscheint. Die Diploë ist arm an Arterien, aber sehr reich an weitmaschigen Venennetzen. Die Venen der Diploë sammeln sich zu grösseren Stämmen, welche in besonderen, baumsormig verzweigten Knochenkanälen der Diploë, Canales Brescheti, verlaufen, und zuletzt die aussere oder innere Tafel des Knochens durchbohren, um in benachbarte äussere oder innere Venenstämme einzumunden. An jenen Theilen des Schädels, welche nur von wenig Weichtheilen bedeckt werden, wie am Schädeldache, stehen die beiden Tafeln der Schädelknochen, wegen stärkerer Entwicklung der Diploë, weiter von einander ab, und sind auch absolut dicker, als an jenen Stellen, welche durch Muskellager bedeckt, und dadurch vor Verletzungen geschützt werden: Schläsen- und untere Hinterhauptgegend. Hier wird die Diploë sogar durch die bis zur Berührung gesteigerte Annäherung beider Taseln gänzlich ausgeschlossen, und letztere überdies so verdünnt, dass der Knochen durchscheinend wird. Auch bei jenen Wänden der Schädelhöhle, welche diese von anstossenden Höhlen des Gesichts, den Augenhöhlen und der Nasenhöhle, trennen, tritt aus gleichem Grunde eine bedeutende Verdünnung derselben auf. — Die Verbindungsränder der Schädelknochen sind entweder mit dendritischen Zacken besetzt, durch deren Ineinandergreisen eine wahre Nath, Sutura vera s. Syntaxis serrata, entsteht, oder scharf auslaufend, zum wechselseitigen Uebereinanderschieben, Sutura spuria s. squamosa, oder rauh und uneben, um dem sie verbindenden Zwischenknorpel eine grössere Insertionssiäche darzubieten, Symphysis. - Nur die äussere Fläche der Schädelknochen wird von einer wahren Beinhaut — Pericranium überzogen, welche über die Näthe oberflächlich weggeht, faserige Verlängerungen in dieselben hineinsenkt, und deshalb von ihnen schwer abzuziehen ist. Sie hat bei der Entwicklung einzelner Schädelknochen einen höchst wichtigen Antheil. An der inneren Fläche des Schädels sehlt sie, und wird durch die harte Hirnhaut vertreten.

Da das Gehirn die Schädelhöhle vollkommen aussult, so müssen die

an seiner Oberstäche vorkommenden, vielstätig verschlungenen Erhabenheiten und Vertiesungen sich an der inneren Tasel der Schädelknochen gewissermassen abdrücken, wodurch die sogenannten Fingereindrücke — Impressiones digitatae, — und die dazwischen vorspringenden Kanten — Juga cerebralia — entstehen. — Alle Schädelknochen werden von gewissen Löchern oder kurzen Kanälen durchbohrt, welche Nerven oder Gestssen zum Verlause dienen. Die Nervenlöcher sinden sich bei allen Individuen unter denselben Verhältnissen, und sehlen nie. Die Gestsslöcher sind, wenn sie Arterien durchlassen, ebensalls constant, wenn sie aber den von innen nach aussen gehenden Venen, oder den sogenannten Emissaria Santorini angehören, unterliegen sie an Grösse, Zahl und Lagerung, mannigfaltigen Verschiedenheiten, und sehlen auch zuweilen gänzlich.

Je weniger ein Schädelknochen an der Bildung anderer Höhlen Antheis nimmt, desto einfacher ist seine Bildung, und somit auch seine Beschreibung; je mehr er an der Begrenzung anderer Höhlen Theil hat, desto complicitier wird seine Gestalt. Es wäre deshalb im Schulvortrage der Anatomie besser, nicht in der Ordnung vorzugehen, welche in diesem Lehrbuche befolgt wird, wo der Anfang mit dem verwickeltsten Schädelknochen — mit dem Grundbein — gemacht wird, sondern, nach der Weise der Alten, mit dem Stiraund Scheitelbeine, oder, was noch einfacher wäre, nach dem Beispiele Meckel's, mit der Wirbelsäule zu beginnen, indem ein Theil der Schädelknochen sich auf den Typus der Wirbelbildung zurückführen lässt.

§. 88. Grundbein.

Das Grundbein (Os basilare s. spheno-occipitale) ist der grösste Knochen des Schädels, dessen Grundfläche und hintere Wand er vorzugsweise bildet. Er verbindet sich mit allen ührigen Schädelknochen, und mit der grösseren Mehrzahl der Gesichtsknochen, bildet somit in der That die wahre Grundlage des knöchernen Schädelcomplexes, und besteht, im vollkommen entwickelten Menschen, aus zwei hinter einander liegenden, und nur durch eine schmale Knochenbrücke vereinigten Stücken, — dem Keilund Hinterhauptstücke, — welche früher allgemein als zwei besondere Schädelknochen betrachtet und beschrieben wurden, bis Sömmerring die richtige Beziehung derselben zu einander auffasste, und sie als integrirende Theile eines Fundamentalknochens des Schädels — des Grundbeins — darstellte.

A. Hinterhauptstück des Grundbeins, oder Hinterhauptbein.

Das Hinterhaupt bein (Os occipitis, os puppis, os memoriae) besteht im neugeborenen Kinde aus 4, durch Knorpel vereinigten Stücken, deren Trennungsspuren am ausgebildeten Knochen nicht mehr zu erkennen sind. Diese Stücke sind: der Grundtheil, Pars basilaris, der Hinterhaupttheil, Pars occipitalis, und zwei Gelenktheile, Partes condyloideae. Diese vier Stücke sind um das grosse ovale Loch des Knochens — Foramen occipitale magnum — so gruppirt, dass der Grundtheil vor, der Hinterhaupt-

theil hinter demselben, die beiden Gelenktheile seitwärts von ihm zu liegen kommen. — Bei vielen Thieren erhält sich die Trennung der 4 Formtheile des Hinterhauptbeins durch das ganze Leben.

- 1. Der Grundtheil vermittelt die Verbindung des Hinterhauptbeines mit dem Keilbeine. Er verknöchert unter allen Kopfknochen zuerst, und stösst mit einer rauhen Fläche an den Körper des Keilbeins, der unmittelbar nach ihm ossificirt. Eine zwischenliegende Knorpelscheibe verbindet sie, verschwindet jedoch vom 15. Lebensjahre an, und weicht einer soliden Verschmelzung durch Knochenmasse, so dass beide Knochen nur gewaltsam durch die Säge von einander getrennt werden können. Dieses ist der Grund, warum das Keil- und das Hinterhauptbein als Ein Knochen zusammengefasst werden. Die obere Fläche des Grundtheiles bildet eine gegen das grosse Hinterhauptloch abfallende Rinne. Die untere ist für Muskelansätze rauh, und durch eine longitudinale Leiste (Crista basilaris) getheilt, deren Stelle zuweilen ein abgerundeter Höcker vertritt. Die Seitenflächen sind rauh, für die Anlagerung der Schläfebein-Pyramiden.
- 2. Der Hinterhaupttheil, auch Hinterhauptschuppe genannt, bildet ein schalensormiges, dreieckiges, mit stark gezahnten Seitenrändern versehenes Knochenstück, an welchem sich eine vordere concave, und eine An der vorderen Fläche ragt in der hintere convexe Fläche findet. Mitte die Protuberantia occipitalis interna hervor, als Durchkreuzungspunkt einer senkrechten und zweier querlaufenden Linien, welche die Eminentia cruciata interna zusammensetzen. Der senkrechte Schenkel des Kreuzes ist unterhalb der Querlinien besonders scharf und vorspringend, und heisst deshalb Crista occipitalis interna; die beiden Querschenkel sassen eine Furche zwischen sich — Sulcus transversus, — deren rechte Hälste sich von der Protuberantia an, nach oben als Sulcus longitudinalis verlängert. Die Sulci dienen zur Aufnahme gleichnamiger Blutleiter der harten Hirnhaut. Durch die kreuzsormige Erhabenheit zersallt die vordere Fläche der Schuppe in vier Gruben, von welchen die beiden oberen die hinteren Enden des grossen Gehirns, die beiden unteren die zwei Hemisphären des kleinen Gehirns aufnehmen. Hält man die Knochen gegen das Licht, so erblickt man ein gegen diese vier durchscheinenden Gruben dunkel abstechendes Kreuz. Die Knochenwand der unteren Gruben ist beim Erwachsenen häufig absolut dünner, als beim neugebornen Kinde.

An der hinteren Fläche bemerkt man die Protuberantia occipitalis externa, welche der inneren nicht entspricht, sondern etwas über ihr steht. Sie schickt zum Hinterhauptloche die Crista occipitalis externa herab, welche durch die beiden querlaufenden Lineae semicirculares externae s. arcuatae durchschnitten wird, deren Entwicklung nur bei Schädeln muskelstarker und bejahrter Individuen auffällt.

Von der Linea arcuata superior bis zum Hinterhauptloche herab ist der Knochen dünnwandig und durchscheinend, und dient den zahlreichen Nackenmuskeln zur Insertion.

Jeder der beiden Seitenränder, welche an der Spitze des Hinterhaupttheils zusammenstossen (wie die beiden Schenkel eines griechischen A), zerfällt in ein oberes grösseres Segment (Margo lambdoideus) zur Verhindung mit dem hinteren Rande des Seitenwandbeins, und in ein unteres kleineres, weniger gezacktes, für den Warzentheil des Schläsebeins — Margo mastoideus.

3. u. 4. Die beiden Gelenk- oder Seitentheile verbinden den Grundtheil mit der Hinterhauptschuppe, und werden in eine obere und untere Fläche, und zwei Seitenränder eingetheilt.

An der unteren Fläche bemerkt man einen elliptischen, convexen, mit glatter Knorpelscheibe überzogenen Knopf (Processus condyloidous, von xóvdoc, rund), mittelst dessen der Schädel auf dem ersten Halswirbel beweglich aufruht. Die Processus condyloidei beider Seitentheile convergiren mit ihren vorderen Enden, welche etwas über den Rand des Hinterhauptloches hinausragen, und dessen vorderen Umfang verschmälern. Hinter dem Gelenkkopf liegt die flache Fossa condyloidea. Die sogenannten Foramina condyloidea, deren ein vorderes und hinteres existirt, sind eigentlich kurze Kanäle, welche den Knochen schief nach innen und oben durchbohren, und deren äussere Oeffnungen, wie ihr Name sagt, we und hinter dem Processus condyloideus liegen. Das Foramen condyloideum anterius findet sich bei allen Individuen genau in denselben Verhältnissen, da es das zwölfte Gehirnnervenpaar aus dem Schädel treten lässt. Fast regelmässig mündet ein aus der Diploë des Knochens herstammender Venenkanal in dasselbe ein. Andere Venenkanäle finden sich zuweilen nebenan sich öffnend. Das Foramen condyloideum posterius unterliegt als Venenkanal sehr vielen Abweichungen, und sehlt häufig auf einer oder beiden Seiten.

Auf der oberen Fläche ragt der mässig gewölbte und niedrige Processus anonymus s. Tuberculum jugulare hervor, unter welchem die innere Oeffnung des Canalis condyloideus anterior liegt.

Der innere Rand ist zugleich Seitenrand des grossen Hinterhauptloches; der äussere Rand hat einen Halbmondausschnitt (Incisura jugularis), an dessen hinterem Ende ein dreiseitiger, etwas nach einwärts
gekrümmter Fortsatz (Processus jugularis) emporwächst. Er wird von
einer halbkreisförmigen Furche für den Querblutleiter (Sulcus jugularis)
umgeben, welche in der Incisura jugularis endet.

Der Hinterhauptknochen ist selbst an den wohlgebildetsten Schädeln selten symmetrisch, und bietet, nebst dem als ursprünglicher Entwicklungsfehler austretenden, theilweisen oder completen Mangel der Schuppe beim Hirnbruch, folgende Spielarten dar: 1. Das Hnterhauptloch ist polygonal statt eirund. 2. Die *Processus condyloidei* mit zwei, durch eine seichte, rauhe Furche getrennten Knorpelplatten belegt. Diese Anomalie datirt aus den früheren Entwicklungsständen des Knochens, indem auch der Basilartheil an der Bildung der *Processus condyloidei* Antheil nehmen kann, wo ihm dann die vordere Knorpelplatte angehört. 3. Die *Processus jugulares* so sehr nach

unten entwickelt, dass sie an die Seitentheile des ersten Halswirbels anstehen, und mit ihnen articuliren (Dieterich, Patruban). - Von der Spitze der Schuppe, oder vom Seitenrande derselben läust eine Fissur, als nicht verknöcherte, und im frischen Zustande durch Knorpel verschlossene Stelle, gegen die Protuberantia externa, welche für Fractur gehalten werden könnte. — Es erhält sich die Trennungsspur von Schuppe und Seitentheil als perennirender Knorpel. Die Schuppe wird durch eine quere, höchst selten durch eine longitudinale Nath geschnitten; die Protuberantia occipitalis externa wird, wie an einem Schädel unserer Sammlung, zu einem 8 Linien hohen, nach abwärts hakenformig gebogenen Knochenriff verlängert, oder, wie an einem zweiten Exemplare, zu einem zolllangen zitzenförmigen Tuber entwickelt. — Als sehr seltene Bildungsabweichung des Hinterhauptbeins, und zugleich als interessante Thierathnlichkeit (Vögel und beschuppte Amphibien) existirt in der Mitte des vorderen Halbkreises des grossen Hinterhauptloches ein convexer und überknorpelter Knopf, - also ein dritter Gelenkknopf, der auf einer entsprechend ausgehöhlten flachen Grube des vorderen Halbringes des Atlas spielt. — Ueber die Gestassfurchen dieses Knochens ist viel Interessantes in Barkow's anat. Abhandlungen, Breslau, 1851, enthalten.

B. Keilstück des Grundbeins, oder Keilbein.

Das Keilstück des Grundbeins, oder das Keilbein, Os cuneiforme (Synonyma: Os sphenoideum, sphecoideum, vespiforme, alatum, polymorphon, pterygoideum, Os colatorii) hat, wie die vielen Synonyma bezeugen dürsten, eine sehr complicirte Gestalt. Die gebräuchlichste von diesen Bezeichnungen ist Os sphenoideum, abgeleitet von $\sigma \varphi \dot{\eta} \gamma$, ein Keil, und $\varepsilon l dog$, die Gestalt.

Die Einfalt der Alten fand in der Form dieses Knochens eine Aehnlichkeit mit einem sliegenden Insecte, woher die jetzt noch übliche Eintheilung in Körper und Flügel stammt.

a) Der Körper, der mittlere, in der Medianlinie des Schädelgrundes liegende Theil des Knochens, ist fast würslig gestaltet, dünnwandig, und schliesst eine Höhle ein, welche durch eine verticale, häufig nicht symmetrisch stehende, und unterbrochene Scheidewand, in zwei seitliche Fächer (Sinus sphenoidales) zerfällt. Er zeigt 6 Flächen, oder besser Gegenden, von welchen die obere und die beiden seitlichen in die Schädelhöhle sehen, während die vordere und untere gegen die Nasenhöhle gerichtet sind, und die hintere mit dem Hinterhauptknochen bei jungeren Individuen durch Knorpel, bei älteren durch wahre Knochenmasse verschmilzt. Die obere Fläche ist sattelformig ausgehöhlt, Türkensattel (Sella turcica, equina, Ephippium), und nimmt den Gehirnanbang (Hypophysis s. Glandula pituitaria cerebri) auf. Die hintere Wand der Sattelhöhle wird durch eine schräge nach vorn ansteigende Knochenwand - Sattellehne, Dorsum ephippii, - gebildet, an deren Ecken die nach hinten gerichteten kleinen konischen Processus clinoidei postici aussitzen. Die hintere Fläche der Sattellehne geht in einer Flucht in die obere Fläche des Basilartheiles des Hinterhauptknochens über, und bildet mit ihr eine abschüssige Ebene

- den sogenannten Clirus. Häufig findet sich vor der Sattelgrube ein stumpfer Knochenhöcker - der Sattelknopf. Tuberculum ephippii, und beiderseits von diesem die sehr kleinen, meistens nur angedeuteten, papillenartigen Processus clinoidei medii, welche ausnahmsweise so gross werden, dass sie auf die gleich zu erwähnenden Spitzen der Processus chinoffei anteriores zuwschsen, sie berühren, oder mit ihnen verschmelren, wedurch eine Oeffnung zu Stande kommt, die die Carotis durchpassuren lässt, und als abnormes Foremen carotico-clinoideum bezeichnet wird. - Die beiden Seitenflächen des Keilbeinkörpers zeigen eine seichte, schräg uach vorn und oben aufsteigende Furche Sulcus caroticus), deren unteres Ende nach aussen durch ein dünnes, abgerundetes, nach hinten gerichtetes Enochenblätteben Lingula begrenzt wird. Die vordere Fläche besitzt zwei durch eine wespringende senkrechte Knochenleiste (Crista spiere felle von einander getrennte, unregelmissige Oeffnungen, welche in die besoen seitlichen Facher der Keilbeinsbible führen. - Die untere Fliebe des Keilbeinkörpers wird, wie die vordere, durch einen mittleren scharfen Kamm halburt, welcher in die Orista sphenoidalis übergeht, und sed m.: de rum scharftantien, rogespitten, seltener bakenformig geartmunden Keilbeinschnabel Restrum spheneriele verlangert.
- is Inc Flügel des Keilbeins bilden drei Paare vom Korper ausgebender, dwergermoer Fortsbire, welche in die kleinen und grossen Flügel, und m die Bügekartigen Fortsbire eingetheilt werden.
- 1. Paur. Kierne Flügel, Alse unneres s. Processus ensiformes. See eraspenagen vom verderen Theile der oberen Flische des Kürpers, jeder mit rum Warrein, die das Schloch Foremen systemm zwischen sich fissen. Sie haben die Gestalt eines krummskiels, und hegen ziemlich hanzeigen, mit einer oberen und einer unteren Flische, einem vorderen missus geziehnen, mit einem hinteren gibtten Rande. Die minere, nach der Samelienne gerichtene Einde derseiben ist der Processus esensidens miserur, weiche Remennung und mehreren kwieren auf den ganzen kleinen Filigel ingerungen wird. Ins imseere sonnte Einde erinag zuweilen die Selbsständignen eines besiedderen, in die harte Hirakaut eingewachsenen Kniederichens.

obere in der Schläsengrube eines ganzen Schädels sichtbar ist, während die untere an der Basis des Schädels liegt. Das vordere Ende der queren Crista entwickelt sich zum Tuberculum spinosum, einem dreieckigen, mit der Spitze nach unten und hinten ragenden Knochenzacken. Die rautenförmige, ebene und glatte Augenhöhlenfläche (Superficies orbitalis s. anterior) ist die kleinste, und bildet den hinteren Theil der äusseren Wand der Augenhöhle.

Die drei Ränder sind der Lage nach ein oberer, ein vorderer, Jeder derselben besteht aus zwei, unter einem vorund ein hinterer. springenden Winkel zusammenstossenden Segmenten, weshalb von älteren Schriftstellern 6 Flügelränder angenommen wurden. Sie bilden zusammen die polygonale Contour der Ala magna, welche mit den zackigen Rändern eines Fledermausstügels entsernte Aehnlichkeit hat. Der obere Rand erstreckt sich vom Ursprunge des grossen Flügels bis zur höchsten Spitze desselben. Sein äusseres Segment bildet eine rauhe dreieckige Fläche, die zur Anlagerung des Stirnbeins dient. Die hintere äusserste Ecke des Dreiecks, in eine scharfe dunne Schuppe auslaufend, stösst an den vorderen unteren Winkel des Seitenwandbeins. Sein inneres Segment ist nicht gezackt, sondern schneidend zugeschärst, sieht der unteren Fläche der Ala minor entgegen, und bildet mit ihr die schräge nach aus- und aufwärts gerichtete, nach innen weitere, nach aussen spitzig zulausende obere Augengrubenspalte (Fissura sphenoidalis s. orbitalis superior). Das aussere Segment bildet zugleich den oberen, das innere den inneren Rand der rhomboidalen Augenhöhlensläche des grossen Flügels. — Der vordere Rand vervollständigt durch seine beiden Segmente die Umrandung der Superficies orbitalis. Sein vorderes Segment ist gezackt, zur Verbindung mit dem Jochbeine, das untere Segment ist glatt, und dem hinteren Rande der Augenhöhlensläche des Oberkiesers zugewendet, mit welchem es die untere Augengrubenspalte (Fissura spheno-maxillaris s. orbitalis inferior) bildet. — Der hintere Rand erzeugt durch seine beiden Abschnitte einen nach hinten, zwischen Schuppe und Pyramide des Schläfebeins eingekeilten Winkel (Portio s. Lamina triangularis), an dessen äusserstem Ende nach unten eine gekerbte Zacke, oder ein zugespitztes Knochenblatt - Dorn, Stachel, Spina angularis - hervorragt, welches zuweilen selbst wieder kleinere Nebenblättchen trägt (Alae parvae Ingrassiae, nach Phil. Ingrassias, einem sicilianischen Arzte und Anatomen des 16. Jahrhunderts benannt).

Der grosse Flügel wird durch drei constante Löcher durchbohrt. 1. Das runde Loch liegt in dem Wurzelstücke des grossen Flügels, neben den Seiten des Keilbeinkörpers, und führt nach vorn. Es dient zum Austritte des zweiten Astes des fünsten Nervenpaares. 2. Das ovale, und knapp an und hinter ihm 3. das kleine Dornenloch (Foramen spinosum) führen nach abwärts, liegen am inneren Abschnitte des hinteren Flügelrandes, und dienen, ersteres dem dritten Aste des fünsten Paares zum Austritte,

letzteres der mittleren harten Hirnhautarterie zum Eintritte in die Schädelhöhle. Am äusseren Segmente des oberen Randes, und an der Schläfenfläche des grossen Flügels, finden sich an Grösse, Zahl und Lagerung wandelbare Löcher für die Diploëvenen.

3. Paar. Die flügelartigen Fortsätze, Processus pterygoidei (πτέρυξ, ein Flügel), auch Alae inferiores s. palatinae genannt, steigen nur wenig divergirend nach unten herab, und bestehen aus zwei Lamellen (Laminae pterygoideae), welche nach hinten auseinander stehen, und eine Grube zwischen sich fassen, Flügelgrube, Fossa pterygoidea. Die aussere Lamelle ist kurzer, aber breiter als die innere, die mit einem nach hinten und aussen gekrümmten Haken (Hamulus pterygoideus) endet. Unten trennt beide Lamellen ein einspringender Winkel (Incisura s. Fissura pterugoidea), der durch den Pyramidenfortsatz des Gaumenbeins ausgefüllt wird. An der oberen Hälste des hinteren Randes der inneren Lamelle läust eine slache Furche (Sulcus tubae Eustachianae) nach aussen und Zwischen ihr und dem Foramen ovale beginnen die beiden, in der neueren Neurologie wichtig gewordenen Canaliculi pterygoidei s. sphenoidales, von welchen der äussere an der Schädelsläche des grossen Flügels, zwischen der Lingula und dem Foramen rotundum, der innere aber in den Canalis Vidianus ausmündet.

Die mit dem Körper und dem grossen Flügel des Keilbeins verschmolzene Basis des Processus pterygoideus wird durch einen horizontal ziehenden Kanal (Canalis pterygoideus s. Vidianus) perforirt, von dessen vorderem Ende eine Furche am vorderen Rande des Flügelfortsatzes herabläust — Sulcus pterygo-palatinus. Das hintere Ende des Vidiankanals liegt unmittelbar unter der Lingula des Sulcus caroticus.

Einen integrirenden Bestandtheil des Keilbeins bilden die Ossicula Bertini s. Cornua sphenoidalia. Sie sind paarige Deckelknochen für die an der vorderen Wand des Keilbeinkörpers besindlichen grossen Oessnungen der Sinus sphenoidales, deren Umfang sie von unten her verkleinern. Ihre Gestalt ist dreieckig, leicht gebogen, indem sie sich von der unteren Fläche des Keilbeinkörpers zur vorderen erheben. Sie verschmelzen srühzeitig mit dem Keil- und Siebbein, und mit den Keilbeinfortsätzen des Gaumenbeines (jedoch häusiger und mittelst zahlreicherer Berührungspunkte mit ersterem), so dass sie bei gewaltsamer Trennung der Schädelknochen an dem einen oder anderen Knochen hasten bleiben, oder zerbrechen, und man sie nur aus jungen Individuen unversehrt erhalten kann.

Beim Neugeborenen besteht das Keilbein aus zwei von einander getrennten Stücken, dem sogenannten vorderen und hinteren Keilbeine. Das vordere trägt die kleinen Flügel, das hintere die grossen und die Processus pterygoidei. Bei vielen Säugethieren bleiben diese beiden Keilbeine durch's ganze Leben getrennt, und selbst beim Menschen erhält sich öfters eine, wie ein klaffender Riss aussehende Trennungsspur, durch das ganze Leben.

Ausser den im Texte angeführten Varietäten einzelner Formtheile des Keilbeins, pflegen folgende noch vorzukommen. Die Keilbeinshöhle wird mehrfächerig, selbst kleinzellig, setzt sich in die Processus clinoidei anteriores fort, oder entbehrt der Scheidewand. - Die mittleren Processus clinoidei verschmelzen durch knöcherne Brücken mit den vorderen und hinteren. Ersteres geschieht häufiger, und kommt auch allein, letzteres nur in Verbindung mit ersterem vor. - Der Clivus bildet eine lange schiefe Ebene, welche sich bis auf 3 Linien Länge und darüber verkürzen kann (Blumenbach). - Vom Foramen rotundum zieht eine seichte Furche zum Foramen ovale. Letzteres verschmilzt mit dem Foramen spinosum, welches auch nur als Ausschnitt gesehen wird. - Die innere Lamelle des Processus pterygoideus krummt sich oben unter die untere Körperstäche als sogenannter Scheidenfortsatz, Processus vaginalis; die äussere Lamelle ist als grosse Seltenheit mit der Spina angularis durch eine knöcherne Spange verbunden, welche Anomalie als Verknöcherung des von Civinini beschriebenen Bandes -Liq. pterygo-spinosum — zu deuten ist. — Die Processus pterygoidei sind bei einigen Säugethieren selbstständige Knochenstücke, die durch Näthe in die grossen Keilbeinstugel eingepstanzt werden.

Die etymologische Erklärung der Synonyma bleibt dem mundlichen Vortrage überlassen.

§. 89. Stirnbein.

Das Stirnbein, Os frontis (Synon.: Os syncipitis, coronale, prorae, inverecundum), liegt am vorderen schmäleren Ende des Schädelovals, dem Hinterhauptknochen gegenüber, dessen Attribute sich bei genauem Vergleiche an ihm theilweise wiederholen. Es trägt zur Bildung der Schädelhöhle, beider Augenhöhlen, und der Nasenhöhle bei, und wird demgemäss in einen Stirntheil, Pars frontalis, zwei Augenhöhlentheile, Partes orbitales, und einen Nasentheil, Pars nasalis, eingetheilt.

1. Die Pars frontalis entspricht durch Lage und Gestalt der Schuppe des Hinterhauptbeins, und ähnelt, wie diese, einer flachen Muschelschale, deren Wölbung, und grössere oder geringere Neigung, einen wesentlichen Einfluss auf den Typus der Gesichtsbildung äussert. Zwei mässig gekrummte obere Augenhöhlenränder (Margines supraorbitales) trennen sie von den beiden horizontal liegenden Partes orbitariae. Jeder derselben hat an seinem inneren Dritttheil ein Loch oder einen Ausschnitt (Foramen s. Incisura supraorbitalis), zum Durchgange eines synonymen Gefässes und Nerven. Zuweilen sind beide nur durch einen schwachen Eindruck des Randes Nach aussen geht jeder Rand in einen stumpfen, robusten, unten gezähnten Fortsatz, Jochfortsatz (Processus zygomaticus) über. Die vordere Fläche des Stirntheiles ist convex, mit zwei wulstigen, halbmondförmigen Erhabenheiten - den Augenbrauenbogen, Arcus superciliares, — die gerade über den Margines supraorbitales liegen. Einen Querfinger breit über diesen, liegen die flachen Stirnhügel - Tubera frontalia. Zwischen den inneren Enden beider Arcus superciliares und den Stirnhöckern liegt über der Nasenwurzel die flache und dreieckige Stirnglatze Glabella (von glaber, die glatte, haarlose Stelle zwischen den Brauen), deren Breite der Physionomie den Ausdruck von Denkkrast verleiht, den wir an den Büsten von Pythagoras, Plato und Newton bewundern. Man überzeugt sich leicht an seinem eigenen Schädel durch Zufühlen mit den Fingern, dass die Augenbrauen (Supercilia) nicht den Arcus superciliares, sondern den Margines supraorbitales entsprechen, und somit die Benennung der Arcus superciliares, wenn auch altherkömmlich und allgemein gebräuchlich, dennoch unrichtig ist. - Eine von dem Processus zygomaticus bogenförmig nach auf- und rückwärts laufende rauhe Linie, die den Ansang einer später, bei der Beschreibung des Seitenwandbeins. zu erwähnenden Linea semicircularis darstellt, schneidet von der vorderen Fläche der Pars frontalis ein kleines, hinteres Segment ab, welches in die Schläsengrube einbezogen, und vom Musculus temporalis, der daran zum Theile entspringt, bedeckt wird. Die hintere Fläche ist concav, und durch einen senkrechten Kamm (Crista frontalis) in zwei gleiche Hälften getheilt. Die Crista spaltet sich im Aufsteigen in zwei Schenkel, die eine Furche — den Anfang des Sulcus longitudinalis des Schädeldaches begrenzen, welche, allmälig breiter und flacher werdend, gegen den zackigen Begrenzungsrand des Stirntheils außteigt. Zu beiden Seiten von ihr liegen unregelmässige rundliche Grübchen oder Eindrücke der inneren Tafel, welche durch die, bei der Betrachtung der Hirnhäute näher zu bezeichnenden Granulationen der harten Hirnhaut (Glandulae Pacchioni) hervorgebracht werden, und zuweilen die Mächtigkeit der Knochenwand bis zum Durchscheinendwerden verringern. Der mehr als halbkreissormige Rand des Stirntheils (Margo coronalis) beginnt hinter dem Processus sygomaticus mit einer gezackten dreieckigen Fläche, die zur Verbindung mit einer ähnlichen am oberen Rande des grossen Keilbeinstügels dient.

2. und 3. Die Partes orbitariae s. horizontales bilden die obere Wand der Augenhöhlen, und werden durch einen von hintenher zwischen sie dringenden breiten Spalt - Siebbeinausschnitt, Incisura ethmoidalis - von einander getrennt. Die obere Fläche hat stark ausgesprochene Juga cerebralia, und trägt die Vorderlappen des grossen Gehirns. Die untere, glatte und concave Fläche, vertiest sich gegen den Processus sygomaticus zur Thränendrüsengrube (Fovea glandulae lacrymalis). und besitzt gegen die Pars nasalis hin, dicht hinter dem inneren Ende des Margo supraorbitalis, ein kleines, häufig ganz verstrichenes Grübchen (Foveola trochlearis), und hinter ihr ein kurzes gekrümmtes Pyramidchen (Hamulus trochlearis), welches so selten vorkommt, dass sein Fehlen eigentlich Regel ist. - Der hintere, zur Verbindung mit den kleinen Keilbeinflügeln bestimmte, gezackte Rand, geht ohne Unterbrechung in den Margo coronalis über; der innere begrenzt die Incisura ethmoidalis. Eine Eigenthümlichkeit dieses Randes, der sich durch seine Breite und sein zelliges Ansehen charakterisirt, beruht darin, dass die obere Knochenlamelle der Pars orbitalis um 3 Linien weiter gegen die Incisura ethmoidalis vordringt, als die untere, wodurch der Rand zwei Lefzen oder Säume bekommt, die durch dünne und regellos gebogene Blättchen, zwischen welchen zellige Fächer liegen, mit einander communiciren. Von rück- nach vorwärts nehmen diese Fächer an Tiese zu, und sühren endlich in zwei hinter der Glabella und den Arcus superciliares besindliche, durch eine unsymmetrische und durchbrochene Scheidewand getrennte Höhlen des Stirnbeins (Stirnböhlen, Sinus frontales), welche durch Divergenz beider Taseln des Knochens entstehen, und sich zuweilen in die Tubera frontalia und die Partes orbitales sortsetzen. Zwischen der äusseren Lesze des inneren Randes, und der anstossenden Papierplatte des Siebbeins, liegen das Foramen ethmoidale anterius und posterius, von welchen das erstere häufig auch blos vom Stirnbeine gebildet wird.

4. Die Pars nasalis liegt vor der Incisura ethmoidalis, unter der Glabella. Streng genommen wäre die ganze zellige Umrandung der Incisura ethmoidalis, ihrer Beziehung zum Siebbeine wegen, als Nasentheil des Stirnbeins anzusehen. Aus der Mitte ihres vorderen Endes ragt der obere Nasenstachel (Spina nasalis superior) hervor, hinter dessen breiter, aber hohler Basis, bei oberer Ansicht ein kleines Loch vorkommt (das blinde Loch, Foramen coecum), welches entweder directe, oder durch enge spaltformige Seitenöffnungen in die Stirnhöhlen, und mittelbar durch diese in die Nasenhöhle führt. Es lässt eine Vene durchgehen, welche den Sinus falciformis major der harten Hirnhaut mit den Venen der Nasenhöhle verbindet, und ist insofern kein blindes Loch, sondern ein doppelmündiger Kanal. Vor der Spina nasalis liegt ein halbkreisförmiger, tief gezähnter Rand — Incisura nasalis — zur Einzackung der Nasenbeine und der Stirnfortsätze des Oberkiefers.

Die häufigste und als Thierähnlichkeit bemerkenswerthe Abweichung von der Norm, ist wohl die Gegenwart einer Sutura frontalis, die vertical von der Nasenwurzel gegen den Margo coronalis aufsteigt, und den Stirntheil in zwei congruente Hälften theilt. Sie kommt in der Regel nur bei breiten Stirnen vor, und findet ihre Erklärung in der Entwicklungsgeschichte des Knochens, der aus zwei, den Tubera frontalia entsprechenden Ossificationspunkten entsteht, welche sich selbstständig vergrössern, bis sie sich mit ihren inneren Rändern berühren, und zuletzt mit einander in Einen Knochen verschmelzen. Wenn nun bei rascher Entwicklung des Gehirns, und eben solcher Zunahme des Schädelvolumens, die Knochenbildung nicht mit gleicher Intensität austritt, kann es bei der blossen Bertihrung beider Hälsten verbleiben, und eine Stirnnath als permanenter Ausdruck der paarigen Entwicklung des Knochens fortbestehen. Dass sie bei Weibern häufiger vorkommt als bei Männern, ist unrichtig. Ein Rudiment der Sutura frontalis findet sich sehr oft auch über der Nasenwurzel, wenn die Verwachsung der beiden Stirnbeinhälsten nicht bis zur Pars nasalis herab fortschritt. — Die Angaben über Mangel der Stirnhöhle (Lavater) entbehren gehöriger Evidenz; dagegen ist grössere Aushreitung und Zerfallen in mehrere Zellen, welches bei gewissen Säugethieren zur Norm gehört, auch im Menschen nicht ungewöhnlich. (Die auffallendste Entwicklung der Stirnbeinhöhlen findet sich beim Elephant, dessen ungeheures Schädelvolumen nicht durch die Grüsse des Gehirns, sondern durch die Grösse der weitverbreiteten Stirnhöhlen bedingt wird). - Häufig findet sich neben der inneren Mündung des Foramen supraorbitale ein zur

Diploë des Stirntheils sührendes Venenloch. — Das Foramen coecum, welches viel bezeichnender Porus cranio-nasalis genannt werden könnte, wird zuweilen vom Stirn- und Siebbein zugleich gebildet. Eine die Stelle der Glabella einnehmende, grosse, runde Oessnung wurde bisher nur einmal gesehen (Römer). Die Tubera frontalia werden bei hörnertragenden Thieren zu langen, hohlen, mit den Sinus frontales communicirenden, mit einer hornigen Rinde überzogenen Knochenzapsen; — bei geweihtragenden Thieren, die ihren Hauptschmuck zu Zeiten abwersen, kurze, platte, und solide Stöcke. — Hält man das Stirnbein so, dass die convexe Stirnsläche nach hinten sieht, und denkt man sich die Incisura ethmoidalis durch die Anlagerung des Keilbeinkörpers in ein Loch umgewandelt, so ist eine gewisse Aehnlichkeit des Stirnbeins mit dem Hinterhauptbeine nicht zu verkennen. — Ueber bisher unerwähnte Kanäle des Stirnbeins handelt Schultz. Siehe Literatur.

§. 90. Siebbein.

Das Siebbein, Os ethmoideum s. cribrosum (Synon.: Os spongiesum, cubicum, cristatum, colatorium; ἢθμός, Sieb, εἶδος, Gestalt), liegt in der Mitte zwischen Schädelhöhle, Nasenhöhle, und den beiden Augenhöhlen, deren innere Wand es vorzugsweise bildet, und ist nur insofern als Schädelknochen anzusehen, als es die Incisura ethmoidalis des Stirnbeins ausfüllt, und dadurch an der Zusammensetzung der Schädelbasis den kleinsten Antheil hat.

Die Synonyma des Knochens drücken seine auffallendsten anatomischen Merkmale aus. Es wird in die Siebplatte, die senkrechte Platte, und die beiden zelligen Seitentheile eingetheilt. Keiner dieser Bestandtheile erreicht auch nur einen mittleren Grad von Stärke, und die doppelten Lamellen der Schädelknochen sind, sammt der Diploë, an den Siebbeinwänden nicht mehr zu bemerken.

- 1. Die Siebplatte (Lamina cribrosa) liegt horizontal in der sie genau umschliessenden Incisura ethmoidalis. Ihr hinterer Rand stösst an die vereinigten schwertsormigen Flügel des Keilbeins. Ein senkrecht stehender, longitudinaler, nicht immer gleich stark ausgeprägter Kamm (Crista ethmoidalis) theilt sie in zwei Hälsten, und entwickelt sich nach vorn zum Hahnenkamm, Crista galli, welcher zuweilen, wenn er seitlich besonders ausgetrieben erscheint, ein Cavum einschliesst, zu welchem eine, an der vorderen Seite der Basis der Crista besindliche Oessung sührt. Die Siebplatte wird durch viele Oessungen durchbohrt (Foramina cribrosa), von denen die größeren dicht an der Crista liegen, und sich in absteigende Kanäle verlängern. Von ihrer unteren Fläche steigt die sogenannte
- 2. senkrechte Platte obwohl selten lothrecht herab, und bildet den oberen Theil der knöchernen Nasenscheidewand, welche durch den Hinzutritt der übrigen Knochen oder Knochentheile, die in der senkrechten Durchschnittsebene der Nasenhöhle liegen, vervollständigt wird.
- 3. und 4. Die zelligen Seitentheile (das sogenannte Siebbeinlabyrinth) sind ein Aggregat von dünnwandigen Knochenzellen, die unter

einander und mit der eigentlichen Nasenhöhle communiciren, und an Grösse, Zahl und Lagerung so sehr variiren, dass es nicht möglich ist, für jeden speciellen Fall geltende Bestimmungen aufzustellen. Im Allgemeinen werden die das Labyrinth bildenden Zellen (Cellulae ethmoidales) in die vorderen, mittleren, und hinteren abgetheilt. Sie werden von aussen durch eine glatte, dunne, aber seste viereckige Knochenwand (Papierplatte, Lamina papyracea) geschlossen, welche zugleich die innere Wand der Augenhöhle bildet, und nicht so weit nach vorn reicht, um auch die vordersten Zellen schliessen zu können, weshalb für diese ein eigener Deckelknochen - das Thränenbein - benöthigt wird. Von oben schliesst sie der innere zellige Rand der Partes orbitariae des Stirnbeins zu, von innen werden sie durch die obere und untere Siebbeinmuschel (Concha ethmoidalis superior et inferior, s. minor et major), zwei dunne, rauhe, porose Knochenblätter. begrenzt, welche so gebogen sind, dass ihre convexen Flächen gegen die Lamina perpendicularis, die concaven gegen die Zellen sehen. Zwischen beiden Siebbeinmuscheln bleibt ein freier Raum oder Gang übrig (der obere Nasengang, Meatus narium superior), in welchen die mittleren und hinteren Zellen einmunden, während die vorderen sich gegen die concave Fläche der unteren, grösseren und stärkeren Siebbeinmuschel öffnen. Nach hinten tragen der Keilbeinkörper, die Ossicula Bertini, und nicht selten die Augenhöhlenfortsätze der Gaumenbeine, nach vorn die Pars nasalis des Stirnbeins, und die Nasenfortsätze der Oberkiefer, und von unten die zelligen inneren Ränder der Augenhöhlenslächen der Oberkiefer, zur Schliessung der Zellen das Ihrige bei. Vom vorderen Ende der unteren Siebbeinmuschel, und von den unteren Scheidewänden der vorderen Siebbeinzellen, entwickelt sich rechts und links ein dünnes, gezacktes, nach hinten gekrummtes Knochenblatt - Processus uncinatus s. Blumenbachii welches über die grosse Oessnung der Highmorshöhle wegstreist, sie theilweise deckt, und nicht selten mit einem Fortsatze des oberen Randes der unteren Nasenmuschel verschmilzt.

Diese Beschreibung des Siebbeins ist nach einem unversehrten und vollständigen Exemplare aus dem Schädel eines beiläufig 16jährigen Individuums entworfen, und dürste nur wenig auf die, durch rohes Sprengen älterer Schädel, verstümmelten Knochen passen, welche gewöhnlich in die Hände der Schüler kommen. Man wird sich auch nicht leicht eine Vorstellung von dem Baue dieses Knochens machen können, wenn man nicht die Integrität desselben opfert, und wenigstens Ein Labyrinth ablöst, da man sonst nicht zur inneren Flächenansicht der beiden Muscheln kommt.

Häusiger vorkommende Verschiedenheiten sind: zwei kleine slügelartige Fortsätze — Processus alares — an der Crista galli, die in correspondirende Grübchen des Stirnbeins passen; Zerfallen der Lamina papyracea in zwei kleinere, durch Nath vereinigte Stücke; Abweichung der Crista galli und der Lamina perpendicularis nach einer Seite; Austreten einer dritten kleinen Siebbeinmuschel, die über der gewühnlichen Concha superior liegt, und Concha Santoriniana heisst (beim Neger in der Regel vorhanden); bedeutende Wulstung und zellige Ausblähung der Concha ethmoidalis inserior; Lehrbuch der Anstomie. 5. Aus.

endlich Verschmelzung der Ossicula Bertini mit den Wänden der hinteren Siebbeinzellen, oder mit der Lamina perpendicularis. Unsymmetrische Stellung der Crista galli, so dass auf der einen Seite derselben mehr Foramina cribrosa als auf der anderen liegen, beobachtete J. B. Morgagni. — An den meisten ägyptischen Mumien ist das Siebbein von der Nasenhöhle aus durchstossen, behuß der Entleerung des Gehirns. Bei den viel selteneren Guanchenmumien der Azoren, wurde das Gehirn durch ein Loch in der Pars orbitalis des Stirnbeins herausgenommen.

§. 91. Seitenwandbeine oder Scheitelbeine.

Die beiden Seitenwandbeine, Ossa parietalia (auch Ossa bregmatics, verticis, tetragona), bilden vorzugsweise das Dach der Schädelhöhle, liegen, vom Scheitel gegen die Schläse herabsteigend, beiderseits symmetrisch, und stellen einsache, viereckige Knochen dar, an denen eine äussere und innere Fläche, vier Ränder, und vier Winkel unterschieden werden.

Die äussere convexe Fläche ragt in der Mitte als Scheitelhöcker, (Tuber parietale) am stärksten vor, und wird, unter dem Scheitelhöcker, durch eine mit dem unteren Rande des Knochens fast parallel laufende Linea semicircularis, als Fortsetzung der von dem Processus zygomaticus des Stirnbeins heraufkommenden scharfen Linie, in einen oberen grösseren, und unteren kleineren Abschnitt getheilt. Nur der untere Abschnitt hilft (zugleich mit den betreffenden Theilen des Stirn-, Keil- und Schläfebeins) das an der Seitenwand des Schädels befindliche Planum semicirculare bilden, welches nach unten und vorn sich zur Schläfengrube, Fossa temporalis, vertieft.

Die innere concave Fläche zeigt a) die gewöhnlichen Fingereindrücke und Cerebraljuga, und längs des oberen Randes mehrere Pacchioni'sche Gruben, b) zwei baumförmig verzweigte, mit dem Gerippe eines Feigenblattes verglichene (Blumenbach) Gefässfurchen für die Ramificationen der Arteria durae matris media, von denen die vordere vom vorderen unteren Winkel des Knochens, die hintere von der Mitte des unteren Randes ausgeht, und c) zwei venöse Sulci, deren einer — Sulcus longitudinalis — längs des oberen Randes sich erstreckt, und jederzeit an einem Scheitelbeine stärker ausgeprägt erscheint, als an dem anderen; der andere, kurze und bogenförmige, den hinteren unteren Winkel einnimmt, und einen Theil des Sinus transversus aufnimmt.

Die vier Ränder werden, ihrer Lage und Verbindung nach, in den oberen, Margo sagittalis, in den unteren, Margo squamosus s. temporalis, in den vorderen, Margo coronalis, und in den hinteren, Margo lambdoideus eingetheilt. Nur der untere bildet ein concaves, wegen innigeren, bis zum Verschmelzen gedeihenden Aneinanderschmiegens beider Tafeln, zugeschärstes Bogenstück; die übrigen sind gerade, und ausgezeichnet zackig.

Es ist unrichtig, die Zuschärfung des unteren Randes durch Verkürzung der äusseren Tafel, und dadurch bedingtes Vorstehen der inneren Tafel zu

erklären. Man überzeugt sich bei senkrechten Durchschnitten des Knochens, dass die äussere Tafel ebensoweit herabreicht, wie die innere, und sich derselben blos bis zum Verschmelzen nähert.

Die vier Winkel, welche nach den anstossenden Knochen genannt werden, sind: der vordere obere, Angulus frontalis, der vordere untere, Angulus sphenoidalis, der hintere obere, Angulus lambdoideus s. occipitalis, der hintere untere, Angulus mastoideus. Der Angulus sphenoidalis ist der spitzigste, der Angulus mastoideus der stumpfste.

Am hinteren Viertel des Margo sagittalis findet sich das Foramen parietale, welches häufig auf einer oder auf beiden Seiten fehlt, und von einem Santorinischen Emissarium zum Austritte benützt wird.

Der Knochen bietet, ausser dem sehr seltenen Zerfallen durch eine Quernath, keine erwähnenswerthen Abweichungen dar. Er ist der einzige Schädelknochen, der nur aus Einem Ossificationspunkt entsteht — Tuber parietale. — Der häufig gebrauchte Name Ossa bregmatica, stammt von $\beta o \xi \chi \omega$, befeuchten. Die Alten glaubten, dass die Borken, welche den Kopf von Säuglingen häufig bedecken, durch eine vom Gehirn ausgeschwitzte Feuchtigkeit entstehen.

§. 92. Schläsebeine.

Beide Schläsebeine, Ossa temporum (Synon.: Ossa parietalia inferiora, lapidosa, squamosa, crotaphitica, memento mori), liegen theils am Grunde des Schädels, theils an der Schläse, wo das srühzeitige Ergrauen der Kopshaare an die Fuga temporis erinnert, daher der lateinische Name. Jeder Schläseknochen hat eine unregelmässige Gestalt, und wird in drei Theile geschieden, welche sich zu der, an der äusseren Seite des Knochens besindlichen grössten Oessnung — dem äusseren Gehörgang, Meatus auditorius externus — so verhalten, dass der Schuppentheil über, der Felsentheil einwärts, der Warzentheil hinter derselben zu liegen kommt.

1. Der Schuppentheil (Squama s. Lepisma) hat an seiner äusseren Fläche vor und über dem Meatus auditorius externus einen, durch zwei zusammensliessende Wurzeln gebildeten, schlanken, aber starken, nach vorn gekrümmten, und zackig endigenden Fortsatz, den Jochfortsatz, Processus zygomaticus. Zwischen den beiden Wurzeln dieses Fortsatzes liegt die querovale Gelenkgrube für den Kopf des Unterkiesers (Fossa glenoidalis), und vor dieser, ein in die vordere Wurzel des Processus zygomaticus übergehender Hügel — Gelenkhügel, Tuberculum articulare. Eine senkrecht aussteigende Furche sür die Schläsenarterie kommt nur selten stark entwickelt vor. Die innere Fläche ist mit ansehnlichen Impressiones digitatae, und stark markirten Juga cerebralia besetzt, und zeigt nahe am vorderen Rande eine tiese Gesassrinne — Sulcus pro arteria meningea media, — die sich in die ähnlichen Rinnen am Seitenwandbeine verlängert.

Der mehr als halbkreissormige Rand der Schuppe ist nur an seinem vorderen unteren Abschnitte gezähnt; der Rest desselben läust, wegen

Kürze der inneren Tafel, scharf schneidend aus, und deckt den im entgegengesetzten Verhältnisse zugeschärften unteren Rand des Scheitelbeins zu, indem er sich über ihn hinaufschiebt.

2. Der Felsentheil (*Pars petrosa*) gleicht einer liegenden, dreiseitigen, aus steinharter Knochenmasse gebildeten Pyramide, deren Basis nach aussen, deren Spitze nach vorn und innen, gegen den Keilbeinskörper sieht. Er zeigt drei Flächen und drei Ränder.

Die hintere Fläche — die kleinste von den dreien — steht bei natürlicher Lagerung des Knochens fast senkrecht, und hat beiläufig in ihrer Mitte eine ovale Oessnung, die in den inneren Gehörgang (Meatus s. Porus acusticus internus) führt. Drei Linien von ihr nach aussen mündet die Wasserleitung des Vorsaals (Aquaeductus vestibuli), in einer krummen, seinen Spalte, von welcher eine Furche herabläust.

Die obere Fläche ist die grösste, und zugleich etwas nach vorn gekehrt, und wird von der inneren Fläche der Schuppe durch eine, nur an jugendlichen Individuen wahrnehmbare, nathähnliche Fissur (Sutura s. Fissura petroso-squamosa) geschieden. Neben der Spitze der Pyramide zeigt sich die innere Oeffnung des carotischen Kanals, von welcher eine Rinne (Semicanalis nervi Vidiani) nach aussen zu einem kleinen Loche führt, welches zu dem in der Masse des Felsenbeins verlaufenden Fallopischen Kanal geleitet, — Hiatus s. Apertura spuria canalis Fallopiae (auch Foramen Tarini, Foramen anonymum Ferreinii). In der Rinne, oder auswärts von ihr, münden, nebst kleinen Ernährungslöchern, die sehr seinen Canaliculi petrosi, die zur Trommelhöhle ziehen. Ein gegen die obere Kanto zulausender Höcker entspricht der Richtung des in die Felsenbeinmasse versenkten Canalis semicircularis superior des knöchernen Ohrlabyrinthes.

Die untere Fläche ist von der Schädelhöhle abgewendet, uneben. und erhebt sich zu einem, den äusseren Gehörgang von unten und vorn umschliessenden Knochenblatte, welches von der Gelenkgrube der Schuppe durch eine, sehr unrecht als Fissura Glaseri gemeinhin bezeichnete Spalte getrennt wird. Man begegnet an dieser Fläche, von aussen nach innen gehend, a) dem Griffelwarzenloch, Foramen stylo-mastoideum, als Ausmündung des Fallopischen Kanals, genau unter dem äusseren Gehörgange, - b) neben ihm dem Griffelfortsatz, Processus styloideus. von verschiedener Länge, nach unten und innen ragend, - c) neben dem Griffelfortsatze der seichteren oder tieferen Drosseladergrube, Fossa juqularis, mit der kleinen Anfangsöffnung des Canaliculus mastoideus s. Arnoldi, der in den Canalis Fallopiae führt, - d) der unteren Oeffnung des carotischen Kanals, neben der Fossa jugularis, gegen den vorderen Rand zu, und e) gegen den hinteren Rand hin, der trichtersormigen End-Zwischen der Incisura jugularis, mündung des Aquaeductus cochleae. und der unteren Oeffnung des Carotischen Kanals, liegt die flache Fossuls petrosa, die häufig kaum angedeutet ist, und dem in die Paukenhöhle eindringenden Canaliculus tympanicus zum Ursprunge dient.

Führt man in das Foramen stylomastoideum eine Borste ein, so gelingt es leicht, sie so weit fortzuschieben, dass sie durch den Hiatus Fallopiae zum Vorschein kommt. Eben so leicht ist es, eine zweite Borste, vom inneren Gehörorgane aus, durch denselben Hiatus austreten zu machen. Es existirt somit in der Substanz des Felsenbeins ein Kanal, der im inneren Gehörgange seinen Anfang, und im Foramen stylomastoideum sein Ende hat, und nebst diesen beiden Mündungen noch eine Seitenöffnung im Hiatus besitzt. Dieser Kanal, der das 7. Gehirnnervenpaar aus dem Schädel leitet, ist der Canalis s. Aquaeductus Fallopiae. Die in der Beschreibung des Felsentheils genannten Canaliculi petrosi sind, so wie der Canaliculus mastoideus und tympanicus, nur für ein Borstenhaar permeabel, und können, da sie von gewöhnlichen feinen Ernährungslöchern, bei äusserer Besichtigung des Knochens, nicht zu unterscheiden sind, nur durch sorgsames Sondiren mit dünnen Borsten ausfindig gemacht werden.

Die drei Winkel oder Ränder werden in den oberen, vorderen, und hinteren eingetheilt. Der obere ist die Vereinigungskante der hinteren Felsenbeinsläche mit der oberen. Er ist besonders an seiner äusseren Hälste tief gesurcht, — Sulcus petrosus superior. Der vordere ist der kürzeste, und bildet, mit dem vorderen unteren Stücke des Schuppenrandes, einen einspringenden Winkel, der die Spina angularis des Keilbeins ausnimmt. Am äusseren Ende dieses Randes liegt eine, in die Trommelhöhle gehende Oessnung, welche durch eine Knochenleiste in eine obere kleinere, und untere grössere Abtheilung gebracht wird. Erstere ist der Ansang des Semicanalis tensoris tympani, letztere die Insertionsössnung der Tuba Bustachii. Der hintere Rand der Pyramide erscheint durch die unregelmässige Incisura jugularis ausgeschnitten, welche mit der gleichnamigen Incisur der Gelenktheile des Hinterhauptbeins das Drosseladerloch (Foramen jugulare s. lacerum) zusammensetzt.

3. Der Warzen- oder Zitzentheil (Pars mastoidea s. mammillaris, von μαστός, Brustwarze) ist ein unsormliches, stumpszackig gerandetes Knochenstück, mit ausserer und innerer Flache. Die aussere Flache ist mit dem einer Brustzitze ahnlichen Processus mastoideus s. Apophysis mammillaris, der von unten durch die Incisura mastoidea wie eingefeilt erscheint, besetzt. Er ist nicht wie die übrigen Knochenapophysen solide. sondern schliesst eine vielzellige Höhle — Cellulae mastoideae — ein, die mit der Trommelhöhle in Verbindung steht. Der Processus mastoideus erscheint von der hinteren Peripherie des äusseren Gehörganges durch eine Spalte abgegrenzt, welche, wie die Fissura petroso-squamosa, ein Rest der früher bestandenen Trennung der drei Formbestandtheile des Schläsebeins ist, und die Endmundung des Canaliculus mastoideus enthält. Die innere Fläche ist concav, mit einer breiten, tiefen, halbmondformig gekrummten Furche — Fossa sigmoidea (σίγμα-είδος, C-nicht Σ-formig) für den gueren Blutleiter der harten Hirnhaut versehen, von welcher ein zum Durchgange eines Santorinischen Emissariums dienendes Loch -

Foramen mastoideum — zur Aussenstäche des Knochens sührt. Häusig wird dieses Loch erst durch den Zusammentritt des Warzentheils mit der Hinterhauptschuppe gebildet, oder liegt wohl auch ganz und gar in letzterer. Die Ränder des Warzentheils sind: der obere, zur tiesgreisenden Nathverbindung mit dem Angulus mastoideus des Scheitelbeins, und der hintere zur schwächer gezackten Vereinigung mit dem unteren Theile des Seitenrandes der Hinterhauptschuppe.

Im Inneren des Schläsebeins liegt, zwischen dem Meatus auditorius externus und dem Felsentheile, die Paukenhöhle (Cavum tympani), und in der Felsenpyramide selbst, das Labyrinth des Gehörorgans. Viele oben angesührte Kanäle und Oessnugen stehen in einem innigen Bezuge zum inneren Gehörorgane, und können erst, wenn der Bau des letzteren bekannt ist, richtig ausgesasst und verstanden werden. Deshalb macht das Studium des Schläsebeins dem Ansänger gewöhnlich die grössten Schwierigkeiten, die wohl in der Natur der Sache liegen, und nur dann verschwinden, wenn man die äussere Oberstäche des Knochens aus seinen Inhalt bezieht, der erst in der Lehre von den Sinnesorganen besprochen wird.

Die Varianten des Schläsebeins sind: Bedeutende, bis aus 2 Zoll steigende Länge des Grissels; Zusammensetzung desselben aus mehreren durch Synchondrose oder Synostose verbundenen Stücken, und excedirende Dicke an seiner Basis, bis auf 4 Linien; Gegenwart einer Markhöhle in ihm; doppelter Warzensortsatz (Roemer, durch besondere Tiese der Incisura mastoides entstanden); Verengerung (Tode), selbst auch Verwachsung (Otto) des Carotischen Kanals; am oberen Felsenbeinrande eine narbig eingezogene Grube, als Ueberbleihsel embryonischer Bildungsphasen; und ein selbstständiges, slaches Knochenscheibehen am Ende des Carotischen Kanals, Ossiculum sesamoideum Cortesii (von Cortese 1625 entdeckt, von Zinn, Meckel dem älteren, und mir bestätigt). Ein ähnliches, selten vorkommendes Knöchelchen, als Ergänzungsstück des Foramen jugulare, erwähnt W. Gruber (Bulletin de l'Acad. de St. Petersburg. 11. Bd. pag. 94). Ich besitze ein übrigens durchaus normales Schläsebein, an welchem hinter und über dem Meatus auditorius externus eine kreisrunde, 3 Linien weite Oessinung in die Trommelhöhle sührt.

§. 93. Verbindung der Schädelknochen. Fontanellen.

Die Verbindung der sieben Schädelknochen wird durch wahre und falsche Näthe, durch Anlagerung und Synchondrose bewerkstelligt. 1. Wahre Näthe finden sich zwischen tief gezahnten, in einander greisenden Knochentändern. Die Kranz- oder Kronennath (Sutura coronalis) zwischen Stirn- und den beiden Scheitelbeinen, die Pfeilnath (Sutura sagittalis s. interparietalis) zwischen beiden Scheitelbeinen, die Lambdanath (Sutura lambdoidea) zwischen Hinterhauptschuppe und den hinteren Rändern beider Scheitelbeine, die Warzennath (Sutura mastoidea) zwischen Warzentheil des Schläsebeins und unterem Seitenrande des Hinterhauptbeins, so wie die abnorme Stirnnath (Sutura frontalis) sind die Repräsentanten der wahren Schädelnäthe. Bei Kahlköpsen kann man sie häusig durch die verdünnten und glänzenden Schädeldecken hindurch erkennen, da sie sich erhöhen, oder, wie die Lambdanath, einsinken. Es giebt deren

nebstdem noch mehrere am Schädel, und sie könnten, wenn sie einen Namen erhalten sollten, selben von den beiden Knochen entlehnen, welche sie vereinigen: Sutura squamoso - sphenoidalis, spheno-frontalis etc.

2. Falsche Näthe (Suturae spuriae s. squamosae) bestehen als Uebereinanderschiebung zweier entgegengesetzt zugeschärster Knochenränder, zwischen Schläsenschuppe und Seitenwandbein (Sutura temporo-parietalis), und zwischen Angulus sphenoidalis des Seitenwandbeins und oberem Rand des grossen Keilbeinstügels (Sutura spheno-parietalis).

3. Einsache Anlagerung oder Harmonie durch rauhe, nicht gezackte Ränder, sindet sich zwischen dem vorderen Rande der Schläsenpyramide, und dem grossen Flügel des Keilbeins, während 4. die Verbindung zwischen dem hinteren Rande und der Spitze der Pyramide einerseits, und der Pars condyloidea des Hinterhauptbeins und dem Keilbeinkörper andererseits, durch einen dichten Faserknorpel als Bindungsmittel ausgeführt wird — Synchondrosis.

Schultz unterscheidet mehrere Unterarten von wahren und falschen Näthen, von welchen die Kopfnath und die Stiftnath die zulässlichsten sind. Erstere charakterisirt sich durch kleine Hervorragungen des einen Knochenrandes, welche durch Löcher des anderen umschlossen werden; findet sich in der Nath zwischen kleinem Keilbeinflügel und Stirnbein. Die Stiftnath entsteht, wenn ganz lose Knöchelchen, wie Stifte, durch die Löcher zweier zusammenstossenden Knochenränder gesteckt sind. Soll in der Nath zwischen Stirnbein und Stirnfortsatz des Oberkiefers, und in der Verbindung vom Basilartheil des Hinterhauptbeins mit dem Keilbeinkörper (während der Verknöcherungsperiode der hier befindlichen Symphyse bei jugendlichen Individuen) vorkommen. Siehe dessen Bemerkungen über den Bau der normalen Menschenschädel. Petersburg, 1852. p. 9.

In jüngeren Lebensperioden erscheinen die wahren Näthe weit weniger kraus, als im mittleren Alter, und verstreichen in vorgerückten Jahren ganz, wobei die Sutura mastoidea den Anfang macht; die Sutura parietalis und lambdoidea folgen nach, und war eine Stirnnath vorhanden, so bleibt sie unter allen am längsten. Jede wahre Nath ist es nur bei äusserer Ansicht; bei innerer Ansicht erscheint sie, wegen sehr geringer Entwicklung von Zacken an der inneren Knochentafel, als eine einfache Harmonie. Die Harmonie der inneren Tafel verschmilzt vor der Sutur der äusseren. Da die innere Tafel der Schädelknochen viel sprüder und brüchiger ist, als die äussere, so wären Nathzacken an der inneren Tafel von keinem besonderen Vortheil für die Festigkeit des Schädels gewesen.

Da die Schädelknochen sich aus Ossisicationspunkten entwickeln, welche durch concentrische Anlagerung gleichartiger Knochenmasse wachsen, so müssen die Ecken und Winkel der breiten Taseln zuletzt entstehen, und es muss eine Periode im Bildungsgange des Schädels geben, wo zwischen den sich nur berührenden Kreisscheiben der Schädelknochen, nicht verknöcherte, und durch Weichgebilde verschlossene Stellen übrig bleiben, welche Fontanellen — Fonticuli s. Lacunae — genannt werden.

Es liegt deren eine an jedem Winkel des Seitenwandbeins, und wir

zählen somit eine Stirn-, Hinterhaupt-, Keilbein- und Warzenfontanelle. Die Stirnfontanelle ist die grösste, viereckig, und erhält sich am längsten. Sie reicht beim Embryo bis zur Nasenwurzel herab. An grossen Kindsköpfen ist sie jahrelang unverknöchert geblieben. Da man bei Neugeborenen, und in den ersten Monaten nach der Geburt, die Bewegungen des Gehirns durch die Stirnfontanelle sieht und fühlt, so wurde sie Fons pulsatilis s. Vertex palpitans geheissen, und da die Aerzte des Alterthums die Vorstellung hatten, dass durch die Bewegungen des Gehirns die Lebensgeister in die Nerven strömten, mag wohl dieses die Veranlassung der sonderbaren Benennung Fonticulus, i. e. Quelle, gewesen sein. Die Hinterhauptsontanelle ist um die Zeit der Geburt schon durch die Spitze der Hinterhauptschuppe ausgefüllt. Im Embryo ist sie dreieckig, und viel kleiner, als die vordere. Die kleine Keilbeinsontanelle am Angulus sphenoidalis des Scheitelbeins, und die Warzenfontanelle (F. mastoideus s. Casserii), werden auch als vordere und hintere Seitenfontanelle beschrieben.

Die Nathe und Fontanellen sind in praktischer Beziehung, für die Ausmittlung der Lage des Kindkopfes bei der Geburt, von hoher Wichtigkeit. Sie erlauben ferner durch ihre Annäherung eine Verkleinerung des Kopfvolumens während des Durchganges durch den Beckenring der Mutter, und sind für das Wachsthum des Schädels eine unerlässlich nothwendige Bedingung. Die Wichtigkeit der Nathe in letzterer Beziehung wurde zuerst von Gibson erkannt, und von Sommerring näher beleuchtet. Die Hirnschale ist in den ersten Wochen des Embryolebens eine häutig-knorpelige Blase, die durch die Entwicklung und Vergrösserung der in ihr niedergelegten, oder auf ihr entstandenen, primitiven Verknöcherungspunkte allmälig verdrängt wird. Man nennt die aus dem Primordialknorpel des Schädels entstandenen Schädelknochen Primordialknochen, die übrigen dagegen, als Auslagerungen auf häutigen Substraten, Deckknochen (siehe §. 110). Wenn diese Knochen bis zur gegenseitigen Berührung herangewachsen sind, so werden zwischen den Berührungsrändern derselben, nur schmale Streisen des Primordialknorpels, oder des häutigen Antheils des jungen Schädels, übrig bleiben. Bei der Zusammensetzung des Schädels aus mehreren, durch Säume von weicherem Stoff getrennten Stücken, ist es den letzteren möglich, dem durch das Wachsthum des Gehirns von innen nach aussen veranlassten Drucke nachzugeben, und sich durch Anschuss neuer Knochenmasse am Rande zu vergrössern. Die Schädelknochen wachsen somit theils an ihren Rändern, theils auch durch Ansatz neuer Knochenmasse an die Flächen der bereits fertigen Schädelknochenscheiben. Würde der Schädel vom Anfange an aus Einem Knochengusse bestehen, so wäre die Vergrösserung seiner Peripherie, wenn nicht unmöglich, doch nur auf sehr langsame Weise zu erzielen.

Da nicht alle Schädelknochen durch Ossificirung eines präexistirenden Knorpels, sondern einige direct aus einem weichen, nicht knorpeligen Blastem gebildet werden, so ist der von Gibson und Sömmerring gebrauchte Ausdruck, dass die Nathknorpel die Absonderungsorgane der Schädelknochen seien, nicht für alle Schädelknochen passend. — Die Näthe halten übrigens die Ränder der fertigen Schädelknochen so fest an einander, dass durch mechanische Gewalten erzeugte Brüche, von einem Schädelknochen in den nächstliegenden fortlausen, ohne durch die Näthe ausgehalten zu werden, und Trennungen der

Näthe ihrer Länge nach (Diastases suturarum), zu den seltensten Folgen von Verletzungen gehören. Hat die Entwicklung des Gehirns ihren Culminationspunkt erreicht, so werden die Näthe überslüssig, und verschmelzen durch Synostose von innen nach aussen zu. Dieses Verschmelzen tritt nicht an der ganzen Länge der Nath mit einmal ein, sondern schreitet gewöhnlich von der Mitte gegen die Endpunkte vor. Ist der Druck, den die Schädelknochen von innen her auszuhalten haben, bei raschem Wachsthum des Gehirns (Hypertrophie), oder bei Wasseransammlungen in der Schädelhöhle ein bedeutender, und kann in einer gegebenen Zeit nicht so viel Knochenmaterie am Rande des jugendlichen Schädelknochens abgelagert werden, als die Ausdehnung der Suturalknorpel erfordert, so werden letztere immer breiter, und können nachträglich durch neue Knochenkerne, die sich vergrössern, ausgestillt und verdrängt werden. Wo ein Nathknorpel vorkommt, setzt sich derselbe in die knorpelige Grundlage der Schädelknochen unmittelbar fort, und ist der nicht ossisicirte Theil des primordialen Schädelknorpels. Entzieht man der Basis einer frischen Hirnschale durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure die Knochenerde, so bleibt eine continuirliche Knorpelschale zurück, an welcher keine Nathspuren zu entdecken sind. Da man die Schädelknochen nur an macerirten Köpfen studirt, erhält man von den Nathknorpeln keine Anschauung.

Ein sehr interessanter Artikel über den auf Festigkeit des Schädels abzweckenden Bau der Näthe findet sich in *Todd*, Cyclopaedia of Anat. and Physiol. "Crane."

§. 94. Ueberzählige Schädelknochen.

Die Zahl der Schädelknochen erscheint in nicht ganz seltenen Ausnahmsfällen durch das Austreten ungewöhnlicher Knochen vermehrt. Es zerfällt entweder ein normaler Schädelknochen, wie bereits beim Stirn-, Scheitel- und Hinterhauptbein bemerkt wurde, durch abnorme Nathbildung in zwei oder mehrere Stücke; oder es entwickeln sich in den Schädelnäthen selbstständige Knochen, die mit dem Namen der Nath- oder Schaltknochen, auch Zwickelbeine (Ossicula suturarum, Wormiana, triquetra, epactalia, raphogeminantia) belegt werden. Die Entstehung letzterer datirt aus jener Periode des Embryolebens, wo die Schädelknochen noch durch weiche häutige Stellen von einander getrennt sind. Werden in diesen selbstständige Ossificationspunkte niedergelegt, die bis auf eine gewisse Grösse wachsen, ohne mit den anstossenden Knochen zu verschmelzen, so treten sie in die Kategorie der überzähligen Schädelknochen. Am häusigsten sinden sie sich in der Lambdanath, wo ihre Zahl, namentlich bei hydrocephalischen Schädelformen, bis in das Unglaubliche wuchert; sie wurden aber in jeder anderen Nath, und selbst in der Mitte der Hinterhauptschuppe eingeschlossen gesehen.

Wo die Pfeilnath mit der Kranznath und mit der Lambdanath zusammenstüsst, erreichen die Nathknochen eine merkwürdige Grösse, und nehmen hier, so wie wenn sie an den beiden unteren Winkeln des Scheitelwandbeins vorkommen, den Namen der Fontanellknochen an. Der zwischen Pfeilund Kreuznath eingeschaltete Fontanellknochen war schon den älteren Aerzten (dem originellen Salzburger, Phil. Höchener, der sich selbst zum Para-

celsus latinisirte) bekannt, und wurde als Heilmittel gegen die fallende Sucht angewendet, woher die alte Benennung: Ossiculum antiepilepticum. Der an der Spitze der Hinterhauptschuppe vorkommende wird bei vielen Nagern, Wiederkäuern und Fledermäusen, ein bleibender Knochen, und in der vergleischenden Anatomie als Os interparietale aufgeführt (Geoffroy). Der bei den Mäusen constante Interparietalknochen wurde von M. N. Meyer: Ostansversum genannt. Ueber die Verschiedenheiten dieses und anderer Schaltknochen an thierischen Schädeln enthalten das vollständigste Material W. Gruber's Abhandlungen aus der menschl. und vergleichenden Anatomie. Petersburg, 1852.

Als allgemeine Gesetze des Vorkommens der Zwickelbeine gelten folgende:

- 1. Sie finden sich in der Regel nur am Schädel, nicht am Gesichte.
- 2. Schädel mit grossen Dimensionen zeigen sie häufiger, als kleine.
- 3. Ihre Grösse variirt vom einfachen Knochenkerne, bis zum Umfange eines Thalers, wie ich an einem Stirnfontanellknochen vor mir sehe.
 - 4. Sie sind häufiger symmetrisch gestellt, als nicht.

Höchst interessant ist eine von Tschudi gemachte Beobachtung, nach welcher ein wahres Os interparietale bei gewissen Stämmen der Ureinwohner von Peru, den Chinchas, Aymaras und Huankas, constant vorkommt. Der grösste obere Theil der Hinterhauptschuppe existirt nämlich bei Neugeborenen als selbstständiger Knochen, bleibt es durchs ganze Leben, oder verschmilzt nur selten nach dem 4. oder 5. Lebensmonate mit dem Reste der Schuppe. Eine über der Linea semicircularis superior verlausende Furche erinnert auch bei alten Schädeln dieser Stämme an die srüher bestandene Trennung.

Die in der Lambdanath eingeschlossenen Nathknochen ragen nicht selten stark hervor, und sind schon für Exostosen gehalten worden (Bartholin). Kleine Nathknochen bestehen in der Regel nur aus der äusseren Knochenlamelle der Schädelknochen, und werden deshalb blos bei äusserer, nicht bei innerer Ansicht der Näthe gesehen. Der Name Os epactale stammt von epactas (Schalttag); der Name Ossa Wormiana (von dem dänischen Arzte Ole Worm) ist ungerecht, da schon Eustachius diese Knochen kannte.

Man hat solche Zwickelknochen fast in allen Näthen angetroffen, und kürzlich wurde von J. Czermak ein solcher in der oberen Wand der Augenhöhle, an der Stelle, wo das Stirn-, Sieb- und Keilbein zusammenstossen, beschrieben. Zeitschrift für wiss. Zool. 1851. 1. Hest. —

§. 95. Schädelhöhle.

Die Grösse und Gestalt der Schädelhöhle, Cavum cranii, ist in verschiedenen Lebensperioden, bei verschiedenen Individuen und Racen, so veränderlich, dass, ohne in nutzlose Details einzugehen, sich nur allgemeine Bestimmungen geben lassen. Es lässt sich insofern sagen, dass die Schädelhöhle im Verhältniss zur Körpergrösse um so geräumiger ist, je jünger das Individuum, denn die Geräumigkeit der Schädelhöhle hängt vom Volumen des Gehirns ab, welches im Embryonen- und Kindesalter relativ prävalirt. — Dass die Gestalt des Schädels sich im Allgemeinen nach der Masse und der Gestalt des Gehirns richtet, ist wahr; unwahr aber ist es, dass man aus der Gestalt des Schädels, aus gewissen Hervorragungen desselben auf die Anlagen, Fähigkeiten, Tugenden und Laster eines Menachen

schliessen könne. Das allgemeine Princip der Abhängigkeit der Schädelform vom Gesammtgehirn ist richtig und unbeanständigt, — die Functionen der einzelnen Gehirntheile aber sind noch so räthselhaft, dass eine Lehre, die sich anmasst, durch Abgreisen des Schädels die geistigen Anlagen eines Menschen aussindig machen zu wollen, nur von Thoren sur Thoren ersunden werden konnte. Dieses über den Werth der Gall'schen Schädellehre. —

Ein durch die Länge der Pfeilnath nach abwärts, und ein anderer durch die Stirnhöcker horizontal nach hinten gelegter Durchschnitt, geben Ovallinien, deren schmales Ende gegen die Stirne zu liegt. Die Schädelhöhle hat somit die Eiform. Die obere Schale des Eies ist glatt, die untere — Basis cranii — zeigt sich bei innerer Ansicht, durch auf einander folgende Vorsprünge und Vertiefungen, in drei Gruben getheilt, welche von vorn nach rückwärts gezählt werden.

- 1. Vordere Schädelgrube. Sie liegt unter allen am höchsten, und wird durch die *Partes orbitariae* des Stirnbeins, die *Lamina cribrosa* des Siebbeins, von welcher man nur sehr wenig sieht, und die schwertförmigen Flügel des Keilbeins gebildet. Der scharfe hintere Rand der letzteren trennt sie von der darauf folgenden mittleren Grube. Aus der Mitte ihres Grundes ragt die *Crista galli* empor, vor welcher das *Foramen coecum* und der Anfang der *Crista frontalis* liegen.
- 2. Die mittlere Schädelgrube hat die Gestalt einer liegenden ∞ , und besteht eigentlich aus zwei seitlichen Gruben, welche durch die Sella turcica in Verbindung stehen. Sie wird durch die oberen und die beiden Seitenslächen des Körpers, so wie durch die Superficies cerebralis des grossen Keilbeinslügels, und durch die obere Fläche der Felsenpyramide zusammengesetzt. Der obere Rand der Pyramide trennt sie von der
- 3. hinteren Schädelgrube, welche die grösste von den dreien ist, und durch das Hinterhauptbein, die hintere Fläche der Pyramide, und die innere Fläche der Pars mastoidea gebildet wird.

Nebst diesen Gruben finden sich an der inneren Oberstäche des Schädelgehäuses noch minder ausgedehnte Vertiesungen, welche als Rinnen auftreten, die entweder verzweigt sind, oder keine Nebenäste abgeben. Erstere nehmen nur arterielle Gesässramistationen auf, und heissen Sulci arteriosi. Sie entspringen am Foramen spinosum mit einer Hauptsurche, welche an der Schuppe des Schläsebeins sich in zwei Nebenzweige theilt, welche durch wiederholte Theilung allmälig sich verjüngen, und über das Seitenwandbein zum grossen Keilbeinstügel und zum Stirnbein gelangen. Letztere sind viel breiter, unverzweigt, geleiten die Blutleiter der harten Hirnhaut, und heissen deshalb Sulci venosi. Wir unterscheiden solgende Sulci venosi: a) Der grösste derselben beginnt schon über der Crista des Stirnbeins, geht längs der Sutura sagittalis nach rückwärts, an der rechten Seite des senkrechten Schenkels der Eminentia cruciata interna des Hinterhauptbeins nach abwärts, und setzt sich in die Furche zwischen den

rechten Hälften der beiden Querlinien als Sulcus transversus fort, streift über den Warzenwinkel des Seitenwandbeins nach vorn, und steigt an der inneren Fläche des Warzentheils vom Schläsebein herab, um sich um den Processus jugularis des Hinterhauptknochens zu krümmen, und im Foramen jugulare dextrum zu endigen. b) Zwischen den linken Hälsten der inneren Querlinien des Hinterhauptbeins besindet sich ein ähnlicher Venensulcus, der denselben Weg zum Foramen jugulare sinistrum einschlägt. c) Am oberen Rande der Pyramide liegt ein constanter Sulcus petrosus superior, und d) am vorderen und hinteren Rande der häusig sehlende Sulcus petrosus anterior et posterior.

Es ist für den Ansinger von grossem Nutzen, sich beim Studium der Schädelgruben nicht der getrennten Schädelknochen, sondern eines horizontal und eines vertical aufgesägten Schädels zu bedienen, und an der Basis und den Seitenwänden derselben die einzelnen Oeffnungen und Furchen aufzusuchen, die in der speciellen Beschreibung der Schädelknochen genannt wurden. Das relative Lagerungsverhältniss dieser Oeffnungen und Furchen ist für die Angaben der später folgenden Doctrinen, besonders der Gesäss- und Nervenlehre, von hohem Belange.

Die durch einen senkrechten Durchschnitt des Schädels erhaltenen Hälften desselben sind sast niemals vollkommen gleich. Diese Ungleichheit trisst besonders gewisse Einzelnheiten, und zwar vorzugsweise die Gruben des Hinterhauptbeins, die Sulci venosi und Foramina jugularia, welche aus der rechten Seite stärker ausgewirkt gesunden werden. Man glaubte mit Unrecht, den Grund sur die grössere Entwicklung der Sulci venosi und des Foramen jugulare dextrum, in dem häusigen Liegen aus der rechten Seite gesunden zu haben, wodurch das venöse Blut, den Gesetzen der Schwere zusolge, in den Gesässen nach rechts strömt.

Am skeletirten Schädel existirt zwischen der Spitze der Felsenpyramide und dem Keilbeinkörper eine zackige Oeffnung, welche im frischen Schädel durch Knorpel ausgefüllt ist, sich in den, zwischen hinterem Winkel der Pyramide und Seitentheil des Hinterhauptbeins besindlichen Spalt — Fissura petroso-basilaris — verlängert, und Foramen lacerum anterius genannt wird.

b) Gesichtsknochen.

§. 96. Allgemeine Bemerkungen über die Gesichtsknochen.

Der Gesichtstheil des Kopfes wird durch 14 Knochen construirt. 13 derselben (die paarigen Oberkiefer-, Joch-, Gaumen-, Nasen-, Thränen-, Muschelbeine, und der unpaarige Pflugscharknochen) sind zu einem unbeweglichen, an der Hirnschale befestigten Ganzen verbunden, welches die zur Unterbringung der Gesichts- und Geruchswerkzeuge erforderlichen Höhlen enthält. Unter diesen liegt der 14. Gesichtsknochen (der Unterkiefer), welcher mit dem übrigen Knochengerüste des Gesichts nicht zusammenhängt, sondern an der Basis des Hirnschädels (am Schläsebein) beweglich durch ein Gelenk suspendirt wird. Da das Pflugscharbein um eine Zeit, wo noch alle übrigen Kopsknochen getrennt von einander bestehen, schon mit dem Siebbein innig verwachsen erscheint, so könnte es, mit Portal

und Lieutaud, als ein Theil dieses Knochens angesehen werden, wodurch die Zahl der Gesichtsknochen auf 13 reducirt würde, deren paarige Stücke das Oberkiefergerüste bilden, welchem der einzige unpaarige Knochen des Unterkiefers beweglich gegenübersteht.

Die Verbindungen der Gesichtsknochen mit den Schädelknochen werden durch starkgezähnte Näthe, und die Verbindungen derselben unter einander grösstentheils durch Anlagerungen bewerkstelligt.

Der Oberkieferknochen verhält sich zum Gesichte wie das Keil-Hinterhauptbein zum Hirnschädel. Er ist ein wahrer Basilarknochen des Gesichts, der sich mit allen übrigen verbindet, und sie an Grösse bei weitem übertrifft. Die übrigen Gesichtsknochen dienen entweder zur Vermehrung seiner Verbindungen mit dem Schädel, welche grösstentheils mittelbare sind, und zur Sicherung seiner Stellung, welche bei dem grossen Drucke, den er beim Beissen auszuhalten hat, leicht zu gefährden wäre (Jochbein, Nasenbein), oder zur Vergrösserung seiner Flächen (die übrigen kleineren und dünneren Gesichtsknochen: Gaumenbein, Muschelbein, Thränenbein). Die Befestigungsknochen werden somit einen bedeutenden Grad von Stärke besitzen müssen, dessen die blossen Vergrösserungsknochen leicht entbehren können. Erstere werden kurze und dicke, letztere flache und dünne Knochen sein.

Von den paarigen Gesichtsknochen genügt es, nur Einen zu beschreiben.

§. 97. Oberkieferbein.

Das Oberkieferbein, Maxilla s. Mandibula superior, Os maxillare superius, ist durch seine Grösse und physiologische Bedeutung als passives Kauwerkzeug, der wichtigste Knochen der festen oberen Gesichtshälfte, und wird in den Körper, und in 4 Fortsätze eingetheilt.

a) Der Körper hat, wenn man sich alle Fortsätze weggenommen denkt, die Gestalt eines Keils, und wird, um mit Aufrechthaltung seiner Grösse und Form eine gewisse Leichtigkeit zu verbinden, durch den Sinus maxillaris s. Antrum Highmori ausgehöhlt. Er besitzt drei Flächen oder Wände: 1. Die äussere oder Gesichtsfläche (Superficies s. Lamina facialis) ist von vorn nach hinten convex, und durch eine vom Jochfortsatze herabsteigende glatte Erhabenheit in eine vordere und hintere Halste getheilt. Erstere besitzt unter ihrem oberen Rande das Foramen infraorbitale, und unter diesem eine seichte Grube, wie ein Fingereindruck der Knochenwand (Fovea maxillaris); letztere wird nach hinten durch die Tuberositas maxillaris — eine mit vielen Löchern durchbohrte Rauhigkeit begrenzt. Die Löcher derselben sind theils der Ausdruck der schwammigen Textur des Knochens, theils dienen sie als Zugänge zu Gesäss- und Nervenkanalen, und heissen in diesem Falle Foramina maxillaria superiora, obwohl jedes Loch des Oberkiefers auf diese Bezeichnung Anspruch hat. 2. Die obere oder Augenhöhlenfläche, Superficies orbitalis s.

Planum orbitale, ist dreieckig, und nach vorn und aussen etwas abschüssig. Von ihren drei Rändern ist nur der innere leicht gezackt, für den unteren Rand des Thranenbeins und der Lamina papyracea des Siebbeins. Der vordere und hintere sind glatt und abgerundet. Der vordere bildet einen Theil des unteren Augenhöhlenrandes (Margo infraorbitalis). Der hintere bildet mit dem über ihm liegenden, unteren Rande der Augenhöhlenstäche des grossen Keilbeinflügels, die untere Augengrubenspalte (Fusura orbitalis Von ihm geht eine Furche, die sich allmähg in einen Kanal (Canalis infraorbitalis) umwandelt, nach vorwärts, um am Foramen infraorbitale auszumunden. Der Canalis infraorbitalis führt während seines Lauses in zwei seitliche Nebenkanälchen, welche zwischen den beiden Lamellen der Facialwand des Oberkieserkörpers, gegen die Wurzeln der Zähne herablausen (Canalis alveolaris anterior et medius), welche, so wie die mehrfachen Canales alveolares posteriores, die von den Foramina maxillaria superiora entspringen, bei äusserer Untersuchung des Knochens nicht zu sehen sind, und mit Hammer und Meissel dargestellt werden mit-3. Die Nasensläche (Superficies s. Lamina nasalis) ist durch die grosse Oeffnung der Highmorsböhle durchbrochen, und hat vor dieser den weiten Sulcus lacrymalis als senkrechten Halbkanal.

b) Die 4 Fortsätze wachsen nach oben, aussen, unten, und innen aus dem Körper heraus, und sind: 1. Der Processus nasalis s. frontalis s. ascendens. Durch seine tiefgekerbte Spitze verbindet sich das Oberkieferbein directe mit dem Schädel an der Pars nasalis des Stirnbeins. Sein vorderer Rand ist an der oberen Hälfte geradlinig, und stösst an das Nasenbein; die untere Hälfte dieses Randes ist concav, und hilft den vorderen Naseneingang (Incisura s. Apertura pyriformis narium) bilden. Der hintere Rand stösst an das Thränenbein. Die äussere Fläche wird durch eine erhabene Leiste (eine Fortsetzung des Margo infraorbita-Lis) in eine vordere, ebene, das knöcherne Nasendach bildende, und in eine hintere, kleinere, rinnensormig gehöhlte Abtheilung (Thränensackgrube, Fossa sacci lacrymalis) getheilt, welche nach abwärts unmittelbar in den Sulcus lacrymalis sortläust. Die innere Fläche deckt nach oben einige Zellen des Siebbeinlabyrinthes, und wird durch eine vom unteren Ende des Sulcus lacrymalis nach vorn laufende rauhe Leiste (Crista turbinalis) zur Anlagerung der unteren Nasenmuschel, quer geschnitten. liegt, einen Daumen breit über der Crista turbinalis, eine rauhe, lineare Anlagerungsspur der unteren Siebbeinmuschel (Crista ethmoidalis). 2. Der Processus sygometicus, stumpspyramidal, und eine Ecke der Highmorshöhle umschliessend, steht fast horizontal nach aussen, und erscheint durch eine dreieckige, zackenbesetzte Fläche wie abgebrochen (Jochbeinansatz). 3. Der Processus palatinus bildet ein viereckiges, starkes, horizontal nach innen gehendes Knochenblatt, welches seine obere, glatte, concave Fläche der Nasenböhle, und seine raube untere Fläche der Mundhöhle zukehrt, und mit dem der anderen Seite den vorderen grösseren Theil des harten

Gaumens bildet. Der innere und hintere Rand sind gezackt, ersterer überdies ausgebogen, und nach vorn zu höher werdend. Er bildet mit dem entgegenstehenden Rande des anderen Oberkieferknochens die Crista nasalis, welche nach vorn in die Spina nasalis anterior (vorderer Nasenstachel) ausläuft. Einen halben Zoll hinter der Spitze der Spina nasalis anterior liegt an der oberen Fläche, dicht am inneren Rande derselben, ein Loch, welches in einen schräg nach innen und abwärts laufenden Kanal (Canalis nasopalatinus) führt. Die Kanäle des rechten und linken Gaumenfortsatzes convergiren somit, vereinigen sich, und münden an der unteren Fläche des harten Gaumens durch eine gemeinschaftliche Oeffnung aus, welche in der die Gaumenfortsätze vereinigenden Nath, hinter den Schneidezähnen liegt, und deshalb Foramen incisivum s. palatinum anterius genannt wird. 4. Der Processus alveolaris ist nach abwärts gerichtet, gebogen, mit äusserer Convexität. Er besteht aus einer äusseren schwächeren, und inneren stärkeren Platte, welche ziemlich parallel laufen. und durch Querwände so unter einander zusammenhängen, dass 8 Zahnzellen - Alveoli - entstehen, welche für die ersten fünf Zähne (von den Schneidezähnen an gezählt) einfach kegelförmig sind, und für die letzten drei, in drei divergirende hohle Zipfe auslaufen. Die Lagerung und Tiefe der Alveoli ist durch die wellensormige Krummung der vorderen Platte des Fortsatzes (Juga alveolaria) angedeutet, welche man am eigenen Schädel deutlich fühlt, wenn man den Finger über dem Zahnsleisch des Oberkiefers hin und her führt. Da die Juga alveolaria der Dicke der Zahnwurzeln entsprechen, so erfährt der Zahnarzt aus derselben Untersuchung, ob ein Zahn leicht oder schwer zu nehmen ist, und richtet darnach das Mass der anzuwendenden Kraft.

Nicht selten finden sich am Oberkiefer aussergewöhnliche Näthe oder Nathspuren, die als Ueberbleibsel früherer Bildungszustände anzusehen sind.

a) Vom Foramen infraorbitale zum gleichnamigen Margo, und zuweilen durch das ganze Planum orbitale laufend. b) Von der Spitze des Processus frontalis gegen den unteren Augenhöhlenrand, wodurch das hintere, die Thränensackgrube bildende Stück des Fortsatzes selbstständig wird (selten). c) Hinter den Schneidezähnen, quer durch das Foramen incisivum gehend. — Meckel sieht in dieser letztgenannten Nathspur eine Andeutung zur Isolirung des bei den Säugethieren existirenden, und die Schneidezähne tragenden Os incisivum s. intermaxillare, dessen Begrenzung, wenn die auch an der vorderen Seite des Körpers bei dreimonatlichen Embryonen gesehene Fissur permanent bliebe, vollständig würde.

Am inneren Rande der Augenhöhlenstäche sinden sich zuweilen die Cellulae orbitariae Halleri, welche zur Completirung des Siebbeinlabyrinthes verwendet werden, — die äussere Fläche des Stirnsortsatzes ist tiesgerinnt (Bromfield), — die Highmorshöhle wird durch eine Scheidewand, wie beim Pserde, getheilt, oder verschwindet (Morgagni), — die Alveoli der Backen- und Mahlzähne communiciren mit der Kieserhöhle, und die Spitzen der Zahnwurzeln ragen srei in letztere hinaus, — das Foramen infraorbitale wird doppelt, wie bei einigen Quadrumanen. Geht ein Zahn ver-

loren, so schwindet dessen Alveolus durch Resorption, was im hohen Alter mit dem ganzen zahnlosen Alveolarfortsatz an beiden Kinnbacken geschieht.

§. 98. Jochbein.

Das Jochbein, Os zygomaticum (Synon.: Os malare, jugale, suboculare, hypopium, pudicum), ist als massiver Strebepseiler zu nehmen, durch welchen der Oberkiefer mit dem Stirn-, Schläse- und Keilbein verbunden, und in seiner Lage befestigt wird, daher sein griechischer Name (von ζύγω, einjochen). Wir haben somit an ihm drei Fortsätze zu unterscheiden, die nach den Schädelknochen, zu welchen sie gehen, benannt werden. Der nach oben gehende Stirnbeinfortsatz ist der stärkste, da der Druck beim Kauen und Beissen von unten her auf den Oberkiefer wirkt, und dessen mögliches Ausweichen nur durch eine starke Stutze am Stirnbein aufgehoben werden konnte. Der nach hinten gerichtete Jochfortsatz bildet mit dem entgegenwachsenden Jochfortsatze des Schläfebeins eine knöcherne Brücke (Pons s. Arcus zygomaticus), welche über die Schläsengrube horizontal gewölbt ist, und ihrer bei verschiedenen Menschenracen verschiedenen Richtung, Bogenspannung, und Stärke wegen, als anatomischer Racencharakter benützt wird. Beide Jochbrücken stehen am Schädel, wie horizontale Henkel an einem Topse; - daher der alte Name Ansae capitis. Der Keilbeinfortsatz ist eigentlich nur eine Zugabe des Stirnfortsatzes, und der schwächste von allen dreien. Ein eigentlicher Körper mit kubischen Dimensionen fehlt am Jochbeine. Wir nennen den mit dem Jochfortsatze des Oberkiefers durch eine dreieckige. rauhgezackte Stelle verbundenen Theil des Knochens: den Körper, welcher ohne scharf gezeichnete Grenzen in die Fortsätze übergeht. Flächen des Knochens, die eben so gut den Fortsätzen wie dem Körper angehören, werden nach ihrer Lage in die Gesichts-, Schläfen-, und Augenhöhlenfläche eingetheilt. Von ersterer zu letzterer läust durch die Substanz des Knochens ein doppelter, selten einfacher Kanal (Canalis zygomaticus facialis), der einen Nebenkanal zur Schläsensläche sendet -Canalis zygomaticus temporalis. — Der Rand, der die Augenhöhlen- und Gesichtssläche trennt, ergänzt den Rand der Orbita.

Das Jochbein bildet den hervorragendsten Theil der Wange (mala von mando, wie scala von scando), und ist seiner Bedeutung als Stützknochen, und seiner vorspringenden, durch mechanische Schädlichkeiten von aussen her leicht zu treffenden Lagerung wegen, der stärkste Knochen der oberen Gesichtshälfte. Er schliesst deshalb auch keine Höhle ein. Seine Grösse und die Stellung seiner Flächen bildet ein wichtiges Moment der Verschiedenheit der Racenschädel. Bei den Mongolen und Slaven kommt am Temporalrande des Jochbeins ein starker, nach hinten gerichteter Fortsatz vor (Schultz).

— Er variirt nur wenig, und fehlt in äusserst seltenen Fällen (Dumeril, Meckel), oder wird durch Nath in zwei (Sandifort), ja selbst in drei Stücke (Spix) getheilt. Läuft die Nath quer durch das Jochbein (was sehr

selten vorkommt), so stellt sie eine Säugethierähnlichkeit dar. — Der Arcus sygomaticus ist so stark, dass trotz seiner Freiheit und scheinbaren Schwäche, Brüche desselben nur selten vorkommen. — Das rechte Jochbein ist in der Regel etwas stärker, als das linke, in Folge des stärkeren Gebrauches des rechten Kaumuskels. — Bei mehreren Edentaten fehlt der Arcus zygomaticus.

§. 99. Nasenbein.

Das Nasenbein, Os nasi s. nasale, bildet mit seinem Gespan den knöchernen Nasenrücken. Beide Nasenbeine sind zwischen die oberen Enden der Stirnfortsätze der Oberkieser hineingeschoben, und stossen mit den inneren Rändern, welche die Spina nasalis des Stirnbeins decken, an einander. Sie stellen längliche und ungleichseitige Vierecke dar, und sind oben dicker als unten. Ihr oberer, dicker, zackiger Rand, ist in die Incisura nasalis des Stirnbeins eingesügt, der untere ist srei und schars, und begrenzt die Incisura pyrisormis narium nach oben. Die vordere glatte Fläche ist von oben nach unten slach sattelsvrmig gehöhlt, die hintere rauhe, steht mit der vorderen durch ein oder mehrere Löcher (Foramina nasalia) in Verbindung.

Kein Knochen des Gesichts erreicht seine volle Ausbildung so frühzeitig, und ist im neugeborenen Kinde schon so sehr entwickelt, wie die Nasenbeine. Sie sind äusserst selten einander vollkommen gleich, verschmelzen am Hottentottenschädel theilweise oder ganz mit einander (Affenähnlichkeit), oder sehlen, und werden durch grüssere Breite des Stirnfortsatzes des Oberkiesers ersetzt. Ihre oberstächliche Lage setzt sie den Brüchen mit Eindruck aus. Letzterer wird, da man der hinteren Fläche der Knochen von der Nase aus beikann, leicht zu heben sein. — Mayer erwähnt noch zweier accessorischer, kleiner Knöchelchen, welche unter 100 Schädeln 2-3 Mal in dem dreieckigen Ausschnitte der Spitze der Nasenbeine vorkommen sollen, und die er für Analoga der bei einigen Säugethieren (Maulwurs) vorkommenden Rüsselknochen hält, (Archiv für physiol. Heilkunde. 1849. pag. 235). Sie scheinen mir besser mit dem Os praenasale einiger Edentaten verglichen zu werden.

§. 100. Gaumenbein.

Das Gaumenbein, Os palatinum, ist ein wahrer Supplementknochen des Oberkiesers, dessen Nasensläche und Gaumensortsatz es vergrößert. Da die Nasensläche und der Gaumensortsatz des Oberkiesers einen rechten Winkel bilden, so muss auch das Gaumenbein aus zwei rechtwinklig zusammengestügten Stücken — Pars perpendicularis et horizontalis — zusammengesetzt sein.

a) Die Pars perpendicularis bildet ein dünnes, längliches Knochenblatt, und besitzt an ihrer inneren Fläche zwei horizontale rauhe Leisten: die untere, stärker ausgeprägte (Crista turbinalis) für die Anlage der unteren Nasenmuschel, die obere schwächere (Crista ethmoidalis) für die Concha ethmoidalis inferior. Die äussere Fläche ist an die Superficies nasalis des Oberkieserkörpers angelegt. Der vordere Rand verlängert sich

zu einem dreieckigen dannen Fortsatze, der die Oeffnung der Highmorshöhle von hinten her verengert. Der hintere Rand zeigt den Sulcus pterygo-palatinus, darum so genannt, weil er mit dem, am vorderen Rande des Processus pterygoideus des Keilbeins befindlichen ahnlichen Sulcus. den Canalis pterygo-palatinus bilden hilft, zu dessen vollkommener Schliessung auch die am hinteren Winkel des Oberkieserkörpers befindliche seichte Längenfurche concurrirt. Vom oberen Rande entspringen zwei Fortsätze. die durch eine tiefe Incisur von einander getrenut werden. Die Incisur wird durch die untere Fläche des Keilbeinkörpers zu einem Loche (Foremen spheno-palatinum), von 3 Linien Querdurchmesser, geschlossen. Der vor dere Fortsatz wird zur Bildung der Augenhöhle einbezogen, und heiest deshalb Processus orbitalis. Er schmiegt sich zwischen den inneren Rand der Augenhöhlenstäche des Oberkiesers, und die Lamina papyraces des Siebbeins hinein, und enthält sehr häufig 2-3 kleine Cellulae paletinae, welche die hinteren Siehbeinzellen decken und schliessen. hintere Fortsatz (Processus sphenoidalis) krummt sich gegen die untere und vordere Fläche des Keilbeinkörpers, an welche er sich anlegt.

b) Die Pars horizontalis ist ein stärkeres, aber kleineres, viereckiges Knochenstück, welches mit den Gaumenfortsätzen des Oberkiefers den harten Gaumen, Palatum osseum, zusammensetzt. Der innere, zur zackigen Verbindung mit dem gleichnamigen Fortsatze des zweiten Gaumenbeins dienende Rand, ist in eine Crista aufgeworfen, welche sich in jene des Oberkiefers fortsetzt. Der vordere Rand stösst an den hinteren des Gaumenfortsatzes des Oberkiefers, der äussere dient zur Verschmelzung mit der Pars perpendicularis, und der hintere halbmondförmige, bildet mit dem der anderen Seite die Spina nasalis posterior — hinteres Ende der Crista nasalis.

An der Verschmelzungsstelle des senkrechten und wagrechten Stückes entspringt der nach hinten in die Incisura pterygoidea des Keilbeins sich einschiebende Processus pyramidalis. Er zeigt die Fortsetzung des Sulcus pterygo-palatinus, welcher zuweilen von der Masse des Pyramidenfortsatzes ganz umschlossen, und in diesem Falle, ohne Beihilse des Processus pterygoideus des Keilbeins und des Oberkiesers, in einen Kanal umgewandelt wird. Der Sulcus oder Canalis erzeugt noch zwei Nebenkanäle, welche den Pyramidensortsatz nach abwärts durchbohren, so, dass der ursprünglich und oben einsache Canalis pterygo-palatinus im Herabsteigen in drei Kanāle sich spaltet, welche an der unteren Fläche des Processus pyramidalis, also am harten Gaumen, durch die 3 Foramina palatina postoriora ausmünden, von welchen das vordere, als Mündung des Hauptkanals, das grösste ist.

Erwähnenswerthe Verschiedenheiten kommen an den Gaumenbeinen nicht vor.

§. 101. Thränenbein.

Das Thränenbein, Os lacrymale (Os unguis von seiner Gestalt und Dünne), ist der kleinste Kopfknochen, und liegt, ein längliches Viereck bildend, am vordersten Theile der inneren Augenhöhlenwand, zwischen Stirnbein, Papierplatte des Siebbeins, und Stirnfortsatz des Oberkiefers. Seine äussere Fläche wird durch eine senkrechte Leiste (Crista lacrymalis) in eine vordere, kleinere, und hintere, grössere Abtheilung gebracht. Erstere stellt eine Rinne vor, welche durch das Heranrücken an den Stirnfortsatz des Oberkiefers, der eine ähnliche Rinne besitzt, zur tiefen Thränensackgrube (Fossa lacrymalis) wird, deren Fortsetzung der absteigende Thränen-Nasenkanal (Canalis naso-lacrymalis) ist. Die Crista lacrymalis setzt sich nach unten in den gekrümmten Thränenbeinhaken (Hamulus lacrymalis) fort, der in den scharfen Winkel zwischen Stirnfortsatz und Augenhöhlenfläche des Oberkiefers eingefügt wird, und nicht selten fehlt. Die innere Fläche deckt die vorderen Siebbeinzellen.

Bei älteren Individuen erscheint das Thränenbein häufig durchlöchert. — Ich besitze einen Fall, wo es durch eine senkrechte Nath in 2 Stücke geschnitten wird. Gruber beschrieb einen bisher einzigen Fall (Müller's Archiv. 1848. pag. 412), wo das sehlende Thränenbein durch eine grosse Anzahl blättchenartiger Fortsätze benachbarter Knochen ersetzt wurde. Er hat auch das Verdienst, ein von E. Rousseau in den Annales des sciences naturelles, 1829, beschriebenes Knöchelchen, welches zuweilen den oberen Theil der äusseren Wand des Thränennasenkanals bildet, neuerdings sorgsältig auf sein Vorkommen untersucht zu haben. — Zuweilen hängt das Thränenbein mit der Lamina papyracea ununterbrochen zusammen. Seine vordere rinnenförmige Abtheilung ist bei den Negern sehr schmal (Sömmerring). Es ist beim Neugeborenen, nach den Nasenbeinen, der entwickeltste Gesichtsknochen.

§. 102. Untere Nasenmuschel.

Die untere Nasenmuschel, Concha inferior (Synon.: Os turbinatum s. spongiosum, Buccinum, Concha Veneris), liegt in der Nasenbühle, an die innere Wand des Oberkieserkörpers gehestet, und gleicht einer Teichmuschel, deren Schloss nach oben, und deren convexe Seite nach innen gegen die Nasenscheidewand gerichtet ist. Da bereits am Siebbein beiderseits zwei Muscheln bekannt wurden, so wird die untere Nasenmuschel, die keinen Bestandtheil eines anderen Knochens ausmacht, als freie Nasenmuschel bezeichnet werden. Sie ist dünn, leicht, porös, und am unteren Rande, der etwas nach aussen und oben ausgerollt erscheint, dick und wie ausgebläht. Der obere Rand giebt dem in die Oessnung der Highmorshöhle sich einhäkelnden Processus maxillaris den Ursprung. Vor diesem sindet sich der zum unteren Thränenbeinrande aussteigende, und den Canalis naso-lacrymalis theilweise bildende Processus lacrymalis. Der mit dem Siebbeinhaken sich verbindende Processus ethmoidalis ist unconstant. Das

vordere und hintere zugespitzte Ende stösst an die Crista turbinalis des Oberkiefers und des Gaumenbeins.

Die unteren Nasenmuscheln verwachsen frühzeitig mit den Knochen, zu welchen sie Fortsätze schicken, und wurden deshalb früher für Theile anderer Gesichtsknochen gehalten: des Thränenbeins (Winslow), des Gaumenbeins (Santorini), des Siebbeins (Fallopia, Hunold). Der Mensch hat unter allen Säugethieren die am wenigsten entwickelten Nasenmuscheln. Welch enormen Entwicklungsgrad dieser Knochen durch Astbildung, Einrollung, und Faltung, erreichen kann, zeigt das Muschelbein des Ameisenbären, des Seehundes, und einiger Beutelthiere. - Die Bedeutung dieses Knochens, der keine Kopfhöhle bilden hilft, ist folgende. Die Nasenhöhle ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet, welche der Träger der Geruchsnerven ist. Diese Haut muss sich falten, um im kleinen Raume der Nasenhöhle dennoch eine grosse Oberfläche für die mit Riechstoffen geschwängerte Lust darzubieten. Diese Falten würden beim Ein- und Ausathmen durch die Nase hin- und herschlottern, und östers den Luftweg ganz verlegen, wenn sie nicht durch knöcherne Stützen in einer bestimmten Lage und Richtung erhalten würden. Diese Stützen sind die Nasenmuscheln.

§. 103. Pflugscharbein.

Das Pflugscharbein, Os vomeris, erscheint als ein unpaarer, flacher, rautensormiger Knochen, der den unteren Theil der knöchernen Nasenscheidewand bildet. Es ist nie vollkommen plan, sondern auf die eine oder andere Seite gebogen. Sein oberer Rand weicht in die beiden Flügel (Alae vomeris) auseinander, welche das Rostrum sphenoidale zwischen sich sasen. Der untere Rand steht auf die Crista nasalis auf, der vordere, längste, verbindet sich oben mit der Lamina perpendicularis des Siebbeins, unten mit dem viereckigen Nasenscheidewandknorpel, — der hintere, kürzeste, steht srei, und theilt die hintere Nasenössnung in zwei seitliche Halsten — Choanae. Sein srühzeitiges Verwachsen mit der senkrechten Platte des Siebbeins ist der Grund, warum es von Santorini, Petit, Lieutaud, Portal, nicht als selbstständiger Gesichtsknochen, sondern als Theil des Siebbeins beschrieben wurde.

Im Kinde besteht die Pflugschar aus zwei durch ein Knorpelblatt getrennten, dünnen Knochenlamellen. Das Knorpelblatt setzt sich ununterbrochen in den Nasenscheidewandknorpel (§. 198) fort. Im Erwachsenen findet sich noch ein Rest des Knorpelblattes zwischen den beiden Lamellen des Vomer. Schrumpft dieser Knorpel beim Trocknen macerirter Knochen ein, so kann dadurch Verbiegung, selbst Bruch, des Vomer entstehen. Die an so vielen Schädeln auffallende Verbiegung des Vomer scheint, wenn auch eine ursprüngliche Richtungsabweichung nicht zu läugnen ist, auf dem angeführten Umstande zu beruhen. — Zwischen den Alae vomeris und der unteren Fläche des Keilbeinkörpers findet sich auch im Erwachsenen ein Loch, welches einen Ast der Rachenschlagader durch den Vomer hindurch zum Nasenscheidewandknorpel gelangen lässt. (Tourtual, der Pflugscharknorpel, im Rheinischen Correspondenzblatt, 1845, Nr. 10 und 11.)



§. 104. Unterkiefer.

Der Unterkiefer, Maxilla inferior s. mandibula, bildet die untere, bewegliche Gesichtshälste, übertrifft an Stärke alle Schädelknochen, und wird in den Kürper und in die beiden Aeste eingetheilt.

1. Der Körper bildet das parabolisch gekrümmte, zahntragende Mittelstück des Knochens. Er ist zuweilen am Kinne sehr breit (Machoire d'ane), zuweilen mehr weniger zugespitzt (Bockskinn, nach Lavater ein Zeichen von Hang zum Geiz). In der Mitte der vorderen Fläche desselben bemerkt man die Protuberantia mentalis. Einen Zoll weit von dieser nach aussen, liegt das Kinnloch (Foramen mentale s. maxillare anterius), unter welchem die Linea obliqua externa zum vorderen Rande des Astes hinaufzieht. In der Mitte der hinteren Fläche ragt der ein- oder zweispitzige Kinnstachel (Spina mentalis interna) heraus. In einiger Entfernung von ihm beginnt die Linea obliqua interna s. mylohyoidea, deren Richtung mit der äusseren so ziemlich übereinstimmt. Der untere Rand ist breit und stumpf, und unter dem Kinnstachel mit zwei rauhen Eindrücken versehen; der obere ist gefächert, und besitzt 16 Zahnzellen (Alveoli), welche den Zahnwurzeln entsprechend gebaut sind.

Die Aeste steigen vom hinteren Ende des Körpers schräge an. Ihre äussere Fläche ist ziemlich glatt, die innere hat in ihrer Mitte das durch ein kleines vorstehendes Knochenschüppchen (Zünglein, Lingula) geschützte Foramen maxillare internum - als Anfang eines, durch den Körper schief nach vorn laufenden, und am Foramen mentale endigenden Kanals — Canalis maxillaris s. alveolaris inferior. Vom Foramen maxillare internum läust eine Rinne (Sulcus mylohyoideus) schief nach abwärts. Der hintere längste Rand bildet, mit dem unteren Rande des Körpers, den Winkel des Unterkiefers (Angulus maxillae). — Der obere Rand ist halbmondsormig eingeschnitten (Incisura semilunaris), wodurch eine vordere und hintere Ecke desselben entsteht. Erstere ist flach und zugespitzt, und heisst Processus coronoideus, — letztere (der Processus condyloideus) trägt auf einem verschmächtigten rundlichen Halse (Collum), ein querovales überknorpeltes Köpschen (Capitulum s. Condylus), welches in die Fossa alenoidalis des Schläsebeins passt. Der vordere Rand geht ohne Unterbrechung in die Linea obliqua externa über.

Der Canalis alveolaris inserior variirt durch Verlauf und Grösse in verschiedenen Lebensepochen desselben Individuums. Beim neugeborenen Kinde streicht er am unteren Rande des Körpers des Unterkiesers hin, und ist sehr geräumig. Im Jünglinge und Manne nimmt er die Mitte des Knochens ein, und stimmt ziemlich genau mit der Richtung der Linea obliqua interna überein. Im Greise, nach Verlust der Zähne, läust er dicht unter der zahnsächerlosen oberen Wand des Körpers, und ist bedeutend enger geworden. — Den Processus coronoideus einen Kronenfortsatz zu nennen, ist zwar üblich, aber nicht etymologisch richtig, da der Name von κοφώνη, Krähe, nicht von corona stammt. Er gleicht bei gewissen Thieren einem Krähen-



schnabel. Allerdings aber kann man ihn Krohnenfortsatz nennen, da Krähe auch Krohne geschrieben wird.

§. 105. Kinnbacken- oder Kiefergelenk.

Das Kinnbackengelenk (Articulatio temporo-maxillaris), besitzt eine nach drei Richtungen gestattete Beweglichkeit.

Der Unterkiefer kann 1. auf und zu, 2. nach beiden Seiten, und 3. vor- und rückwärts bewegt werden. Bei den ersten beiden Bewegungsarten, wenn ihre Extension eine geringe ist, verlässt das Köpschen desselben die Fossa glenoidalis des Schlasbeins nicht, bei letzterer rollt es sich auf das Tuberculum articulare hervor, und gleitet wieder in die Fovea glenoidalis zurück, welches auch bei weitem Oessnen und darauf solgendem Schliessen des Mundes geschieht.

Bei sehr weitem Aufsperren des Mundes kann der Gelenkkopf selbst vor das Tuberculum articulare treten, über welches er dann nicht mehr zurück kann, und der Kiefer somit verrenkt ist. Man versteht sonach, wie man sich durch ausgiebiges Gähnen die Kiefer verrenken kann, und wie sich eine Frau, welche eine grosse Birne am dicken Ende anbeissen wollte, denselben Unfall zuziehen konnte (worüber kürzlich die Comptes rendus der Pariser Akademie berichtet haben).

Eine vom Rande der Fossa glenoidalis und des Tuberculum articulare entspringende, und am Collum endigende, fibröse, sehr dünne und laxe Kapsel umgiebt das Gelenk, dessen Höhle durch einen ovalen, am Rande dickeren, convex-concaven Zwischenknorpel (Cartilago interarticularis) in zwei übereinauder liegende Räume getrennt wird, welche besondere Synovialhäute besitzen. Der Rand des Zwischenknorpels ist mit der sibrösen Kapsel verwachsen. Er selbst folgt den Bewegungen des Gelenkkopses, tritt mit ihm auf das Tuberculum und wieder zurück, und dämpst die Gewalt der Stösse, die die dünnwandige durchscheinende Gelenkgrube des Schlasbeins bei krästigem Zubeissen auszuhalten hat. Zwei Seitenbänder verstärken die Kapsel. Das äussere ist kurz und stark, und geht von der Wurzel des Processus zygomaticus zur äusseren Seite des Halses; das innere ist lang und dunn, steht mit der Kapsel nicht in Contact, entspringt von der Spina angularis des Keilbeins, und endigt an der Lingula des Unterkieferkanals. Ein vom Griffelfortsatze des Schläfebeins zum Winkel des Unterkiefers herablaufender, breiter, aber dunner Bandstreifen, kann als Ligamentum stylo-maxillare angeführt werden, und ist, so wie das Ligamentum laterale internum, streng genommen, kein eigentliches Aufhänge- oder Befestigungsmittel des Unterkiefers, sondern ein Theil gewisser, später am Halse zu erwähnender Fascien.

Da beim Aufsperren des Mundes der Gelenkkopf des Unterkiefers nach vorn auf das Tuberculum, der Winkel aber nach hinten geht (wie man sich leicht am eigenen Kinnbacken mit dem Finger überzeugen kann), so muss in der senkrechten Axe des Astes ein Punkt liegen, der bei dieser Bewegung seine Lage nicht ändert. Dieser Punkt entspricht dem Foramen maxillare

internum. Man sieht, wie klug die Lage dieses Loches gewählt wurde, nur auf diese Weise Zerrung der hier eintretenden Nerven und Gefässe bei den Kaubewegungen vermieden werden konnte.

Es verdient noch bemerkt zu werden, dass die Knorpelüberzüge der das Kinnbackengelenk bildenden Knochen äusserst dünn sind, und fast nur aus faseriger Substanz bestehen.

§. 106. Zungenbein.

Das Zungenbein, Os hyoides, ypsiloides, gutturale (von seiner Aehnlichkeit mit dem griechischen Buchstaben v, os voeides genannt) ist ein Additament der Kopsknochen, liegt an der vorderen Seite des Halses, und stützt die Basis der Zunge, für deren knöcherne Grundlage es gilt. Es ist der einzige Knochen des Skelets, der mit den übrigen in keiner unmittelbaren Berührung, sondern nur in mittelbarem Verbande steht. Man theilt es in einen Körper, oder Mittelstück, und 2 Paar seitliche Hörner, welche Theile jedoch, da sie durch Gelenke beweglich vereinigt werden, und in der Regel im hohen Greisenalter noch unverschmolzen sind, als eben so viele besondere Zungenbeine angesehen werden sollen (Meckel). Das Mittelstück (Basis) mit vorderer convexer, hinterer concaver Fläche, oberem und unterem schneidenden Rande, trägt an seinen beiden Enden, mittelst Gelenken aussitzend, die grossen Hörner oder seitlichen Zungenbeine (Cornua majora), welche zwar länger, aber auch bedeutend dünner als das Mittelstück sind, und den Bogen desselben Das rechte und linke grosse Horn gleichen einander fast vergrössern. niemals vollkommen. Die kleinen Hörner (Cornua minora s. Corpuscula triticea s. Cornicula) sind am oberen Rande des ausseren Endes des Mittelstücks durch Kapselbänder angeheftet. Sie erreichen bei weitem nicht die Länge und Stärke der seitlichen Hörner, indem ihre gewöhnliche Länge zwischen 2-3 Linien schwankt. Häufig steigt die Länge des linken um das Doppelte des rechten, welches Verhältniss Duvernoy und Meckel als Norm ansehen. Die kleinen Hörner dienen einem von der Spitze des Griffelfortsatzes herabsteigenden Aufhängeband des Zungenbeins (Ligamentum stylo-hyoideum s. suspensorium) als Insertionsstellen. Das Band verknorpelt und verknöchert theilweise nicht selten. Es ist leicht zu beweisen, dass besonders lange Griffelfortsätze oder Zungenbeinhörner (kleine) nur durch fortschreitendes Verknöchern dieses Bandes entstehen.

§. 107. Höhlen des Gesichts.

1. Die beiden Augenhöhlen (Orbitae), deren Abstand durch die Entfernung beider Laminae papyraceae des Siebbeins von einander bestimmt wird, stellen liegende, hohle, vierseitige Pyramiden dar, die mit ihren inneren Flächen ziemlich parallel liegen, und deren verlängerte Axen sich am Türkensattel schneiden. Die äussere Wand, vom Jochbein und grossen Keilbeinflügel gebildet, ist die stärkste, die obere die grösste, die

nere, vom Processus frontalis des Oberkiefers, vom Thränenbein, und der Lamina papyracea gebildet, die kleinste und schwächste. Die Basis der Pyramide ist die grosse, durch den Margo supra- et infraorbitalis umschriebene Oeffnung der Augenhöhle, Apertura orbitalis. Hinter der Basis erweitert sich die Pyramide etwas, besonders nach oben und aussen (Fossa glandulae lacrymalis). Die Winkel derselben sind abgerundet, und werden, der äussere obere durch die Fissura orbitalis superior, der äussere untere durch die längere, aber schmälere Fissura orbitalis inferior gespalten. Die Spitze der Pyramide liegt im Foramen opticum. Die übrigen Oeffnungen und Löcher der Augenhöhlenränder wurden bei deren specieller Beschreibung erwähnt.

2. Die Nasenhühle (Cavum narium) hat eine viel schwerer zu beschreibende Gestalt, und viel complicirtere Wände. Sie wird in die eigentliche Nasenhöhle, und die Nebenhöhlen (Sinus s. Antra) eingetheilt. eigentliche Nasenhöhle liegt über der Mundhöhle, und ragt bis zur Schädelhöhle zwischen den beiden Augenhöhlen hinauf. Oben wird sie durch die Nasenbeine und die Lamina cribrosa des Siebbeins, unten durch die Processus palatini der Oberkiefer, und die horizontalen Platten der Gaumen-Die ausgedehnten Seitenwände werden oben, wo die beine begrenzt. Nasenhöhle an die Augenhöhle grenzt, durch den Nasenfortsatz des Oberkiefers, das Thränenbein, und die Papierplatte des Siebbeins gebildet; weiter unten folgen die Superficies nasalis des Oberkiesers, der senkrechte Theil des Gaumenbeins, und der Processus pterygoideus des Keilbeins. Die vordere Wand fehlt grüsstentheils, und es befindet sich an ihrer Stelle die durch die beiden Oberkieser und Nasenbeine begrenzte Apertura pyriformis. Die hintere Wand wird theilweise durch die vordere Fläche des Keilbeinkörpers dargestellt, unter welchem sie sehlt, und von den beiden Choanae s. Aperturae narium posteriores eingenommen wird. Der Name Choanae stammt von χέω (giessen), weil der Nasenschleim durch diese Oeffnung sich in die Rachenhöhle ergiesst, und als Sputum ausgeworfen werden kann. Jede Choana oder hintere Nasenöffnung wird oben durch den Körper des Keilbeins, aussen durch den Processus pterygoideus, innen durch den Vomer, und unten durch den horizontalen Gaumenbeintheil umgeben. - Die knöcherne Nasenscheidewand (Septum narium osseum), aus der senkrechten Siebbeinplatte und der Pflugschar bestehend, geht selten senkrecht von der Siebplatte und der Spina nasalis superior zur Crista nasalis inferior herab, und theilt die Nasenhöhle in zwei meist ungleiche Seitenhälsten. - Nebst den die Nasenhöhle construirenden Knochen hat man noch gewisse, von ihren Wänden ausgehende knöcherne Vorsprünge, als Vergrösserungsmittel ihrer inneren Oberstäche, ins Auge zu fassen, und diese sind: die Blättchen, die das Siebbeinlabyrinth bilden, die obere und untere Siebbeinmuschel, und die untere oder freie Nasenmuschel. Sie sind als Stützknochen für die sie überziehende Nasenschleimhaut anzusehen, welche dadurch eine viel grössere Oberstäche erhält, als wenn sie

nur die glatten Wände eines hohlen Würfels zu überziehen hätte. - Die Muscheln tragen zur Bildung der sogenannten Nasengänge (Meatus narium) bei, deren drei auf jeder Seite liegen. Der obere, zwischen oberer und unterer Siebbeinmuschel, ist der kürzeste, und etwas schräg nach hinten und unten gerichtet. Es entleeren sich in ihn die hinteren und mittleren Siebbeinzellen, und die Keilbeinhöhle. Der mittlere, zwischen unterer Siebbeinmuschel und unterer oder freier Nasenmuschel, ist der längste. horizontal gerichtet, und communicirt mit der Highmorshöhle, den vorderen Siebbeinzellen, und der Stirnhöhle. Der untere, zwischen unterer Nasenmuschel und Boden der Nasenhöhle, ist der geräumigste, und nimmt den von der Fossa lacrymalis der Augenhöhle nicht senkrecht, sondern ein wenig schief nach aussen und hinten herabsteigenden Thränennasengang auf, dessen Ausmündungsöffnung durch das vordere Ende der unteren Nasenmuschel von oben her überragt wird. Die Nebenhöhlen, die, obwohl sie als Vergrösserungsräume der Nasenhöhle gelten, doch in keiner Beziehung zur Wahrnehmung der Gerüche stehen, sind die Stirn-, Keilbeinund Oberkieserhöhle, deren bereits früher Erwähnung geschah.

- 3. Die Mundhühle (Cavum oris) ist, wegen Beweglichkeit des Unterkiefers, von veränderlicher Grüsse. Sie wird nicht allenthalben von knöchernen Wänden begrenzt. Die untere Wand oder der Boden wird nur durch Muskeln gebildet. Die obere Wand ist der harte Gaumen (Palatum durum s. osseum), an welchem die aus einem Längen- und Querschenkel bestehende Kreuznath (Sutura palatina cruciata) vorkommt. Die vordere und die beiden seitlichen Wände werden bei geschlossenem Munde durch die zahntragenden Ränder beider Kiefer dargestellt. Die hintere Wand fehlt, und wird selbst im nicht macerirten Schädel durch eine Oeffnung eingenommen, mittelst welcher die Mundhühle mit der hinter ihr liegenden Rachenhühle communicirt.
- 4. Noch ist am Schädel beiderseits eine Grube zu bemerken, die den tießten, zwischen Oberkießer, Flügelsortsatz des Keilbeins, und Gaumenbein hineingezogenen Winkel der Schläßengrube vorstellt, und Flügelgaumengrube oder Keiloberkießergrube (Fossa pterygo-palatina s. sphenomaxillaris) genannt wird. Sie liegt unter der Augenhöhle, mit welcher sie durch die Fissura orbitalis inferior in Verbindung steht, und auswärts von dem hinteren Theile der Nasenhöhle. Ihre Gestalt ist sehr unregelmässig, und ihre Verbindung mit der Schädelhöhle und den Höhlen des Gesichtes sehr vielfältig. Gewöhnlich bezeichnet man nur die tießte und engste Stelle dieser Grube, welche zunächst durch den Flügelsortsatz des Keilbeins und das Gaumenbein gebildet wird, als Flügelgaumengrube, und nennt den weiteren, zwischen Oberkießer und Keilbein gelegenen Theil derselben, Keil-Oberkießergrube.

Löcher und Kanäle der Augenhöhle. 1. Zur Schädelhöhle: Foramen opticum, Fissura supraorbitalis, Foramen ethmoidale anterius. 2. Zur Nasenhöhle: Foramen ethmoidale posterius, Ductus lacrymarum nasalis. 3. Zur Schläsengrube: Canalis sygomaticus temporalis. 4. Zur Fossa pterygopalatina: Fissura orbitalis inferior. 5. Zum Gesicht: Canalis sygomaticus facialis, Foramen supraorbitale, Canalis infraorbitalis.

Löcher und Kanäle der Nasenhöhle. 1. Zur Schädelhöhle: Foramina cribrosa. 2. Zur Mundhöhle: Canalis naso-palatinus. 3. Zur Fossa pterygo-palatina: Foramen spheno-palatinum. 4. Zur Augenhöhle, bei dieser erwähnt. 5. Zum Gesichte: Apertura pyriformis, Foramina nasalia.

Löcher und Kanile der Mundhöhle. 1. Zur Nasenhöhle: Canalis naso-palatinus. 2. Zur Fossa pterygo-palatina: Canales pterygo-palatini s. Canales palatini descendentes. 3. Zum Gesichte: Canalis inframaxillaris.

Löcher und Kanäle der Fossa pterygo-palatina. 1. Zur Schädelhühle: Foramen rotundum. 2. Zur Augenhühle: Fissura infraorbitalis. 3. Zur Nasenhühle: Foramen spheno-palatinum. 4. Zur Mundhühle: Canalis palatinus descendens. 5. Zur Schädelbasis: Canalis Vidianus.

Die Zusammensetzung der Augenhöhle, so wie die zu ihr oder von ihr führenden Oefinungen werden, da die Wände der Augenhöhle bei äusserer Inspection des Schädels leicht zu übersehen sind, auch eben so leicht studirt. Schwieriger aufzufassen ist die Construction der Nasenhöhle und der Flügelgaumengrube. Es müssen, um zur inneren Ansicht der Wände, und der in diesen befindlichen Oeffnungen zu gelangen, Schnitte durch sie geführt werden, wozu man für die Nasenhöhle frische Schädel wählt, die bereits zu einem anderen anatomischen Zwecke dienten, und deren Nasenhöhle noch durch die Schleimhaut derselben (Membrana pituitaria narium s. Schneideri) ausgekleidet ist. An skeletirten Köpfen werden durch das Eindringen der Säge, die dunnen und nur lose besestigten Muschelknochen leicht zersplittert, und man erhält nur ein unvollkommenes Bild ihrer Lagerungsverhältnisse, und ihrer Beziehungen zu den Nasengängen. Zwei senkrechte Durchschnitte, deren einer mit der Nasenscheidewand parallel läuft, deren anderer sie schneidet, leisten das Nöthige. - Die Wichtigkeit der Osteologie für die Nervenlehre bewährt sich am schönsten in der Flügelgaumengrube. Die Anatomie des zweiten Astes vom Trigeminus wird, ohne genaue Vorstellung der mit dieser Grube in Verbindung stehenden Kanäle und Oeffnungen, unmöglich verstanden. Es muss der Processus pterygoideus des Keilbeins an seiner Basis, mit Schonung der senkrechten Platte des Gaumenbeins, abgesägt werden, um die in ihr liegenden oben erwähnten Zugangs- und Abgangsöffnungen zu sehen.

§. 108. Verhältniss der Hirnschale zum Gesicht.

Bei keinem Säugethier ist der Hirnschädel im Verhältnisse zum Gesichte so gross wie beim Menschen, dessen Organ der Intelligenz — Gehirn — über die der Sinnlichkeit fröhnenden Werkzeuge des Kauens und Riechens prävalirt. Das Höchste und Niedrigste der Menschennatur steht am Kopfe gepaart, mit überwiegender Ausbildung des Ersteren. Je mehr die Kauwerkzeuge sich entwickeln, und je grösser der Raum wird, den die Nasenhöhle einnimmt, desto vorspringender erscheint der Gesichtstheil des Kopfes, und desto mehr entfernt sich das ganze Profil vom Schönheitsideal. Die schön gewölbte Stirn, und ihr fast senkrechtes Abfallen gegen das Gesicht, ist ein den kaukasischen Menschenschädel charakterisirendes Merkmal. Da von dem Verhältnisse des Schädels zum Gesichte die nach unseren Schönheitsbegriffen mehr oder minder edle Kopfbildung abhängt, und die

Grüsse dieses Verhältnisses ein augenfälliges Merkmal gewisser Menschenracen abgiebt, so hat man gesucht, die Beziehungen des Hirnschädels zum Gesichte durch Messungen auszumitteln, indem man durch gewisse willkürlich angenommene Punkte des Kopfes Linien zog (Lineae craniometricae), deren Durchschnittswinkel einen Ausdruck für dieses Verhältniss abgiebt.

- 1. Messung nach Daubenton (1764). Man zieht vom unteren Augenhöhlenrande zum hinteren Rande des Foramen occipitale magnum eine Linie, und eine zweite von der Mitte des vorderen Randes dieses Loches zum Endpunkte der früheren. Der durch beide Linien gebildete, nach vorn offene Winkel (Angulus occipitalis Daub.) ist im Menschengeschlechte am kleinsten und vergrössert sich in der Thierreihe um so mehr, je mehr das grosse Hinterhauptloch die Mitte der Schädelbasis verlässt, und auf das hintere Ende des Schädels hinaufrückt, wodurch seine Ebene nach vorn abschüssig wird. Als osteologischer Charakter der Racen lässt sich dieser Winkel nicht benützen, da nach Blumenbach's Erfahrungen seine Grösse bei Individuen derselben Race innerhalb einer gewissen Breite variirt. Im Mittel beträgt er beim Menschen 4°, beim Orang 37°, beim Pferde 70°, und beim Hunde 82°.
- 2. Messung nach Camper (1791). Man zieht eine Tangente zur vorragendsten Stelle des Stirn- und Oberkieferbeins, und schneidet diese durch eine vom äusseren Gehörgang zum Boden der Nasenhöhle gezogene Linie. Der Winkel beider ist der Angulus faciei Camperi, dessen Ausmittlung unter allen Schädelmessungsmethoden die häufigste Anwendung gefunden hat. Je näher er 90° steht, desto schöner ist das Schädelprofil. Vergrössert er sich über 90°, so entstehen jene über die Augen vortretenden Stirnen, die bei Rhachitis und Hydrocephalus vorkommen, und die Schönheit des Profils ebenso beeinträchtigen, wie die flachen. - Als Massstab für die Entwicklung des Gehirns in der Thierreihe kann der Camper'sche Winkel nicht benützt werden, da die Wölbung der Stirn blos durch geräumige Sinus frontales (Elephant, Schwein) bedingt sein kann. Auch ist seine Grösse bei Schädeln, die verschiedenen Racen angehören, häusig gleich (Neger- und alter Lithauerschädel). Seine Grösse beträgt bei Schädeln kaukasischer Race 85° (griechisches Profil), beim Neger 70°, beim jungen Orang 67°, beim Schnabelthier 14°. - Daubenton's und Camper's Messungen trifft überdies der Vorwurf, dass sie das Schädelvolumen nur durch die senkrechte Ebene messen, und die Peripherie (den Querschnitt) unberücksichtigt lassen. Die Camper'sche Messung muss auch deshalb variable Resultate an Schädeln derselben Race geben, weil der vorspringendste Punkt des Oberkiefers, der in den Alveoli der Schneidezähne liegt, durch Aussallen der Zähne und damit verbundene Resorption der Alveoli im höheren Alter zurücktreten muss.
- 3. Blumenbach's Scheitelansicht (1795) ist keine Messung, sondern eine beiläusige Schätzung der Schädel- und Gesichtsverhältnisse. Es werden die zu vergleichenden Schädel so ausgestellt, dass die Jochbogen voll-

hommen horizontal liegen, und dann von oben in der Vogelperspective angesehen, wohei obiges Verhältniss, und alle übrigen abweichenden Einzelnheiten im Schädelbaue, sich dem geübten Auge besonders scharf herausstellen.

4. Cuvier's Methode (1797) zerlegt den Schädel in zwei seitliche Hälften, und bestimmt an der Durchschnittsebene den Grüssenunterschied von Schädel und Gesicht. Dieser ist beim Orang — 0, und verhält sich beim Menschen wie 4:1.

Es sind noch mehrere andere craniometrische Methoden bekannt, worunter die Spigel'sche (1645) die älteste ist. Da es sich hier nur um Andeutungen, und nicht um erschöpfende Zergliederung und Vergleichung der einzelnen Methoden handelt, kann das Gesagte genügen.

Die Hauptunterscheidungsmerkmale des menschlichen und thierischen Schädels liegen in dem ovalen Cranium, dem nahe 90° betragenden Gesichtswinkel, dem mehr in der Mitte des Schädelgrundes liegenden Foramen occipitale magnum, dem gerundeten, vorspringenden Kinn i Mentum prominulum, Linn.), und in der bogenförmigen Stellung der gleich hohen, und gleichförmig neben einander stehenden Zähne. Die Lage des Hinterhauptloches stimmt mit dem Mittelpunkte des Schädelgrundes wohl nicht überein, sonst müsste der Schädel auf der Wirbelsäule balanciren, was nicht der Fall ist. Der Schädel wird am Ueberneigen nach vorn nur durch die Wirkung der Nackenmuskeln gehindert; lässt diese nach, wie bei Lähmung, beim Einschlasen, und im Greisenalter, so solgt er dem Zuge seiner Schwere, und sinkt gegez die Brust.

Die Racenverschiedenheiten der Schädel gehören in das Gebiet der physischen Anthropologie. Es wird hier blos erwähnt, dass die Gestalt des Schädels von der Norm des wohlgefälligen Ovals nach zwei Extremen hin abweicht. Es giebt 1. stark nach hinten verlängerte, und 2. in dieser Richtung kurze Racensormen des Schädels (Dolichocephali - Brachycephali). Repräsentanten dieser Formen in Europa sind die germanischen und slavischen (besonders sudslavischen, croatischen und morlachischen) Schädel. Das Gesicht kann bei beiden vor- oder zurückstehen, d. h. prognathisch oder orthognathisch sein (γrάθος, Kiefer). Die Germanen, Celten, Britten, und Juden aind orthognathische, die Neger und Grünländer prognathische Formen von Langköpsen. Die Magyaren, Finnen, Türken sind orthognathische, die Kalmücken, Mongolen und Tartaren prognathische Kurzköpfe. - Das Verhältniss der Schädelhöhle zum Gesicht ist bei den Negern kleiner als bei allen übrigen Racen, und ein mit 36 Europäerschädeln verglichener Negerschädel nahm unter allen die geringste Wassermenge auf (Saumarez). Wie wichtig für den Kunstler die nationalen Formen der Schädel sind, kann man aus dem Missfallen entnehmen, welches ein Fachmann bei dem Anblick sogenannter Meisterwerke der Kunst empfindet. Der Daniel von Rubens ist kein Jude, seine sabinischen Weiber sind Holländerinnen, Raphael's Madonnen sind hübsche Italienerinnen, und Lessing's Hussiten wahrlich keine Czechen.

Bei angeborenem Blödsinne ist die Hirnschale, selbst bei gewöhnlicher Grösse des Gesichts, klein, ja kleiner als dieses. Dagegen finden sich eminente Geistesanlagen nicht immer in grossen Köpfen. — An antiken Statuen von Göttern und Halbgöttern wurden auch, wahrscheinlich um das Lebermenschliche auszudrücken, Gesichtswinkel von 100° beliebt. Bei Neugeborenen ist er durchschnittlich 10° grösser als bei Erwachsenen, und soll, bei der im höheren Alter vorkommenden Gehirnatrophie, durch Einsinken des Schädels wieder Meiner werden.

§. 109. Altersverschiedenheiten des Kopfes.

Bei sehr jungen Embryonen gleicht die Gestalt des Schädels einem Sphäroid, mit ziemlich gleichen Durchmessern. Das Gesicht ist nur ein kleiner, untergeordneter Anhang desselben. Selbst bei Neugeborenen, und in den ersten Lebensmonaten, ist die rundliche Form des Gesichtes noch die vorwaltende, welche sich erst von der Zeit an, wo die Kieser als Kauwerkzeuge gebraucht zu werden ansangen (Ausbruch der Zähne), in die länglich-ovale ausdehnt. Die Schläsenschuppe nimmt im ersten Kindesalter verhältnissmässig einen weit geringeren Antheil an der Bildung der Schädelseiten. Der Grund der Schläsengrube ist eher convex als concav, und der grösste Querdurchmesser liegt zwischen beiden Tubera parietalia. Sämmtliche Schädelknochen sind, da sie eine kleinere Hohlkugel bilden, mehr gekrümmt. Ihre Textur ist wegen Prävalenz des Knochenknorpels weich und biegsam, und man hat Fälle gesehen, wo sie durch einen Stoss eingebogen, aber nicht gebrochen wurden (Chaussier, Velpeau). Aeussere mechanische Einstüsse, Binden, Schnüren, localer Druck, andern, bekannten Erfahrungen zu Folge, die Form des Schädels. - Die Nasenhöhle ist klein. ihre Nebenhöhlen beginnen sich erst zu entwickeln; die Stirnhöhle erst im zweiten Lebensjahre. Die Mundhöhle erscheint, da die Alveolarfortsätze Die Aeste des Unterkiefers ragen über den der Kiefer fehlen, niedrig. oberen Rand des Körpers nur wenig hervor, und haben eine schiefe Richtung nach hinten. Sie verlängern sich erst mit dem Austreten der Alveolarfortsätze, und dem Ausbruche der Zähne. Vom Eintritte der Geschlechtsreise angesangen, andert sich die Form des Schädels nicht mehr, und bleibt, ein geringes Zunehmen in der Peripherie abgerechnet, stationär. Im Mannesalter verschwinden die Näthe allmälig, und im Greisenalter beginnt die rückschreitende Metamorphose des Schädels. Die Schädelknochen werden dunn, sprude, die Diploë schwindet, an einzelnen Stellen (Keilbeinfortsatz des Jochbeins, Lamina papyracea) entstehen durch Resorption der Knochenmasse Oeffnungen. Der Greisenschädel verliert 2/s von seinem vollen Gewichte im Mannesalter (Tenon), das Cavum cranii verkleinert sich durch Schwund des Gehirns, sinkt wohl auch an den Scheitelbeinen grubig ein. und das Gesicht verliert, durch Ausfallen der Zähne und Verschwinden der Alveolarfortsätze, an senkrechter Höhe. Der Unterkiefer, der seinen ganzen Zahnbogen einbüsste, bildet einen grösseren Bogen als der Oberkieser, stösst mit seinem vorderen Theile nicht mehr an diesen, sondern schliesst ihn bei geschlossenem Munde ein. Das Kinn steht vor, weil die Aeste des Unterkiefers eine schiefe Richtung nach hinten annehmen (Menton en galoche), und nähert sich der Nase (le nez et le menton se disputent entrer la bouche), wodurch die Weichtheile der Backe, die ihrer Spannkrast ebenfalls verlustig werden, lax herabhängen, oder sich faltig einbiegen. Die Kanten und Winkel sämmtlicher Schädelknochen werden schärfer und dünner. und der anorganische Knochenbestandtheil überwiegt den organischen so

sehr, dass geringere mechanische Beleidigungen hinreichen, Brüche des Schädels hervorzurufen.

Obwohl die Knochen des Schädeldaches im Embryo früher zu verknöchern beginnen, als jene des Schädelgrundes, so ist doch um die Zeit. der Geburt die Schädelbasis zu einem festeren Knochencomplex gediehen, als das Schädeldach. So lange die Fontanellen offen sind, wird auch die Weichheit und Nachgiebigkeit des kindlichen Kopfes bestehen. - Dem weichen kindlichen Schädel durch Druck eine bleibende Missstaltung aufzudringen. war und ist bei gewissen rohen Völkerstämmen herrschende Volkssitte. Schon Hippocrates spricht von scythischen Langköpfen (Macrocephali), die durch Kunst (vinculo et idoneis artibus) erzeugt wurden. Die in Oesterreich zu Grafenegg und Inzersdorf aufgefundenen Avarenschädel (Sitzungsberichte der kais. Akademie, 1851, Juli), und die von Pentland nach Europa gebrachten alten Peruanerschädel, vom Stamme der Huancas, sind durch fest angelegte Zirkelbinden, deren Eindruck noch zu erkennen, zum Wachsthum in die Länge gezwungen worden. Kox und Adair haben uns die Verfahrungsart der Indianer am Columbiaflusse und in Nordcarolina, die Köpfe ihrer Kinder bleibend flach zu drücken, mitgetheilt. Die Wanasch, und einige tartarische Völker, umwickeln ebenso die Schädel ihrer Kinder bis an die Augen. wodurch sie sich konisch zuspitzen. Zusammenschnüren durch Riemen (Lachsindianer), Festbinden in einer hölzernen Form (Tschactas), Einklemmen zwischen Bretern (Omaguas) sind ebenfalls im Gebrauche. Die merkwürdigste Entstellung, die ich kenne, sehe ich an einem Indianerschädel aus dem Golf von Mexico, der am Hinterhaupt und am Scheitel durch einen breiten tiefen Eindruck in zwei seitliche halbkugelige Vorsprünge zerfällt. Es ist aber offenbar zu weit gegangen, wenn man glaubt, dass das breite Hinterhaupt der alten Deutschen, so wie die breiten Schläfen der Belgier, vom Liegen der Kinder (Vesal), die runden Köpfe der Türken durch den Turban, und die flachen Köpfe der Aegyptier und einiger Gebirgsstämme durch das Tragen schwerer Lasten auf dem Kopfe entstanden seien (Hufeland). Durch Foville's interessante Abhandlung über Schädelmissstaltung erfahren wir, dass in einigen Departements von Frankreich das Binden des Schädels der Neugeborenen noch tiblich sei. Man bemerkt an Erwachsenen noch die Spuren der Einschnürung. Foville hält diesen Gebrauch nicht ohne Einfluss auf später sich entwickelnde Seelenstörungen. Unter 431 Irren im Hospice von Rouen. hatten 247 den vom Schnürband herrührenden Eindruck. Die Irrenärzte Delaye und Mitivié bestätigten diese Beobachtung in den Irrenhäusern von Toulouse und Paris.

Es finden sich auch Schädel mit auffallender Ungleichheit beider Hälften. Frühes Verschmelzen der Näthe der einen Seite, und fortdauerndes Wachsthum der übrigen, ist meist davon Ursache.

Nicht immer werden die Schädel im Greisenalter dünner. Es kann auch das Gegentheil stattfinden, wenn beim beginnenden Schwund des Gehirns nur die innere Tafel einsinkt, und der vergrösserte Diploëraum durch Knochen ausgefüllt wird.

Eine auf zahlreiche Messungen gegründete morphologische Entwicklungsgeschichte des Kopfes enthält R. Froriep's Charakteristik des Kopfes. Berlin, 1845. 8., und Engel's Schrift über das Knochengerüste des menschlichen Antlitzes, Wien, 1850, weist durch Messungen nach, dass die Form des menschlichen Antlitzes einem auf sie wirkenden Mechanismus (der Kraft der Kaumuskeln) ihre Ausbildung verdankt.

§. 110. Entwicklung der Kopfknochen.

Wie schon mehrmals erwähnt wurde, ist in den frühesten Perioden des Fötallebens, die embryonische Grundlage des Schädels eine theils häutige, theils knorpelige Blase. Der knorpelige Antheil, welcher vorzugsweise der zukünstigen Basis cranii entspricht, ist Jacobson's Primordialcranium. Diese Blase verknöchert auf zweierlei Art. Erstens durch Umwandlung des Knorpels in Knochen, welche, wenn sie sertig sind, ihrer Entstehung aus Primordialknorpel wegen, Primordialknochen des Kopses heissen. Zweitens durch Bildung von Knochen aus einem weichen, auf den häutigen Wänden des Schädels abgelagerten Blastem (Belegknochen).

Die Entstehung der Primordialknochen aus Knorpel geht auf die im §. 77 geschilderte Weise vor sich. — Wie entstehen aber die Deckknochen? — Ueber diese Frage haben die neuesten Forschungen folgenden Außschluss gegeben. Jeder Deckknochen ist von der häutigen Unterlage, auf welcher er entsteht, durch eine deutliche, abpräparirbare Lamelle von unreisem, homogenem, Bindegewebe getrennt, und besitzt auch auf seiner äusseren Fläche eine ähnliche Bindegewebschichte. In diesen Bindegewebschichten finden sich sehr zahlreiche, und anfangs regellos eingestreute, grössere und kleinere Zellen mit Kernen, welche sich in Knochenkörperchen umwandeln. Die erste Anlage (Punctum ossificationis) eines Deckknochens läust an ihrem Rande in Strahlen aus, welche ohne scharfe Grenze in weiche Bälkchen übergehen, welche sich zu einem ossescirenden Netzwerk verbinden. Niemals sieht man an dem Bildungsprocess eines Deckknochens Knorpelsubstanz Antheil haben, und die genetische Verschiedenheit beider ist demgemäss eine wohlbegründete. Jedoch ist zu bemerken, dass auch bei den aus präsormirtem Schädelknorpel entstandenen Knochen, die Zunahme an Dicke gleichfalls, wie bei den Deckknochen, durch Verknöcherung eines weichen Blastems stattfindet, welches durch die Beinhaut an die Oberfläche des Knochens abgelagert wird. (Dieses gilt nicht blos für die Schädelknochen, sondern für alle Knochen überhaupt.)

Als Deckknochen des Primordialknorpels des Schädels entstehen solgende: das Stirnbein, die Seitenwandbeine, die obere Hälste der Hinterhauptschuppe, die Schläsebeinschuppe, die Nasen-, Joch-, Oberkieser-, Thränen- und Gaumenbeine, die innere Lamelle der Processus pterygoidei des Keilbeins, die Pflugschar, und der Unterkieser. Durch Verknöcherung des Primordialknorpels bilden sich: der Grundtheil, die untere Hälste der Schuppe, und die beiden Gelenktheile des Hinterhauptbeins, die grossen und kleinen Flügel des Keilbeins, und die äussere Lamelle der Processus pterygoidei, das Siebbein, der Felsen- und Warzentheil des Schläsebeins, die untere Muschel, das Zungenbein, und die Gehörknöchelchen (Kölliker).

Da der eben besprochene Gegenstand vor das Forum der Entwicklungsgeschichte gehört, so müssen von Jenen, welche in diese höchst interessante, und für die vergleichende Anatomie des Schädels ergebnissreiche Sache näher einzugehen wünschen, die in der Literatur der Osteologie, §. 146, angeführten Entwicklungsschristen nachgesehen werden. — Ein bündiges Resumé des bisher über die Entwicklung der Kopsknochen Geleisteten, gab einer der thätigsten Bearbeiter dieses Gegenstandes: Kölliker, in seinem "Bericht über die zootomische Anstalt zu Würzburg. 1849. 4." und in seiner Gewebslehre pag. 233—256.

B. Knochen des Stammes.

Die Knochen des Stammes werden nach Meckel in die Urknochen oder Wirbel, und in die Nebenknochen eingetheilt. Letztere zerfallen wieder in das Brustbein und die Rippen.

a) Urknochen oder Wirbel.

§. 111. Begriff und Eintheilung der Wirbel.

Die Grundlage, das Stativ des Stammes, ist eine in seiner hinteren Wand befindliche, senkrechte und gegliederte Säule, Wirbelsäule (Columna vertebralis), deren einzelne Elemente: Wirbel (Vertebrae s. Spon-Da der bei weitem grössere Theil dieser Säule, zur Aufnahme des Rückenmarks und seiner Nerven, hohl ist, so bildet jeder Wirbel einen kurzen hohlen Cylinder oder Ring. Nur das untere zugespitzte Ende der Wirbelsäule - das Steissbein - ist solide, und wird nur deshalb, weil es bei den Thieren, wie die übrige Wirbelsäule, hohl ist, eine Fortsetzung des Rückenmarks einschliesst, und gewisse typische Uebereinstimmungen in der Entwicklung des Steissbeins mit den übrigen Wirbeln vorkommen, noch unter die Wirbel gezählt. Die Wirbelsäule wird der Länge nach in ein Hals-, Brust-, Lenden- und Kreuzsegment eingetheilt. Steisshein ist ein Anhang des letzteren. Das Halssegment besteht aus sieben Halswirbeln (Vertebrae colli s. cervicis), das Brustsegment aus zwölf Brustwirbeln (Vertebrae thoracis), das Lendensegment aus fünf Lendenwirbeln (Vertebrae lumbales). — Die das Kreuzsegment zusammensetzenden fünf Kreuzwirbel (Vertebrae sacrales) verwachsen im Jünglingsalter zu Einem Knochen (Kreuzbein), und heissen deshalb falsche Wirbel (Vertebrae spuriae), während die übrigen durch das ganze Leben getrennt bleiben, und wahre Wirbel (Vertebrae verae) genannt werden. vier, mit Wirbeln kaum mehr vergleichbaren Stücke des Steissbeins, werden den falschen Wirbeln beigezählt.

Jeder wahre Wirbel hat, als vollständiger Ring, eine mittlere Oeffnung (Foramen vertebrale), und eine vordere und hintere Bogenhälfte. Der vordere Bogen verdickt sich (mit Ausnahme des ersten Halswirbels) zu einer kurzen Säule (Körper des Wirbels, Corpus vertebrae), welche eine obere und untere plane, und eine von rechts nach

links convexe, von oben nach unten ausgeschweiste Begrenzungsstäche besitzt. Der Körper eines Wirbels besteht fast durchaus aus schwammiger Knochenmasse, und besitzt an seiner hinteren, dem Foramen vertebrale zugekehrten Fläche, mehrere grosse Oeffnungen für austretende Venen, an denen die schwammige Substanz eines Wirbels sehr reich ist. Der hintere Bogen bleibt dunn (heisst deshalb vorzugsweise Bogen, Arcus vertebrae), und treibt siehen Fortsätze aus, welche entweder zur Verbindung der Wirbel unter einander, oder zum Ansatz bewegender Muskeln dienen. Diese Fortsätze werden in Gelenkfortsätze und Muskelfortsätze (Processus articulares et musculares) eingetheilt. Wir zählen drei Muskelfortsätze. Der eine ist unpaar, und wächst von der Mitte des Bogens nach hinten als Dornfortsatz, Processus spinosus, - die heiden anderen sind paarig, und stehen seitwarts als Querfortsatze, Processus transversi. Die Gelenkfortsätze zerfallen in zwei obere, und zwei untere (Processus ascendentes et descendentes). Sie sind mit Gelenkstächen versehen, welche bei den oberen Fortsätzen nach hinten, bei den unteren nach vorn gerichtet sind.

Wo der Bogen vom Körper abgeht, hat er an seinem oberen Rande einen flachen, und am unteren Rande einen tiesen Ausschnitt, welche heide Ausschnitte sich mit den entgegenstehenden Ausschnitten des darüber und darunter liegenden Wirbels zu Löchern vereinigen, — Zwischenwirbelbeinloch, Foramen intervertebrale s. conjugatum. — Nicht bei allen Wirbeln wiederholen sich die ausgezählten Theile in derselben Art und Weise. Sie erleiden vielmehr an einer gewissen Folge von Wirbeln sehr wichtige Modificationen, welche einen anatomischen Charakter der verschiedenen Abtheilungen der Wirbelsäule bilden, der in den solgenden §§. erörtert wird.

§. 112. Halswirbel.

Alle Säugethiere, sie mögen langhälsig sein, wie die Giraffe, oder keinen äusserlich wahrnehmbaren Hals besitzen, wie der Wallfisch, haben sieben Halswirbel. Nur bei den Faulthieren steigt ihre Zahl auf 8 und 9, und bei der Seekuh (die, ihrer zum Kriechen, und zum Halten des Jungen dienenden Flossenfüsse wegen, Manatus, schlecht Manati heisst) sinkt sie auf 6 herab.

Ein charakteristisches Merkmal sämmtlicher sieben Halswirbel des Menschen liegt in dem Loche ihrer Querfortsätze — Foramen transversarium. Kein anderer Wirbel hat durchbohrte Querfortsätze. Man könnte auch sagen, dass die Querfortsätze sämmtlicher Halswirbel aus einer vorderen und hinteren Spange beständen, zwischen welchen das Foramen transversarium liegt. Wichtig ist es, hiebei zu bemerken, dass die vordere Spange von den Seiten des Körpers, die hintere aber, wie die Querfortsätze aller übrigen Wirbel, vom Bogen ausgeht. Die vordere Spange

hat auch in der That, wie in der Note zu diesem & gezeigt wird, nicht die Bedeutung eines Querfortsatzes, sondern einer sogenannten Halsrippe. Mit Ausnahme der beiden ersten, theilen die Halswirbel serner folgende allgemeine Eigenschaften. Der Körper ist niedrig, aber breit. Die obere Flache ist von rechts nach links, die untere von vorn nach hinten concav. Legt man zwei Halswirbel über einander, so greisen die sich zugekehrten Flächen in einander ein. Der Bogen gleicht mehr den Schenkeln eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Basis der Körper vorstellt. Das Foramen vertebrale ist somit eher dreieckig als rund. Der horizontale Dornfortsatz ist an seiner Spitze in zwei Zacken gespalten. Die durchlöcherten Querfortsätze sind korz, platt, an ihrer oberen Fläche rinnenartig gehöhlt, und endigen in einen vorderen und hinteren Höcker - Tuberculum. Die aufund absteigenden Gelenkfortsätze sind niedrig, ihre Gelenkflächen rundlich; und vollkommen eben. Die oberen sehen schief nach hinten und oben, die unteren nach vorn und unten. - Der erste und zweite Halswirbel entfernt sich auffallend, der siebente nur wenig von diesem gemeinsamen Vorbilde.

Der erste Halswirbel oder der Träger (Atlas) hat, da er keinen Körper besitzt, die ursprüngliche Ringform am reinsten erhalten. Er besteht aus einem vorderen und hinteren, gleich starken Halbringe. Wo diese zusammenstossen, liegen die dicken Seitentheile, welche sich in die starken und vorragenden Querfortsätze ausziehen. Obere und untere Gelenkfortsätze, so wie der Dornfortsatz, fehlen. Statt der beiden ersteren finden sich nur obere ausgehöhlte, und untere ebene Gelenkflächen. Der Dornfortsatz ist auf ein kleines Höckerchen (Tuberculum posterius) in der Mitte des hinteren Halbringes reducirt. Ein ähnliches (Tuberculum anterius) am vorderen Halbringe erinnert an den fehlenden Körper. In der Mitte der hinteren Fläche des vorderen Halbringes liegt eine kleine, rundliche, überknorpelte Stelle. Sein Foramen vertebrale ist, wegen Mangel des Körpers, grösser als bei irgend einem Wirbel.

Der zweite Halswirbel (Epistropheus, von στρέφω, drehen), unterscheidet sich von dem obigen Vorbilde der Halswirbel dadurch, dass sein kleiner Körper an der oberen Fläche einen zapfenförmigen Fortsatz; den sogenannten Zahn (Processus odontoideus), aufsitzend trägt, welcher an seiner vorderen und hinteren Seite überknorpelt ist. Man unterscheidet an ihm den Hals, den Kopf, und die Spitze. — Die oberen Gelenkfortsätze fehlen, und finden sich statt ihrer blos zwei glatte, ebene Gelenkflächen nahe am Zahne, welche schräg nach aussen und abwärts geneigt sind. Die obere Incisur zur Bildung des Zwischenwirbelloches fehlt gleichfalls in der Regel. Zuweilen wird der Zahnfortsatz so lang, dass er die vordere Peripherie des grossen Hinterhauptloches erreicht, und mit ihr durch ein Gelenk articulirt (Dieterich), als Thierähnlichkeit (beschuppte Amphibien) interessant. — Es lässt sich aus der Entwicklungsgeschichte der Wirbelsäule beweisen, dass der Zahnfortsatz des Epistropheus eigentlich der Körper des Atlas ist.

Der siebente Halswirbel, der an Grösse und Configuration dem Uebergang zu den Brustwirbeln bildet, hat den längsten Dornfortsatz (heisst deshalb Vertebra prominens), der nicht mehr gespalten ist, und auch nicht horizontal, sondern etwas schräg nach abwärts geht. Am unteren Rande seines Körpers findet sich seitlich öfters ein Stück einer überknorpelten Gelenkfläche, welche mit einem grösseren, am oberen Rande des ersten Brustwirbels vorkommenden, die Gelenkgrube für den Kopf der ersten Rippe bildet.

Die hinter dem Seitentheile des Atlas liegende Incisur (welche mit dem Hinterhauptbein das erste Foramen intervertebrale bildet) wird - wie bei den meisten vierfüssigen Thieren - durch eine darüber weggezogene dünne Knochenspange zuweilen in ein Loch umgewandelt. Verwachsungsfälle eines oder beider Seitentheile mit den Condylis des Hinterhauptbeins sind im höheren Alter nichts Seltenes (Sandifort). Viel seltener besteht er aus zwei, durchs ganze Leben getrennt bleibenden seitlichen Hälsten, oder es fehlt dem hinteren Bogen die Mitte. Das Foramen transversarium wird doppelt auf einer, oder auf beiden Seiten. - Durch die Löcher der Querfortsätze läuft die Arteria und Vena vertebralis. Nur das Foramen transversarium des siebenten Halswirbels hat keine Beziehung zur Wirbelarterie, lässt aber doch die Wirbelvene durchgehen. (Vielleicht doch in jenen Fällen, wo es doppelt vorkommt?) - Da jenes Stuck eines Querfortsatzes, welches vor dem Foramen transversarium liegt, sich aus einem besonderen Ossificationspunkt entwickelt, der, bevor er mit dem hinteren Stücke verschmilzt, sich in die Länge zieht, und in diesem Zustande einer kurzen Rippe (Halsrippe vieler Thiere) vergleichbar wird, so ist eigentlich nur der hinter dem Foramen transversarium gelegene Theil eines Querfortsatzes als eigentlicher Querfortsatz zu nehmen. Die vergleichende Anatomie, und die Ursprungs- und Endigungsweisen der Halsmuskeln sprechen dieser Ansicht das Wort, die durch die Gesetze der Entwicklung eine unumstössliche Wahrheit wird. An 6- und auch 7monatlichen Embryonen sieht man die zu einem rippenähnlichen Stabe entwickelte vordere Spange des Foramen transversarium am siebenten Halswirbel sehr gut. Die Querfortsätze des achten und neunten Halswirbels der Faulthiere tragen durch das ganze Leben hindurch kurze Rippen. Diese Wirbel wären somit, als rippentragende, strenggenommen Brustwirbel. Wenn die Angabe Blainville's, dass auch Manatus sieben Halswirbel habe, richtig befunden wurde, so ware das Gesetz der heiligen Sieben für die Halswirbel der Saugethiere ohne Ausnahme gültig.

Der Name *Epistropheus* wurde ursprünglich, und zwar mit vollem etymologischen Recht, dem Atlas beigelegt. Er ist es ja, der sich dreht. Der zweite Halswirbel hiess damals axis (auch $\tilde{a}\xi\omega\nu$), oder vertebra dentata.

§. 113. Brustwirbel.

Die zwölf Brustwirbel haben, als charakteristisches Merkmal, an ihren Körpern kleine überknorpelte Gelenkstellen, zur Verbindung mit den Rippenköpfen. Die Körper der Brustwirbel gewinnen, von oben nach unten gezählt, zusehends an Höhe. Der Querdurchmesser nimmt bis zum vierten an Grösse ab, von diesem bis zum zwölften aber zu. Der Querschnitt der obersten und untersten Brustwirbelkörper ist oval, der mittleren dreieckig

mit gerandeten Winkeln. Am vorderen Umfange des Körpers ist die Höhe geringer, als am hinteren. - Die Bogen der Brustwirhel sind stark gekrummt, das Foramen vertebrale ein Kreis. Die Bornfortsätze eind lang. dreiseitig, zugespitzt, schief nach unten gerichtet, und decken sich an den mittleren Brustwirbeln dachziegelformig. Die Querfortsätze sind ebenfalls lang, stark, etwas nach hinten weichend. Ihre aufgetriebenen knopfformigen Enden besitzen (mit Ausnahme der zwei letzten) nach vorn sehende. flach vertieste, überknorpelte Gelenkslächen, für die Tubercula costarum. Die auf- und absteigenden Gelenkfortsätze stehen vollkommen vertical, und ihre rundlichen, planen Gelenkslächen sehen direct nach hinten und nach vorn. - Jeder der neun oberen Brustwirbelkörper hat an seiner Seitengegend, unmittelbar vor dem Ursprunge des Bogens, zwei Gelenkslächen, die eine am oberen, die andere am unteren Rande. Erstere ist grösser, letztere kleiner. Thurmt man die Wirbel über einander, so bilden die zusammenstossenden Gelenkslächen derselben die Grübchen für die Rippenkopfe - Foveae articulares. Hat der siebente Halswirbel kein Stück einer Gelenkstäche an seinem unteren Rande, so wird das Grübchen für den ersten Rippenkopf blos durch die Gelenksläche am oberen Rande des ersten Brustwirbels gebildet. Der eilste und zwölste Brustwirbel hat eine vollkommene Fovea articularis am oberen Rande. Somit wird der zehnte nur eine unvollkommene Gelenksiäche, und zwar an seinem oberen Rande, besitzen können. Die Dornfortsätze der oberen und mittleren Brustwirbel liegen selten in der verticalen Durchschnittsebene, sondern weichen, besonders bei Frauen, die sich stark schnüren, etwas nach rechts ab.

Die Fovea articularis am 11. und 12. Brustwirbel wird sehr oft so undeutlich, dass sie mehr einem rauhen Höcker gleicht.

§. 114. Lendenwirbel.

Bei den fünf Lendenwirbeln sehlen die Löcher in den Quersortsätzen, so wie die Gelenksächen am Körper, und am Ende der Quersortsätze. Ihr anatomischer Charakter ist somit ein negativer: Mangel der Löcher in den Quersortsätzen, und der Gelenksächen am Körper. Ihre Grösse ist kein absolutes Unterscheidungsmerkmal, da ein junger Lendenwirbel kleiner als ein alter Hals- oder Brustwirbel ist. — Sie sind in demselben Individuum nach jedem Durchmesser grösser, als die Hals- und Brustwirbel. Ihr Körper ist oval, das Loch für das Rückenmark rund, und weiter als an den Brustwirbeln. Die Dornsortsätze sind seitlich comprimirt, hoch, aber schmal, horizontal gerichtet. Die Quersortsätze schwächer als an den Brustwirbeln, und vor den Gelenksortsätzen entspringend. Die oberen Gelenksortsätze sind, von vorn nach hinten, concav; ihre überknorpelte Fläche sieht nach innen. Die unteren stehen, so wie die oberen, senkrecht, und ihre überknorpelte Fläche ist convex, und nach aussen gerichtet. Zwischen dem oberen Gelenksortsatz und der Wurzel des Quersortsatzes, findet sich regel-

mässig ein stumpfer Höcker, oder eine rauhe Leiste, welche der Processus transversus accessorius ist. Der fünfte Lendenwirbel ist vorn merklich höher als hinten, was auch bei den übrigen Lendenwirbeln, aber in viel geringerem Grade, der Fall ist.

Am hinteren ausseren Rande des oberen Gelenkfortsatzes wird öfters ein Hügel oder eine Zacke beobachtet — Processus mammillaris — der am funken Lendenwirbel niemals fehlt. - Die unteren Ränder der Dornfortsätze erscheinen gegen die Spitze hin eingeschnitten, wodurch zwei seitliche Höckerchen entstehen. Die zwischen beiden Höckerchen befindliche Vertiefung (Erinnerung an die gegabelten Dornen der Halswirbel) ist zuweilen, wegen Reibung an dem oberen Rande des nächstfolgenden Dornfortsatzes beim starken Rückwärtsbiegen der Wirbelsäule, wie abgeschliffen. Seltener findet sich am unteren Theile der Spitze des Dornfortsatzes ein besonderer, hakenförmig nach unten gebogener Höcker, der an den nächsten Dornfortsatz stösst, und mit ihm ein wahres Gelenk bildet (Mayer). Eine schon im Mannesalter austretende Verwachsung zweier oder mehrerer Lendenwirbel unter sich, oder des letzten Lendenwirbels mit dem Kreuzbein, kommt nicht gar selten vor, und bildet den Uebergang zur normalen Verwachsung der falschen Kreuzbeinwirbel. Bei Individuen von hoher Statur wird die Zahl der Lendenwirbel häufig, wenn auch nicht immer, um einen Wirbel vermehrt. Ich besitze den fünsten Lendenwirbel eines Erwachsenen, dessen Bogen und untere Gelenkfortsätze mit dem Körper nicht verschmolzen sind.

Durch vergleichend anatomische Untersuchung, und durch die Ergebnisse der Entwicklungsgeschichte der Wirbelsäule lässt es sich beweisen, dass die Processus transversi der Lendenwirbel eigentlich den Rippen, und nicht den Querfortsätzen der übrigen Wirbel, analog sind, und somit besser Processus costarti genannt werden können. Der Querfortsatz der übrigen Wirbel ist an den Lendenwirbeln durch den Processus transversus accessorius repräsentirt. Die anatomischen Verhältnisse der Rückenmuskeln bekräftigen ebenfalls diese Auffassung. Ausführlich über diesen Gegenstand handelt Retzius, über die richtige Deutung der Seitenfortsätze an den Rücken- und Lendenwirbeln, in Müller's Archiv. 1849. p. 593.

§. 115. Kreuzbein.

Das Kreuzbein (Os sacrum, latum, clunium, Vertebra magna) wird auch heiliges Bein genannt. Der Name stammt wohl daher, dass der Knochen, als der grösste Wirbel, von den Griechen μέγας σπόνδυλος genannt, und εξος (heilig) sehr oft für μέγας gebraucht wurde (so z. Β. Τλιος ερή, εξοςς πόντος bei Homer).

Das Kreuzbein ist der grösste Knochen der Wirbelsäule, und besteht aus fünf unter einander verschmolzenen falschen Wirbeln. Es ist wie ein Keil zwischen die beiden ungenannten Beckenknochen hineingetrieben, schliesst den Beckenring nach hinten, und dient gewissermassen der auf ihm ruhenden Wirbelsäule als Piedestal. Seine concav-convexe Gestalt lässt einen Vergleich mit einer zugespitzten Schausel zu, oder besser noch mit einer umgestürzten, nach vorn gekrümmten Pyramide, an welcher eine nach oben gekehrte Basis, eine vordere und hintere Fläche, und zwei Seitenränder unterschieden werden. Die Basis hat in ihrer Mitte eine ovale

Verbindungsstelle für den letzten Lendenwirbel, welche Verbindung, da die Axe des Kreuzbeins keine Verlängerung der Axe der Lendenwirbelsäule ist, sondern nach hinten abweicht, einen vorspringenden Winkel (das Promentorium oder Vorberg) bildet. Hinter dieser Verbindungsstelle liegt der dreieckige Eingang eines, das Kreuzbein durchdringenden Kanals, welcher eine Fortsetzung des Kanals der Wirbelsäule ist, und Canalis sacralis gehannt wird. Rechts und links von diesem Eingange stehen die beiden oberen Gelenkfortsätze des ersten falschen Kreuzwirbels hervor. Die vordere Fläche ist concav, und zeigt vier oder fünf Paar Löcher (Foramins sacralia anteriora), welche in den Canalis sacralis führen, von ohen nach unten an Grösse abnehmen, und zugleich etwas näher rücken. Die Löcher eines Paares sind durch quere erhabene Leisten (Spuren der Verwachsung der salschen Kreuzwirbelkörper) verbunden. Die hintere Fläche ist convex, und zeigt eine mittlere und zwei seitliche, parallele, erhabene, rauhe Leisten, die eine Reihenfolge verschmolzener Höcker darstellen. Die mittdere Leiste, auch Crista sacralis genannt, wird durch die unter einander verwachsenen Dornen, die beiden seitlichen durch die zusammenfliessenden Querfortsätze gebildet. Bei besonders kräftig entwickelten Kreuzbeinen sieht man zwischen diesen drei Reihen noch zwei schwächer angedeutete eingeschaltet, - die Verschmelzungsstellen der auf- und absteigenden Gelenkfortsätze. Am unteren Ende der mittleren Leiste liegt die untere Oeffnung des Canalis sacralis als sogenannter Kreuzbeinschlitz (Hiatus sacralis). welcher beiderseits durch die als abgerundete Höckerchen ohne Gelenkfläche erscheinenden, absteigenden Gelenkfortsätze des letzten falschen Kreuzwirbels begrenzt wird. Man nennt sie sehr unpassend Cornua sacralia. Mit den vorderen Kreuzbeinlöchern correspondirend liegen die hinteren (Foramina sacralia posteriora), welche kleiner und unregelmässiger sind, als die vorderen, und so wie diese in den Canalis sacralis führen. - Die nach unten convergirenden dicken Seitenränder des Kreuzbeins sind an ihrem oberen dickeren Ende mit einer S- oder ohrsormigen Verbindungsstäche für den Hüstknochen versehen, und gehen nach unten in eine abgeschnittene Spitze über, an welche sich das Steissbein hestet. Bevor sie diese Spitze erreichen, werden sie halbmondförmig ausgeschnitten - Incisura sacrococcygea.

Die Bedeutung der einzelnen Formbestandtheile des Kreuzbeins als Wirbelelemente, wird durch die Untersuchung jugendlicher Knochen, wo die Verwachsung der fünf falschen Wirbel zu Einem Knochen noch nicht vollendet ist, besonders klar. Man überzeugt sich, dass die vorderen Kreuzbeinlöcher den Zwischenwirbellöchern, die hinteren den Zwischenräumen je zweier Wirbelbogen entsprechen, während die verschmolzenen Muskel- und Gelenkfortsätze in den longitudinalen Leisten an der hinteren Fläche des Knochens erkannt werden. — Kein Knochen bietet so zahlreiche Verschiedenheiten seiner Form dar, wie das Kreuzbein. Es wird aus fünf oder sechs falschen Wirbela zusammengesetzt, wodurch die Zahl der vorderen und hinteren Foramina sacratia vier oder fünf beträgt. Nur muss man nicht die Fälle, wo das erste

Stück des Steissbeins, oder der letzte Lendenwirbel mit dem Kreuzbein verwachsen ist, für eine wirkliche Vermehrung seiner Wirbelzahl ansehen. Auch nur vier Kreuzwirbel wurden gesehen. — Albin und Sandifort haben zuerst eine interessante Anomalie des Kreuzbeins erwähnt, wo der erste falsche Wirbel auf der einen Seite ganz die Form eines Lendenwirbels, auf der anderen die Beschaffenheit eines Kreuzwirbels hatte. Fälle von unvollkommener Schliessung oder gänzlichem Offensein des Canalis sacralis werden in jedem anatomischen Museum außbewahrt. Unsymmetrie des Knochens, und seitliches Abweichen seiner Spitze kommen sehr häufig vor. Ich besitze einen sehr merkwurdigen Fall von anomaler Bildung des Kreuzbeins, wo die seitlichen Bogenhälsten der falschen Wirbel (welche durch ihre Nichtvereinigung das Offenbleiben des Sacralkanals bedingen) mit einander so verwachsen sind, dass die rechte Bogenhälste des ersten Wirbels mit der linken des zweiten, die rechte Hälste des zweiten mit der linken des dritten u. s. w. zusammenstösst, wodurch eine ganz sonderbare Verschobenheit der hinteren Fläche entsteht. Die linke Bogenhälfte des ersten, und die rechte Bogenhälfte des letzten Kreuzwirbels ragen als stumpfe Höcker unverbunden hervor. An einem zweiten Falle wächst zwischen dem ersten und zweiten hinteren Foramen sacrale rechterseits ein stumpfpyramidaler Fortsatz heraus, der sich nach aussen krummt, und mit der Tuberositas ossis ilei durch Synchondrosis zusammenstösst.

Da das Kreuzbein an der Bildung des Beckenringes participirt, und von seiner Grösse und Gestalt die in beiden Geschlechtern sehr ungleiche Länge und Weite des Beckens vorzüglich abhängt, so muss der Geschlechtsunterschied an ihm sehr deutlich ausgesprochen sein. Es gilt als Norm, dass das weibliche Kreuzbein breiter, kürzer, gerader, und mit seiner Längenaxe mehr nach hinten gerichtet ist, als das männliche.

Man könnte die Cornua sacralia auch für die nicht vereinigten Enden der Bogenhälften des letzten Kreuzwirbels ansehen.

§. 116. Steissbein.

Das Steissbein, Os caccygis (auch Kukuksbein, von xóxxv5), ist eigentlich eine Reihe von vier, nur selten von fünf Knochenstücken, an deren erstem nur wenig Attribute eines Wirbels, an den übrigen gar keine mehr zu erkennen sind. Die Ringform ist bei allen ganz eingegangen, und nur ein Rudiment des Körpers übriggeblieben. Das erste Stück hat noch Andeutungen von aufsteigenden Gelenkfortsätzen, welche nun Cornua coccygea heissen, und auf die Cornua sacralia zu wachsen, ohne sie zu erreichen. Die Seitentheile mahnen an verkümmerte Processus transversi. Die Verbindungsstelle für die abgestutzte Kreuzbeinspitze ist noch das wenigst entstellte Ueberbleibsel einer oberen Wirbelfläche. Die am unteren Ende des Seitenrandes des Kreuzbeins erwähnte flache Incisura sacrococcygea wird durch Anlagerung des ersten Steisswirbels bedeutend vertieft, und daher der Name. Bei den geschwänzten Säugethieren ändert sich der Wirbelcharakter der einzelnen Steissbeinwirbel gar nicht, und finden sich alle Attribute einer wahren Vertebra an ihnen.

Bauhin betrachtete es als Regel, dass das weibliche Steisaber Stuck mehr hätte, als das männliche. — Die Verwachsung des a wirbels mit dem letzten Kreuzwirbel ereignet sich nur im männlichen Geschlechte; bei Weibern ist eine solche Ankylose etwas Unerhörtes, und hätte den nachtheiligsten Einfluss auf das Gebären. Man behauptete, es entstünden solche Verwachsungen gerne bei Individuen, die oft und anhaltend reiten. Wie wenig an dieser Behauptung Wahres ist, beweist das Skelet eines alten donischen Kosaken in der Blumenbach'schen Sammlung, an welchem vier Lendenwirbel ankylosirten, das Steissbein aber vollkommen beweglich blieb. Das dritte und vierte Stück des Steissbeins erscheinen bisweilen nicht auf, sondern neben einander (Folge von Verrenkung, welche, bei der Häufigkeit von Fällen auf das Gesäss, nicht eben selten vorkommen mag). Ihre Verwachsung ist häufig.

§. 117. Bänder der Wirbelsäule.

Sie zerfallen in die allgemeinen und besonderen. Erstere finden sich entweder als lange continuirliche Bandstreisen an der ganzen Länge der Wirbelsäule, oder sie treten zwischen je zwei Wirbeln (nur nicht zwischen Atlas und Epistropheus) in derselben Art und Weise auf, und wiederholen sich so oft, als Wirbelverbindung überhaupt stattfindet. Letztere werden nur an bestimmten Stellen der Wirbelsäule, und namentlich an ihren Endpunkten gefunden.

A) Allgemeine Bander, die die ganze Lange der Wirbelsaule einnehmen.

Sie finden sich als zwei lange Bänder, an der vorderen und hinteren Fläche der Wirbelkörper herablaufend. Das vordere (Ligamentum longitudinale anterius) entspringt an der Pars basilaris des Hinterhauptbeins, ist anfangs schmal und rundlich, wird im Herabsteigen breiter, adhärirt fest an die vordere Gegend der Wirbelkörper und besonders der Zwischenwirbelbänder, und verliert sich ohne deutliche Grenze in die Beinhaut des Kreuzbeins. Das hintere (Ligamentum longitudinale posterius) wird weder so breit, noch so stark wie das vordere. Es liegt im Rückgratskanal, beginnt am Körper des dritten Halswirbels, und verliert sich im Periost des Kreuzbeinkanals. Beide lange Bänder sind eigentlich nur eine sich stetig wiederholende Succession von Fasern, welche an einem oberen Wirbel entstehen, und am zweiten oder dritten folgenden enden. Sie beschränken die Rück- oder Vorwärtsbeugung der Wirbelsäule.

B) Allgemeine Bander, die sich zwischen je zwei Wirbeln wiederholen.

1. Zwischenwirbelscheiben (Ligamenta intervertebralia, besser Fibro-cartilagines intervertebrales) sind die Bindungsmittel der einzelnen Wirbelkörper. Sie bestehen aus kurzen fibrösen Cylindern oder Ringen, welche einander umschliessen (ohne concentrisch zu sein), und welche Zwischenräume zwischen sich übrig lassen, die von weicher, gallertartiger, und sehr elastischer Knorpelmasse eingenommen werden. In der Mitte jeder einzelnen Knorpelscheibe, wo die fibrösen Ringe sehlen, ist der Knorpel in grösserer Menge abgelagert, und springt beim Querschnitt über die Durchschnittsebene vor.

- 2. Zwischenbogenbänder, oder gelbe Bänder (Ligamenta intercruralia s. flava). Sie füllen die Zwischenräume je zweier Wirbelbogen aus, bestehen aus elastischen Fasern, und besitzen deshalb einen hohen Grad von Dehnbarkeit.
- 3. Von den Zwischendorn- und 4. den Zwischen querbändern (Ligamenta interspinalia et intertransversalia), so wie von den Kapselbändern der auf- und absteigenden Gelenkfortsätze, sagt der Name Alles. 3 und 4 sind besonders stark am Lendensegmente der Wirbelsäule. Die sogenannten Spitzenbänder der Dornfortsätze (Ligamenta apicum) sind wohl nur die äussersten verdickten Ränder der Zwischendornbänder. Sie finden sich nur vom siebenten Halswirbel an bis zu den falschen Dornen des Kreuzbeins. Vom siebenten Halswirbel, bis zur Protuberantia occipitalia externa, werden sie durch das Nackenband (Ligamentum nuchae) ersetzt, welches beim Menschen verbältnissmässig schwach ist, bei den Thieren aber, die schwere Geweihe tragen, oder ihres Kopfes sich zum Stossen und Wühlen bedienen, ungemein kraftvoll entwickelt getroffen wird. Man fühlt es am eigenen Nacken sehr gut, wenn man den Kopf stark nach vorn beugt.

C) Besondere Bander zwischen einzelnen Wirbeln.

Um die Beweglichkeit des Kopses zu vermehren, konnte er weder mit dem ersten Halswirbel, noch dieser mit dem zweiten durch Zwischenwirbelscheiben verbunden werden. Es waren besondere Einrichtungen nothwendig, um den Kops beweglicher zu machen, als es ein Wirbel auf dem anderen ist. Bewegt sich der Kops in der verticalen Ebene, so drehen sich die *Processus condyloidei* seines Hinterhauptes, in den oberen concaven Gelenkstächen der Seitentheile des Atlas, welcher ruhig bleibt, vor und zurück. Bewegt sich der Kops um seine senkrechte Axe drehend nach rechts und links, so ist es eigentlich der Atlas, welcher diese Bewegung macht, indem er sich um den Zahn des Epistropheus, wie ein Rad um eine excentrische Axe, dreht; — der Kops, welcher vom Atlas getragen wird, macht nothwendig die Drehbewegung des Atlas mit.

1. Bänder zwischen Atlas und Hinterhauptbein. Der Raum, der zwischen dem vorderen Halbring des Atlas und der vorderen Peripherie des Hinterhauptloches, so wie zwischen hinterem Halbring und hinterer Peripherie dieses Loches übrig bleibt, wird durch zwei sehnige Häute verschlossen, welche als vorderes und hinteres Verstopfungsband (Membrana obturatoria anterior et posterior) bezeichnet werden. Erstere ist stärker, straffer angezogen, letztere dünner und schlaffer, und wird beiderseits durch die Arteria vertebralis, welche von den Löchern der Querfortsätze des Atlas sich zum grossen Hinterhauptloche krümmt, durchbohrt. — Die Gelenkslächen der Processus condyloidei und der Seitentheile des Atlas werden durch sibröse Kapseln zusammengehalten, deren vordere und hintere Wände weit und nachgiebig sind, um die Beugung und Streckung des Kopfes nicht zu sehr zu beschränken.

2. Bänder zwischen Epistropheus, Atlas, und Hinterhauptknochen. Der Zahn des Epistropheus wird durch ein starkes Querband (Ligamentum transversum atlantis) an die Gelenksläche des vorderen Halbringes des Atlas angedrückt. Es ist dieses Querband in der Ebene des Atlasringes, von einem Seitentheil zum anderen, also quer gespannt, und theilt die Oeffnung des Atlas in einen vorderen, für den Zahn des Epistropheus, und in einen hinteren, grösseren, für das Rückenmark bestimmten Raum ein. Vom oberen Rande desselben geht ein Fortsatz zum vorderen Rande des grossen Hinterhauptloches, und vom unteren Rande ein gleicher zum Körper des Epistropheus herab. Diese beiden senkrechten Fortsätze bilden mit dem Querband ein Kreuz — Ligamentum cruciatum. Damit der Zahn aus dem durch den vorderen Halbring des Atlas und durch das Querband gebildeten Ring nicht herausschlüpfe, ist er ebenfalls an den vorderen Umfang des grossen Hinterhauptloches durch drei Bänder - ein mittleres und zwei seitliche - besestigt. Das mittlere (Ligamentum suspensorium dentis) geht von der höchsten Spitze des Zahnes zum vorderen Rande des Foramen occipitale magnum; die beiden seitlichen (Ligamenta alaria s. Maucharti) erstrecken sich von den Seiten des Zahnes zu den Seitenrändern des Hinterhauptloches, und zur inneren Fläche der Processus condyloidei. Sie beschränken die drehende Bewegung des Kopfes, ohne sie ganz aufzuheben. - Der hier beschriebene Bandapparat wird durch eine sehnige und derbe Haut zugedeckt, welche vom Clivus des Keilbeins herabkommt, mit der harten Hirnhaut theilweise verwächst, und am Körper des dritten Halswirbels dort endet, wo das Ligamentum longitudinale posterius beginnt. Ich nenne sie Membrana ligamentosa, und verstehe unter dem Namen Apparatus ligamentosus, welchen ihr alte und neue Schriststeller beilegen, die ganze Bandverbindung der zwei oberen Halswirbel und des Hinterhauptbeins. Der Name Apparatus drückt ja eine Vielheit von Theilen aus, und kann auf Ein Ligament nicht angewendet werden.

Zwischen vorderer Peripherie des Zahnes, und der anstossenden Gelenkstäche des vorderen Atlasbogens, so wie zwischen hinterer Peripherie des Zahnes, und dem darüber weggehenden Ligamentum transversum, befinden sich Synovialkapseln, aber ohne Faserkapseln. Ich habe kleine unconstante Schleimbeutel gefunden und beschrieben, mit welchen diese Synovialkapseln in Verbindung stehen.

Genaue Zergliederungsresultate über diese Bänder gab W. Gruber in Müller's Archiv. 1851.

3. Bänder zwischen Kreuz- und Steissbein. Die Spitze des Kreuzbeins wird mit dem ersten Steissbeinstück, und die folgenden Stücke des Steissbeins unter einander, durch Faserknorpelscheiben — wie wahre Wirbel — vereinigt. Dazu kommen vordere, hintere, und seitliche Verstärkungsbänder — Ligamenta sacro-coccygea. Das Ligamentum sacro-coc-

cygeum posterius ist zwischen den Kreuzbeins- und Steissbeinshörnern ausgespannt, und schliesst den Hiatus sacro-coccygeus.

Da der Atlas, zugleich mit dem Kopfe, sich um den Zahn des Epistropheus nach rechts und links um 45° drehen kann, so müssen die Kapseln. welche die unteren Gelenkstächen der Seitentheile des Atlas mit den oberen Gelenkslächen des Epistropheus verbinden, sehr schlaff und nachgiebig sein. wie sie es in der That auch sind. - Zerreissung des Querbandes und der Seitenbander des Zahnes, die durch ein starkes und plötzliches Niederdrücken des Kopfes gegen die Brust entstehen könnte, wurde den Zahnfortsatz in das Rückenmark treiben, und absolut tödtliche Zerquetschung desselben bedingen. Die Gewalt, die eine solche Verrenkung des Zahnfortsatzes nach hinten bewirken soll, muss sehr intensiv sein, da die Ligamenta suspensoria allein ein Gewicht von 125 Pfund ohne zu zerreissen tragen (Maisonabe), und die Stärke des Querbandes wenigstens nicht geringer ist, die übrigen Bänder und Weichtheile gar nicht gerechnet. Man hat behauptet, dass beim Tode durch Erhenken eine Verrenkung des Zahnes nach hinten jedesmal eintrete (Petit). Wenn R. Wagner bei Selbstmördern, die sich erhenkten, diese Verrenkung niemals beobachtete, so liegt der Grund wohl darin, dass beim Selbsthenken kein Druck nach abwärts auf den Kopf ausgeübt wird. Ich habe an zwei Leichen gehenkter Mörder ebenfalls keine Zerreissung der Bänder des Zahnes beobachtet, möchte jedoch die Möglichkeit derselben nicht in Zweisel ziehen. wenn, wie es in Frankreich vor Einführung der Guillotine (und, wie ich höre. auch in Ungarn) geschah, der Henker sich auf die Schultern des Delinquenten schwingt, und dessen Kopf mit beiden Händen nach unten drückt. Petit könnte somit wohl Recht gehabt haben. Man hat ja auch in einem Falle, wo ein junger Mensch sich auf einen anderen stürzte, der gerade mit seinem Leibe ein Rad schlug, Zersprengung der Bänder des Zahnes, und augenblicklich tödtliche Luxation des Zahnes mit Zermalmung des Rückenmarks erfolgen gesehen. Eine in der neuen Ausgabe von Sömmerring's Osteologie, p. 236, zu lesende Note, veranlasste mich zu dieser Bemerkung. — Der Bandapparat zwischen Zahn des Epistropheus, Atlas, und Hinterhauptbein, wird am zweckmässigsten untersucht, wenn man an einem Nacken, der bereits zur Muskelpräparation diente, die Bogen der Halswirbel und die Hinterhauptschuppe absägt, und den Rückgratkanal mit dem grossen Hinterhauptloche dadurch öffnet. Nach Entfernung des Rückenmarks trifft man die harte Hirnhaut. Unter dieser folgt die Membrana ligamentosa, und, bedeckt von dieser, das Ligamentum cruciatum, nach dessen Wegnahme das Ligamentum suspensorium, und die beiden Ligamenta alaria übrig bleiben.

§. 118. Betrachtung der Wirbelsäule als Ganzes.

Die Wirbelsäule ist, mit Ausschluss des Steissbeins, eine hohle gegliederte Knochenröhre, die das Rückenmark und die Ursprünge der Rückenmarksnerven einschliesst. Am Skelete betrachtet, ist die Röhre nur unvollkommen von knöchernen Wänden gebildet. Zwischen je zwei Wirbelkörpern und deren Bogen bleiben offene Lücken übrig, die im frischen Zustande durch die Ligamenta intervertebralia und intercruralia verschlossen werden, so dass beiderseits nur die Foramina intervertebralia für die austretenden Rückenmarksnerven offen bleiben. Die Länge der Säule vom Atlas bis zum Kreuzbeine beträgt durchschnittlich den dritten Theil der

ganzen Körperlänge. Die einzelnen Glieder derselben, oder die Wirbel. nehmen an absoluter Grösse bis zum Kreuzbein allmälig zu, vom Kreuzbein bis zur Steissbeinspitze aber schnell ab. Die Breite der Wirbelkörper nimmt vom zweiten bis siebenten Halswirbel zu, von hier bis zum vierten Brustwirbel ab, und steigt von nun an successive bis zur Basis des Kreuzbeins. Die Höhe der einzelnen Wirbel ist am Halssegmente fast gleich, und wächst bis zum letzten Lendenwirbel in steigender Progression. Der Kanal für das Rückenmark ist in den Halswirbeln ziemlich gleichweit, in den Rückenwirbeln vom 6. bis zum 9. am engsten, in den oberen Lendenwirbeln etwas weiter, und verengt sich neuerdings gegen die Kreuzbeinspitze. Die Seitenöffnungen des Kanals, deren wir mit Inbegriff des Kreuzbeins 30 zählen, nehmen von den Halswirbeln bis zum letzten Lendenwirbel an Grüsse zu. Die Entsernung je zweier Dornsortsätze ist am Halssegmente, wegen horizontaler Richtung und Schwäche derselben, am grössten, am Brustsegmente am kleinsten, und im Lendensegmente kaum kleiner als am Halse. Das dachziegelformige Uebereinanderschieben der Brustwirbeldornen schützt das Rückenmark gegen Stich und Hieb von hinten her besser, als am Halse und an den Lenden. Ein durch die hinteren Kreuzbeinlöcher eingedrungenes Instrument kann durch die vorderen in die Beckenhöhle gelangen. Der Abstand zweier Bogen ist zwischen Atlas und Epistropheus am grössten, sehr klein bei den Rückenwirbeln, grösser bei den Lendenwirbeln. Am leichtesten dringen verletzende Werkzeuge zwischen Hinterhaupt und Atlas in die Rückgratshöhle ein. — Die Spitzen der Overfortsätze der 6 oberen Halswirbel liegen in einer senkrechten Linie über einander. Der Querfortsatz des 7. Halswirbels weicht etwas nach hinten, welche Abweichung sämmtlichen Brustwirbelquerfortsätzen zukommt, und sich an den Lendenwirbeln wieder in die rein quere Richtung verwandelt. Zwischen den Dorn- und Querfortsätzen aller Wirbel liegen 2 senkrechte Rinnen, Sulci dersales, die einem Theile der langen Rückenmuskeln zur Aufnahme dienen.

Die Wirbelsäule steht nicht vollkommen vertical, sondern erscheint bei seitlicher Ansicht nach bestimmten Gesetzen gekrümmt. Der Halstheil ist nach vorn mässig convex, der Brustheil stark nach hinten gebogen, der Lendentheil wieder nach vorn, das Kreuzbein nach hinten convex. Diese 4 Krümmungen addiren sich zu einer Schlangenkrümmung. Man prägt sich das Gesetz der Krümmung am besten ein, wenn man festhält, dass jene Reihen von Wirbeln, welche mit keinen Nebenknochen in Verbindung stehen (Hals- und Lendenreihe), nach vorn, dagegen die mit Nebenknochen verbundenen Reihen (Brustwirbel und Kreuzbein) nach hinten convex gekrümmt sind. Die nach hinten convexen Krümmungen vergrössern den Rauminhalt der vor ihnen liegenden Höhlen der Brust und des Beckens. Die Krümmungen der Wirbelsäule entwickeln sich erst deutlich mit dem Vermögen aufrecht zu stehen und zu gehen. Bei Embryonen und bei Kindern, die noch nicht gehen lernten, sind sie nur angedeutet. Bei Thieren, die auf

zwei Füssen zu gehen abgerichtet sind, treten sie ebenfalls auf. Die stärkste, nach vorn convexe Krümmung, liegt zwischen Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, als sogenanntes Promontorium (Vorberg).

Die nach vorn convexen Krümmungen werden durch die Einschiebung der Zwischenwirbelbänder bedingt, welche an ihrem vorderen Umfange höher als am hinteren sind. Die nach hinten convexe Krümmung der Brustwirbelsäule hängt nicht von den Zwischenwirbelbändern ab, die hier vorn und hinten gleich hoch sind, sondern wird durch die vorn etwas niedrigeren Körper der Brustwirbel erzeugt. Die leichte Seitenkrümmung, die die Brustwirbelsäule besonders in ihrem Brustsegmente nach rechts zeigt, und die bei Wenigen fehlt, scheint mit der vorwaltenden Uebung der rechten oberen Extremität in Verbindung zu stehen; denn bei Individuen; die ihre Linke geschickter zu gebrauchen wissen, soll sich die Brustwirbelsäule nach links krümmen (?).

Die weibliche Wirbelsäule unterscheidet sich von der männlichen darin, dass die Querfortsätze der Brustwirbel stärker nach hinten abweichen, und das Lendensegment verhältnissmässig kurzer ist. - Da die Dornfortsätze durch die Haut zu sühlen sind, so bedient man sich der Untersuchung ihrer Richtung, um eine Verkrümmung der Wirbelsäule auszumitteln. — Der Dorn des 7. Halswirbels wird, seiner Länge und Richtung wegen, am meisten den Bruchen ausgesetzt sein. — Oft findet man die rechte Hälste eines Wirbels merklich höher als die linke, was, wenn keine Ausgleichung durch ein entgegengesetztes Verhältniss des nächstfolgenden Wirbels herbeigeführt wird, Seitenverkrummung (Scoliosis) bedingt. - Die Gesetze des Gleichgewichtes fordern es, dass, wenn an einer Stelle eine Verkrummung des Ruckgrats auftritt, in einem unteren Segmente der Wirbelsäule eine compensirende, i. e. entgegengesetzte Krummung durch erstere bedingt wird. - Im höheren Alter wird die Convexität der Brustwirbelsäule stärker, und heisst, wenn sie auffällt, Senkrücken der Greise. - Die Dorn- und Querfortsätze sind als Hebelarme zu nehmen, durch deren Länge die Wirkung der Rückgratsmuskeln begunstigt wird.

Durch die Entwicklungsgeschichte der Wirbelsäule und durch die Data der vergleichenden Osteologie wird bewiesen, dass die beiden Schenkel der durchbohrten Querfortsätze der Halswirbel einer verschiedenen Deutung unterliegen, und nur der hintere Schenkel dem Processus transversus eines Brustwirhels vergleichbar ist, der vordere aber als Rippenrudiment angesehen werden muss. Nesbitt's und Meckel's Beobachtungen constatirten die Entstehung eines eigenen länglichen Knochenkernes im vorderen Umsange des Foramen transversarium des 7. Halswirbels. Dieser Kern entspricht durch Lage und Gestalt einem Rippenhalse, und verschmilzt zuweilen gar nicht mit dem übrigen Wirbel, sondern bleibt getrennt, verlängert sich rippenartig, und wird als überzählige (dreizehnte) Rippe gezählt. Bei den übrigen Halswirbeln wird für den vorderen Umfang des Foramen transversarium von Meckel kein besonderer, von M. J. Weber dagegen ein besonderer Ossificationspunkt angegeben, den ich an der 6., 5. und 4. Vertebra colli ganz deutlich an Ilg'schen Präparaten gesehen habe. Bei den Lendenwirbeln ist nicht der allgemein sogenannte Querfortsatz, sondern der Processus transversus accessorius einem Brustwirbelquerfortsatze zu vergleichen, und der für den Querfortsatz gehaltene Processus transversus stimmt vollkommen mit einer Rippe tiberein,

weshalb die von Krause gewählte Bezeichnung Processus costerius vorzuziehen ist. Wenn sich die dreizehnte Rippe nicht am letzten Halswirbel, sondern am ersten Lendenwirbel bildet, so sitzt sie immer auf der Spitze des Processus costarius, nicht am Wirbelkörper auf.

§. 119. Beweglichkeit der Wirbelsäule.

Nur das aus den 24 wahren Wirbeln gebildete längere Stück der Wirbelsäule ist nach allen Seiten beweglich. Das zwischen die Beckenknochen eingekeilte Kreuzbein steckt fest, und das Steissbein kann nur nach vorund rückwärts bewegt werden. Die Beweglichkeit der wahren Wirbel hängt zunächst von den Zwischenwirbelbändern ab. Jede Bandscheibe dieser Art stellt ein elastisches Kissen dar, welches dem darauf liegenden Wirbel eine geringe Bewegung nach allen Seiten zu erlaubt, ihn aber zugleich mit dem nächst darunter liegenden auf das festeste verbindet. Wenn die Beweglichkeit zweier Wirbel gegen einander auch sehr limitirt ist, so wird doch die ganze Wirbelsäule, durch Summirung ihrer Theilbewegungen, einen hohen Grad von geschmeidiger Biegsamkeit erhalten. — Die Beweglichkeit der Wirbelsäule ist nicht an allen Stellen derselben gleich. Jene Stücke der Wirbelsäule, wo der Kanal für das Rückenmark eng ist, haben eine sehr beschränkte, oder gar keine Beweglichkeit (Brustsegment, Kreuzbein), während mit dem Grösserwerden dieses Kanals an den Hals- und Lendenwirbeln, die Beweglichkeit zunimmt. Die grössere oder geringere Beweglichkeit eines Wirbelsäulensegmentes wird von folgenden Punkten abhängen: 1. von der Menge der in ihm vorkommenden Bandscheiben (oder, was dasselbe sagen will, von der Niedrigkeit der Wirbelkörper), 2. von der Höhe der Bandscheiben, 3. von der grösseren oder geringeren Spannung ihrer concentrischen tendinösen Ringe, 4. von der Kleinheit der Wirbelkörper, 5. von einer günstigen oder ungünstigen Stellung der Wirbelfortsätze.

- 1. Mit der Menge der Bandscheiben an einem Wirbelsegmente von bestimmter verticaler Ausdehnung, wächst die Menge des beweglichen Elementes der Wirbelsäule. Daher wird die Halswirbelsäule einen höheren Grad von allseitiger Beweglichkeit besitzen, als das Brust- oder Bauchsegment, was durch die Beobachtung an Lebenden und Todten bestätigt wird. Beugung, Streckung, Seitwärtsneigung, und Drehung um ihre Axe, kommt den Halswirbeln am meisten, den 10 oberen Brustwirbeln am wenigsten zu.
- 2. Die Höhe der Zwischenwirbelscheiben nimmt vom letzten Lendenwirbel bis zum 3. Brustwirbel ab, wächst aber bis zu den mittleren Halswirbeln wieder, und nimmt von nun an bis zum zweiten neuerdings ab. Nach den genauen Messungen der Gebrüder Weber, beträgt die mittlere Höhe der letzten Zwischenwirbelscheibe 10,90 Millim., zwischen 3. und 4. Brustwirbel 1,90, zwischen 5. und 6. Halswirbel 4,60, zwischen 2. und 3. Halswirbel 2,70. Die Summe der Höhen aller Zwischenwirbelscheiben ist gleich dem 4. Theil der ganzen Säulenhöhe. Die unbeweglichsten Wir-

bel sind der 3. bis 6. Brustwirbel, so wie der 2. Halswirbel. Die Lendenwirbel, welche, ihrer grossen Verbindungsstäche wegen, schwerer auf einander beweglich wären, sind durch ihre hohen Bandscheiben ziemlich beweglich geworden. Dass die am vorderen und hinteren Rande ungleiche Höhe der Bandscheiben auf die Entstehung der Schlangenbiegung der Rückensäule Einfluss hat, ist klar.

- 3. Schneidet man eine Bandscheibe senkrecht durch, so bemerkt man. dass die Durchschnittslinien ihrer Faserringe keine geraden, sondern krumme Linien sind, deren Convexität für die äussersten oder grössten Ringe nach aussen, und für die kleineren, inneren, nach innen sieht. Je stärker diese Krümmungen sind, desto höher müssen die Ringe im gestreckten Zustande werden, und desto grösser die verticale Ausdehnungsmöglichkeit für die, zwischen den Faserringen eingeschaltete, elastische Knorpelmasse. aus diesem Grunde wird die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, trotz der Grösse der Verbindungsslächen, zunehmen. Es ist schon a priori einleuchtend, dass ein Band, welches aus nicht elastischen Ringen, und zwischen diesen liegender elastischer Masse besteht, beim Comprimiren eine Krümmung der nicht elastischen Ringe zeigen müsse. Je grösser diese Krümmung war, desto grösser wird, wenn der Druck nachlässt, die verticale Ausdehnung des Bandes werden, und mit dieser wächst im gleichen Schritte die absolute Beweglichkeit des darüber liegenden Wirbels.
- 4. Die kleine Peripherie der Halswirbelkörper fördert ihre Beweglichkeit nach allen Seiten. Die grosse Peripherie der Lendenwirbelkörper ist ein namhaftes Bewegungshinderniss, und wird nur durch die Höhe der Intervertebral-Ligamente, und die starke Krümmung ihrer fibrösen, ringförmigen Elemente compensirt.
- 5. Die Stellung der Fortsätze, ihre Richtung und Länge, insluirt sehr bedeutend auf die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Die horizontalen, und unter einander parallelen Dornen der Hals- und Lendenwirbel, selbst die Spaltung der Spitzen bei ersteren, sind für die Rückwärtsbeugung der Hals- und Lendenwirbelsäule günstige, die schiese Richtung der Brustdornen ungünstige Momente. Die ineinander greisenden auf- und absteigenden Gelenkfortsätze der Lendenwirbel begünstigen die Axendrehung der Körper dieser Wirbel, welche Bewegung durch die Höbe der Zwischenwirbelscheiben in erheblichem Grade möglich gemacht wird.

Die Zusammendrückbarkeit der Zwischenwirbelscheiben ist der Grund, warum der menschliche Körper bei aufrechter Stellung kürzer, als bei horizontaler Rückenlage ist. Nach Messungen, die ich an mir selber vorgenommen, beträgt meine Körperlänge nach 7ständiger Ruhe 5 Schuh 8 Zoll, vor dem Schlafengehen dagegen nur 5 Schuh 7 Zoll 3 Linien. Nach längerem Krankenlager ist die (bald wieder schwindende) Zunahme der Körperlänge oft sehr ausfallend.

Drückt man auf eine präparirte und vertical aufgestellte Wirbelsäule von oben her, so nehmen ihre Krümmungen zu, und kehren bei nachlassendem. Drucke in das frühere Verhältniss zurück. Während des Druckes apringen die

Zwischenwirbelscheiben wie Wülste vor, und flachen sich bei nachfolgender Ausdehnung wieder ab. Werden die Zwischenwirbelscheiben beim Beugen der Säule comprimirt, so müssen die Ligemente fleve gespannt werden, und umgekehrt. Dasselbe gilt für die vorderen und hinteren Peripherien der fibrüsen Ringe der Zwischenwirbelscheiben.

Die Beweglichkeit der Wirbelszule an einzelnen Stellen wurde durch E. H. Weber dadurch bestimmt und gemessen, dass er, an einer mit den Bindern praparirten Wirhelstule, drei Zoll lange Nadeln in die Dorn- und Querfortsätze einschlag, welche als verlängerte Fortsätze oder Zeiger, die an und für sich wenig merklichen Bewegungen der Wirbel in vergrössertem Massstabe angaben. Unter underen fichrten diese schönen Untersuchungen zur Kenntniss, dass, beim starken leberbeugen der Wirbelsäule nach ruckwärts, sie nicht gleichstruig im Bogen gekrummt wird, sondern dass es drei Stellen an ihr giebt, wo die Beugung viel schärfer ist, als an den Zwischenpunkten, und fist wie eine Knickung der Wirbelsäule aussieht. Diese Stellen liegen 1. zwischen den unteren Halswirbeln. 2. zwischen dem 11. Brustund 2. Lendenwirbel, 3. zwischen dem 4. Lendenwirbel und dem Kreuxbein. An Gymnasten, die sich mit dem Kopfe rückwärts bis zur Erde beugen, kann man sich von der Lage der einspringenden Winkel, die durch das Knicken der Wirbelsäule entstehen, leicht überseugen. Da die Bänder an diesen drei Stellen minder fest sein mitsen, so erklärt es sich, warum die mit Zerreissung der Bänder auftretenden Wirbelverrenkungen gerade an diesen Stellen vorkommen. Wie gross die Festigheit des ganzen Bandapparates der Wirhelstule ist, kann man aus Maisonabe's Versuchen entnehmen, nach welchen em liewicht von 100 Pf. daru gehirt, um eine Halswirbelsäule, von 150 Pf. um eine Brustwirbeliaule, und von 230 Pf. (nach Bouvier 300 Pf.), un eine Lendenwirbelsäule zu serreissen.

Die Verbindungen der Wirhelkörper durch die Faserknorpelscheiben, sind modificirte Symphysen, die der Gelenkfortsätze durch straffe Kapseln: Amphierthrosen.

b) Nebenknochen des Stammes.

§ 120. Brustbein.

Die Nebenknochen des Stammes bilden die Brust, und werden in das Brustbein und die Rippen eingetheik.

Das Brustbein oder Brustblatt (Normum. Os s. Scutum pectoris. Os xiphoides: bei Hippocrates oriiNo; daher der Name Stethenhop für ein in der neueren Medicin gebrünchliches Instrument, zum Untersuchen der Brustorganet hegt der Wirbelstule gegenüber, an der vorderen Fliche des Stammes. Es ist ein langer, breiter und sponziöser Enochen, der, wenn er schän gebildet ist, einige Arbalichkeit mit einem kurzen römischen Schlachtschwerte hat, und deshalb von den Alten in den Griff, die Klinge, und die Spitze oder den Schwertfortsatz abgetheilt wurde. Der Griff Menubrium) oder die Handhabe, ist der oberste und breiteste Theil des Enochens, liegt der Wirbelstule niber, als das untere Ende, hat eine vordere, leicht convexo, eine hinture, wenig concave Fläche, und 6 länder. Der ob ore ist der hörsote, und halbenodibruig ausgeschnitten

(Incisura semilunaris s. jugularis); der untere ist gerade. und dem auf Vereinigung mit dem oberen Rande der Klinge; — die an die Incisura semilunaris stossenden oberen Seitenränder sind sattelformig auggehöhlte, überknorpelte Gelenkslächen, für die inneren Enden der Schlüsselbeine (Incisurae claviculares); — die an den unteren Rand stossenden. etwas convergirenden unteren Seitenränder setzen sich in jene der Klinge (Mittelstück, Corpus sterni) fort, welche dreimal länger, aber zusehends schmäler ist als der Griff, und an ihrem unteren Rande die Spitze (Processus xiphoideus s. mucronatus s. ensiformis) trägt, welche scharf zuläust, oder abgerundet, oder gabelsormig gespalten erscheint, häusig ein oder zwei Löcher besitzt, und länger als der Griff und die Klinge knorpelig bleibt, weshalb sie auch allgemein Schwertknorpel genannt wird.

Die Seitenränder des Brustbeins, vom Manubrium bis zum Schwert-knorpel, stehen mit den inneren Enden von 7 Rippenknorpeln in Verbindung. Der erste Rippenknorpel geht, ohne Unterbrechung oder Zwischenraum, unmittelbar in die knorpelige Grundlage des Manubriums über. Der 2. Rippenknorpel legt sich in ein Grübchen zwischen Handgriff und Klinge, der 3., 4., 5. und 6. legen sich in ähnliche, aber immer flacher werdende Grübchen im Verlaufe des Seitenrandes, und der 7. Rippenknorpel in eine sehr seichte Vertiefung zwischen Klinge und Schwertfortsatz.

Der ganze Knochen ist von oben nach unten etwas convex, sehr leicht, hat nur eine äusserst feine Schichte compacter Rinde, und besitzt, da er blos durch die elastischen Rippenknorpel gehalten und gestützt wird, einen sehr hohen Grad von Schwungkraft. Die einzelnen Stücke desselben hängen lange durch Synchondrose zusammen, und werden deshalb auch seit Bausner (1656) als drei besondere Brustbeine beschrieben.

Bei den Säugethieren besteht das Brustbein meistens aus so vielen Stücken, als sich wahre Rippen finden.

Das weibliche Brustbein charakterisirt sich durch die grössere Breite seiner Handhabe, und durch seine schmälere, aber längere Klinge. — Die Synchondrose zwischen Handhabe und Klinge verwächst häufig schon im frühen Mannesalter; im Kindesalter ist sie so beweglich, dass man bei Athmungsstörungen (Enghrüstigkeit, Keuchhusten etc.) Griff und Klinge sich auf einander beugen und strecken sieht. - Am unteren Ende der Klinge, welches gewöhnlich der breiteste Theil derselben ist, existirt abnormer Weise ein Loch von 1-5 Linien Durchmesser, welches im frischen Zustande durch Knochenknorpel und Beinhaut verschlossen wird, und Anlass zu tödtlichen Verletzungen durch spitzige Instrumente gehen kann. — Zuweilen besteht die Klinge selbst aus zwei oder drei, durch Knorpel vereinigten Stücken. Kurze Brustbeine sind gewöhnlich breiter, als lange. Das Brustbein des Donischen Kosaken in der Blumenbach'schen Sammlung ist handbreit. -Die Schwungkrast des Knochens ist so bedeutend, dass er durch Stoss von vorn her nicht leicht zerbricht, und sehr grosse Lasten ohne eingedrückt zu Portal zergliederte zwei durch das Rad hingerichtete Verwerden trägt. brecher, an denen keine Brüche des Brustbeins vorkamen. - In sehr seltenen Fällen, deren ich einen im Wiener Krankenhause sah, kommt es gar nicht zur Entwickelung des Brustbeins, und dieser Schlussstein des Brust-Lehrbuch der Anatomie. 5. Aufl.

kastens fehlt, wodurch eine Spalte entsteht, durch welche das Herz aus dem Brustkasten treten, und vor demselben eine bleibende Lage einnehmen kann (*Ectopia cordis*). — Unsymmetrie des Knochens ist nicht selten, und kommt mit und ohne Rückgratsverkrümmung vor. Es wurden schon rechtwinkelig nach innen gekrümmte, und gerade, 3½ Zoll lange *Processus xiphoidei* beobachtet (Richter, Velpeau). Desault sah ihn bis an den Nabel hinabreichen. —

Breschet (Recherches sur différentes pièces du squelette des animaux vertébrés encore peu-connues. Paris, 1838. 4.) beschrieb zwei mehr oder weniger verknöcherte Anhängsel der Brustbeinhandhabe, welche nach innen von der Incisura clavicularis liegen, und im Menschen häufig vorkommen sollen. Er nannte sie Ossa suprasternalia, und hält sie für paarige Rippenrudimente. Nach Luschka (der sie in Kölliker's Zeitschrift, Bd. IV, 1. Hft. nach zwei von ihm beobachteten Fällen beschreibt) sind sie paarig, symmetrisch, an Form dem Erbsenbeine der Handwurzel ähnlich, und mit dem Brustbein durch Synchondrose zusammenhängend. Sie haben eine starke Bandverbindung mit dem in §. 126 erwähnten Zwischenknorpel des Sterno-Claviculargelenks.

§. 121. Rippen.

Rippen (Costae) sind die zwischen Wirbelsäule und Brustbein liegenden, bogenförmigen, sehr elastischen, von aussen nach innen etwas flach gedrückten Knochen. Da die Rippen, mit Ausnahme der ersten und der zwei letzten, auf einer horizontalen Unterlage nicht in ihrer ganzen Länge ausliegen, so sind sie keine reinen Kreissegmente, sondern Abschnitte von Die Vielheit derselben, die beim ersten Anblicke eines Skelets vorzüglich in die Augen fällt, veranlasste ohne Zweisel den Ursprung des Wortes Gerippe. Jede Rippe, deren man 12 Paare zählt, besteht aus einer knöchernen Spange, und einem knorpeligen Verlängerungsstücke (dem Rippenknorpel). Erreicht der Knorpel einer Rippe den Seitenrand des Brustbeins, so heisst die Rippe eine wahre (Costa vera, ge-Die oberen 7 Paare sind wahre Rippen. Erreicht der Knorpel das Brustbein nicht, wie an den 5 unteren Rippenpaaren, so legt er sich entweder an den darüber liegenden Knorpel an, wie bei der 8., 9. und 10. Rippe, oder er bleibt frei — 11. und 12. Rippe. In beiden Fällen heissen die Rippen falsche (Costae spuriae s. mendosae). Die 11. und 12. werden insbesondere, ihrer grossen Beweglichkeit wegen, auch schwankende Rippen (Costae fluctuantes) genannt. Jede Rippe hat eine äussere convexe, und innere concave Fläche, einen oberen abgerundeten, einen unteren der Länge nach gefurchten Rand (Sulcus costalis), am hinteren Ende ein überknorpeltes Köpschen (Capitulum), und am vorderen Ende eine kleine Vertiefung, in welche der Rippenknorpel fest eingelassen ist. Die erste Rippe hat ein rundliches Köpschen. Nur wenn die Gelenksläche zur Aufnahme desselben zugleich vom siebenten Halswirbel gebildet wird, besitzt dieses Köpschen zwei, durch eine Crista vereinigte, schiese Gelenkflächen, welche am Köpschen der zweiten bis zehnten immer vorkommen.

Die zehn oberen Rippen besitzen zunächst am Köpschen einen rundlichen Hals. Wo dieser in das breitere Mittelstück der Rippe übergeht, steht nach hinten der Rippenhöcker (Tuberculum costae) heraus, welcher sich mittelst einer überknorpelten Fläche an die ihm zugekehrte Gelenkfläche des betressenden Wirbelquerfortsatzes anstemmt. Das Tuberculum bildet zugleich die Spitze des sogenannten Angulus s. Cubitus costae, der durch die verschiedene Richtung des Halses und Mittelstückes einer Rippe gebildet wird.

Die einzelnen Rippen unterscheiden sich in folgenden Punkten von einander:

- 1. Durch ihre Länge. Die Länge der Rippen nimmt von der 1. bis zur 7. oder 8. zu; von dieser gegen die 12. ab. Die Abnahme geschieht rascher als die Zunahme, und es muss somit die 12. kürzer sein als die 1.
- 2. Durch ihre Krümmung. Diese nimmt von der 1. bis zur 12. ab, oder mit anderen Worten, die Kreise, deren Bogensegment eine Rippe ist, werden von oben nach unten grösser.
- 3. Durch ihre Richtung. Die Rippen liegen nicht horizontal, sondern schief, mit ihren hinteren Enden höher, als mit den vorderen. Diese Schiefheit ist bei der ersten Rippe am bedeutendsten, und nimmt von oben nach unten ab. Nebstdem kehren die oberen Rippen ihre Ränder nicht direct nach oben und unten, sondern zugleich nach innen und aussen, wodurch ihre Flächen nicht mehr rein äussere und innere, sondern zugleich obere und untere werden.
- 4. Durch das Verhältniss des Halses zum Mittelstück. Absolut genommen, nimmt die Länge des Rippenhalses von der 1. bis 7. Rippe zu, relativ zur Länge des Mittelstücks aber ab. An den beiden letzten Rippen fehlt er.
- 5. Durch ihre Beweglichkeit, welche von der 1. bis 12. gradatim zunimmt.

Die Rippenknorpel, Cartilagines costarum, folgen hinsichtlich ihrer Länge den Rippen, welchen sie angehören. Ihre von oben nach unten abnehmende Stärke, so wie die Art ihrer Endigung, bedingt die verschiedene Beweglichkeit der Rippen. Die Richtung der drei oberen Knorpel entfernt sich nicht viel von der horizontalen; die folgenden treten, abweichend von der Richtung ihrer Rippen, schräge gegen das Brustbein in die Höhe.

Die weiblichen Rippen sind nicht so stark gekrümmt, wie die männlichen, und ihr Hals geht unter schärferem Winkel in das Mittelstück über. Nach Meckel sind, selbst in kleineren weiblichen Körpern, die ersten beiden Rippen länger als bei Männern. — Zuweilen theilt sich eine Rippe oder ihr Knorpel vorn gabelförmig, oder es verschmelzen 2, ja selbst 3 Rippen theilweise zu einem flachen, breiten Knochenstück, oder es gehen 2 Rippen in Einen Knorpel über. — Die Zahl der Rippen sinkt auf 11 herab, wobei nicht die 1., sondern die 12. Rippe fehlt, und der 12. Brustwirbel ein überzähliger Lendenwirbel wird. Vergrösserung der Rippenzahl, wozu das Breiterwerden und die Spaltung der Rippe am vorderen Ende den Uebergang bil-

den, ereignet sich in der Regel durch Einschiebung eines rippentragenden Wirbels zwischen dem 12. Brust- und 1. Lendenwirbel. Jedoch bildet sich die 13. Rippe auch oberhalb der sonstigen ersten, indem die ungewöhnlich verlängerte, und selbstständig gewordene, vordere Wurzel des Querfortsatzes des 7. Halswirbels, ihre auch in der Entwicklungsgeschichte begründeten Rechte als Rippe geltend macht. (§. 118.) Der von Adams beschriebene Fall, wo das 1. Rippenpaar das Brustbein nicht erreichte, gehört wahrscheinlich hieher. Bertin will auf beiden Seiten 15 Rippen beobachtet haben. Das Pferd hat 18, der Elephant 19 Rippenpaare.

§. 122. Verbindungen der Rippen.

Die wahren Rippen verbinden sich an ihren hinteren Enden mit der Wirbelsäule, an ihren vorderen Enden durch ihre Knorpel mit dem Seitenrande des Brustbeins. Beide Verbindungen bilden Gelenke, welche als Articulationes costo-spinales und costo-sternales bezeichnet werden. Bei den falschen Rippen fehlt die Verbindung mit dem Brustbein.

- A) Die Gelenke zwischen den hinteren Rippenenden und den Wirbeln, sind für die 10 oberen Rippen doppelt: 1. zwischen Rippenkopf und seitlichen Gelenkgrübchen der Wirbelkörper (Articulationes costo-vertebrales); 2. zwischen Höcker der Rippe und Wirbelquerfortsatz (Articulationes costo-transversales). Bei den zwei letzten Rippen fehlt die zweite Gelenkverbindung.
- 1. Jede Articulatio costo-vertebralis besteht aus einer Kapsel, welche durch ein vorderes strahlensürmiges Hilfsband (Ligamentum capituli costas anterius s. radiatum) bedeckt wird. Im Inneren des Gelenkes sindet sich bei den zehn oberen Rippen, von der Crista des Köpschens zum Intervertebralknorpel gehend, das Ligamentum interarticulare s. transversum.
- 2. Da die Ouerfortsätze der Wirbel für die Anguli costarum als Strebebalken wirken, die das Ausweichen der Rippen nach hinten verhüten, die Rippe aber bei den Athembewegungen sich am stemmenden Querfortsatze etwas verschieben muss, so wurde die Errichtung der Articulationes costotransversales für die zehn oberen Rippen nothwendig. Die zwei letzten Rippen, deren Kürze, Schwäche, und deren in den Bauchmuskeln versteckte Lage, sie vor der Gefahr der Verrenkung sichert, benöthigen die Stütze der Querfortsätze nicht. Jede Articulatio costo-transversalis besteht aus einer schwachen Kapsel, und einem starken Hilfsbande, welches die hintere Seite des Gelenkes deckt (Ligamentum costo-transversale posterius). Auch die von dem nächst darüber liegenden Querfortsatze zum oberen Rande und zur hinteren Fläche des Rippenhalses herabsteigenden, vorderen und hinteren Ligamenta colli costae, sichern die Lage der Rippe, ohne ihre Erhebung beim Einathmen zu stören.
- B) Die Gelenke zwischen den vorderen Rippenenden und dem Brustbeine gehören der 2. bis inclusive 7. Rippe an, da der erste Rippenknorpel ununterbrochen in das Brustbein übergeht, und kein Ge-

lenk mit letzterem bildet. Jedes dieser Gelenke besteht aus einer Synovialkapsel mit vorderen deckenden Bändern (*Ligamenta sternocostalia radiata*). — Vom 6. und 7. Rippenknorpel geht das straffe *Ligamentum costo-xiphoideum* zum Schwertfortsatze.

§. 123. Allgemeine Betrachtung des Brustkorbes.

Der Brustkorb oder Brustkasten (Thorax) ist ein kegel- oder fassförmiges Knochengerüste, zu welchem die Rippen die Reifen darstellen, und an welchem eine vordere, hintere, und zwei Seitengegenden oder Wände angenommen werden. Die vordere ist die kürzeste, slacher als die übrigen, und wird vom Brustbein und den Knorpeln der wahren Rippen gebildet. Sie liegt schräg von oben nach unten, indem das untere Ende des Brustbeins zweimal so weit von der Wirbelsäule entsernt ist, als das obere. Die hintere Wand ist durch die in die Brusthöhle vorspringenden Wirbelkörper stark eingebogen, und geht ohne bemerkbare Grenze in die langen Seitenwände über. Die Länge der vorderen, der hinteren, und der Seitenwand, verhalten sich wie 5:11:12 Zoll. Der horizontale Durchschnitt des Brustkorbes hat eine bohnenformige, - der senkrechte, durch beide Seitenwände gelegte, eine viereckige Gestalt mit Der durch die Brustwände eingeschlossene Raum convexen Seitenlinien. (Cavum thoracis) ist oben und unten offen, und von der hinteren zur vorderen Wand durch die Zwischenrippenräume (Spatia intercostalia) zugängig. Die obere kleinere Oeffnung (Apertura thoracis superior) wird durch den ersten Brustwirbel, das erste Rippenpaar, und die Handhabe des Brustbeins gebildet. Die untere viel grössere Oeffnung wird vom letzten Brustwirbel, dem letzten Rippenpaar, den Knorpeln aller falschen Rippen, und dem Schwertfortsatz des Brustbeins zusammengesetzt. Die Ebenen beider Oeffnungen sind, wegen Kürze der vorderen Brustwand, auf einander zugeneigt, und convergiren nach vorn. Die Zwischenrippenräume können, da die Rippen nicht parallel liegen, und nicht überall gleich weit von einander abstehen, auch nicht gleichweit sein. Sie erweitern sich nach vorn zu, sind an der Uebergangsstelle der Rippe in ihren Knorpel am geräumigsten, und werden, gegen den Rand des Brustbeins zu, wieder schmäler-Eine stark vorspringende, volle und convexe Brust, ist ein nie fehlendes Zeichen eines krastvollen, gesunden Knochenbaues, während ein schmaler vorn gekielter Thorax, ein physisches Merkmal körperlicher Schwäche und angeborenen Siechthums abgiebt.

Da das hintere Ende einer Rippe höher liegt als das vordere, so kann, wenn die Hebemuskeln der Rippen wirken, die Richtung der Rippen sich der horizontalen nähern, wodurch das Brustbein so zu sagen aufgehoben, und von der Wirbelsäule entfernt wird. Die Gelenke am hinteren Rippenende, und die Elasticität der Knorpel am vorderen, erlauben auch den Rippen (am wenigsten der ersten) eine Drehung, wodurch ihr Mittelstück

gehoben, und ihr unterer Rand mehr nach aussen bewegt wird. Beide Bewegungen finden beim tiefen Einathmen statt, und erweitern den Brustkorb im geraden (vom Brustblatte zur Wirbelsäule gezogenen), und im queren (von einer Seite zur anderen gehenden) Durchmesser. Die verticale Vergrösserung der Brusthöhle wird nicht durch Knochenbewegung, sondern durch das Herabsteigen des Zwerchfelles erzielt. Hören die Muskelkräfte, welche die Rippen aufhoben und etwas drehten, zu wirken auf, so stellt sich das frühere Verhältniss theilweise schon durch die Elasticität der Knorpel wieder her.

Der grösste Umfang des Brustkorbes fällt nicht in die untere Brustapertur, sondern in die Mitte der Höhe, und beträgt im Mittel 25 Zoll. Die Breite der hinteren Brustwand erlaubt dem Menschen auf dem Rücken zu liegen, was die Thiere nicht können.

Der weibliche Brustkorb hat eine mehr gerundete Form, und erscheint deshalb mehr fassartig als der männliche, der ihn übrigens an Geräumigkeit tibertrifft. Bei Frauen, die sich stark schnüren, wird der untere Umfang des Brustkorbes auffallend verkleinert, die recht- und linkseitigen falschen Rippen sind zusammengeschoben, und die Knorpel der achten Rippen stossen vor dem nach hinten gedrängten Schwertknorpel an einander. — Die Dornfortsätze der Brustwirbel springen überhaupt bei Frauen weniger vor; der Ausschnitt zwischen den Knorpeln der 7., 8. und 9. Rippe beider Seiten bildet einen spitzigeren Winkel; die Brusthöhle, ungeachtet sie länger ist, endigt doch höher über der Schossfuge (wegen grösserer Höhe der weiblichen Lendenwirbelsäule, und wegen geringerer Einsenkung des Kreuzbeins zwischen den Haft-Wenn ein weiblicher und ein männlicher Leichnam von gleicher Grösse horizontal neben einander liegen, so ist hei letzterem die Brust merklich höher als die Schossfuge, bei ersterem niedriger oder gleich hoch. «Umständliche Erörterung dieser Verhältnisse des Brustkorbes in beiden Geschlechtern enthält Sommerring's kleine Schrift: Ueber die Wirkung der Schnürbrüste. Berlin, 1793. 8.

C. Knochen der oberen Extremitäten oder Brustglieder.

§. 124. Eintheilung der oberen Extremitäten.

Jede obere Extremität besteht aus vier beweglich unter einander verbundenen Abtheilungen, der Schulter, dem Oberarm, dem Vorderarm, und der Hand, welche letztere selbst wieder in die Handwurzel, die Mittelhand, und die Finger abgetheilt wird.

§. 125. Knochen der Schulter.

Die Schulter besteht aus zwei Knochen, dem Schlüsselbeine und dem Schulterblatte. Durch das Schlüsselbein hängt sie mit dem Stamme, und durch das Schulterblatt mit dem Oberarmknochen zusammen.

A) Das Schlüsselbein (Clavicula, Furcula, Ligula, Os juguli, grie-

chisch zaelg, wie im bekannten Bonmot König Philipp's von Macedonien) ist ein sanst S-formig gekrummter, starker, sich mit der ersten Rippe kreuzender Röhrenknochen, und bildet das einzige Vereinigungsmittel der oberen Extremität mit dem Stamme. Sein inneres Ende (Extremitas sternalis) ist etwas aufgetrieben, und stützt sich mittelst einer stumpf dreieckigen, mässig sattelförmig gebogenen Gelenkfläche auf die entsprechend gekrimmte Incisura clavicularis des Brustbeins. Es hat an der dem ersten Rippenknorpel zugekehrten Seite eine längliche Rauhigkeit. Sein äusseres Ende (Extremitas acromialis) ist von oben nach unten flachgedrückt, und zeigt eine kleine ovale Gelenkstäche, zur Verbindung mit dem Acromium An seiner unteren Fläche bemerkt man eine rauhe des Schulterblattes. Stelle, welche mit der am inneren Ende angegebenen, gleiche Bestimmung hat, und einem Bande zur Anhestung dient. Das Mittelstück ist gerundet, sehr fest, und schliesst nur eine kleine Markhöhle ein. Die Krümmung des Knochens ist von der Mitte zum inneren Ende nach vorn convex, zum ausseren Ende nach vorn concav.

Das Schlüsselbein hat, als Verbindungsknochen der oberen Extremität mit dem Stamme, eine hohe Wichtigkeit. Es hält, wie ein Strebepfeiler, das Schultergelenk in gehöriger Entfernung von der Seite des Thorax, und bedingt mitunter die Freiheit der Bewegungen des Armes. Bricht es, so sinkt die Schulter herab, der Oberarmkopf reibt sich bei Bewegungsversuchen an der Thoraxwand, und die Bewegungen der oberen Extremität werden dadurch in bedeutendem Grade beeinträchtigt. - Je krastvoller und freier die Bewegungen der vorderen Extremität bei den Thieren werden, desto grösser und entwickelter ist das Schlüsselbein, z. B. bei kletternden, grabenden, fliegenden Säugethieren. Bei den Katzen nimmt es nur die Hälfte des Abstandes zwischen Brustbein und Schulterblatt ein, und sehlt bei den Ein- und Zweihusern u. m. a. vollkommen. - Beim weiblichen Geschlechte ist es besonders an seiner ausseren Hälste nicht so scharf gebogen, wie im männlichen. Portal behauptet, das rechte Schlüsselbein sei in beiden Geschlechtern stärker gekrummt, als das linke. - Die oberflächliche Lage des Knochens macht ihn der chirurgischen Untersuchung leicht zugänglich, und Erkennung und Einrichtung seiner Brüche unterliegen keinen erheblichen Schwierigkeiten. Mangel der ausseren Hälfte des Knochens (welche durch einen Fortsatz des Schulterblattes ersetzt wurde) beschrieb Martin.

B) Das Schulterblatt — Scapula (Synon.: Omoplata, Scoptula, Pterygium, Chelonium) — ist ein breiter, flacher, bei seiner Grösse zugleich leichter, in der Mitte sogar durchscheinender Knochen, der wie ein knöchernes Schild die hintere Thoraxwand, von der zweiten bis siebenten oder achten Rippe, theilweise bedeckt. Es hat eine dreieckige Gestalt, und wird in eine vordere und hintere Fläche, drei Ränder und eben so viele Winkel, und in zwei Fortsätze eingetheilt. — Die vordere Fläche ist leicht ausgehöhlt, und mit 3—5 rauhen Linien gezeichnet, welche die Ursprungsstellen der einzelnen Bündel des Musculus subscapularis sind, und nicht durch den Abdruck der Rippen entstehen, wie man früher glaubte, und der alte Name Costae scapulares noch ausdrückt. Die hintere Fläche

wird durch ein stark vorragendes Knochenriff, die Schultergräte (Sping scapulae, besser Schultergrat, da man auch Rückgrat sagt, von Grat - Kante) in die kleine Obergrätengrube (Fossa supraspinata), und in die grössere Untergrätengrube (Fossa infraspinata) abgetheilt. Der der Wirbelsäule zugekehrte innere Rand ist der längste; der äussere ist kurzer und verdickt, und zeigt bei sehr starken Schulterblättern zwei deutliche Säume oder Lefzen - Labia. Der obere Rand ist der kürzeste, concav und scharf. An seinem äusseren Ende findet sich ein tiefer Einschnitt -Incisura scapulae. Der untere Winkel ist abgerundet, der obere innere spitzig ausgezogen, der obere aussere aufgetrieben, massiv, mit einer ovalen flachen Gelenkgrube für den Kopf des Oberarmknochens versehen - Cavitas glenoidalis. Die Furche, durch welche diese Gelenkgrube von dem übrigen Knochen wie abgeschnürt erscheint, heisst der Hals -Collum scapulae. Einige Autoren beschreiben den äusseren Winkel, seiner Dicke und seines Umfanges wegen, auch als Körper - Corpus scapulae. Die an der hinteren Fläche der Scapula aussitzende Schultergräte, verlängert sich nach aussen und oben in einen breiten, von oben nach unten flachgedrückten Fortsatz, welcher über die Gelenksläche des Schulterblattes wie ein Schirmdach hinausragt, und Grätenecke - Summus humerus s. Acromion (τὸ ἄχρον τοῦ ώμου, Höhe der Schulter) — genannt wird. An ihrem äussersten Ende befindet sich, nach innen zu, eine kleine Gelenkfläche, zur Verbindung mit der Extremitas acromialis des Schlüsselbeins. Nebst dem Akromion wird die Gelenkstäche noch durch einen anderen Fortsatz - den Rabenschnabelfortsatz, Processus coracoideus s. uncinatus - überwölbt, welcher zwischen Incisura semilungris und Caritas glenoideg breit entspringt, sich nach vorn und aussen fast im rechten Winkel über die Gelenksläche wegbiegt, und aus so compacter Knochenmasse besteht, dass er unbedingt der stärkste Theil des Schulterblattes zu nennen Er wird von der Extremitas acromialis des Schlüsselbeins, welche quer über ihn läuft, gekreuzt.

Das Schulterblatt, welches nur durch eine sehr kleine Gelenksläche mit dem Schlüsselbeine, und durch dieses mit dem Stamme zusammenhängt, hat eine bei jeder Stellung des Armes veränderliche Lage. Hängen die Hände an den Seiten des Stammes ruhig herab, so stehen die inneren Ränder der beiden Schulterblätter senkrecht, und sind der Wirbelsäule parallel. Hebt man den Arm langsam bis in die verticale Richtung nach aufwärts, so folgt der untere Winkel des Schulterblattes diesen Bewegungen, und entsernt sich, einen Kreisbogen beschreibend, von der Wirbelsäule. — Der Knochen ist allenthalben von Muskeln bedeckt, die nur die Spina scapulae bei mageren Personen durch die Haut - ja durch den Rock - erkennen lassen. - Das blossgestellte Akromion ist den Brüchen ausgesetzt, besonders wenn es, wie ich an zwei Fällen vor mir sehe, mit der Spina scapulae nur durch Zwischentritt eines Knorpels zusammenhängt. R. Wagner hat das Akromion sogar durch ein wahres Gelenk mit der Schultergräte articuliren gesehen. - In der Mitte der Untergrätengrube kommt als merkwürdige Thierbildung zuweilen eine grosse Oeffnung vor, so wie auch die Incisura semilunaris durch eine knocherne Querspange in ein Loch sich umwandelt. — Beim sogenannten phthisischen Habitus liegt, wegen Schmalheit des Thorax, das Schulterblatt nicht mit der ganzen Breite seiner vorderen Fläche auf der hinteren Thoraxwand auf, sondern entfernt sich von ihr mit seinem inneren Rande, welcher sich nach hinten wendet, und die Haut des Rückens aufhebt — Scapulae alatae.

§. 126. Verbindungen der Schulterknochen.

- 1. Brustbein-Schlüsselbeingelenk, Articulatio sterno-clavicularis. Eine sibröse, an ihrer vorderen Wand sehr starke Kapsel, vereinigt die sür einander bestimmten, sattelsörmig gekrümmten Gelenksächen des Brust- und Schlüsselbeins. Die Höhle des Gelenks wird durch einen scheibensörmigen Zwischenknorpel, der mit der Kapsel verwachsen ist, in zwei Räume getheilt. Weitere Besestigungsbänder des Gelenks sind: das rundliche Ligamentum interclaviculare, welches in der Incisura jugularis sterni quer von einem Schlüsselbeine zum anderen geht, und das länglich viereckige Ligamentum costo-claviculare, vom ersten Rippenknorpel zur unteren Rauhigkeit der Extremitas sternalis claviculae. Trotz dieser accessorischen Bänder ist die Beweglichkeit des Gelenks nach jeder Richtung, wenn auch nur in beschränktem Masse, gestattet.
- 2. Schlüsselbein-Schulterblattgelenk, Articulatio acromioclavicularis. Nebst der fibrösen und Synovialkapsel findet sich noch ein
 festes, von oben über das Gelenk streifendes Verstärkungsband Ligamentum acromio-claviculare. Während das Schlüsselbein über den Processus coracoideus wegläust, wird es mit ihm durch das ungewöhnlich starke
 Ligamentum coraco-claviculare verbunden. Einen Zwischenknorpel in der
 Articulatio acromio-clavicularis, der von Vesal zuerst angesührt, und in
 den meisten anatomischen Handbüchern erwähnt wird, habe ich nie gesehen.
- 3. Besondere Bänder des Schulterblattes. Vom Processus coracoideus zum Akromion läust das starke und breite Ligamentum coracoacromiale. Es bildet eine Art sehnigen Gewölbes über der Gelenkstäche des Schulterblattes, welches die Verrenkungen des Oberarms nach oben nicht zulässt. Ueber die Incisura semilunaris legt sich das kurze Ligamentum transversum.

§. 127. Oberarmbein.

Das Oberarmbein, Os brachii s. humeri, bildet allein die knöcherne Grundlage des Oberarms. Sein oberes, dickes, ein überknorpeltes Kugelsegment vorstellendes Ende — der Kopf, Caput humeri — ist etwas nach hinten und innen gerichtet, und wird von einer Kreisfurche umgeben, welche den eingeschnürten Hals des Kopfes vorstellt, und Collum humeri anatomicum genannt wird, um ihn vom Collum chirurgicum zu unterscheiden, welches sich weiter abwärts, bis zur Insertionsstelle des Musculus teres major, erstreckt. (Die Chirurgen psiegen nämlich einen über der Insertions

Zwischenwirbelscheiben wie Wülste vor, und flachen sich bei nachfolgender Ausdehnung wieder ab. Werden die Zwischenwirbelscheiben beim Beugen der Säule comprimirt, so müssen die Ligamenta flava gespannt werden, und umgekehrt. Dasselbe gilt für die vorderen und hinteren Peripherien der fibrüsen Ringe der Zwischenwirbelscheiben.

Die Beweglichkeit der Wirbelsäule an einzelnen Stellen wurde durch E. H. Weber dadurch bestimmt und gemessen, dass er, an einer mit den Bändern präparirten Wirbelsäule, drei Zoll lange Nadeln in die Dorn- und Ouerfortsätze einschlug, welche als verlängerte Fortsätze oder Zeiger, die an und für sich wenig merklichen Bewegungen der Wirbel in vergrössertem Massstabe angaben. Unter anderen führten diese schönen Untersuchungen zur Kenntniss, dass, beim starken Ueberbeugen der Wirbelsäule nach rückwärts, sie nicht gleichformig im Bogen gekrummt wird, sondern dass es drei Stellen an ihr giebt, wo die Beugung viel schärfer ist, als an den Zwischenpunkten, und fast wie eine Knickung der Wirbelsäule aussieht. Diese Stellen liegen 1. zwischen den unteren Halswirbeln, 2. zwischen dem 11. Brustund 2. Lendenwirbel, 3. zwischen dem 4. Lendenwirbel und dem Kreuzbein. An Gymnasten, die sich mit dem Kopfe rückwärts bis zur Erde beugen, kann man sich von der Lage der einspringenden Winkel, die durch das Knicken der Wirbelsäule entstehen, leicht überzeugen. Da die Bänder an diesen drei Stellen minder sest sein müssen, so erklärt es sich, warum die mit Zerreissung der Bänder auftretenden Wirbelverrenkungen gerade an diesen Stellen vorkommen. Wie gross die Festigkeit des ganzen Bandapparates der Wirbelsaule ist, kann man aus Maisonabe's Versuchen entnehmen, nach welchen ein Gewicht von 100 Pf. dazu gehört, um eine Halswirbelsäule, von 150 Pf., um eine Brustwirbelsäule, und von 250 Pf. (nach Bouvier 300 Pf.), um eine Lendenwirbelsäule zu zerreissen.

Die Verbindungen der Wirbelkörper durch die Faserknorpelscheiben, sind modificirte Symphysen, die der Gelenkfortsätze durch straffe Kapseln: Amphiarthrosen.

b) Nebenknochen des Stammes.

§. 120. Brustbein.

Die Nebenknochen des Stammes bilden die Brust, und werden in das Brustbein und die Rippen eingetheilt.

Das Brustbein oder Brustblatt (Sternum, Os s. Scutum pectoris, Os xiphoides; bei Hippocrates oxỹos, daher der Name Stethoskop für ein in der neueren Medicin gebräuchliches Instrument, zum Untersuchen der Brustorgane) liegt der Wirbelsäule gegenüber, an der vorderen Fläche des Stammes. Es ist ein langer, breiter und spongiöser Knochen, der, wenn er schön gebildet ist, einige Aehnlichkeit mit einem kurzen römischen Schlachtschwerte hat, und deshalb von den Alten in den Griff, die Klinge, und die Spitze oder den Schwertsortsatz abgetheilt wurde. Der Griff (Manubrium) oder die Handhabe, ist der oberste und breiteste Theil des Knochens, liegt der Wirbelsäule näher, als das untere Ende, hat eine vordere, leicht convexe, eine hintere, wenig concave Fläche, und 6 Ränder. Der ob ere ist der kürzeste, und halbmondsörmig ausgeschnitten

(Incisura semilunaris s. jugularis): der untere ist gerade, und dient zur Vereinigung mit dem oberen Rande der Klinge; — die an die Incisura semilunaris stossenden oberen Seitenränder sind sattelförmig ausgehöhlte, überknorpelte Gelenksächen. für die inneren Enden der Schlüsselbeine (Incisurae claviculares); — die an den unteren Rand stossenden, etwas convergirenden unteren Seitenränder setzen sich in jene der Klinge (Mittelstäck, Corpus sterni) fort, welche dreimal länger, aber zusehends schmäler ist als der Griff. und an ihrem unteren Rande die Spitze (Processus ziphoideus s. mucronatus s. ensiformis) trägt, welche scharf zuläust, oder abgerundet, oder gabelsförmig gespalten erscheint, häusig ein oder zwei Löcher besitzt, und länger als der Griff und die Klinge knorpelig bleibt, weshalb sie auch allgemein Schwertknorpel genannt wird.

Die Seitenränder des Brustbeins, vom Manubrium bis zum Schwertknorpel, stehen mit den inneren Enden von 7 Rippenknorpeln in Verbindung. Der erste Rippenknorpel geht, ohne Unterbrechung oder Zwischenraum, unmittelbar in die knorpelige Grundlage des Manubriums über. Der
2. Rippenknorpel legt sich in ein Grübchen zwischen Handgriff und Klinge,
der 3., 4., 5. und 6. legen sich in ähnliche, aber immer flacher werdende
Grübchen im Verlaufe des Seitenrandes, und der 7. Rippenknorpel in eine
sehr seichte Vertiefung zwischen Klinge und Schwertfortsatz.

Der ganze Knochen ist von oben nach unten etwas convex, sehr leicht, hat nur eine äusserst seine Schichte compacter Rinde, und besitzt, da er blos durch die elastischen Rippenknorpel gehalten und gestützt wird, einen sehr hohen Grad von Schwungkrast. Die einzelnen Stücke desselben hängen lange durch Synchondrose zusammen, und werden deshalb auch seit Bausner (1656) als drei besondere Brustbeine beschrieben.

Bei den Säugethieren besteht das Brustbein meistens aus so vielen Stücken, als sich wahre Rippen finden.

Das weibliche Brusthein charakteriert sich durch die gestebere Breite seiner Handhabe, und durch seine schmalere, aber langere Klinge. Synchondrose zwischen Handhabe und klange Germachet haufig sehom um frühen Mannesalter: im Kindesalter ist sie en heweglich, dass man her Athmungsstörungen (Englissistigkeit, Keuthlissten etc., Griff und klinge sich auf einander beugen und streißen sieht. - Am interen Lude der klarge, welches gewöhnlich der bredeste Theil derselben ob, existist abnutmer Weise ein Loch von 1-5 Lines Durchmeiser, welcher im frieden Zustande durch Knochenknorpel und Bernant verwittensen wurd, und Anleis zu teiltlichen Verletzungen durch spitzige fastromente geben bann. Zymeilen bedeht die Klinge selbet bie zwe ider der Grein Bergeb gereinigten bijdeben. Kurze Brustbeine and gewaltikelt me ber all harge. Das Revelbeits der fin nischen Kosaken in der Bildmennbern wieden vermitung int beneffinen. Die Schwungkraft des Kummiene al ein vergentiere dem ein durch himte eine vors her night leads sommers, and here groups Leaven obes engelightly on werden tragt. Postal proposers one come de Red e eyer chule bis brecher, in denen fin in Beiebe fen Beinigen er vorrausen. tenen Fillen, deren an einer in Wiener Legenbel eine ech kommt er gar nicht zur Entwickelung der Brustanan, und dann Seinverstam der Reust Lehrbach for Alb train . Auf

§. 129. Knochen des Vorderarms.

Der Vorderarm (Antibrackium) wird durch zwei neben einander liegende Röhrenknochen, Ellbogenröhre und Armspindel, gebildet.

A. Die Ellbogenröhre (Ulna, Cubitus, Focile majus) ist der grössere der beiden Vorderarmknochen. Sie ist am oberen Ende viel stärker als am unteren, und daselbst durch einen tiefen halbmondförmigen Ausschnitt (Cavitas sigmoidea s. lunata major) ausgehöhlt, der, seiner ganzen Bildung nach, genau die Rolle des Oberarmbeins umfasst. Das obere, dicke, und hinten rauhe Ende dieses Ausschnittes ist der Hakenfortsatz, Olecranon (τὸ κράτον τῆς ωλένης, caput ulnae), oder Processus anconaeus (von ἀγκών, Haken, womit das altdeutsche Enke verwandt ist, welches sich noch in dem Worte verrenken, besser verenken erhielt). Das untere, weniger vorspringende, und zugeschärste Ende stellt den Kronenfortsatz (Processus coronoideus) dar. Auswarts vom Kronenfortsatze liegt eine kleine halbmondformige Vertiefung (Cavitas sigmoidea s. lunata minor) für den glatten Umfang des Köpschens der Armspindel. Unter dem Kronenfortsatze steht die Tuberositas ulnae. für die Insertion des Musculus brachialis internus. Das Mittelstück ist besonders an seiner unteren Hälfte etwas nach hinten gebogen und dreiseitig. Die schärfste Kante (Criste ulnae) sieht nach vorn, der Armspindel entgegen. Die aussere und innere Fläche gehen durch gerundete Winkel in die hintere Fläche über. An der inneren Fläche liegen, ober der Mitte des Knochens, 1-2 schräg nach aufwärts führende Ernährungslöcher. Das untere Ende, seiner Gestalt wegen das Köpfchen (Capitulum) genannt, hat eine in der Mitte etwas eingedrückte Gelenksläche, welche sich auch auf jenen Theil des Randes fortsetzt, welcher mit der Armspindel in Berührung steht. Am hinteren Umfang des Köpfchens ragt ein drei Linien langer, stumpfspitziger Fortsatz (Processus styloideus ulnae) herab. Zwischen ihm und dem äusseren Umfange des Köpfchens, verläuft die Rinne für den Musculus ulnaris externus.

B. Die Armspindel, Speiche, Radius (Synon.: Focile minus, Additamentum ulnae, Manubrium manus), verhält sich in ihren Eigenschasten der Ulna entgegengesetzt. Sie ist an ihrem oberen Ende mit einem, auf einem engeren Halse aussitzenden Köpschen versehen, welches eine slach vertieste, auch den Rand des Köpschens überziehende Gelenksläche besitzt, die sich in der Cavitas sigmoidea minor ulnae drehen kann. Unter dem Halse liegt ein rauher Höcker (Tuberositas radii) zur Anhestung des Musculus biceps brachii. Das Mittelstück ist nach vorn gebogen und dreiseitig. Die schärste Kante (Crista radii) sieht der Crista ulnae zu, und hildet mit ihr den in der Mitte breitesten, oben und unten zugespitzten Zwischenknochenraum (Spatium interosseum). Die innere und äussere Fläche gehen durch abgerundete Winkel in die vordere über. An der Crista, oder am oberen Theile der inneren Fläche, liegt ein ein-

faches, schräg nach oben sührendes Ernährungsloch. Das untere Ende ist viel dicker und breiter als das obere. Seine grösste Fläche sieht nach abwärts gegen die Handwurzel, ist concav, überknorpelt, und durch eine von aussen nach innen lausende Kantenspur in zwei Facetten getheilt. Wo dieses untere Ende mit dem Köpschen der Ulna in Berührung tritt, ist es leicht halbmondsörmig ausgeschnitten (Incisura semilunaris radii), und die Knorpelkruste der unteren Gelenkstäche setzt sich in diesen Ausschnitt fort. Dem Ausschnitt gegenüber verlängert sich das untere Ende in einen stumpsen Höcker (Processus styloideus radii). Die äussere rauhe Seite des unteren Endes hat zwei, seltener drei, deutliche senkrechte Muskelsurchen.

Da das Skelet des Vorderarms aus zwei Knochen besteht, so muss jeder derselben der Oberstäche näher liegen, als der einfache Axenknochen des Oberarms. Die Ulna kann ihrer Länge nach, der Radius nur an seiner unteren Hässte, durch die Haut gesühlt werden. Die beiden Knochen verhalten sich hinsichtlich ihrer anatomischen Eigenschasten verkehrt zu einander. Die Ulna ist oben, der Radius unten dick, — die Ulna hat ihr Capitulum unten, der Radius oben, — das Capitulum ulnae dreht sich in dem Halbmondausschnitt am unteren Ende des Radius, das Capitulum radii in der Cavitas sigmoidea minor am oberen Ende der Ulna, — die Ulna ragt um die Höhe des Olekranons weiter nach oben, der Radius mit seinem unteren Ende weiter nach abwärts, — die Ulna kehrt, bei ruhig herabhängendem Arme, ihre Crista nach vorn, der Radius nach rückwärts, — endlich vermittelt die Ulna, durch das Umgreisen der Rolle, die seste Verbindung des Vorderarms mit dem Oberarme, während das untere Ende des Radius mit den zwei grüssten Knochen der ersten Handwurzelreihe eine Verbindung eingeht.

§. 130. Ellbogengelenk.

Das Ellbogengelenk, Articulatio cubiti, ist ein gemischtes Gelenk, da Winkelbewegung und Rotation in ihm ausführbar ist, — ein Trochoginglymus.

Es besteht, streng genommen, aus drei Gelenken, die durch eine gemeinschaftliche Kapsel zu Einem Gelenke vereinigt werden.

Die Rolle des Oberarms bildet mit der Cavitas sigmoidea major die Articulatio brachio-ulnaris, — die Eminentia capitata des Oberarms mit dem Capitulum radii die Articulatio brachio-radialis, — und der überknorpelte Rand des Capituli radii mit der Cavitas sigmoidea minor ulnae die Articulatio radio-ulnaris. Bei der Beugung und Streckung des Vorderarms geschieht die Bewegung in den beiden ersten Gelenken, das dritte bleibt vollkommen ruhig. Bei der Drehung des Radius, durch welche die Hand nach innen oder nach aussen gewendet wird (Pronatio et Supinatio) bewegt sich das erste Gelenk nicht, die Axendrehung des Köpschens der Armspindel wird nur im zweiten und dritten Gelenke eine Bewegung veranlassen. — Wäre der Radius ein vollkommen geradliniger Knochen, so würde die Axendrehung seines Köpschens zugleich den ganzen Radius, wie

eine Walze, um seine Längenaxe drehen, ohne dass er seinen Ort verlässt. Da er aber vom Halse angefangen sich nach vorn krümmt, so muss, wenn das Köpschen sich um seine Axc dreht, das untere Ende einen Kreisbogen beschreiben, dessen Centrum das unverrückte Köpschen der Ulna ist.

Die gemeinschaftliche fibrose Kapsel des Ellbogengelenks entspringt über der Rolle und der Eminentia capitata des Oberarmbeins, und schliesst auch die vordere und hintere Fovea trochlearis ein. Der Radius wird an die Cavitas sigmoideu minor ulnae durch das Ringband (Ligamentum annulare radii) angedrückt, welches seinen Hals und den überknorpelten Rand seines Köpschens umgreist, und an dem vorderen und hinteren Ende der Cavitas sigmoidea minor besestigt ist. Das innere Seitenband entspringt vom Condylus internus des Oberarmbeins, und endigt breit an der inneren Seite des Processus coronoideus ulnae. Das aussere Seitenband entspringt am Condylus externus des Oberarmbeins, und darf nicht am Radius endigen, da dessen Drehbewegungen dadurch zu sehr beschränkt würden, sondern verwebt sich mit dem Ringbande, ohne an den Radius zu adhäriren. Meiner Ansicht zufolge, ist das Ringband eigentlich nur das gespaltene, und in zwei Schenkel divergirende äussere Seitenband, oder, anders ausgedrückt, der Kopf des Radius ist durch einen Schlitz des äusseren Seitenbandes durchgesteckt. Aus demselben Grunde kann auch die fibröse Kapsel sich nicht an beiden Knochen des Vorderarms, sondern nur am Rande der Cavitas sigmoidea major ulnae inseriren, und setzt sich, so wie das äussere Seitenband, nicht an den Radius, sondern nur an das Ringband seines Köpfchens an. Die Synovialkapsel überzieht alle drei im Ellbogen vereinigte Gelenke.

Das den Zwischenknochenraum ausfüllende Ligamentum interosseum, und die von der Tuberositas ulnae zur Tuberositas radii schräg laufende Chorda transversalis cubiti, sorgen für ein innigeres Aneinanderhalten beider Vorderarmknochen.

Da das Olekranon sich im höchsten Grade der Ausstreckung des Vorderarms in die Fovea supratrochlearis posterior des Oberarmknochens stemmt, so kann die Streckung auf nicht mehr als 180° gebracht werden. - Das Maximum der Beugung tritt dann ein, wenn der Processus coronoideus ulnae auf den Grund der Fossa supratrochlearis anterior stösst. - Die fibröse Kapsel dient nicht dazu, die drei Knochen des Ellbogengelenks an einander zu halten. Man kann die vordere und die hintere Kapselwand quer durchschneiden, und man wird dadurch nichts an der Festigkeit des Gelenks geändert haben. Erst wenn ein oder beide Seitenbänder zerschnitten sind. weichen die Knochen aus einander. - Da das untere Ende des Radius mit den zwei grössten Knochen der ersten Handwurzelreihe durch Bänder hinlänglich fest zusammenhängt, die Ulna aber (wie gleich gezeigt wird) mit der Handwurzel in gar keine unmittelbare Berührung kommt, so wird die Hand jeder Bewegung des Radius folgen, und durch die Drehung desselben, nach innen oder aussen, sich so stellen, dass die Hohlhand nach hinten oder nach vorn sieht, d. h. die Pronations- und Supinationsbewegungen beschreiben zusammen einen Kreisbogen von 180°. Soll die Bewegung der Hand in einem noch grösseren Bogen vollsührt werden, so muss auch zugleich der Oberarm sich um seine senkrechte Axe drehen, was die Laxität der sibrösen Capsula humeri leicht gestattet. — Vom hinteren Rande der unteren Gelenkstäche des Radius geht ein dreieckiger Zwischenknorpel zum Processus styloideus ulnae, an welchen er durch ein kurzes Band (seiner Farbe wegen Ligamentum subcruentum) gehestet wird. Er hat eine obere und untere Fläche. Erstere bildet mit Hilfe der Incisura semilunaris radii eine Nische sür das Capitulum ulnae; letztere liegt in der Verlängerung der unteren Gelenkstäche des Radius, und stösst an den dritten Knochen der ersten Handwurzelreihe (dreieckiges Bein). Eine weite Kapsel (Membrana sacciformis) nimmt das Capitulum ulnae, die Incisura semilunaris radii, und die obere Fläche des Zwischenknorpels in ein gemeinschastliches Cavum aus.

§. 131. Knochen der Hand.

A. Erste Abtheilung. Knochen der Handwurzel.

Die erste, sich an den Vorderarm anschliessende Abtheilung der Hand, ist die Hand wurzel, Carpus (vielleicht von $\tilde{a}\varrho\pi\omega$, greifen), welche aus acht kleinen, in zwei Reihen, zu vieren gruppirten Knochen zusammengesetzt wird.

Ohne in eine detaillirte Beschreibung der einzelnen Handwurzelknochen einzugehen, geben wir nur folgende allgemeine, und für das Bedürfniss des Anfängers genügende Anhaltspunkte:

- 1. Die erste oder obere Reihe der Handwurzelknochen wird, wenn man von der Radial- gegen die Ulnarseite zählt, durch das Kahnbein, Mondbein, dreieckige Bein, und Erbsenbein (Os scaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme) zusammengesetzt. Die zweite oder untere Reihe enthält, in derselben Richtung gerechnet, das grosse und kleine vieleckige Bein, das Kopfbein, und das Hakenbein (Os multangulum majus, minus, capitatum, hamatum).
- 2. Von den Knochen der ersten Reihe helfen nur die drei ersten das Gelenk zwischen Vorderarm und Handwurzel bilden; das vierte (Erbsenbein) wird hiezu gar nicht verwendet, weshalb es, genau genommen, nicht die Bedeutung eines Handwurzelknochens hat, und von Albin auch nicht zur Handwurzel gezählt wurde: "ad carpum re vera non pertinet".
- 3. Obwohl alle Handwurzelknochen eine sehr unregelmässige und schwer durch Worte anschaulich zu machende Gestalt haben, so darf man sich doch erlauben, um die Verbindungen leichter zu übersehen, an jedem derselben sechs Gegenden (nicht mathematische Flächen) anzunchmen, welche, wenn man sich die Hand nicht liegend, sondern herabhängend denkt, in die obere und untere, die Dorsal- und Volargegend, die Radial- und Ulnargegend eingetheilt werden.
- 4. Die oberen Gegenden der drei ersten Handwurzelknochen bilden, da sie sämmtlich gewölbt sind, durch ihr Nebeneinandersein einen convexen Kopf, der in die Vertiefung zwischen beiden Griffelfortsätzen am

unteren Ende der Vorderarmknochen aufgenommen wird. Die erste Facette der unteren Gelenksläche des Radius steht mit dem Kahnbein, die zweite mit dem Mondbein in Contact. Der dritte Knochen - das dreieckige Bein - stösst aber nicht an das Köpschen der Ulna, weil dieses nicht so weit herab reicht, wie das untere Speichenende. Es bleibt vielmehr ein Raum zwischen beiden Knochen übrig, der gross genug ist, um einen dicken Zwischenknorpel, Cartilago interarticularis, aufzunehmen (Note zu §. 130). — Die untere Gegend derselben Knochen bildet, durch ihre Nebeneinanderlagerung, vom Radial- gegen den Ulnarrand hin, eine Wellenfläche, deren nach unten convexer Theil (Wellenberg) dem Kahnbein allein zukommt, während der concave Theil (Wellenthal) durch einen Theil des Kahnbeins, das ganze Mondbeih und dreieckige Bein zusammengesetzt wird. Die Dorsalgegend ist convex, die Volargegend concav. Die einander zugekehrten Ulnar- und Radialgegenden der einzelnen Handwurzelknochen sind mit kleinen Gelenkslächen zur wechselseitigen Verbindung versehen.

- 5. Die vier Knochen der zweiten Reihe werden unter demselben allgemeinen Gesichtspunkte aufgefasst. Die oberen Gegenden derselben bilden, da sie sich an die untere Gegend der ersten Reihe anlagern, eine umgekehrte Wellenstäche, deren gegen den Radialraud zu liegende Concavität durch das Os multangulum majus et minus, deren Convexität durch das Kopf- und Hakenbein gebildet wird. Die unteren Gegenden der vier Knochen dieser Reihe stossen mit den Mittelhandknochen zusammen, und bilden eine Reihe von Gelenkstächen, deren erste, für den Mittelhandknochen des Daumens bestimmte, dem Os multangulum majus allein angehört, sattelförmig gekrümmt ist, und von den winklig aus- und eingeschnittenen unteren Gelenkstächen der übrigen Knochen dieser Reihe, durch eine kleine nicht überknorpelte, rauhe Zwischenstelle getrennt ist. Die untere Gegend des Hakenbeins stösst an das vierte und fünste Mittelhandbein. Die übrigen Gegenden dieser Knochen verhalten sich wie an jenen der ersten Handwurzelreihe.
- 6. Beide Reihen bilden einen, gegen den Rücken der Hand convexen, gegen die Hohlhand concaven Bogen. Der erste und letzte Knochen jeder Reihe wird somit gegen die Hohlhand stark vorspringen, und dadurch die sogenannten Eminentiae carpi erzeugen, welche in zwei Eminentiae radiales und zwei ulnares zerfallen. Die Eminentia carpi radialis superior gehört einem Höcker des Kahnbeins, die inferior einem Höcker des grossen vielwinkligen an, die Eminentia carpi ulnaris superior wird durch das Erbsenbein, die inferior durch den hakenfürmigen Fortsatz des Hakenbeins erzeugt. Von den Eminentiae carpi radiales zu den ulnares geht ein starkes queres Band (Ligamentum carpi transversum), welches die concave Seite des Bogens in einen Kanal für die Sehnen der Fingerbeuger umwandelt.

Die Benennung der Handwurzelknochen ist so glücklich gewählt (durch Mich. Lyser, 1665), dass sie die Gestalt derselben besser ahnen lässt, als die aussuhrlichste Beschreibung. Um die Handwurzel als Ganzes kennen zu lernen, muss man sie an einer gefassten Hand studiren. Wünscht sich Jemand speciell in die Beschreibung der Flächen und Ränder einzelner Handwurzelknochen einzulassen, so findet er in der Weber'schen Ausgabe von Hildebrandt's Anatomie die weitläufigsten Schilderungen. Es ist sehr belehrend, sich nach einem guten Vorbilde in der Zusammenstellung der Handwurzelknochen zu üben, die rechten von den linken unterscheiden zu lernen, und einen senkrechten Schnitt durch eine frische Handwurzel zu legen, um die Contactlinien zu sehen, welche durch die Verbindung beider Handwurzelreihen unter sich, und mit den darüber und darunter liegenden Knochen zu Stande kommen. Man erhält durch die Ansicht solcher Schnitte die beste Vorstellung von der Beweglichkeit beider Handwurzelreihen, und von der Lagerung des zwischen Capitulum ulnae und Os triquetrum eingeschalteten Zwischenknorpels.

B. Zweite Abtheilung. Knochen der Mittelhand.

Die fünf Mittelhandknochen (Ossa metacarpi) liegen, den ersten abgerechnet, in einer Ebene neben einander, nehmen vom Zeigefinger gegen den kleinen Finger an Länge und Stärke ab, und bilden den breitesten, aber auch unbeweglichsten Theil der Hand. Sie werden vom Daumen gegen den kleinen Finger gezählt. Jeder Mittelhandknochen ist der Länge nach ein wenig gekrummt, und hat ein oberes, einfach schräg abgestutztes (wie beim 3., 4. und 5.), oder winklig eingeschnittenes Ende (wie beim 2.), welches Basis heisst. Die nach oben gekehrte grösste Fläche der Basis ist überknorpelt, und setzt sich in kleinere, an der Radial- und Ulnarseite der Basis befindliche Gelenkslächen fort. Das untere Ende ist sphärisch convex (Capitulum), mit einem Grübchen an der Radial- und Ulnarseite für Bandanhestung. Das Mittelstück ist dreikantig-prismatisch. Die Dorsalseite ist mässig convex, die ihr gegenüberstehende Volarkante concav gekrümmt. - Der Mittelhandknochen des Daumens (Os metacarpi policis) unterscheidet sich von den übrigen durch seine, mit einer sattelformigen Gelenkstäche versehene Basis, sein von oben nach unten slachgedrucktes, breites Mittelstück (wodurch er einer Phalanx prima eines Fingers ähnlich wird), so wie durch seine Kürze, und seine abweichende Lage, da er mit den übrigen nicht in einer unveränderlichen Ebene liegt, sondern frei beweglich ist.

C. Dritte Abtheilung. Knochen der Finger.

Die Knochen der Finger, Phalanges digitorum manus s. Internodia (φάλαγξ, eine Reihe oder Folge), sind, trotz ihrer Kürze, dennoch den langen Knochen beizuzählen, da sie, wie diese, im jüngeren Alter einen Körper und eine Epiphyse (und zwar nur eine obere) besitzen.

Der Daumen hat zwei, die vier übrigen Finger drei Phalangen oder Glieder. Da die Fingergelenke bei Celsus Nodi heissen, so werden die Phalangen auch häusig Internodia genannt. Die Nodi sind die Ursache, Lehrbuch der Anatomie. 5. Aus. 18

į

warum an mageren oder abgezehrten Händen, bei aneinander geschlossenen Fingern, spaltförmige Räume zwischen den Fingern offen bleiben. Alle Phalangen sind länglich, flachgedrückt, gebogen, mit einer dorsalen convexen, und volaren concaven Fläche, und zwei Seitenrändern versehen. Das erste Glied jedes Fingers hat an seinem oberen Ende eine einfache concave Gelenksläche, — den Abdruck der Capitula der Mittelhandknochen. Sein unteres Ende hat zwei, durch einen Einschnitt getrennte, überknorpelte Condyli, welche zusammen eine Art von Rolle bilden, und seitwärts noch zwei rauhe Grübchen, zur Befestigung der Seitenbänder. — Das zweite Glied (welches am Daumen fehlt) hat am oberen Ende zwei flache, durch eine Erhöhung geschiedene Vertiefungen, am unteren eine Rolle, wie das erste. - Das dritte Glied (welches am Daumen das zweite ist) hat oben zwei. Vertiefungen, unten läuft es in eine rauhe, schaufelformige Platte aus. Es wurde sehr unpassend mit einer Pfeilspitze verglichen. Die Länge der Glieder nimmt, so wie ihre Breite und Stärke. vom ersten zum dritten ab. Die französischen Anatomen gebrauchen für 1., 2. und 3. Fingerglied die Ausdrücke phalange, phalangine, und phalangette (Chaussier).

Galen hielt das Os metacarpi pollicis sur die erste Phalanx des Daumens, der somit, wie jeder andere Finger, drei Phalangen, aber keinen Mittelhandknochen hätte, - eine Ansicht, die nicht ganz ohne Grund ist, und deshalb in Vesal, Duverney, Bertin, Cheselden und J. Bell Anhänger fand. Durch sein Exterieur ist das Os metacarpi pollicis gewiss einem ersten Fingergliede nahe verwandt. Seine grosse Beweglichkeit unterscheidet es functionell von den Mittelhandknochen, und seine Entwicklung erfolgt nach demselben Gesetze, wie die jeder Phalanx prima. Jede Phalanx prima nämlich entsteht aus zwei Ossificationspunkten, einem oberen und unteren. Letzterer wird zu Ende des dritten Embryo-Monats in der knorpeligen Grundlage des Mittelstückes niedergelegt; ersterer bildet sich erst im funften Lebensjahre im oberen Ende, und bleibt bis zum Pubertätseintritt mit dem Mittelstücke unverschmolzen. Das untere Ende erhält keinen besonderen Knochenkern. Genau so verhält es sich mit dem Metacarpus des Daumens, während die Metacarpusknochen der übrigen Finger, im Anfange des dritten Embryo-Monats einen Ossificationspunkt im Mittelstück, und schon im zweiten Lebensjahre einen Knochenkern für das untere Ende (Capitulum), aber keinen für das obere Ende erhalten.

§. 132. Bänder der Hand.

A. Bänder der Handwurzel. Die Bewegungen, welche die Hand als Ganzes ausführt — Beugung und Streckung, Zuziehung und Abziehung — geschehen im Gelenke zwischen dem unteren Ende des Vorderarms und den drei ersten Handwurzelknochen — Articulatio carpi. Sie sind in ziemlich grossem Massstabe ausführbar. Vom Maximum der Beugung bis zum Maximum der Streckung beschreibt die Hand einen Bogen von 180°, von der grössten Zuziehung bis zur grössten Abziehung einen Bogen von 80°. Die Abziehung (Seitenbewegung nach der Ulna zu) ist mehr gestattet

als die Zuziehung (Seitenbewegung nach dem Radius zu), weil der dreieckige Knorpel zwischen Ulna und Os triquetrum eine Compression erlaubt. Ein- und Auswärtswendung der Hand geschieht nicht in dem Handwurzelgelenk, sondern, wie §. 130 gezeigt wurde, im Drehgelenk des Radius mit der Ulna, also im Ellbogen. Die freie Beweglichkeit der Handwurzel am Vorderarm bedingt eine laxe fibröse Kapsel (Ligamentum capsulare articulationis carpi), welche von dem Umfang der unteren Gelenkstäche des Radius und des dreieckigen Zwischenknorpels entspringt, und sich an der Peripherie des, durch die oberen Gegenden der drei ersten Handwurzelknochen gebildeten Kopfes besestigt. Das Os pisiforme wird nicht in die Höhle dieser Kapsel einbezogen, sondern articulirt für sich mit einer kleinen Gelenkstäche an der Ulnargegend des Os triquetrum. Die Synovialhaut setzt sich in die Fugen zwischen den drei ersten Carpusknochen nicht fort. Die Volarseite der sibrösen Kapsel wird durch zwei sehr starke Bänder, die vom Radius und dem Zwischenknorpel zu den drei ersten Handwurzelknochen in gerader und schiefer Richtung laufen (Ligamentum accessorium rectum et obliquum) verstärkt. An der Dorsalseite liegt das breitere Ligamentum rhomboideum, vom Radius zum Os lunatum und triquetrum gehend; - vom Griffelsortsatz des Radius zum Kahnbein ist das Ligamentum laterale radiale, und vom Griffelfortsatz der Ulna zum dreieckigen Bein, das Ligamentum laterale ulnare s. Funiculus ligamentosus ausgespannt. Man kann die Articulatio carpi eine beschränkte Arthrodie nennen, da sie Beugung und Streckung, Zu- und Abziehung der Hand, aber keine Axendrehung vermittelt. - Die erste und zweite Handwurzelreihe sind durch eine Synovialkapsel mit einander vereinigt welche nicht nur die einander zugekehrten Flächen beider Reihen überzieht, sondern selbst in die Fugen zwischen den Handwurzelknochen bis auf eine gewisse Tiefe eindringt. Darum sieht man, nach Eröffnung der Kapsel, Spalten zwischen denselben. Kurze und straffe Bänder, die an der Dorsal- und Volarseite der Haudwurzel von der ersten Reihe zur zweiten laufen. beschränken die Beweglichkeit dieses Gelenkes (welches ich als Articulatio intercarpea bezeichnen will) so sehr, dass nur eine geringe Beuge- und Streckbewegung übrig bleibt; die Zuziehung und Abziehung aber, wie schon aus der wellensurmigen Begrenzungslinie beider Knochenreihen zu entnehmen war, ganz ausgeschlossen wird. Unter den volaren Verstärkungsbändern ist jenes zwischen dem Erbsenbein und dem Haken des Hakenbeins (Ligamentum piso-uncinatum) das stärkste. Die Articulatio intercarpea ist eine Amphiarthrose.

B. Bänder der Mittelhand. Eine straffe sibröse Kapsel verbindet die Basen der vier letzten Mittelhandknochen mit der zweiten Handwurzelreihe zur sesten, und sehr wenig Beweglichkeit zeigenden Articulatio carpometacarpea. Die mit ihr zusammenhängende Synovialkapsel schickt saltenartige Verlängerungen zwischen die kleinen Gelenkslächen an den Seiten der Basen. Starke und sest angezogene Hilfsbänder, die von den Knochen

der zweiten Handwurzelreihe zu den Basen der Mittelhandknochen laufen, verstärken die Verbindung des Metacarpus mit dem Carpus; so wie die zwischen den Basen je zweier Metacarpusknochen quergespannten Ligamenta basium dorsalia et volaria, die Entfernung eines Mittelhandknochens vom anderen unmöglich machen. Auch die Capitula der 4 letzten Metacarpusknochen sind an der Volarseite durch Querbänder mit einander verbunden, welche einige Nachgiebigkeit haben, und den Metacarpusknochen gestatten, beim Aufstemmen auf eine Unterlage, mit ihren Köpfchen etwas auseinander zu weichen, was die Basen nicht können. — Das Os metacarpi des Daumens bildet mit dem Os multangulum majus ein durch die Gestalt der Gelenkflächen und durch die Weite der Kapsel bedingtes Sattelgelenk (nach A. Fick), welches Beugung und Streckung des Daumens, nebst Zu- und Abziehung gestattet. — Die übrigen Articulationes carpometacarpeae stellen kaum bewegliche Amphiarthrosen vor.

A. Fick, die Gelenke mit sattelförmigen Flächen, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift, 1854. pag. 314.

C. Bander der Fingerglieder. Wir unterscheiden an jedem Finger eine Articulatio metacarpo-phalangea, dann eine erste und eine zweite Articulatio interphalangea. Die Articulatio metacorpo-phalangea, zwischen dem kugeligen Capitulum des Metacarpus und der oberen slachen Grube der Phalanx prima, ist für den Zeige-, Mittel-, Ring- und Ohrfinger eine Arthrodie, welche Beugung und Streckung, Zu- und Abziehung, aber keine Axendrehung des Fingers erlaubt, während das mehr quergezogene, walzenformige Capitulum des Metacarpus des Daumens, der Phalanx prima nur eine Beug- und Streckbewegung gestattet, also ein Winkelgelenk bedingt. Die Articulationes interphalangeae sind wahre Winkelgelenke. — Alle 3 Arten Fingergelenke besitzen fibrose und Synovialkapseln, nebst Seitenbändern, welche aus den seitlichen Grübchen der oberen Phalanx entspringen, und am Seitenrande der folgenden endigen. Für die Articulatio metacarpo-phalangea sind die Seitenbänder sehr schwach und dehnbar, und müssen es sein, da, wenn sie so stark wären, wie am 2. und 3. Fingergelenk, die durch die Form der Gelenkstächen gegebene Arthrodie in ein Winkelgelenk eingeschränkt würde. Die Volarseiten der fibrösen Kapseln der Articulationes metacarpo-phalangeae sind an ihrer unteren Wand durch Faserknorpelsubstanz verdickt, und bilden eine Art Rolle oder Rinne, in welcher die Sehne des Fingerbeugers läuft. Man hat allgemein diese verdickte Stelle des Kapselbandes als Ligamentum transversum beschrieben. In der Mitte einzelner Faserknorpelplatten finden sich knöcherne Kerne. welche die Gestalt einer halben Erbse oder des Samens der Sesampslanze haben (Ossa sesamoidea), und ihre glatte Fläche dem Gelenk zukehren. Am Gelenke zwischen Metacarpus und Phalanx prima des Daumens, finden sich constant zwei neben einander liegende Sesambeine; am ersten Gelenke des Zeige- und Ohrfingers, so wie am zweiten Gelenke des Daumens kommen sie ebenfalls, aber einfach vor. Bei den arabischen Schriftstellern hiessen sie Albadara.

Da der Metacarpus des Daumens mit dem Os multangulum majus durch ein einer Arthrodie sich näherndes Sattelgelenk, und mit der ersten Phalanx durch ein Winkelgelenk verbunden wird, so verhält er sich auch in dieser Beziehung mehr wie eine Phalanx prima der übrigen Finger.

§. 133. Allgemeine Bemerkungen über die Hand.

Das ans 27 Knochen bestehende, und durch 40 Muskeln bewegliche Skelet der Hand, in welchem Festigkeit mit geschmeidiger Beweglichkeit sich auf die sinnreichste Weise combinirt, ist für die roheste Arbeit, wie für die subtilsten Hanthierungen im gleichen Grade geschickt, und entspricht durch seinen wohlberechneten Mechanismus vollkommen jener geistigen Ueberlegenheit, durch welche der Mensch, das an natürlichen Vertheidigungsmitteln ärmste Geschöpf, sich zum Beherrscher der lebenden und leblosen Natur aufwirft. Die Hand, am Ende einer langen gegliederten Knochensäule befestigt, und durch ihren Hautüberzug besonders in der Hohlhand (palma von παλάμη) mit hoher Empfindlichkeit ausgerüstet, erhebt sich zur Bedeutung eines Tastorgans, welches, nach allen Richtungen des Raumes beweglich, uns von der Ausdehnung der Materie und ihren physikalischen Eigenschaften belehrt. Die ältesten Massbestimmungen (ulna. Elle, - spithama, Spanne, - pollex, Zoll) sind deshalb der Länge einzelner Handabtheilungen entnommen. Die Fähigkeit der Hand, sich zu einem Löffel auszuhöhlen, und zu einer Schaufel zu strecken, bedingt ihren Gebrauch zum Schöpfen und Wühlen, die gekrümmten Finger bilden einen starken und breiten Haken, der beim Klettern die trefflichsten Dienste leistet, und der jedem anderen Finger entgegenstellbare Daumen, wirkt mit diesem wie eine Zange, die zum Ergreifen und Befühlen kleiner Gegenstände benutzt wird. Der lange, freibewegliche und starke Danmen (pollex a pollere) ist ein Vorzug der Menschenhand. Er krummt sich mit Krast gegen die übrigen Finger zur Faust, Pugnus, die zum Anfassen und Festhalten schwerer Gegenstände dient. Der Daumen leistet hiebei so viel, wie die übrigen Finger zusammengenommen, er stellt das eine Blatt einer Beisszange vor, und führt deshalb bei Albin den Namen manus parva, majori adjutrix, was die griechische Bezeichnung arrizeto noch besser ausdrückt. Eine Hand ohne Daumen, hat ihren besten Theil eingebüsst, und der Chirurg wird mit seiner Entfernung nicht so rücksichtslos verfahren, wie mit den übrigen Fingern.

Die Affenhand, deren Stummeldaumen Eustachius einen pollex ridiculus nannte, ist ein viel unvollkommener organisirtes Werkzeug, als die Menschenhand, das Organon organorum des Anaxagoras. — Die ungleiche Länge der Finger ist für das Umfassen kugeliger Formen wohlberechnet, und schliesst, wenn die Finger gegen die Hohlhand gebeugt und

zusammengekrümmt sind, einen leeren Raum ein (wie z. B. beim Fliegenfangen), der durch den Daumen als Deckel geschlossen wird. — Die aus mehreren Knochen zusammengesetzte bogenförmige Handwurzel unterliegt der Gefahr des Bruches weit weniger, als wenn ein einziger gekrummter Knochen ihre Stelle einnähme. Ihre concave Seite, die durch das starke Lieumentum carpi transpersum in einen Ring umgebildet wird, schützt die Beuresehnen der Finger vor Druck und Reibung. Die seste Verbindung der Mittelhand mit der Handwurzel macht das Stemmen und Stützen mit den Händen möglich, und die Längenkrümmung der einzelnen Metacarpusknochen, so wie ihre Nebeneinanderlagerung in einer gegen den Rücken der Hand convexen Ebene, erleichtert die Aushohlung der Hohlhand zum poculum Diogenis. - Die Zehnzahl der Finger, die bei den ersten Rechnungsversuchen der Menschen zum Zählen diente, ist gewiss die anatomiache l'esache unseres jetzigen Zahlen-Decadensystems. — Die grosse Beweglichkeit der Finger, und die möglichen zahlreichen Combinationen ihrer Stellungen machten sie zu Vermittlern der Zeichensprache; ihre tiefen Trennungsspalten erlauben das Falten der Hände, um mit doppelter Kraft zu drücken, und die nur im Winkel mögliche Beugung der zwei letzten Phalangen, giebt der geballten Faust eine Eraft, die einst statt des Nochtes galt. Wie nethwendig das Zusammenwirken beider Hande zu gowissen Verrichtungen wird, beweist das alte Sprichwort: manus manus Arret. Eine fehlende Hand kann deshalb nur unvollkommen durch die andere ersetzt werden, und der Verbest Einer Hand ist deshalb schwerer un fahlen, als jeuer eines Auges, da zum Sehen unter allen Verhältnissen Ein Auge hinreicht. - Die trussendfaltigen Verrichtungen der Hinde Hanthisrungen), die die Nethwendigkeit dietiet, und der Verstand raffiniet, und die ein ausschliessliches Pritrogativ der Menschen sind, werden durch den weisen Rou dieses Werkzenges ausführbar.

D. Knochen der unteren Extremitäten oder Bauchglieder.

§ 134. Eintheilung der unteren Extremitäten.

Jode untere Extremitit besocht, wie die obere, aus vier beweglich verbundenen Urtheilungen: der Bithe, dem Überschenkel, dem Unorrschenkel, und dem Passe, welcher selbst wieder in die Passwurzel, den Mitteiliuss, und die Johen verfallt.

& 135 Millerin.

Pas Hallibera (de monumentum a auroganem, in casar, in pairus Internir ensepreix, durch seine Lage und nur Thei durch seine Sestait, der Schuler der aberen Entrement. Penie Milliarchen inssen im Lennbein zwischen sich, und bilden mit ihm den Beckenring. Sie sind die grössten aller gemischten und flachen Knochen, und werden in drei Theile eingetheilt: das Darmbein, Sitzbein, und Schambein. Diese Eintheilung ist nicht willkürlich, sondern in der Evolution des Knochens gegründet, indem jedes Hüftbein beim neugeborenen Kinde aus drei, nur durch Knorpel verbundenen Stücken besteht, welche die allgemein übliche Eintheilung veranlassten, und welche selbst im 16. Lebensjahre noch nicht vollkommen zu Einem Knochen verwachsen sind. Bei zwei Säugethieren (dem Schnabel-thiere und der Echidna) bleiben sie durch das ganze Leben getrennt. Hält man sich an die etwas unter der Mitte des Knochens befindliche, grosse Gelenkgrube (die Pfanne), so liegt das Darmbein über ihr, das Sitzbein unter ihr, und das Schambein an ihrer inneren Seite.

A. Das Darmbein, Os ilei s. ilium, ist an seiner Basis, die die obere Wand der Pfanne bildet, dick, verflacht sich nach oben, breitet sich zugleich aus, und wird in eine äussere und innere Fläche, und einen dicken Begrenzungsrand eingetheilt. Die aussere Fläche ist an ihrem vorderen Theile convex, am hinteren concav, und besitzt eine, selbst bei älteren Individuen nicht immer scharf ausgeprägte, mit dem oberen Rande parallel laufende Linie (Linea semicircularis s. arcuata externa) als die Ursprungsgrenze des Musculus glutaeus tertius. Sonst ist diese Fläche glatt, und zeigt nur in ihrer Mitte ein grösseres, und gegen den Rand zu, viele kleinere Ernährungslöcher. Die innere Fläche wird durch einen schräg von hinten nach vorn und unten gehenden, schneidend zulaufenden Winkelvorsprung (Linea arcuata interna) in eine kleinere untere, und viel grössere obere Abtheilung gebracht. Die untere hilft die Seitenwand des kleinen Beckens, und zugleich den Grund der Pfanne bilden, die obere ist an ihrer vorderen Hälste concav und glatt (Fossa iliaca). an ihrer hinteren Hälste rauh und uneben, mit einer ohrmuschelförmigen Verbindungsstelle für die ähnlich gestaltete Fläche am breiten Seitenrande des Kreuzbeins, und hinter dieser mit einem unsormlichen Höcker (Tuberositas ossis ilei) versehen. — Der Begrenzungsrand zerfallt 1. in den breiten nach oben convexen Kamm (Crista ossis ilei). welcher vorn nach aussen, und hinten nach innen, also S-förmig gekrümmt ist, und eine aussere und innere Lefze, so wie eine zwischen beiden liegende Mittellinie besitzt; 2. in den vorderen und hinteren Rand, welche beide sast senkrecht von den Endpunkten der Crista absallen, scharf sind, und einen halbmondförmigen Einschnitt zeigen, welcher durch einen oberen und unteren Stachel (Spina ossis ilei) begrenzt wird. Der hintere Rand geht unter der Spina posterior inferior in einen tief gehöhlten Ausschnitt (Incisura ischiadica major s. iliaca) über.

B. Das Sitzbein, Os ischii s. coxendicis, wird in den Körper, den absteigenden, und aufsteigenden Ast eingetheilt. Der Körper bildet die untere Peripherie der Pfanne, ist dreiseitig, und hat an seinem hinteren Rande einen spitzigen Stachel (Spina ossis ischii), welcher

mit der Spina essis ilei posterior inferior, die oben genannte Incisura ischiadica major s. iliaca begrenzt. Der absteigende Ast (Ramus descendens), welcher die drei Flächen des Körpers beibehält, endigt mit dem starken Sitzknorren (Tuberositas ossis ischii), zwischen welchem und der Spina ischii die seichte Incisura ischiadica minor liegt. Der aufsteigende Ast (Ramus ascendens) erhebt sich vom Sitzknorren nach innen und oben, ist flachgedrückt, und besitzt nur eine vordere und hintere Fläche, nebst innerem stumpfen, und äusserem scharfen Rande.

C. Das Schambein, Os pubis s. pectinis, zerfalk in einen horis zontalen und absteigenden Theil oder Ast. Der horizontale Ast bildet mit seinem äusseren Ende die innere Pfannenwand, und stösst am inneren Ende durch eine breite, rauhe Verbindungsstäche, und darauf haftenden Faserknorpel, mit dem gleichnamigen Knochen der anderen Seite zusammen. Die Stelle, wo das äussere Ende des horizontalen Astes sich mit dem Pfannenstück des Darmbeins (Basis) verbindet, bleibt durch das ganze Leben als ein rauher Rücken kennbar, der gewöhnlich Tuberculum ileo-pectineum, passender jedoch Tuberculum ileo-pubicum genannt wird. Der horizontale Ast bildet ein kurzes, dreiseitiges Prisma, dessen Flächen, weil das äussere und innere Ende dicker sind als das Mittelstück, sämmtlich concav sein müssen. Von den drei Winkeln ist der obere der schärfste. und heisst Schambeinkamm - Pecten s. Crista ossis pubis. Er setzt sich nach aussen, hinter dem Tuberculum ileo-pubicum, in die Linea arcuate interne des Darmbeins fort, und endigt nach innen am gerundeten Schambeinhöcker — Tuberculum pubicum. Die beiden unteren Ränder verlängern sich in die Ränder des vom Sitz- und Schambein umschlossenen grossen Loches (Foramen obturatum s. evale), und zwar der vordere untere in den ausseren, der hintere untere in den inneren Rand des Loches. Vom inneren Ende des horizontalen Astes geht der absteigende Ast dem aufsteigenden Sitzbeinaste entgegen, und verschmilzt mit ihm. Er hat, wie dieser, eine vordere und hintere Fläche, einen äusseren und inneren Rand. — Wo die drei Stücke des Hüftbeins zusammenstossen, liegt die tiefe, sphärisch gehöhlte Gelenkgrube zur Aufnahme des Oberschenkelkopfes - die Pfanne, Acetabulum s. Cotyle (vielleicht ursprünglich acceptabulum). Ihr rauher Rand (Supercilium acetabuli) bildet keine vollkommene Kreislinie, sondern ist an der inneren und unteren Peripherie durch die Incisura acetabuli ausgeschnitten. Die innere Oberfläche der Pfanne ist nicht durchaus überknorpelt, sondern zeigt an ihrem Grunde eine knorpellose, vertieste Stelle (Fossa acetabuli), welche sich bis zur Incisura acetabuli ausdehnt.

Neben der Pfanne liegt nach innen das sogenannte verstopfte Loch (Foramen obturatorium, besser obturatum oder ovale), welches durch die Aeste des Sitz- und Schambeines umgeben wird, und genau betrachtet, besonders an älteren Leuten, eine dreieckige Form mit abgerundeten Winkeln hat. Die Umrandung des Loches bildet keine in sich selbst zurück-

laufende Linie, indem, wie oben bemerkt wurde, der äussere Rand in den vorderen unteren Rand des horizontalen Schambeinastes, und der innere Rand in den hinteren unteren übergeht. Dadurch geschieht es, dass die untere, furchenähnlich stark ausgehöhlte Fläche des horizontalen Schambeinastes, den oberen Rand des Verstopfungsloches bildet.

Das Studium des Hüftbeins macht den Anfangern einige Schwierigkeit, da an den Knochen Erwachsener, deren sie sich bedienen, die Trennungsspuren der einzelnen embryonalen Stücke nicht mehr abzusehen sind. empfehle deshalb, zur besseren Orientirung, diese Trennungslinien am ausgebildeten Knochen auf folgende Weise zu verzeichnen. Man beschreibt mit Tinte eine über das Tuberculum ileo-pubicum und nach seiner Richtung laufende Linie, verlängert sie über den Ansang der Linea arcuata interna einen Querfingerbreit nach abwärts, und lässt sie dann in zwei Schenkel divergiren, deren einer nach aussen, zur Mitte der Incisura ischiadica major, der andere nach innen, zum oberen Dritttheil des äusseren Randes des Verstopfungsloches geführt wird. Diese gespaltene Linie wird die Gestalt eines umgekehrten Y haben, und an der inneren Oberstäche des Hustbeins die Verwachsungsstelle der drei Stücke angeben. Um sie auch an der äusseren Oberstäche des Knochens darzustellen, verlängert man das vordere Ende der längs des Tuberculi ileo-pubici gezogenen Linie, einen Querfingerbreit in die Pfanne hinein, und lässt sie wieder in zwei Schenkel auslaufen, welche durch die Pfanne, und über den Rand derselben hinaus, so verlängert werden, dass sie mit den Endpunkten der an der inneren Seite verzeichneten Schenkel zusammenstossen. Man wird dann den Antheil kennen lernen, den jedes der drei Stücke des Hustbeins an der Bildung der Pfanne nimmt. Die Verschmelzungsstelle des absteigenden Schambein- und aufsteigenden Sitzbeinastes fällt beiläufig in die Mitte des inneren Randes des Foramen obturatum.

An Abnormitäten ist das Hüstbein nicht reich; — eine der merkwürdigsten besitze ich, wo ein an der Incisura acetabuli entspringender Knochenbalken, quer über das Foramen obturatum läust, ohne den äusseren Rand desselben zu erreichen. Ebenso ist an einem Becken unserer Sammlung der absteigende Schambeinast mit dem aussteigenden Sitzbeinaste nicht verbunden. — Einen vollständigen knöchernen Pfannenrand, ohne Incisur, zeigt ein im Prager anatomischen Museum ausbewahrtes Hüstbein. — Löcher im Pfannengrund, die durch Schwund der Knochenmasse im höheren Alter entstehen, sind keine Seltenheit. — Das weibliche Hüstbein zeichnet sich durch die Kürze und Schmalheit seines Darmbeines, die Kürze seines Sitzbeines, die Länge seines horizontalen Schambeinastes, und die Schmalheit der das Foramen obturatum umgebenden Knochentheile aus. — Die schwächsten und dünnsten Theile des Hüstbeins sind die Mitte des Darmbeins, und die Fossa acetabuli.

§. 136. Verbindungen der Hüftbeine.

Die Hüstbeine verbinden sich mit dem Kreuzbeine durch die Symphysis sacro-iliaca, und unter einander durch die Symphysis ossium pubis.

1. Die Symphysis sacro-iliaca $(\sigma \dot{v} v - \phi \dot{v} \omega)$, zusammenwachsen) ist, nach den neuesten Untersuchungen von Luschka, eigentlich ein Gelenk, indem die überknorpelten, ohrförmigen Verbindungsstächen des Darm- und

Kreuzbeins, welche man mit einander verwachsen dachte, durch eine mit Synovialhaut und Epithel ausgekleidete, spaltsormige Höhle von einander getrennt sind. Dieses Gelenk, welches den altherkömmlichen Namen einer Symphyse noch lange führen dürste, wird durch vordere, untere, und hintere Verstärkungsbänder bedeckt, welche zugleich mit der über die Symphyse wegstreichenden Beinhaut, eine Art Kapsel um die innere Höhle bilden. Unter den hinteren verdienen das Ligamentum ileo-sacrum longum et breve, ihrer Grösse wegen, besondere Erwähnung. Das erste entspringt von der Spina posterior superior, das zweite, vom ersten bedeckt, von der Spina posterior inferior des Darmbeins, und beide enden am Seiten-Ueber der Symphyse findet sich das Ligamentum rande des Kreuzbeins. ileo-lumbale, welches vom Querfortsatz des fünsten Lendenwirbels entspringt, und, in zwei Schenkel gespalten, sich mit einem an der Tuberositas ossis ilei, mit dem anderen theils an der Basis des Kreuzbeins inserirt, theils sich über die Symphysis sacro-iliaca ausbreitet, und an der inneren Darmbeinfläche endigt.

Luschka, die Kreuz-Darmbeinfuge und die Schambeinfuge, im Archiv für pathol. Anatomie. 7. Bd. p. 299.

Zur Verbindung des Hustbeines mit dem heiligen Beine dienen noch zwei krastvolle Bänder, welche zugleich den Raum des kleinen Beckens seitwärts begrenzen helfen. Sie sind a) das Sitzknorren-Kreuzbeinband, Ligamentum tuberoso-sacrum, welches am Sitzknorren entsteht, und stark schief nach innen und oben laufend sich ausbreitet, um an der Spina posterior inferior des Darmbeins, und am Rande des Kreuz- und Steissbeins, zu endigen. Von seiner Ursprungsstelle am Sitzknorren läuft ein schmaler sichelsormiger Fortsatz, Processus falciformis, am aussteigenden Sitzbeinund absteigenden Schambeinast bis zur Symphysis pubis, woselbst er mit dem gleich zu erwähnenden Ligamentum arcuatum inferius verschmilzt. b) Das Sitzstachel-Kreuzbeinband, Ligamentum spinoso-sacrum, ist kürzer und schwächer, als das erstere, entspringt von der Sping ossis ischii, schlägt eine minder schiefe Richtung zum Seitenrande des letzten Kreuzwirbels und des Steissbeins ein, wo es sich festsetzt, und sich sonach mit dem Ligamentum tuberoso-sacrum kreuzt. Durch die Kreuzung beider Bänder werden die Incisura ischiadica major und minor in Löcher desselben Namens umgewandelt.

2. Die Symphysis ossium pubis schliesst durch die Vereinigung der horizontalen Schambeinäste den Beckenring ab. Der kühne Versuch, diese Symphysis bei gewissen Arten schwerer Geburten zu trennen, veranlasste ein genaueres Studium ihres Baues. Sie ist nach demselben Typus, wie die Verbindung zweier Wirbelkörper durch Bandscheiben, eingerichtet. Es findet sich, zwischen den schräg nach vorn und innen gerichteten Endflächen beider horizontalen Schambeinäste, ein dreieckiger, aus concentrischen Schichten bestehender Faserknorpel, der in der Mitte einen weicheren Kern, und in diesem, nach hinten zu, eine kleine, spaltförmige, con-

stante Höhle enthält, beim Manne schmäler und länger, beim Weibe kürzer, aber breiter ist, und durch bogenförmig gespannte Bänder, die von einem Schambeinhöcker zum anderen, als Ligamentum arcuatum superius, und von einem absteigenden Schambeinast zum anderen, als Ligamentum arcuatum inferius, ziehen, verstärkt wird.

Luschka (a. a. 0. p. 310) findet östers eine doppelte, paarige Höhle in der Schamfuge, mit einer faserknorpeligen Zwischenwand, welche sich zu den beiden Höhlen wie eine Cartilago interarticularis verhält.

Das Foramen obturatum wird durch eine sehnige Membran (Membrana obturatoria s. Ligamentum obturatorium) so verschlossen, dass nur am oberen äusseren Winkel desselben, eine schräg von innen und unten nach oben und aussen laufende Lücke (Canalis obturatorius) oben bleibt, welche in die kleine Beckenböhle führt.

Man kann an einem skeletirten Becken die Richtung der Bänder durch Fäden oder Bandstreisen vorstellen, welche den angegebenen Ursprung und das Ende eines Bandes verbinden. Die Richtung des Ligamentum tuberosound spinoso-sacrum, ihre Kreuzung, und ihre Theilnahme an der Bildung des grossen und kleinen Hüftloches, sind für die später folgenden Details von besonderer Wichtigkeit. - Durch die Symphysen erhält der Beckengurtel ein Minimum von Beweglichkeit, welches durch den gelockerten Zustand derselben in der Schwangerschaft vergrössert wird. Verknöcherungen der Symphysen, und besonders der Schamfuge, gehören beim weiblichen Geschlechte unter die grössten Seltenheiten (Otto), obwohl sie bei gewissen Säugethieren regelmässig vorkommen (bei den Wiederkäuern, Einhufern und Pachydermen). Durch die Bänder, welche, ungeachtet ihrer Stärke, doch einem von innen wirkenden Drucke nachgeben werden, kann die Beckenhöhle erweitert werden; sie begrenzen den kleinen Beckenraum so gut wie Knochen, und haben nicht, wie diese, den Nachtheil der Sprödigkeit. — Das Foramen obturatum, das grösste Loch am Skelete, hat nur unnütze Knochenmasse zu vertreten, und bedingt somit eine grössere Leichtigkeit des Beckens. - Durch das grosse Hüftloch, viel seltener durch das kleine, können, so wie durch den Canalis obturatorius, Eingeweide der Beckentheile als Herniae nach aussen, und fremde Körper durch Verwundung nach innen dringen. Im Prager Museum befindet sich ein Fall, wo eine Nadel im Nervus ischiadicus (welcher durch das grosse Hüftloch aus der Beckenhöhle heraustritt) gefunden wurde, und ganz von ihm umschlossen wird (Gruber). Verwundungsfälle, wo das Becken quer durch und durch geschossen wurde, ohne Knochenverletzung, sind ebenfalls bekannt. — Ueber die Höhle des Schamfugenknorpels handelt ausführlich Zaglas in Monthly Journal, 1851, Nov., und Luschka, a. a. 0.

§. 137. Das Becken als Ganzes.

Das Becken (*Pelvis*) ist ein durch die Verbindung der beiden Hüftbeine, und das zwischen ihre hinteren Enden hineingeschobene Kreuzbein mit dem Steissbein, gebildeter Knochenring, der am unteren Ende des Stammes liegt, an seiner hinteren Peripherie die Wirbelsäule trägt, und sich mittelst der Pfannen auf die Köpfe des Oberschenkels stützt. Stellt man diesen Knochenring so vor sich hin, dass er mit den beiden Sitzknor-

ren und mit der Steissbeinspitze auf dem Tische aufsteht, so hat er wirklich einige Aehnlichkeit mit einem tiefen Wasserbecken (ad lavacri similitudinem Vesal.), dessen breiter, nach aussen gebogener Rand, vorn und hinten abgebrochen erscheint, so dass nur zwei Seitenstücke desselben, die beiden Darmbeine, übrig bleiben. Es wird in das grosse und das kleine Becken eingetheilt.

A. Das grosse Becken ist eigentlich nur der breite, nach aussen gebogene, unvollständige Rand des kleinen Beckens, und wurde deshalb auch Labrum pelvis genannt. Die hintere Lücke des ausgebrochenen Randes wird durch den letzten Lendenwirbel nur unvollständig, die vordere, viel grössere Lücke, durch die musculöse Bauchwand vollständig ausgefüllt oder ergänzt. Die Höhle des grossen Beckens dient zur Vergrösserung der Bauchhöhle, und geht, sich trichterförmig verengernd, in die Höhle des kleinen Beckens über.

B. Das kleine Becken bildet ebeufalls eine nach unten konisch sich verengernde Höhle, deren hintere lange Wand durch die vordere concave Kreuzbein- und Steissbeinfläche, deren vordere Wand durch die kurze Symphysis ossium pubis, und die, das Foramen obturatum umgebenden Aeste des Scham- und Sitzbeins, nebst dem Ligamentum obturatorium, gebildet wird. Die Seitenwände werden von jenem Theile der Hüstbeine, der zwischen Linea arcuata interna und Tuberositas ossis ischii liegt, und von deu Ligamentis tuberoso - et spinoso - sacris erzeugt. Die Höhle des kleinen Beckens hat eine obere und untere Oeffnung. Die obere Oeffnung oder der Eingang des kleinen Beckens (Apertura pelvis superior), durch welche das kleine Becken mit dem grossen zusammenhängt, wird durch eine Linie begrenzt, welche vom Promontorium, und vom vorderen Rande der Basis des Kreuzbeins, so wie von beiden Lineis arcuatis internis der Darmbeine, und den beiden Cristae der Schambeine zusammengesetzt wird. Sie heisst, weil sie aus so vielen Stücken Linea terminalis. Die hat im mannbesteht, Linea innominata, bess lichen Geschlechte, wegen grösseren Vorspringens des Promontoriums, eine mehr herzformige, im weiblichen Geschlechte eine ovale Gestalt. - Die untere Oeffnung oder der Ausgang (Apertura pelvis inferior) ist kleiner als der Eingang, und wird von der Spitze und den Seitenrändern des Steissbeins, den unteren Rändern der Ligamenta tuberoso- und spinoso-sacra, den Höckern und aufsteigenden Aesten der Sitzbeine, den absteigenden Aesten der Schambeine, und dem Ligamentum arcuatum inferius gebildet. Sie hat in beiden Geschlechtern eine herzförmige Gestalt. Die Spitze des Herzens liegt am unteren Rande der Symphysis ossium pubis, der eingebogene Rand des Herzens wird durch den Vorsprung des Steissbeins erzeugt. Durch das Zurückweichen des beweglichen Steissbeins, kann der gerade Durchmesser dieser Oeffnung bedeutend vergrössert werden, wodurch ihre Gestalt viereckig wird. Denkt man sich von einem Sitzknorren zum anderen eine gerade Linie gezogen, so heisst der vor

dieser Linie liegende Theil der Oeffnung Schambogen, Arcus ossium pubis, der im weiblichen Geschlechte constant weiter als im männlichen ist.

Da die vordere Wand des kleinen Beckens viel niedriger ist als die hintere (sie verhält sich zu dieser beiläufig wie 1:3), so werden die Ebenen der oberen und unteren Beckenöffnung nicht mit einander parallel sein können, sondern nach vorn convergiren. Dasselbe muss von je zwei imaginären Durchschnittsebenen gelten. Würde man die Mittelpunkte mehrerer solcher Durchschnitte durch eine Linie verbinden, so würde diese keine gerade, sondern eine krumme Linie sein, deren Convexität gegen das Kreuzbein sieht. Diese Linie ist die Beckenaxe oder Leitungslinie, weil in ihrer Richtung sich der Kopf eines zu gebärenden Kindes bewegt.

Nebst der Beckenaxe werden in der oberen und unteren Beckenöffnung, so wie in der Höhle des Beckens selbst, mehrere für den Geburtshelfer wichtige Durchmesser gezogen.

- a) In der oberen Beckenössnung: 1. der gerade Durchmesser, Diameter antero-posterior s. Conjugata, von der Mitte des Promontoriums zum oberen Rande der Symphysis pubis; 2. der quere, Diameter transversus, zwischen den grössten Abständen der Linea innominata; 3. und 4. die beiden schiefen, Diametri obliqui s. Deventeri (nach Heinrich Deventer, einem niederländischen Geburtshelser, benannt), von der Symphysis sacro-iliacs einerseits, zum entgegengesetzten Tuberculum ileopubicum.
- b) In der unteren Beckenössnung zieht man: 1. den geraden Durchmesser, von der Steissbeinspitze zum unteren Rande der Symphysis pubis; 2. den queren, zwischen beiden Sitzknorren. Der quere ist constant, der gerade aber durch die Beweglichkeit des Steissbeins vergrösserbar. Man zieht deshalb, um auch sur den geraden Durchmesser eine constante Grösse zu hen, noch einen zweitag, von der Vereinigungsstelle des Kreuzbeins mit dem Steissbeine, zum unteren Rande der Symphysis pubis.
- c) In der Höhle des kleinen Beckens: 1. der gerade Durchmesser, von der Verschmelzungsstelle des 2. und 3. Kreuzbeinwirbels, zur Mitte der Schambeinvereinigung, und 2. der quere, der die Mittelpunkte beider Pfannen verbindet.

Um eine richtige Vorstellung von der Lage des Beckens zu erhalten, muss man es so stellen, dass die Conjugata mit dem Horizonte einen Winkel von 65° bildet. Dieser Winkel giebt einen mathematischen Ausdruck für die sogenannte Neigung des Beckens, und variirt sehr wenig bei verschiedenen Individuen. Bei Männern ist er constant um einige Grade spitziger, als bei Weibern. Hat man einem Becken diese Neigung gegeben, so wird man finden, dass die Spitze des Steissbeins um etwas mehr als 7 Linien höher liegt, als der untere Rand der Schambeinfuge.

Man hatte die Neigung des Beckens, oder den Winkel der Conjugata mit dem Horizonte, noch vor wenig Jahren für viel kleiner als 65° gehalten, indem man die Spitze des Steissbeins mit dem unteren Rande der Schamfuge in einer horizontalen Linie liegend annahm. Dieser unrichtigen Vorstellung über die Neigung des Beckens, die selbst durch die besten anatomischen Abbildungen vervielfültigt wurde, verdanken die unrichtigen, aber noch immer gebrauchten Ausdrücke: horizontaler und absteigender Ast des Schambeins, aussteigender Ast des Sitzbeins etc., ihren Ursprung. Bei einer Neigung von 65° wird der horizontale Ast des Schambeins eine sehr abschüssige Lage einnehmen, der absteigende Ast wird stark schief nach hinten, und der aufsteigende Sitzbeinast nach vorn gerichtet sein. Nägele hat durch Versuche an Lebenden die wahre Neigung des Beckens ausgemittelt.

§. 138. Unterschiede des männlichen und weiblichen Beckens.

Kein Theil des Skelets bietet so auffallende, und wegen ihrer physiclogischen Beziehungen so wichtige Geschlechtsverschiedenheiten dar, wie Anatomischer Charakter des weiblichen Beckens ist Weite und Kürze, des männlichen vergleichungsweise Enge und Höhe. Geburtsact bedingt diesen Unterschied. Die Bewegungen des Kindskopfes durch den Beckenring wird leichter durch die Weite des Beckens, und ist schneller beendigt durch die Kurze desselben. Die Weite des kleinen Beckens nimmt beim Weibe in doppelter Beziehung zu. gewinnt die ganze Beckenhöhle gleichmässig mehr Umfang als die männliche, und zweitens geht die konische Beckenform des Mannes beim Weihe in eine mehr cylindrische über. Der grössere Umsang des weiblichen Beckens wird durch die grössere Breite des Kreuzbeins, so wie durch die grössere Länge der Linea arcuata interna, und der Schambeine bedingt. Die mehr cylindrische Form desselben resultirt aus dem grösseren Parallelismus der beim Manne convergirenden Sitzbeine. Die Pfannen und die Sitzknorren stehen somit weiter aus einander, und der Arcus ossium pubis wird offener und weiter, als im männlichen Geschlechte, sein müssen. Letzterer wird noch dadurch vergrössert, dass die absteigenden Scham- und aufsteigenden Sitzbeinäste wie um ihre Axe gedreht erscheinen, wodurch ihr innerer Rand sich nach vorn wendet. Das flache und stark nach hinten gerichtete Kreuzbein vergrössert ganz vorzüglich den Raum der kleinen Beckenhöhle, und die grosse Beweglichkeit des Steissbeins bedingt ebenso augenfällig die bedeutende Erweiterungsfähigkeit des Ausganges während des Geburtsactes. Die Kurze des weiblichen Beckens ist durch die geringere Länge der Sitzbeine gegeben.

Das grosse Becken bietet keine so erheblichen Differenzen der Durchmesser dar, und zeichnet sich im Weibe nicht so sehr durch seine Weite, als durch die Schmalheit und Niedrigkeit der Darmbeine, vor dem männlichen aus. Folgende Tabelle dient zum Vergleiche der wichtigsten Durchmesser des kleinen Beckens in beiden Geschlechtern, nach Krause:

Apertura pelvis superior.	im Manne	im Weibe
Conjugata	4"	4" 3"
Querer Durchmesser	4" 9"	5"
Schiefer Durchmesser	4" 6"	4" 8"
Umfang der Linea innominata	15"	16" 6"
Cavum pelvis		
Gerader Durchmesser	4"	4" 6"
Querer Durchmesser	4"	4" 3"
Senkrechter Durchmesser von der Linea		
arcuata zum Tuber ossis ischii	4"	3" 6"
Grösster Umfang	13" 6"	15" 6"
Apertura pelvis inferior.		
Veränderlicher gerader Durchmesser, von		
der Spitze des Steissbeins	2" 9"	3" 4"
Constanter gerader Durchmesser, von der		
Symphysis sacro-coccygea	3" 6"	4" 3"
Querdurchmesser	3"	4"

Die Ausmittlung der Beckenweite ist für den Geburtshelfer von der grössten Wichtigkeit, um zu entscheiden, ob eine Geburt möglich oder nicht. Dass selbst bei sehr verengertem Becken einer Schwangeren, durch die von den Muskeln der Gebärmutter bewirkte Zusammendrückung der Frucht, eine normale Geburt möglich ist, beweist jener Fall, wo eine Gebärende, bei welcher die Unmöglichkeit des Gebärens auf natürlichem Wege (wegen Verkrüppelung des Beckens) ärztlich ausgemittelt und festgestellt, und der Kaiserschnitt als das einzige Rettungsmittel für Mutter und Kind erklärt wurde, der um seine Instrumente nach Hause eilende Wundarzt bei seiner bewaffneten Rückkunst die Frau — eines Knäbleins genesen fand.

Der veränderliche Durchmesser des Beckenausganges kann nach Meckel bis auf 5 Zoll erweitert werden, welche Erweiterung jedoch nicht ganz zu Gunsten der Geburt geschieht, weil der constante Durchmesser des Ausganges nur 4" 3" misst. Die gegen das Ende der Schwangerschaft eintretende Auflockerung der Symphysen des Beckens, die von Galen schon gekannt (non tantum dilatari, sed et secari tuto possunt, ut internis succurratur), von Pineau und Hunter constatirt wurde, ist ebenfalls nicht ohne Einfluss auf dessen Erweiterung. Bei Frauen, die schon oft geboren haben, sind sämmtliche Beckendurchmesser etwas grösser, und die Symphysis pubis breiter, als Man will bemerkt haben, dass der rechte schiese Durchmesser des Beckeneinganges immer etwas kurzer als der linke ist. - Das menschliche Becken unterscheidet sich durch seine Breite, und durch die Neigung der Darmbeine nach aussen, vom thierischen, dessen Ossa ilei schmal sind, und senkrecht stehen. - Die breiten, concaven, und divergirenden Darmbeine können einen Theil der Last der Eingeweide stützen, und sprechen sosomit für die Bestimmung des Menschen zum aufrechten Gange. An den Becken neugeborener Kinder sind die Geschlechtsunterschiede kaum zu bemerken.

§. 139. Oberschenkelbein.

Das Oberschenkelbein (Os femoris, Femur, griechisch oxélos, daher oxelezóv) ist der längste und stärkste Röhrenknochen, und überhaupt der mächtigste Knochen des Skelets. Das Mittelstück ist, seiner Länge nach, etwas nach vorn gekrümmt, dreiseitig prismatisch, mit vorderer, ausserer, und innerer Fläche. Von den drei Winkeln ist der hinterste der schärste, er heisst Linea aspera femoris. Er zeigt zwei Lefzen, Labia, welche gegen das obere und untere Ende des Knochens in zwei Schenkel aus einander weichen, wodurch diese Enden, besonders das untere, vierseitig werden. In oder neben der Linea aspera liegen, an nicht genau bestimmten Stellen, ein oder zwei nach oben dringende Ernährungslöcher. Das obere Ende bildet mit dem Mittelstücke einen Winkel, welcher grösser ist als ein rechter, und hat auf einem, von vorn nach hinten etwas comprimirten Halse (Collum femoris), einen kugelrunden überknorpelten Kopf (Caput femoris) aufsitzen, auf welchem eine kleine rauhe Grube (Foveola) zur Insertion des runden Bandes vorkommt. Der Kopf halt ²/₂ einer Kugel von 20—22 Linien Durchmesser. An der winkelig geknickten Uebergangsstelle des Halses in das Mittelstück, sind zwei starke Höcker - Rollhügel, Trochanteres (τροχός, Radspeiche) - angebracht, welche für die Drehmuskeln des Schenkels als Hebelarme dienen, und ihnen ihre Wirkung erleichtern. Der äussere Rollhügel liegt in der verlängerten Axe des Mittelstücks, steht also gerade nach oben, und hat an seiner hinteren Seite eine Grube - Fossa trochanterica. gegengesetzte innere Rollhügel liegt unter dem ausseren, und bildet einen kleinen, nach hinten gerichteten Kegel, der mit dem grossen Rollhügel durch eine vordere, sehr schwache, und eine hintere, rauhe Verbindungslinie (Linea intertrochanterica anterior et posterior) vereinigt wird. Der äussere Rollhügel ist am lebenden Menschen sehr gut zu fühlen, der innere nicht, da er von der dicken Musculatur an der inneren Seite des Schenkels ganz maskirt wird. - Das untere Ende ist dick und breit, und zeigt zwei nur an ihrem untersten Theile überknorpelte Knorren -Condylus externus et internus. Die Ueberknorpelung des einen Knorrens setzt sich an der vorderen Seite in die des anderen ununterbrochen fort, und bildet zwischen diesen eine sattelformige Vertiefung, in welcher die Kniescheibe bei den Bewegungen des Unterschenkels auf- und niedergleitet. Der äussere Condylus springt nach vorn mit einem scharfen Hügel mehr hervor als der innere, und ist zugleich um 3 Linien kurzer und breiter, als letzterer. Ein senkrechter, von vorn nach hinten gehender Durchschnitt jedes Condylus, giebt keine kreisformige, sondern ein Segment einer Spirallinie, welche, ohne einen grossen Fehler zu begehen, und um den Mechanismus des Kniegelenks besser zu verstehen, als elliptisch angenommen werden kann. Hinten sind beide Condyli durch eine tiefe, nicht überknorpelte Grube (Fossa poplitea s. intercondyloidea) getrennt. An der äusseren Seite jedes Condylus bemerkt man einen flachen, rauhen Hügel (Tuberositas condyli) für den Ursprung der Seitenbänder.

Am weiblichen Schenkelbeine ist der Hals länger, und mehr wagrecht, und der Längenunterschied beider Condyli am unteren Ende ist bedeutender. Da das Oberschenkelbein nicht vertical, und mit seinem Gespan nicht parallel zum Knie herabläust, sondern mit ihm convergirt, so werden die unteren Enden der Condyli, ungeachtet ihrer verschiedenen Länge, doch so ziemlich in einer horizontalen Ebene liegen. Die Richtung beider Schenkelbeine bildet mit der Verbindungslinie beider Pfannen ein Dreieck, dessen Basis beim Weibe, wegen grösserer Pfannendistanz, breiter ist. Bei alten Individuen verlängert sich häufig die Markhöhle des Mittelstücks bis in den Schenkelhals, und bedingt dadurch die Häufigkeit der Schenkelhalsbrüche im höheren Alter. Die Spitze des grossen Trochanters liegt mit dem Mittelpunkte des Schenkelkopfes in derselben Höhe. Eine die Mittelpunkte beider Schenkelköpfe verbindende Linie, ist die Axe für Beuge- und Streckbewegung des Stammes auf den Stützen der Beine. Der Schwerpunkt des menschlichen Körpers liegt, beim Erwachsenen, beiläufig 31/4 Par. Zoll über der Mitte dieser Axe. - Nur beim Menschen und einigen Affen ist das Schenkelbein länger als das Schienbein. Barthez untersuchte einen jungen Menschen, dessen rechter Femur viel kurzer, und die Tibia viel länger war, als gewöhnlich. Schenkelbein wird im Wiener anatomischen Museum ausbewahrt. Es misst 26 Zoll 6 Linien. Das dazu gehörige Schienbein hat eine Länge von 21 Zoll 9 Linien, und das Hüstbein (von der Mitte der Crista bis zum Tuber ischii) von 12 Zoll. Das im anat. Museum zu Marburg aufbewahrte Schenkelbein, welches für das grösste galt, misst nur 23 Zoll 31/2 Par. Linien. — Bei angeborener Verrenkung des Hüstgelenks sehlt zuweilen am Schenkelkopse das Grübchen für das runde Band.

§. 140. Hüftgelenk.

Das Hüftgelenk (Articulatio coxae s. femoris) gehört, wie das Knieund Sprunggelenk, zu den stärksten Gelenken des menschlichen Kürpers.

Die Bestimmung der unteren Extremität, als Stütze des Körpers beim aufrechten Gange zu dienen, machte eine grössere Festigkeit des Hüftgelenks, und eine beschränktere Beweglichkeit desselben nothwendig, als am Oberarmgelenk gefunden wurde. Das tiefe Eindringen des Schenkelkopfes in die Pfannenhöhle, bedingt jene Form beschränkter Arthrodie, welche in der Sprache der Techniker Nussgelenk heisst. - Die Tiese der Pfanne wird durch einen faserknorpeligen Ring, der auf dem Supercilium acetabuli fest aufsitzt, und mit scharfem Rande endigt, vergrössert. Dieser Ring (Limbus cartilagineus acetabuli) geht über die Incisura acetabuli brückenartig weg, und verwandelt sie in ein Loch, durch welches Blutgefässe in die Pfannenhöhle dringen. Die Faserkapsel des Gelenks entspringt vom rauhen Umfange des knöchernen Pfannenrandes, schliesst somit den faserknorpeligen Ring noch ein, und befestigt sich nur an der Linea intertrochanterica anterior. Ihre vordere Wand wird durch ein von der Spina anterior inferior ossis ilei entspringendes, ungemein starkes, 4-5 Linien dickes Band verstärkt, welches theils an der Linea intertro-Lehrbuch der Anatomie. 5. Aufl.

chanterica, wie die vordere Kapselwand, endigt, theils mit zwei, um den Hals des Femur herumgebenden, und sich hinten zu einer Schlinge vereinigenden Schenkeln, eine Art Halsband (Zona orbicularis Weberi) bildet, welches nirgends an den Hals adhärirt. Die Zona beschränkt die Streckung des Schenkels, ohne seine Beugung oder Axendrehung zu hem-Die Synovialkapsel überzieht die sibrose Kapsel, den Limbus cartilagineus, und den Hals des Schenkelbeins; die Reibstächen der Gelenkknorpel erhalten von ihr keinen Ueberzug. In der Höhle des Gelenks liegt das runde Band des Schenkelkopfes (Ligamentum teres), welches an der Incisura acetabuli entspringt, und, bei richtiger Neigung des Beckens, senkrecht zur Grube des Schenkelkopfes außteigt. Es beschränkt dieses Band die Zuziehung des Schenkels, und schreibt zugleich den durch die Incisura acetabuli eindringenden Blutgestssen den Weg vor, den sie zum Oberschenkelkopfe zu nehmen haben. Da das Band, wenn es in die Höhle des Gelenkes vorragen würde, durch Reibung viel zu leiden hätte, so ist die knorpellose Fovea acetabuli zu seiner Aufnahme bereit gehalten. Es ist keine vollkommene Verrenkung des Hüftgelenks ohne Zerreissung dieses Bandes denkbar.

Wodurch wird der Schenkelkopf in der Pfanne gehalten? - Die Lösung dieser Frage, die wir den geistreichen Untersuchungen der Gebruder Weber verdanken (Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Göttingen, 1836. 8.). führte zu dem überraschenden Resultate, dass das Zusammenhalten der Knochen im Hüftgelenke, nur vom Druck der Atmosphäre abhängt, eine Wahrheit, die für alle übrigen Gelenke in gleicher Weise gilt. - Bei den Nussgelenken, die der Mechaniker baut, hat die Pfanne, wenigstens in einem ihrer Bögen. mehr als 180°, umfasst somit den Kopf, und lässt ihn nicht heraus. menschliche Hüftpfanne hält in keinem ihrer Bögen mehr als 180°. Limbus cartilagineus geht wohl über den grössten Kreis des Kopfes hinaus. kann ihn aber nicht tragen, da er durch die Reibung bald abgenützt und unbrauchbar gemacht wurde, eine Last von circa 20 Pfunden (Gewicht der ganzen unteren Extremität mit ihren Weichtheilen) zu tragen. Die Kapsel und die Zona orbicularis können am Cadaver zerschnitten werden, ohne dass der Kopf aus der Pfanne weicht, und nützen in dieser Beziehung so wenig, wie der knöcherne und der knorpelige Pfannenrand. Um die Krast des Lustdrucks bei der Fixirung des Schenkelkopfes in der Pfanne einzusehen, denke man sich einen hohlen Cylinder, der oben, wie die Pfannenhöhle, blind abgeschlossen ist. In die untere Oeffnung des Cylinders passe der Schenkelkopf genau ein, und verschliesse sie luftdicht. Denkt man sich nun, dass die Luft im Cylinder verdünnt wird, so muss der Schenkelkopf durch den äusseren Lustdruck aufsteigen, und ist der Cylinder ganz luftleer geworden, so wird der Schenkelkopf am pfannenähnlichen blinden Ende desselben anstehen. Das Stück des Cylinders, welches der Schenkelkopf während seines Außteigens durchlausen hat, kann man nun wegnehmen, und durch einen saserknorpeligen Ring ersetzen, der sich um den Kopf des Schenkelbeins anlegt. Bei jedem Versuch, den Schenkel aus der Pfanne zu ziehen, und dadurch in der Pfanne einen lustleeren Raum zu bilden, wird der aussere Lustdruck den faserknorpeligen Ring, wie ein Ventil, um den Kopf herum andrucken, und sein Bohrt man in den Pfannengrund vom Becken aus Heraussinken verhüten. ein Loch, so hält die einströmende Luft dem äusseren Luftdrucke das Gleichgewicht, der Schenkel wird nicht mehr durch den Lustdruck balancirt, sondern tritt, seiner Schwere folgend, so weit heraus, bis er vom Limbus cartilagineus getragen wird. Zerschneidet man diesen, so fällt er ganz heraus. Wird der Schenkel in die Pfanne zurückgebracht, und das Bohrloch hieraut mit dem Finger zugehalten, so balancirt er wieder, wie früher, und stürzt nach Entfernung des Fingers neuerdings herab. Da die Grösse der Krast, mit welcher der Lustdruck auf das Hüstgelenk wirkt, gleich ist dem Gewichte einer Quecksilbersäule von der Höhe des Barometerstandes und dem Umsange des Pfannenrandes, so lässt sich diese Grösse leicht berechnen, und wird dem Gewichte der unteren Extremität gleich gesunden.

Da dem Gesagten zufolge, der Schenkel im Pfannengelenk äquilibrirt ist, so schwingt er bei seinen Bewegungen wie ein Pendel ohne Reibung, und die Gesetze der Pendelschwingungen finden auf die Bewegungen des Schenkels volle Anwendung. Sie erklären uns, warum die Schritte desselben Menschen gleich lang sind, warum kleine Menschen kurze, und grosse Menschen lange Schritte machen, warum die Bewegungen kleiner Menschen schnell und hurtig, jene grosser Menschen gravitätisch und langsam sind, warum ein kleiner und grosser Mensch Arm in Arm ner schwer zusammengehen, und bald aus dem Schritt fallen, warum man im Militär die grossen Leute in eigene Compagnien, und die grössten davon in eine Reihe stellt, u. v. a.

§. 141. Knochen des Unterschenkels.

Der Unterschenkel wird durch zwei langrührige Knochen: das Schienund Wadenbein, gebildet, welchen ein kurzer und dicker Knochen: die Kniescheibe, als Zugabe beigesellt ist.

A. Das Schienbein, Tibia, Canna major, ist der grössere von beiden, und nächst dem Schenkelbein der grösste Röhrenknochen. Gestalt gleicht einer Schalmeie, deren Mundstück der Knöchel vorstellt, daher der lateinische Name Tibia). Es bildet die eigentliche knöcherne Stütze des Unterschenkels, und übertrifft das an seiner ausseren Seite liegende Wadenbein viermal an Masse und Gewicht. Sein Mittelstück ist eine scharf zugeschnittene dreiseitige Säule. Die vordere Kante ist besonders schneidend, und heisst deshalb Schienbeinkamm - Crista tibiae. Sie ist am lebenden Menschen durch die Haut hindurch zu fühlen. scharf ist die aussere, und am stumpfsten die innere Kante. Die hintere Fläche ist eben, und zeigt in ihrem obersten Theile eine rauhe, schief von aussen und oben, nach innen und unten laufende Linie (Linea poplitea), als Insertionsstelle des gleichnamigen Muskels. Neben dem unteren Ende dieser Linie liegt, der äusseren Kante zu, das grösste aller Ernährungslöcher, welches schief abwärts in den Knochen dringt. Die äussere Fläche ist der Länge nach concav, die innere etwas convex, und nur durch die Haut bedeckt, somit leicht zu fühlen. Das obere Ende ist der dickste Theil des Knochens, und breitet sich wie ein Säulenknauf in die zwei seitlich vorspringenden Schienbeinknorren (Condyli tibiae) aus. welche an ihrer oberen Fläche nur sehr wenig vertieste Gelenkslächen besitzen. Die Gelenksläche des inneren Condylus ist etwas tieser ausgehöhlt. und liegt zugleich etwas höher, als die äussere. Zwischen beiden Gelenkflächen liegt eine in zwei stumpfe Spitzen getheilte Erhabenheit (Eminentie s. Acclivitas intercondyloidea), welche vor und hinter sich rauhe Stellen für die Anhestung der Kreuzbänder des Kniegelenks liegen hat. Condylus ist mit einem breiten porüsen Rande umgeben. Unter der vorderen Verbindungsstelle beider Ränder, bemerkt man den Schienbeinstachel (Spina, besser Tuberositas tibiae) als Anfangspunkt der vorderen Am Umsange des äusseren Condylus sieht man nach hinten eine rundliche, kleine, schräg nach abwärts sehende Gelenksläche, für das Köpfchen des Wadenbeins. Das untere Ende hat eine viereckige, von vorn nach hinten concave Gelenksläche, welche nach innen durch einen kurzen, aber breiten und starken Fortsatz - innerer Knöchel, Malleolus internus - begrenzt wird, dessen ebene Gelenksläche mit der ersteren fast einen rechten Winkel bildet. Am hinteren Theile des inneren Knöchels, verläust eine Furche sur die Sehne des hinteren Schienbeinmuskels. Dem inneren Knöchel gegenüber, zeigt das untere Ende an seiner äusseren Gegend einen zur Aufnahme des Wadenbeinendes dienenden Ausschnitt, Incisura peronea. - Das Schienbein ist fast vollkommen gerade, und nimmt nur bei Individuen, die in ihrer Jugend Anlage zur Rhachitis hatten, eine leise Biegung an, ohne gerade auffallend verkrümmt zu sein. Die vordere Kante ist jedoch, selbst bei vollkommen gut gebauten Füssen, an der oberen Hälste nach innen, an der unteren nach aussen gebogen, also schwach S- oder wellenformig gekrummt.

- B. Das Wadenbein, Fibula, Perone, Canna minor, ist der viel schlankere Nebenknochen des Schienbeins, der mit diesem gleiche Länge hat, aber etwas tieser steht, so dass sein oberes Ende oder Köpschen (Capitulum) an die untere kleine Gelenksläche des Condylus externus tibiae, nicht aber an den Oberschenkelknochen anstösst, und sein unteres Ende, welches den äusseren Knöchel (Malleolus externus) bildet, weiter herabreicht, als der Malleolus internus. Die dem Schienbeine zugekehrte innere Fläche des äusseren Knöchels ist überknorpelt, und steht mit der entgegensehenden Fläche des inneren Knöchels parallel, also senkrecht, wodurch eine tief einspringende Gelenkhöhle sür den ersten Fusswurzelknochen (Sprungbein) zu Stande kommt. An seinem hinteren Rande hemerkt man die zuweilen sehr seichte Furche sür die Sehnen des langen und kurzen Wadenbeinmuskels. Das Mittelstück ist ein unregelmässig vierkantiger Schast, dessen vordere Kante die schärfste ist, und Crista sibulae heisst.
- C. Die Kniescheibe, Patella (Rotula, Mola, Scutum genu, Os thyreoides, Epigonis), ist, ihres Verhältnisses zur Strecksehne des Unterschenkels wegen, ein wahres Sesambein, le grand os sesamoide de la jambe von Bertin. Ihre bei beiden Geschlechtern, und bei Individuen eines Geschlechtes, bemerkbare Verschiedenheit an Grösse und Stärke, hängt von der Intensität der Wirkung der Unterschenkelstrecker ab. (Bei Ajax Telamonius lässt sie Pausanias handgross sein!) Sie hält ganz gut den Vergleich mit dem Olekranon der Ulna aus, da sie, wie dieses, den Streck-

sehnen zur Anhestung dient. Wie das Olekranon in dem Einschnitte der Trochlea des Oberarms beim Strecken und Beugen des Vorderarms auf und nieder gelit, eben so gleitet die Kniescheibe in der Vertiefung zwischen beiden Condyli femoris beim Strecken und Beugen des Unterschenkels auf Sie ist ein herz- oder kastaniensormiger flacher Knochen, mit einer oberen Basis, und unteren Spitze, welche durch ein sehr starkes Band (Ligamentum patellae proprium) mit der Spina tibiae zusammenhängt. Ihre vordere Fläche ist convex und rauh, ihre hintere besteht aus zwei unter einem sehr stumpfen Winkel zusammenstossenden, sehr wenig concaven Gelenkstächen, einer äusseren grösseren, die dem Condulus externus, und einer inneren kleineren, die dem Condylus internus zugewendet ist. - Das Schien- und Wadenbein werden oben durch die sehr straffe Articulatio tibio-fibularis, ihrer Länge nach durch die Membrana interessea, und unten durch die sesten vorderen und hinteren Knöchelbänder, welche vom Malleolus externus quer zum vorderen und hinteren Ende der Incisura fibularis des Schienbeins laufen, verbunden, und können ihre wechselseitige Lage kaum ändern.

§. 142. Kniegelenk.

Das Kniegelenk (Articulatio genu) ist vorwaltend ein Winkelgelenk, erlaubt aber dem Unterschenkel, nebst der Beugung und Streckung, im gebeugten Zustande noch eine Axendrehung (Pronation und Supination). welche bei gestrecktem Knie nicht möglich ist. Es ist somit wie das Ellbogengelenk ein Trocho-ginglymus. Im Ellbogengelenk war die Winkelbewegung und die Drehung auf verschiedene Knochen vertheilt, - im Kniegelenk, wo von den Knochen des Unterschenkels nur das Schienbein als theilnehmender Knochen austritt, muss durch eine besondere Modification der Bänder, die Coëxistenz dieser beiden, sonst einander ausschliessenden Bewegungsarten, an Einem Knochen möglich gemacht werden. bogengelenke wurde das Maximum der Beugung und Streckung durch das Stemmen des Processus coronoideus, und des Olekranons der Ulna, in den Gruben des Oberarms, bestimmt, - im Kniegelenke sehlen am Schienbein solche stemmende Fortsätze, und doch kann man den Unterschenkel nicht auf mehr als 180° strecken, und nur mit Mühe bis zum Oberschenkel Die Ursache dieser Beschränkung liegt ebenfalls im Bandmechanismus, der an diesem Gelenke eine Complicirtheit besitzt, wie sie bei keinem anderen Gelenke vorkommt.

Der Bandapparat des Kniegelenks besteht aus folgenden Einzelnheiten:
1. Die zwei halbmondförmigen Zwischenknorpel, Fibrocartilagines interarticulares (auch semilunares, falcatae, lunatae, meniscoideae). Die stark convexe Krümmung der beiden Condyli femoris würde die flachen Gelenkstellen der Condyli tibiae nur an einem Punkte berühren, wenn nicht, durch die Einschaltung der Zwischenknorpel, der zwischen den

Condyli femoris und tibiae übrig bleibende Raum ausgefüllt, und die Berührungssläche beider dadurch vergrössert würde. Jeder Zwischenknorpel hat die Gestalt eines C, oder Halbmondes, dessen convexer und dicker Rand gegen die fibröse Kapsel, dessen concaver schneidender Rand gegen den Berührungspunkt der Condyli sieht. Beide sind nicht gleich gross. innere ist weniger gekrummt, und am convexen Rande, der mit der fibrösen Kapsel verwachsen ist, höher, somit weniger beweglich, als der aussere, der eine schärfere Krümmung hat, niedriger ist, und, da er mit der Kapsel nicht verwächst, eine grössere Verschiebbarkeit besitzt. Die vorderen Enden beider, sind in der Grube vor der Eminentia intercondyloides des Schienbeins, die hinteren Enden hinter dieser Erhabenheit durch kurze Bandsasern besestigt. Sie vertiesen die seichten Gelenkslächen der Schienbeinknorren, und adaptiren sie der Convexität der Schenkelbeinknorren, sie vergrössern die Contactslächen des Gelenks, und verhüten dadurch die gewisse Abnützung der sich reibenden Condyli, und vermehren ihre Stabilität. - sie dämpfen als elastische Zwischenpolster die Gewalt der Stosse. die das Gelenk beim Sprunge auszuhalten hat, und verhindern, da sie den lustleeren Raum des Gelenks aussüllen, eine durch den ausseren Lustdruck möglicher Weise zu bewirkende Einklemmung der Kapsel zwischen den auf einander rollenden Condyli femoris et tibiae.

- 2. Die zwei Kreuzbänder, Ligamenta cruciata, liegen in der Gelenkhöhle, entspringen an den einander zugekehrten rauhen Flächen der Condyli femoris, und inseriren sich in den Gruben vor und hinter der Eminentia intercondyloidea tibiae. Das vordere Kreuzband geht vom Condylus externus femoris zur vorderen, das hintere Kreuzband vom Condylus internus zur hinteren Grube. Sie kreuzen sich somit wie die Schenkel eines X. Beide Kreuzbänder sind sehr fest und stark, und functioniren als die (das Olekranon und den Processus coronoideus vertretenden) Hemmungsmittel der Beugung und Streckung des Kniegelenks.
- 3. Die zwei Seitenbänder, Ligamenta lateralia, liegen ausser der Kapsel. Das äussere Seitenband entspringt von der Tuberositas des äusseren Schenkelknorrens, ist rundlich, und besestigt sich am Köpschen des Wadenbeins. Das innere entspringt an derselben Stelle des inneren Schenkelknorrens, ist breiter, länger und stärker, als das äussere, und setzt sich am inneren Condylus, und am oberen Ende der inneren Kante des Schienbeins sest. Wären beide Condyli semoris Walzenstücke mit cylindrischer Oberstäche, deren Axe durch die Ursprungsstellen beider Seitenbänder geht, so würden diese Bänder bei gebogenem und gestrecktem Zustande des Gelenks dieselbe Spannung haben, und die Axendrehung des Unterschenkels nicht gestatten. Da aber die von vorn nach hinten gezogene Begrenzungslinie der Schenkelknorren kein Kreisbogen, sondern ein Stück einer Ellipse (eigentlich einer Spirale, Weber) ist, so wird, wenn diese Ellipse sich auf den Schienbeinpsannen dreht, ihr Mittelpunkt (Tuberositas condyli, Ursprung des Seitenbandes) bei gestrecktem Knie höher als bei

gebeugtem Knie zu stehen kommen, und dadurch das Seitenband nur bei gestrecktem Knie angespannt, bei gebogenem dagegen relaxirt sein müssen, wodurch, im letzteren Falle, ein Drehen des Schienbeins um seine Axe möglich wird.

- 4. Die fibrose Gelenkkapsel bildet einen dünnen und weiten Sack (um die Drehung des Unterschenkels nicht zu hindern), der von der Peripherie des unteren Endes des Oberschenkelbeins entspringt, und an dem rauhen Umfange beider Schienbeinknorren endigt. An ihrer vorderen, sehr weiten Wand, hat sie eine Oeffnung, welche die hintere überknorpelte Fläche der Kniescheibe aufnimmt, und durch sie geschlossen wird. Sie ist so dunn. dass man sie für eine blosse Fortsetzung der Beinhaut des Oberschenkels zur Tibia angesehen hat. Nur an der hinteren und äusseren Wand erhält sie stärkere Sehnenstreisen eingewebt. Der Sehnenstreifen der hinteren Wand - Kniekehlenband, Ligamentum popliteum - entsteht vom Condulus externus femoris, und endigt unter dem Condylus internus tibiae. Er bängt auf eine in der Muskellehre zu erwähnende Weise mit den Sehnen des Musculus semimembranosus, und dem äusseren Ursprungskopfe des Gastrocnemius zusammen, wird durch die Thätigkeit dieser Muskeln, beim Beugen des Knies (zugleich mit der hinteren Kapselwand), nach hinten gezogen, und entrückt dadurch die Kapselwand einer möglichen Einklemmung. Der Sehnenstreisen der äusseren Wand ist viel dünner, entspringt am Kopfe des Wadenbeins, und verliert sich aufwärtssteigend in der ausseren Kapselwand. Er wurde von Mehreren Ligamentum laterale externum breve genannt.
- 5. Die Synovialkapsel ist mit der inneren Fläche der sibrösen Kapsel untrennbar verwachsen. Zu beiden Seiten der Kniescheibe bildet sie zwei, in die Höhle des Gelenks hineinragende, mit Fett reichlich gefüllte Falten Flügelbänder, Ligamenta alaria welche von der Basis der Kniescheibe, zu den vorderen Enden der Zwischenknorpel herablausen, sich hier mit einander verbinden, und in das unpaarige Schleimband (Ligamentum mucosum) übergehen, welches sich in der Fossa intercondyloidea des Oberschenkels setsetzt. Ich habe bewiesen, dass durch diese beiden Flügelbänder die Kniegelenkhöhle in drei vollkommen unabhängige Gelenkräume getheilt wird, deren mittlerer dem Kniescheibengelenke angehört. Sie sunctioniren sür dieses Gelenk als Ventile, welche selbst bei seitlicher Erössnung der Kniegelenkkapsel, das Kniescheibengelenk dem Einslusse des Lustdruckes unterordnen, und eine Entsernung der Kniescheibe von der Furche, in welcher sie gleitet, nicht zulassen.

Durch Versuche am Cadaver lassen sich folgende, in der Eigenthümlichkeit der Kniegelenkbänder gegründete Sätze beweisen:

a) Die fibröse Kapsel ist kein Befestigungsmittel der Knochen des Kniegelenks. Schneidet man an einem präparirten Kniegelenke die Seitenbänder entzwei, und trennt man durch eine dünne, am Seitenrande der Kniescheibe in die Kapsel eingestochene Messerklinge, die Kreuzbänder, wodurch also die Kapsel, ausser der kleinen Stichöffnung, ganz bleibt, so hat man die Festigkeit des Gelenks im gebogenen und gestreckten Zustande total vernichtet. Der Unterschenkel entfernt sich vom Oberschenkel, so weit es die Schlassheit der Kapsel gestattet. — Hat man an einem anderen Exemplare die Kapsel ganz entsernt, die Seiten- und Kreuzbänder aber geschont, so wird die Festigkeit des Gelenks im gebogenen und gestreckten Zustande dieselbe, wie bei unversehrter Kapsel, sein.

- b) Die Seitenbänder bedingen im gestreckten, aber nicht im gebogenen Zustande die Festigkeit des Kniegelenks. Trennt man wie in a) die Kreuzbänder, mit Schonung der Seitenbänder, so bemerkt man im gestreckten Knie keine Verminderung seiner Festigkeit. Je mehr man es aber beugt, desto mehr beginnt es zu schlottern, der Unterschenkel entfernt sich vom Oberschenkel, und kann um sich selbst gedreht werden. Da das innere Seitenband breiter und stärker gespannt ist als das äussere, so wird, bei der Drehung des Unterschenkels, nur der äussere Schienbeinknorren einen Kreisbogen beschreiben, dessen Centrum der innere Knorren bildet, der nicht von seinem Platze weicht.
- c) Die Kreuzbänder bedingen im gebogenen, aber nicht im gestreckten Zustande, die Festigkeit des Kniegelenks. Werden die Seitenbänder zerschnitten, die Kreuzbänder aber nicht, so klappert das Kniegelenk, wenn es gestreckt wird, und der Unterschenkel dreht sich, wegen Tendenz der Kreuzbänder parallel zu werden, um fast 90° nach aussen. (Nach innen kann er sich nicht drehen, da hiebei die Kreuzbänder sich schraubenförmig um einander winden müssten.) Im stark gebogenen Zustande des Gelenks, hat sich seine Straffheit nicht geändert. Das hintere Kreuzband ist zugleich das wichtigste Hemmungsmittel der Streckung des Unterschenkels, welcher, wenn jenes zerschnitten wird, sich auf mehr als 180° strecken lässt.
- d) Die Synovialkapsel erzeugt, nebst den oben erwähnten Einstülpungen, eine gewisse Anzahl Ausstülpungen. Man bohre in die Kniescheibe ein Loch, und fülle durch dieses die Kniegelenkhöhle mit erstarrender Masse. Es werden sich dadurch drei beutelförmige Ausstülpungen der Synovialkapsel austreiben, welche sind: α) eine obere, unter der Sehne des Unterschenkelstreckers liegende, β) eine seitliche, welche sich unter der Sehne des Musculus popliteus nach aussen wendet, und zuweilen mit der Synovialkapsel des Wadenbein-Schienbeingelenks communicit, so dass diese als eine Verlängerung des Kniegelenk-Synovialsacks erscheint, γ) eine zweite seitliche, die sich zwischen die Sehne des Musculus popliteus, und das äussere Seitenband, einschiebt. Nach Gruber's fleissigen und genauen Untersuchungen (Prager med. Vierteljahrschrift. II. Bd. 1. Heft), kommt die offene Communication der Synovialkapsel des Kniegelenks mit jener des Wadenbein-Schienbeingelenks unter 160 Fällen nur 11 Mal vor.

Ueber die Mechanik des Kniegelenks handelt ausstthrlich H. Meyer, in Müller's Archiv. 1853. pag. 497.

§. 143. Knochen des Fusses.

Die Knochen des Fusses (Ossa pedis) werden, entsprechend den Knochen der Hand, in die Knochen der Fusswurzel, des Mittelfusses, und der Zehen eingetheilt.

A) Erste Abtheilung. Knochen der Fusswurzel.

Die Fusswurzel (Tarsus) besteht aus sieben kurzen und dicken Knochen (Ossa tarsi), welche aber nicht mehr in zwei transversale Reihen,

wie die Handwurzelknochen, geordnet sind, sondern theils über, theils der Länge und Quere nach neben einander zu liegen kommen.

- 1. Das Sprungbein, Talus, Astragalus (Synon.: Os tesserae s. balistae), hat seinen griechischen Namen von seiner Gestalt (ἀστράγαλος, lat. talus, ein Würfel - ἀστραγαλίζειν, mit Würfeln spielen, bei Homer). und ist der einzige Fusswurzelknochen, der mit dem Unterschenkel articulirt. Er nimmt unter allen die höchste Lage ein, und wird in den Körper, Hals, und Kopf eingetheilt. Der Körper ist ein viereckiges Knochenstück, welches in die Vertiefung zwischen beiden Knücheln hineinpasst. Die obere Fläche ist von vorn nach rückwärts convex, von einer Seite zur anderen mässig concav. Sie ist überknorpelt, und geht unter rechten Winkeln in die seitlichen Gelenkstächen über, von welchen die äussere länger, und in senkrechter und querer Richtung concav erscheint, die innere aber kurzer ist, wie es die ungleiche Länge der beiden Malleoli, mit welchen sie in Verbindung kommen, erfordert. Die untere Gelenkfläche ist concav, schräge, von innen nach aussen und vorn laufend, und zur Verbindung mit dem darunter liegenden Fersenbeine bestimmt. Die vordere Fläche verlängert sich zum kurzen, aber dicken, etwas nach innen gerichteten Halse des Sprungbeins, welcher den Kopf trägt, dessen vordere Gegend mit einer schief nach abwärts gerichteten convexen Gelenksläche versehen ist, welche sich in eine kleinere, an der unteren Seite des Halses, fortsetzt. Zwischen dieser Gelenksläche und der unteren des Körpers läuft eine tiefe rauhe Rinne - Sulcus tali.
- 2. Das Fersenbein, Calcaneus, Calcar pedis, ist der grösste Fusswurzelknochen, liegt unter dem Sprungbein, reicht nach vorn eben so weit wie dieses, überragt es aber rückwärts beträchtlich, wodurch der Fersenvorsprung — die Hacke, Calx — entsteht. Es ist länglich viereckig, wird von vorn nach rückwärts dicker, und endigt mit dem Fersenhöcker — Tuberositas calcanei. An seiner oberen Fläche sieht man in der Mitte die längliche, convexe, etwas schief gerichtete Gelenksläche für den Körper des Sprungbeins. Vor ihr liegt eine rauhe Furche (Sulcus calcanei), die mit der ähnlichen, an der unteren Gegend des Sprungbeins, den Sinus tarsi bildet. Jenseits dieser Furche überragt ein kurzer, aber starker, nach innen gerichteter Fortsatz (Processus lateralis s. Sustentaculum) die innere Fläche des Knochens, bildet mit dieser eine Art Hohlkehle, und ist an seiner oberen Seite überknorpelt, um mit der Gelenkstäche an der unteren Seite des Sprungbeinhalses zu articuliren. Am vorderen inneren Winkel der oberen Fläche liegt zuweilen noch eine kleine Gelenksläche, die einen Theil der unteren Peripherie des Sprungbeinkopses stützt, und entweder vollkommen isolirt ist, oder mit der Gelenksläche des Sustentaculums zusammenfliesst. Camper's Vermuthung, dass diese Verschmelzung bei Frauenzimmern vorkomme, die Stöckelschuhe mit hohen Absätzen trugen, wird dadurch widerlegt, dass die Vereinigung auch heut zu Tage. wo die Fussbekleidung der Damen eine zweckmässigere ist, nicht selten ist, und

auch an ägyptischen Mumien so gut wie bei Europäern, an einem oder an beiden Füssen, vorkommt. Die vordere Fläche ist die kleinste, unregelmässig viereckig, und ganz überknorpelt, zur Verbindung mit dem Würfelbein. Die äussere und hintere Seite sind wie die untere rauh, letztere hat einen vorderen niedrigen, und einen starken hinteren, zweiknorrigen Höcker.

- 3. Das Kahnbein, Os scaphoideum s. naviculare, liegt zwischen dem Kopfe des Sprungbeins und den drei Keilbeinen, am inneren Fussrande. Seine hintere Fläche ist tief gehühlt, für das Caput tali, seine vordere convexe Fläche hat drei ziemlich ebene Facetten, für die Anlagerung der Keilbeine; die convexe Dorsal- und die Plantarsläche sind rauh, und am inneren Rande der letzteren ragt die stumpse Tuberositas ossis navicularis hervor, hinter welcher eine Rinne (Sulcus ossis navicularis) verläust.
- 4. 5. 6. Die drei Keilbeine, Ossa cuneiformia, liegen vor dem Kahnbein, an dessen drei Facetten sie stossen, und werden vom inneren Fussrande nach aussen gezählt. Das erste oder innere Keilbein ist das grösste. Die stumpse Schneide des Keils liegt am Rücken des Fusses, somit die rauhe Basis an der Plantarsläche. Die innere Fläche ist convex und rauh, die äussere concav, und gegen den oberen Rand mit einer schmalen, zungenförmigen Gelenksläche (eine Fortsetzung der hinteren). zur Anlagerung des zweiten Keilbeins, versehen. Die vordere überknorpelte Fläche ist bohnenförmig, mit nach innen gerichteter Convexität, und verbindet sich mit dem Mittelsussknochen der grossen Zehe. - Das zweite oder mittlere Keilbein ist das kleinste, kehrt seine Schneide nach der Plantarfläche, somit seine Basis nach oben. Es stösst hinten an die mittlere Facette des Kahnbeins, und vorn an den Mittelfussknochen der zweiten Zehe. Die Seitenflächen sind theils rauh, theils mit Knorpeln geglättet. - Das dritte oder äussere Keilbein, der Grösse nach das mittlere, gleicht an Gestalt und Lage dem zweiten, grenzt hinten an die dritte Facette des Kahnbeins, vorn an den Mittelfussknochen der dritten Zehe, innen an das zweite Keilbein, und aussen an das Würfelbein.
- 7. Das Würfelbein, Os cuboideum, liegt am äusseren Fussrande vor dem Fersenbein. Seine obere Fläche ist rauh, die untere mit einer von aussen nach innen und etwas nach vorn gerichteten Rinne versehen, hinter welcher ein glattrandriger Wall sich hinzieht Sulcus et Tuberositas ossis cuboidei. Die innere Fläche besitzt eine ebene Gelenkstäche für das dritte Keilbein, und zuweilen hinter dieser eine kleinere, sür eine zusällige vierte Facette des Kahnbeins; die äussere Fläche ist die kleinste, die vordere stösst an den vierten und sünsten Mittelfussknochen.

Man kann die Fusswurzel nach Rosenmüller in zwei Längenreihen, oder nach Meckel in drei Querreihen abtheilen. Rosenmüller's Längenreihen sind eine aussere tiefer liegende, und eine innere höhere. Die aussere besteht aus dem Fersen- und Würfelbein, die innere aus dem

Sprung- und Kahnbein, und den drei Keilbeinen. Die innere Reihe stützt sich zum Theil auf der äusseren. — Die drei Querreihen Meckel's bestehen: die erste aus dem über einander liegenden Sprung- und Fersenbein, die zweite aus dem neben einander liegenden Kahn- und Würfelbein, die dritte aus den drei Keilbeinen. Krause zählt nur zwei Reihen, und lässt die hintere aus dem Sprung-, Fersen- und Kahnbein, die vordere aus den drei Keilbeinen und dem Würfelbeine bestehen.

B) Zweite Abtheilung. Knochen des Mittelfusses.

Die funf Mittelfussknochen (Ossa metatarsi) liegen in einer von aussen nach innen convexen Ebene neben einander. Sie sind kurze Röhrenknochen, der Länge nach ein wenig aufwärts convex gekrümmt, mit einem Mittelstück, hinterem dicken, und vorderem kugelig-convexen Ende. Das Mittelstück ist dreiseitig, mit kleiner Dorsalstäche und breiteren Seitenflächen. Der schärste Rand ist concav, und sieht gegen die Plantarsläche des Fusses. Das hintere dicke Ende (Basis) ist durch eine ebene Gelenksläche senkrecht abgeschnitten, und besitzt an den drei mittleren Mittelfussknochen noch kleine, seitliche, überknorpelte Stellen, zur wechselseitigen Verbindung. — Das vordere, kopfformige Ende (Capitulum) ist mit seitlichen Grübchen, für Bandinsertionen, versehen. Sie werden, wie die Keilbeine, vom inneren Fussrande nach aussen gezählt. - Der erste Mittelfussknochen, der grossen Zehe angehörig, Os metatarsi hallucis s. primum, unterscheidet sich von den übrigen durch seine Kürze und Stärke. Er liegt nicht, wie die übrigen, mit dorsaler Fläche und unterer Kante, sondern umgekehrt, wie um seine Axe gedreht, so dass eine Fläche nach unten, eine Kante nach oben sieht. Sein Capitulum hat an seiner unteren Gegend einen überknorpelten länglichen Hügel oder Rücken, an dessen Seiten Furchen für die Sesambeine liegen. Der Mittelfussknochen der zweiten Zehe ist der längste, weil das zweite Keilbein, an welches seine Basis stösst, das kurzeste ist. Der Mittelfussknochen der kleinen Zehe ist durch einen Höcker seiner Basis kennbar, welcher am äusseren Fussrande über das Würfelbein hinausragt, und durch die Haut leicht zu fühlen ist.

Die Mittelfussknochen bilden, durch ihre Vereinigung mit der Fusswurzel, einen von vorn nach hinten, und von aussen nach innen convexen Bogen, der beim Stehen nur mit seinem vorderen und hinteren Ende den Boden berührt. Dieser Bogen hat einen äusseren, flachen, und einen inneren, convexeren, zugleich höher liegenden Rand, auf welchen die Körperlast durch das Schienbein stärker, als auf den äusseren drückt. Die Spannung des Bogens ist veränderlich. Er verflacht sich, und breitet sich aus, wenn der Fuss beim Stehen von obenher gedrückt wird, und nimmt seine frühere Convexität wieder an, wenn er gehoben wird. Eine bleibende Flachheit des Bogens bedingt den Plattfuss, der mit seiner ganzen unteren Fläche austritt. Der ganze Bogen kann zur Verlängerung der unteren Extremität benützt werden, wenn man sich durch Strecken der Füsse erhebt (auf die Zehen stellt), wobei der Fuss nur mit den Köpfen der Mittelfussknochen und mit den Zehen den Boden berührt. — Durch die Beweglichkeit der einzelnen Stücke des

Bogens, kann sich der Fuss den Unebenheiten des Bodens besser anpassen, und der Tritt wird sicherer. Die Längenaxe des Fusses, oder die Chorda des Bogens, wirkt beim Strecken des gestemmten Fusses als einarmiger, bei Beug- und Streckbewegungen des gehobenen Fusses als zweiarmiger Hebel, dessen Hypomochlium im Sprunggelenke liegt.

C) Dritte Abtheilung. Knochen der Zehen.

Die Knochen der Zehenglieder (Phalanges digitorum pedis), entsprechen, durch Zahl, Form und Verbindung, jenen der Finger. Sie sind kürzer und rundlicher als diese, — die dritten Phalanges häufig verkrüppelt, die zweiten mehr viereckig als oblong, und öfters an der kleinen Zehe mit der dritten Phalanx verwachsen. Die zwei Phalanges der grossen Zehe (die mittlere fehlt wie am Daumen) zeichnen sich durch ihre Breite und Stärke vor den übrigen aus. Es wurde hier von allen Anatomen übersehen, dass die letzten Phalangen der Zehen und Finger sehr oft an ihren Seitenrändern Löcher, und, wenn diese fehlen, entsprechende Ausschnitte besitzen, durch welche die ansehnlichen Zweige der Digitalgefässe und Nerven zum Rücken des Fingers, namentlich zum blut- und nervenreichen Nagelbett verlaufen.

An schön gebildeten Füssen soll die grosse Zehe etwas kürzer als die zweite sein, und die vordere Vereinigungslinie der Zehenspitzen einen Bogen bilden. So ist es wenigstens an den classischen Arbeiten älterer und neuerer Kunst zu sehen, wenn gleich nicht zu läugnen ist, dass, bei der ungleich grösseren Mehrzahl der Füsse, die grosse Zehe absolut die längste ist. Vielleicht hat die Festigkeit der Füssbedeckung, welche das Wachsthum des starken Hallux weniger beschränken wird, als das der nächst folgenden Zehe, hierauf einen Einfluss. Dem Künstler mag es erlaubt sein, die anatomische Richtigkeit der gefälligeren Form zum Opfer zu bringen.

§. 144. Bänder des Fusses.

1. Bänder der Fusswurzel. Der Fuss ist einer dreifachen Bewegung fähig. 1. Die Streckung und Beugung geschieht in verticaler Ebene, 2. die Aus- und Einwärtsbewegung der Fussspitze in horizontaler Ebene (von Weber Rotation, von Krause zweckmässiger Abduction und Adduction genannt), 3. die Supination und Pronation, wodurch der aussere oder innere Fussrand gehoben wird, wird durch Drehung des Fusses um seinen längsten Durchmesser gegeben. Versuchen an Leichen zufolge verhält sich der Umfang dieser drei Bewegungen wie 78°: 20°: 42°. Die erste Bewegung wird durch das Gelenk zwischen dem Sprungbein und dem Unterschenkel vermittelt, und die Drehungsaxe geht horizontal durch beide Knöchel. Die zweite Bewegung tritt in demselben Gelenke auf, indem die innere Gelenksläche des Sprungbeins am inneren Knöchel vor- und rückwärts gleiten kann, und dadurch einen Kreisbogen beschreibt, dessen Centrum im äusseren Knöchel liegt. Die dritte Bewegung leistet das Kugelgelenk zwischen Sprung- und Kahnbein, und das Drehgelenk zwischen Sprung- und Fersenbein. Sie combinirt sich immer mit der zweiten Bewegungsform,

welche an und für sich sehr klein ist, und nur durch gleichzeitiges Eintreten der dritten, im Bogen von 20° ausführbar wird.

Die Bänder der Fusswurzel bedingen a) theils eine Verbindung dieser mit dem Unterschenkel, b) theils eine Vereinigung der einzelnen Fusswurzelknochen unter einander.

a) Die Verbindung der Fusswurzel mit dem Unterschenkel bildet das Fuss- oder Sprunggelenk, Articulatio pedis s. talocruralis. Die beiden vorstehenden Knöchel umfassen den Körper des Sprungbeins gabelartig, und gestatten ihm wohl beim Beugen und Strecken des Fusses in verticaler Ebene sich um seine Queraxe, aber nicht sich um seine Längenaxe zu drehen. Um einen Begriff von der Festigkeit dieses Gelenks zu haben, muss man es im frischen Zustande untersuchen, indem, an gebleichten Knochen, die Knorpelüberzüge der Gelenkflächen so eingetrocknet sind, dass der Talus in der Gabel der Knöchel klappert.

Die Bänder des Sprunggelenks sind, nebst der fibrösen und Synovialkapsel, die die Ränder der beiderseitigen Gelenkstächen umsäumen, die drei äusseren, und das einsache innere Seitenband. Die drei äusseren sind rundlich, strangförmig, entspringen vom Malleolus externus s. fibularis, und lausen in divergenter Richtung, das vordere zur äusseren Fläche des Halses (Ligamentum fibulare tali anticum), das hintere zur hinteren Fläche des Körpers vom Sprungbeine (Ligamentum fibulare tali posticum), während das mittlere zur äusseren Fläche des Fersenbeins herabsteigt (Ligamentum fibulare calcanei). Das innere Seitenband entspringt vom unteren Rande des Malleolus internus s. tibialis, und endigt, sich ausbreitend, an der inneren Fläche des Sprungbeins, und am Sustentaculum des Fersenbeins. Seine Gestalt giebt ihm den Namen Ligamentum deltoides.

b) Die Verbindungen der Fusswurzelknochen unter einander müssen, bei dem Drucke, den der Fuss von obenher auszuhalten hat, überhaupt sehr fest, und an der Sohlenseite fester, als an der Dorsalseite sein. Die einander entgegenschauenden Gelenkslächen je zweier Fusswurzelknochen, werden durch eine sibröse, mit Synovialhaut gesutterte Kapsel, und durch Verstärkungsbänder, zu einer Amphiarthrose vereinigt. welche den Namen von den betreffenden Knochen entlehnt: Articulatio talo-calcanea, calcaneo-cuboidea, talo-navicularis. Die meiste Beweglichkeit besitzt die Articulatio talo-navicularis, weil die Berührungsflächen sphärisch gekrümmt sind, wie es die in diesem Gelenke gestattete Drehbewegung erheischt. Das Kahnbein und die drei Keilbeine sind nicht durch drei besondere, sondern durch eine gemeinschastliche Kapsel mit einander vereinigt. Die Verstärkungsbänder, die den Namen des Gelenks tragen, dem sie angehören (Ligamentum talo-calcaneum, etc.), werden ihrem Vorkommen nach in äussere und innere, - dorsale und plantare eingetheilt. Von diesen verdienen, ihrer Stärke wegen, folgende besondere Erwähnung: 1. das Ligamentum intertarseum, im Sinus tarsi zwischen

Sprung- und Fersenbein angebracht, 2. das Ligamentum calcaneo-cuboideum plantare, vom Höcker des Fersenbeins zur Tuberositas ossis cuboidei gehend, ist eines der stärksten Ligamente des Körpers, und besteht
aus einer oberstächlichen und tiesen Schichte, deren erstere eine Fortsetzung zu den Basen der zwei letzten Mittelsussknochen schickt. 3. Das
Ligamentum calcaneo-naviculare plantare, welches, seiner häusigen Verknorpelung wegen, auch Ligamentum cartilagineum genannt wird, und gar
nicht selten ein Sesambein enthält.

- 2. Bänder des Mittelsusses. Sie sind 1. Kapselbänder, zur Verbindung der einzelnen Mittelsussknochen mit den correspondirenden Flächen der Fusswurzel, wodurch die fünf straffen Articulationes tarsometatarseae entstehen, deren Synovialkapseln sich in die seitlichen Gelenke der Bases ossium metatarsi fortsetzen, 2. Hilfsbänder dieser Gelenke, an der Dorsal- und Plantarseite, 3. Zwischenbänder der Bases, Ligamenta basium transversalia s. interbasica, zwischen je zwei Bases quer ausgespannt, deren es vier dorsalia und drei plantaria giebt (indem zwischen Metatarsus der grossen und der nächstsolgenden Zehe, kein Querband in der Planta vorkommt), 4. Zwischenbänder der Köpschen, Ligamenta capitulorum metatarsi, deren vier in der Planta existiren.
- 3. Bänder der Zehenglieder. Die Verbindungen der Zehenglieder gleichen jenen der Fingerglieder vollkommen. Die Gelenke zwischen den Köpschen der Metatarsusknochen und den ersten Zehengliedern sind ziemlich frei, die Gelenke der Phalanges unter einander aber Winkelgelenke. An allen sinden sich Kapseln, mit einem inneren und äusseren Seitenbande, und einer unteren, stärkeren, wie verknorpelten Wand, in welcher, am ersten Gelenke der grossen Zehe, zwei anschnliche Sesambeine eingewachsen sind, deren dem Gelenke zugekehrte Flächen, in die Rinnen des Metatarsus hallucis (neben dem Längenhügel) einpassen. Am zweiten Gelenke der grossen Zehe sinde tsich ein drittes, so wie zuweilen an der inneren Fläche des ersten Keilbeins, und an der äusseren Ecke der Tuberositas ossis cuboidei, ein viertes und fünstes Os sesamoideum.

§. 145. Allgemeine Bemerkungen über den Fuss.

Die untere Extremität ist nach demselben Typus gebildet wie die obere, deren Abtheilungen sie, mit wenig Verschiedenheiten, wiederholt. Das Gesetz der strahligen Bildung, mit Zunahme der Axenknochen von 1 bis 5, ist in beiden ausgedrückt. Das Hüftbein entspricht der Schulter, und man braucht ein Schulterblatt nur so aufzustellen, dass seine Gelenkfläche nach unten sieht, um die Aehnlichkeit desselben mit dem Darmbeine evident zu machen. Um den Bewegungen der oberen Extremität das möglichst grösste Bereich zu geben, musste das Schulterblatt, welches so vielen Muskeln des Armes zum Ursprunge dient, selbst ein verschiebbarer Knochen

sein. Das Hüftbein dagegen, durch welches der Stamm auf dem Oberschenkelknochen ruht, musste mit der Wirbelsäule in sesterem Zusammenhange stehen. — Das Schenkelbein wiederholt durch seinen Kopf und Hals. durch seine Trochanteres, und seine rollenartig vereinigten Condyli, den Kopf, Hals, die Tubercula, und die Trochlea des Oberarmbeins. - Der Unterschenkel besteht, wie der Vorderarm, aus zwei Röhrenknochen, von denen jedoch nur das Schienbein mit dem Oberschenkel articulirt. Das Wadenbein, welches nicht bis zum Oberschenkel reicht, und somit auch keinen Theil der Körperlast trägt, ist nur der Lage nach, und durch den Malleolus externus (der dem Processus styloideus des Radius entspricht). dem Radius vergleichbar. Genauer genommen, vereinigt das Schienbein die Bildungen der Ulna und des Radius, und zwar ist seine obere Hälfte der Ulna, seine untere dem Radius vergleichbar. Man setze die obere Hälfte einer Ulna mit der unteren Hälfte eines Radius zusammen, und man wird einen Knochen erhalten, der dem Schienbein viel ähnlicher ist als eine ganze Ulna. Denkt man sich noch die Kniescheibe mit ihrer Spitze an die Tibia angewachsen, so springt die Aehnlichkeit noch mehr in die Augen. Die Kniescheibe ist das selbstständig gewordene Olekranon des Unterschenkels. Beide entwickeln sich aus besonderen Ossificationspunkten, und dienen den Streckern zur Insertion. Der Ossisicationspunkt des Olekranons verschmilzt mit dem Körper der Ulna; es wurden jedoch von mir und de la Chenal Fälle beschrieben, wo das Olekranon einen substantiven, nicht mit der Ulna verschmolzenen Knochen darstellte, was bei mehreren Gattungen der Fledermäuse als Norm erscheint. Auch führt das Schienbein allein die Winkel- und Drehbewegungen aus, in welche am Vorderarm sich Ulna und Radius theilten. - Der Fuss besteht, wenn man das Erbsenbein der Handwurzel nicht zum Carpus zählt, der Zahl nach aus ebensoviel Knochen, wie die Hand. Jedoch ist die Zusammensetzung der Fusswurzel durchaus verschieden von jener der Handwurzel. Das Sprungbein ist durch seine Einlenkung am Unterschenkel den drei ersten Handwurzelknochen analog, allein die übrigen Tarsusknochen bieten gar keine Vergleichungspunkte mit den Handwurzelknochen dar. - Da der Fuss ein Piedestal für die knöchernen Säulen der Beine bilden soll, so waren Festigkeit und Grösse unerlässliche Bedingungen. Diesen beiden Bedingungen entspricht der Fuss 1. durch seine bogenformige Gestalt, die durch die Stärke der Plattfussbänder, auch bei der grössten Belastung des Körpers, aufrecht erhalten wird, und 2. durch die Länge und Breite des Tarsus und Metatarsus. Die Zehen kommen, ihrer Kürze und Schwäche wegen, beim Stehen auf der ganzen Sohlensläche nicht sehr in Betracht. da die Endpunkte des festen Fussbogens im Fersenhöcker und in den Köpfehen der Metatarsusknochen liegen. Die geringe Festigkeit der Zehen. und ihre Zusammensetzung aus kurzen, dünnen Säulenstücken, ist auch der Grund, dass wir uns nicht auf ihre Spitzen erheben können. Wenn wir glauben auf den Zehenspitzen zu gehen, so gehen wir eigentlich nur auf

dem Capitulum des Metatarsus der grossen Zehe, und dieses Gehen würde ein sehr unsicheres und vielmehr ein Trippeln sein, wenn die durch ihre Muskeln gebeugten Zehen, in diesem Falle nicht als eine Art elastischer Schwungfedern wirkten, durch welche die Schwankungen des Körpers corrigirt, und die Sicherheit des Trittes vermehrt wird. Ein Mensch, der keine Zehen hätte, könnte, mit gestreckten Füssen, nur wie auf kurzen Stelzen gehen. - Das Hauptunterscheidungsmerkmal des Fusses von der Hand liegt in dem Unvermögen, die grosse Zehe, wie einen Daumen, den übrigen Zehen entgegenzustellen, um zu fassen oder zu halten. Wenn neuerlich behauptet wurde, dass bei Ziegeldeckern, guten Kletterern, und bei Hottentotten, die grosse Zehe opponirbar sei (Bory de St. Vincent). so muss dieses so lange für eine blosse Meinung eines Nichtanatomen gehalten werden, bis sie durch anatomische Untersuchungen gerechtsertigt sein wird, was a priori nicht leicht denkbar ist. Hätte die grosse Zehe die angeborene, aber durch Vernachlässigung verlernte, oder nicht zur Entwicklung gekommene Oppositionsfähigkeit, so würde sich diese gewiss bei jenen Individuen in ihrer ganzen Grösse zeigen, welche mit Mangel der Hände geboren wurden, und die die Noth lehrte, sich ihrer Füsse statt der Hände zu den gewöhnlichen Verrichtungen des täglichen Lebens (Schreiben, Spinnen etc.) zu bedienen. Ich habe an einem Mädchen mit angeborenem Mangel der oberen Extremitäten, welches es so weit brachte, mit den Füssen eine Pistole zu laden und abzudrücken, die grosse Zehe nicht entgegenstellbar gefunden. Es fehlt übrigens auch die Musculatur biezu. Die Zehen des Fusses können zum Ergreisen dienen, wie die Finger der Hand ohne Mithilfe des Daumens, allein die Sicherheit des Anfassens und Festhaltens ist ihnen versagt. Durch ihre Adductionsbewegung konnen die Fusse einen festen Korper umklammern, wie es beim Emporklettern an einem Baumstamme oder Seile, oder beim festen Schluss des Reiters auf einem sich bäumenden Pferde geschieht. Wie unvollkommen und unbehilslich der beste Kletterer unter den Menschen ist, zeigt die Behendigkeit und Schnelligkeit der kletternden Thiere.

Wenn die Füsse die Aufstellungsbasis des Leibes abgeben, so sind grosse Füsse jedenfalls anatomisch vollkommener als kleine. Das Stehen mit parallelen Füssen ist, wegen Grösse der Basis und Entfernung des Schwerpunktes von der Umdrehungskante, das sicherste. Je weiter die Füssepitzen sich nach aussen wenden, desto schwerer und unsicherer wird das Stehen. Der Bauer steht fester als der Soldat in Positur. Eine gewisse Entfernung der Füsse von einander, ist bei einer festen Positur nothwendig, darf aber ein gewisses Maximum nicht überschreiten. — Jede Bewegung, die der Füss am Unterschenkel ausführt, kann letzterer ebenfalls an ersterem machen. Der Unterschenkel beugt sich und streckt sich im Sprunggelenk gegen den Füss beim Niederkauern und Erheben, — er dreht sich mittelst des Sprungbeins am Kahn- und Fersenbein, um mit weit ausgespreiteten Extremitäten und ganzer Sohlenfläche zu stehen, — und der innere Knöchel dreht sich um die innere Gelenkfläche des Sprungbeins, wenn man, auf Einem Füsse stehend, Drehbewegungen mit dem Stamme macht. Bei sehr starker Auspoder Einwärts-

drehung der Fussspitzen in aufrechter Stellung, geschieht die Bewegung im Hüstgelenke, und man sühlt den Trochanter einen eben so grossen Bogen beschreiben, wie die Zehen. Sonderbarer Weise behaupten die alten Anatomen (Spigelius), dass starke Knöchel bei neidischen, kleine bei trägen Individuen vorkommen, so wie noch in neuerer Zeit Dupuytren und Malgaigne angeborene Breite des Vorderarms in der Nähe der Handwurzel, sür ein organisches Zeichen geistiger Schwäche erklären (?).

Ueber die Analogien der oberen und unteren Extremitäten siehe:
Falguerolles, diss. de extremitatum analogia. Erlangae, 1785. 4. — Bergmann, zur Vergleichung des Unterschenkels mit dem Vorderarme, in Müller's Archiv, 1841. p. 201., und R. Owen, On Nature of Limbs. London, 1849.

§. 146. Literatur der Bänder- und Knochenlehre.

A) Knochenlehre.

a) Gesammte Osteologie.

Unter allen organischen Systemen wurden die Knochen am frühesten genau bekannt, und die beschreibende Osteologie kann gegenwärtig als abgeschlossen betrachtet werden. Schon die älteste osteologische Literatur enthält treffliche Beschreibungen einzelner Knochen, und das Galen'sche Werk de usu partium wird, selbst in unseren Tagen, noch immer als Muster classischen Styls und geistreicher Behandlung dieses Gegenstandes gelesen, obwohl es, wie Vesal bewies, sich meist auf Affenknochen bezieht.

- A. Vesalii tabulae ossium hum. Edit. Sandifort. Ludg. Bat., 1782. fol. Gab. Fallopiae expositiones in librum Galeni de ossibus, in dessen Operibus anat. Francof. ad Moen., 1600. fol.
- B. Eustachii examen ossium, in dessen Opusc. anat. Venet., 1564. 4. und J. Ph. Ingrassias, in Galeni librum de ossibus commentarius. Panormi, 1603. fol. enthalten die interessanten Streitfragen über die Galen'sche Osteologie. Als unerreicht stehen B. S. Albini tabulae sceleti et musculorum corp. hum. Lugd. Bat., 1747. fol. max., und dessen Tabulae ossium. Leidae, 1753. fol. max., da. Die Genauigkeit der Beschreibungen, und die künstlerische Vollendung der Zeichnungen (von Wandelaer's Meisterhand) machen diese beiden Werke zum Hauptschatz der osteologischen Literatur. Hieran schliessen sich:
 - S. Th. Sömmerring, tab. sceleti feminini. Traj. ad Moen., 1797. fol., und die osteologischen Tafeln in den Atlassen von Jul. Cloquet, M. J. Weber (Skeletabbildungen in natürlicher Grösse, mit dem Schatten der Umrisse der Weichteile) und J. Langenbeck, icones anat.

Die Leichtigkeit, womit man sich bei jeder anatomischen Anstalt Knochen verschafft, macht heut zu Tage das Studium der Knochen nach Originalen viel empfehlungswerther, als die Benützung osteologischer Abbildungen, um so mehr, als es kaum möglich sein wird, sich selbst nach den besten Abbildungen eine richtige Vorstellung von den Formen der Knochen (besonders der Schädelknochen) zu bilden. Die besten speciellen Osteographien sind:

Lehrbuch der Anatomie. 5. Aufl.

- P. Paaw, de hum. corporis ossibus. Lugd. Bat., 1615. 4. Ein genaues und nebenbei sehr unterhaltendes Werk.
- J. G. Walter, Abhandlungen von trocknen Knochen. Berlin, 1798. 8. Höchst genau.
- F. H. Loschge, die Knochen des menschlichen K\u00f6rpers und ihre vorz\u00fcglichsten B\u00e4nder in Abbildungen und Beschreibungen. Erlangen. Zweite Auflage. 1804. Gr\u00fcndliche Bearbeitung des Textes, und vom Verfasser sehr emsig nach der Natur gezeichnete Abbildungen.
- J. F. Blumenbach, Geschichte und Beschreibung der Knochen. Götting. Zweite Auflage. 1807. 8. Durch die vielen eingeschalteten comparativ-anatomischen Bemerkungen sehr interessant.
- M. S. Krüger, die Osteologie mit Rücksicht auf comparative und patholog. Anatomie, in tabellarischer Form dargestellt. Mit einer Kupfertafel. Berlin, 1837. Sehr brauchbar.
- J. F. South, A Complete Description of the Bones. London, 1837. 12. Deutsch von Henle. Berlin, 1840. Sehr compendiüs, mit guten Holzschnitten.
- S. Th. Sömmerring, Lehre von den Knochen und Bändern, mit Ergänzungen und Zusätzen herausgegeben von R. Wagner. Leipzig, 1839. 8.

b) Schädelknochen.

- C. V. Schneider, de osse cribriformi. Viteb., 1665. 12.
- S. Reininger, de cavitatibus ossium capitis, in Halleri disput. anat. Vol. VI.
- G. Janke, de cavernis quibusdam, quae in ossibus capitis continentur. Lips., 1753. 4.
- F. Blumenbach, prolusio anat. de sinibus frontalibus. Gotting., 1779. 4.
- Ol. Wormii, epistolae, medici, anatomici, botanici argumenti. Hafniae, 1728. Cura J. Rostgaard. (Ueber die Nathknochen, welche seinen Namen führen, Ossicula Wormii, epist. 29. Sie waren jedoch, nach Worm's Zeugniss selbst, schon dem Guintherus Andernacensis, geb. 1487, bekannt.)
- E. Sandifort, de ossiculis suturarum, in dessen Observ. anat. path. Lugd. Bat., 1774. 4.
- C. G. Jung, Animadversiones de ossibus generatim, et in specie de ossibus rapho-geminantibus (Nathknochen). Basil., 1827. 4.
- E. Hallmann, die vergl. Osteologie des Schläsebeins. Hannover, 1837. 4.
- F. S. Leukart, Untersuchungen über das Zwischenkieferbein des Menschen. Stuttgart, 1840. 4.
- P. Lammers, über das Zwischenkieserbein, und sein Verhältniss zur Hasenscharte, und zum Wolfsrachen. Erlangen, 1853.
- Engel, über den Einfluss der Zahnbildung auf das Kiefergerüst, in der Zeitschrift der Wiener Aerzte. 5. Jahrgang.
- Dieterich, Beschreibung einiger Abnormitäten des Menschenschädels. Basel, 1842.
- G. J. Schultz, Bemerkungen über den Bau der normalen Menschenschädel. Petersburg, 1852. Hält eine, oft in Kleinigkeiten abschweifende Nachlese über bisher unbeachtete osteologische Vorkommnisse.
- L. Fick, über die Architektur des Schädels, in Müller's Archiv. 1853.
- c) Deutung und Zurückführung der Schädelknochen auf die allgemeinen Normen der Wirbelbildung.
 - L. Oken, über die Bedeutung der Schädelknochen. Jena, 1807. 8. lsis. 1820.
 - J. B. Spix, cephalogenesis. Monach., 1815. fol.
 - C. G. Carus, von den Urtheilen des Knochen- und Schalengerüstes. Leipzig, 1821. fol.

C. B. Reichert, über die Visceralbogen der Wirbelthiere, in Müller's Archiv. 1837, und dessen vergleichende Entwicklungsgeschichte des Kopfes. Königsberg, 1838.

Spöndli, über die Primordialschädel der Säugethiere u. des Menschen. Zürch, 1846. Bidder, de cranii conformatione. Dorpati, 1847.

Kölliker, Mittheilungen der Zurcher naturforschenden Gesellschaft, 1847, und dessen Bericht über die zootomische Anstalt in Würzburg. Leipzig, 1849. Die Entwicklungsschristen von Baer, Rathke, Bischoff, Duges, Jacobson und Reichert.

d) Schädelformen und Altersverschiedenheiten des Kopfes.

- J. F. Blumenbach, collectiones craniorum diversarum gentium. Gottingae, 1790—1828. 4.
- S. Th. Sömmerring, über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer. Frankf. a. M., 1785. 8.
- P. Camper, über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge. Aus dem Holland. übersetzt von Sömmerring. Berlin, 1792. 4.

Gibson, de forma craniorum gentilitia. Edinb., 1808. 8.

- C. Crull, dissertatio de cranio ejusque ad faciem ratione. Groning., 1810.
- M. J. Weber, die Lehre von den Ur- und Racenformen der Schädel und Becken. Düsseldorf, 1830. 4.
- A. Hueck, de craniis Estonum. Dorpati, 1838. 4.
- H. Rathke, über die Macrocephali in der Krimm. Müller's Archiv. 1842. p. 142.
 Van der Hoeven, über die Schädel slavonischer Völker, in Müller's Archiv. 1844. p. 433.
- A. Retzius, über die Schädel der Nordbewohner, in Müller's Archiv. 1845., — über Schädel der Iberier, 1847., — über verschiedene Völker, 1848 und 1849., — über Griechen und Finnen, 1848., — über Peruaner, 1849.
- R. Froriep, die Charakteristik des Kopfes nach dem Entwicklungsgesetz desselben. Berlin, 1845. 8., und Prichard's Naturgeschichte des Menschengeschlechtes.
- J. Engel, Untersuchungen über Schädelformen. Prag, 1851.

e) Wirbelsaule.

- E. H. Weber, über einige Einrichtungen im Mechanismus der menschlichen Wirbelsäule, in Meckel's Archiv. 1828.
- J. Müller, vergleichende Anatomie der Myxinoiden. Erster Theil: Osteologie und Myologie. Berlin, 1835. fol. Höchst gestreiche und für die richtige Aussaung und Deutung der Rückenmuskeln unentbehrliche Reslexionen über die Wirbelfortsätze.
- A. Retzius in Müller's Archiv. 1849. 6. Heft.

f) Becken.

- F. C. Naegele, das weibliche Becken, betrachtet in Beziehung seiner Stellung und die Richtung seiner Höhle. Carlsrube, 1823. 4.
- G. Vrolik, considérations sur la diversité des bassins des races humaines. Amst., 1826. 8.

g) Mechanik der Gelenke.

- W. und E. Weber, Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Götting., 1836.
 8. Ein durch Originalität und mathematische Begründung seiner Lehrsätze gleich ausgezeichnetes Werk.
- G. B. Günther, das Handgelenk in mechanischer, anatomischer und chirurgischer Beziehung. Hamburg, 1841. 8.

- Ch. Bell, die menschliche Hand. Aus dem Englischen von Hauf. Stuttgart, 1836. 8.
- J. Hyrtl, Kniegelenk. Oesterr. medic. Jahrb. 1839. Hungelenk, Zeitschr. der Wiener Aerzte, 1846, und dessen Handbuch der topographischen Anatomie. 2. Aufl.
- Mehrere kleinere Abhandl. von H. Mayer und L. Fick in Müller's Archiv. 1853.

h) Altersverschiedenheiten und Spielarten der Knochen.

- J. J. Sue, sur les propriétés du squelète de l'homme, examiné depuis l'âge le plus tendre, jusqu' à celui de 60 ans et au delà, Mém. prés. à l'Académie royale des sciences. Paris, 1755.
- F. Isenstamm, brevis descriptio sceleti humani variis in aetatibus. Erlangae, 1796. 8.
- F. Chaussard, recherches sur l'organisation des vieillards. Paris, 1822.
- J. van Döveren, observ. osteol. varios naturae lusus in ossibus exhibentes. In ejusdem Specim. observ. acad. Groning. 1765.
- Ch. Rosenmüller, diss. de singularibus et nativis ossium varietatibus. Lipsiae, 1804. 4.

i) Praktische Anweisungen zur Skeletopoe.

Nebst den allgemeinen Schristen über Zergliederungskunst:

- J. Cloquet, de la sceletopée, ou de la préparation des os, des articulations, et de la construction des scelètes, in dessen Concours pour la place de chef des travaux anatom. Paris, 1819. 4.
- J. A. Bogros, quelques considérations sur la sceletopée. Paris, 1819. 4.
- G. Metzius, de construendo sceleto. Erfurti, 1836. 4.
- C. Hesselbach, vollständige Anleitung zur Zergliederungskunde. Erster Band. Arnstadt, 1805. 4.
- W. Gruber, Abhandlungen aus der menschlichen u. vergleichenden Anatomie. Petersburg, 1852. Eine wahre Fundgrube interessanter, und seltener Anomalien in Thieren und Menschen (Osteologische Varietäten als Thierähnlichkeiten, Os interparietale, Abnorme Näthe etc.).

k) Chemische Untersuchungen der Knochen.

E. v. Bibra, chemische Untersuchungen über die Knochen und Zähne des Menschen und der Wirbelthiere, mit Rücksicht auf physiologische und pathologische Verhältnisse. Schweinfurt, 1844. 8.

B) Bänderlehre.

Die Bänderlehre bildet bei weitem kein so vollendetes Ganzes, wie die Osteologie. Die neueste Zeit hat noch Entdeckungen in diesem Fache gebracht.

- J. Weitbrecht, Syndesmologia, sive historia ligamentorum corporis hum. Petropoli, 1742. 4. Mit 26 Tafela. Deutsch von Loschge, mit besseren Abbildungen als im Original. Zweite Auflage. Erlangen, 1804. fol. Ist das Hauptwerk der Bänderlehre, obwohl einzelne Abbildungen an Correctheit übertroffen werden von:
- Langenbeck, icones anat. osteologiae et syndesmologiae. Tab. XVII. Göttingen, 1839, fol., und F. Arnold, tab. anat. Fasc. IV. p. 2.
- B. Cooper, A Treatise on the Ligaments. London, 1825. fol. Mit 13 Kupfer-tafeln. Zweite Auflage. 1827. 4.
- H. Barkow, Syndesmologie, oder die Lehre von den Bändern. Breslau, 1841. 8.

DRITTES BUCH.

Muskellehre und topographische Anatomie.

		•
•		
·		

A. Kopfmuskeln.*)

§. 147. Eintheilung der Kopfmuskeln.

Unter Kopfmuskeln, im engeren Sinne des Wortes, verstehen wir jene, die am Kopfe entspringen, und am Kopfe endigen. Die vielen Muskeln, die nur am Kopfe endigen, und anderswo entspringen, werden nicht als Kopfmuskeln, sondern als Muskeln jener Gegenden beschrieben, durch welche sie verlaufen, bevor sie zum Kopf gelangen. — Die eigentlichen Kopfmuskeln zerfallen in zwei Klassen. Die erste wird durch jene Muskeln gebildet, die nur mit Einem Ende an einem Kopfknochen haften, mit dem anderen sich in Weichtheile, in die Haut, oder in Aponeurosen des Kopfes verlieren.

^{*)} Es kann als allgemeine Regel für die Präparation der Muskeln gelten, dass man weniger Zeit auf die Säuberung ihrer Oberstäche (durch Abpräpariren der Scheide), als auf die sorgfältige Bloslegung ihrer Ursprünge und Enden zu verwenden babe. Man giebt sich bei den praktischen Uebungen an der Leiche häusig schon damit zufrieden, den Bauch eines Muskels zu sehen, und memorirt Anfang und Ende desselben aus dem Buche, ohne sich die Mühe zu nehmen, sie zu präpariren. Da es kaum möglich ist, sich über die Wirkungsweise eines Muskels eine richtige und bleibende Vorstellung zu bilden, wenn man nicht die beiden Endpunkte seiner Länge vor Augen hat, so wird diese Regel von allen Jenen gewiss beachtet werden, welche das Seciren nicht als Spielerei betreiben. - Ferner gewöhne man sich, die Hautschnitte zur Umschreibung einzelner Muskelbezirke, welche man eben bloslegen will, nicht mit jenem Messer zu machen, welches zur Präparation der Muskeln dienen soll (Scalpell), sondern mit dem grossen, bauchigen Messer der Secirbestecke (Knorpelmesser), oder mit einem, nur zu diesem Zweck zu gebrauchenden, grösseren und stärker gearbeiteten Scalpell. Die feine Schneide der Scalpelle legt sich öfters schon beim ersten Hautschnitt um, besonders wenn die Haut nicht vorläufig abrasirt wurde, welches niemals unterlassen werden soll. Nur die zarte Gesichtsbaut kann von dieser Regel ausgenommen werden. - Der Gebrauch der Pincette ist nur bei der Darstellung kleinerer Muskeln nützlich. Bei der Praparation der grösseren sind die Finger der linken Hand die beste Zange. Abzulösende grosse Hautlappen werden am zweckmässigsten mit der vollen Faust gefasst und gespannt. — Man trage nie mehr Haut ab, als zur Bloslegung einer Muskelgruppe erforderlich ist, die man eben studiren will. Fertig präparirte Muskeln lasse man beim Weggehen unbedeckt. Sie werden durch Oxydirung ihres Blutes und Verdunstung ihres Wassergehaltes lebhaster geröthet, und faulen nur leichter, wenn sie mit der Haut wieder zugedeckt werden. - Der Anfänger beginne nicht mit den Muskeln des Kopfes oder Rumpfes, sondern mit jenen der oberen oder unteren Extremität.

Sie sind sämmtlich dünne, und vergleichungsweise schwache Muskeln, da die Theile, die sie zu bewegen haben, wenig Widerstand leisten. Die zweite Klasse fasst solche Muskeln in sich, welche sich mit beiden Enden an Kopfknochen inseriren, und da es nur Einen beweglichen Knochen (den Unterkiefer) am Kopfe giebt, an diesem sich festsetzen müssen.

Bevor man zum Studium der Muskeln und zur praktischen Bearbeitung derselben an der Leiche schreitet, möge man die Paragraphe 28 — 36 der allgemeinen Anatomie ausmerksam durchgehen.

§. 148. Kopfmuskeln, die sich in Weichtheile inseriren.

Die Muskeln dieser Klasse bewegen entweder die behaarte Kopfhaut, oder bewirken die Erweiterung und Verengerung der im Gesichte befindlichen Oeffnungen.

A. Muskeln der behaarten Kopfhaut sind: der Musculus frontalis und occipitalis. Ersterer entspringt von der Glabella und dem inneren Ende des Arcus superciliaris, läust, mit dem der anderen Seite divergirend, über den Stirnhöcker nach aufwärts, breitet sich zu einer flachen und dünnen Muskelschichte aus, und inserirt sich mit einem mässig convexen Rande in eine, der Oberstäche der Hirnschale wie eine Kappe genau angefügte Aponeurose (die Schädelhaube, Galea aponeurotica cranii), welche unmittelbar unter der Haut liegt, sich zum Hinterhaupte und zur Schläsegegend ausbreitet, an die Linea semicircularis der seitlichen Schädelgegend fest adhärirt, und mit dem fibrösen Deckblatte des Schläfemuskels verwachsend, bis zum oberen Jochbogenrande, wo sie endigt, herabläuft. An ihren hinteren Rand inserirt sich der viereckige, flache, dunne Musculus occipitalis, der von der Linea semicircularis superior des Hinterhauptbeins entsteht, und mit dem der anderen Seite etwas convergirend in der Galea sich verliert. - Die beiden Stirnmuskeln werden die sehnige Schädelhaube nach vorn, die beiden Hinterhauptmuskeln nach hinten ziehen, und da diese innig und fest mit der behaarten Haut des Schädels zusammenhängt, wird sie den Bewegungen der Galea folgen. Wirken die Stirn- und Hinterhauptmuskeln gleichzeitig, so wird die Galea an den Schädel angepresst. Das Sträuben der Haare kann jedoch nicht, wie man glaubt, von der vereinigten Wirkung des Occipitalis und Frontalis abhängen, da die Haarwurzeln weder mit diesen Muskeln, noch mit der Galea zusammenhängen. Das Sträuben der Haare ist vielmehr von der Contraction der von der Haut zu den Haartaschen gehenden glatten (organischen) Muskelfasern abhängig. Wirkt der Musculus frontalis allein, so legt er die Stirnhaut in guere Falten, welche, wenn sie zu bleibenden Runzeln werden, die gefurchte Stirne der Greise bilden.

Der Musculus frontalis wird von seinem nächsten Nachbar nach aussen, dem Musculus orbicularis, durch die innere Augenwinkelvene getrennt. —

Man kann die Stirnmuskeln als den vorderen, die Hinterhauptmuskeln als den hinteren Bauch, und die Galea als die Sehne eines und desselben

Muskels betrachten, der dann Museulus epicranius oder occipito-frontalis zu nennen wäre. Wenn die Galea verschiebbar ist, so kann sie mit dem unter ihr liegenden Periost des Schädels nur eine lockere und dehnbare Zellgewebsverbindung eingehen. Ueber einen der beiden Stirnmuskeln, und zwar häufiger über den rechten als über den linken, verläuft die bei körperlichen Anstrengungen und Gemüthsbewegungen schwellende Stirnvene (Vena praeparata), "die Ader des Zornes", aus welcher man vor Zeiten zur Ader liess.

- B. Muskeln um die Oeffnungen des Gesichts.
- 1. Muskeln der Augenlidspalte. Vom inneren Winkel der Augenlidspalte geht ein kurzes breites Bändchen (Ligamentum palpebrarum internum) zum Stirnfortsatz des Oberkiesers, welches man, ohne Präparation, durch Spannen der Augenlider nach aussen, sehen kann. Von der oberen Fläche dieses Bändchens entspringt der Schliessmuskel der Augenlider, Musculus orbicularis s. sphincter palpebrarum, der eine Kreisbewegung um den Umfang der Orbita macht, und an der unteren Fläche desselben Bändchens endigt. Man braucht den Muskel nur einmal zu sehen, um überzeugt zu sein, dass er seinen Namen mit Unrecht trägt, indem er nur die Haut um die Orbita zusammenschieben, und in strahlensormige Falten legen kann, mit den Augenlidern aber nichts zu schaffen hat. Die Schliessung der Augenlider wird vielmehr durch ein besonderes, dunnes, unter der Haut der Augenlider liegendes, gelblich-röthliches Muskelstratum bewirkt, welches von Albin als Musculus ciliaris beschrieben wurde. -Die obere Augenbraue kann gegen die Nasenwurzel und etwas herab bewegt werden, durch den Musculus corrugator supercilii, der, vom Stirnmuskel bedeckt, von der Glabella entspringt, über den Arcus superciliaris nach aussen geht, und mit dem oberen Theile des Orbicularis sich so verwebt, dass er eigentlich ein tiesliegendes Stratum desselben vorstellt.

Eine Parthie von Fasern des Orbicularis entspringt von der äusseren Wand des Thränensacks, als ein flaches, viereckiges Bündel. Dieses ist der schon von Duvernoy gekannte, irrig von Horner als neu beschriebene Musculus Horneri (Philadelphia Journal, 1824, Nov.).

2. Muskeln der Nase. Der Ausheber des Nasenslügels und der Oberlippe, Levator alae nasi et labii superioris, entsteht vom Stirnfortsatze des Oberkiesers, und hängt mit dem Ursprunge des Musculus frontalis zusammen. Er steigt an der Seite der Nase herab, und theilt sich in zwei Schenkel, deren einer zum Nasenslügel, der andere, breitere zur Oberlippe herabläust. Er rümpst die Nase, und erweitert das Nasenloch. (Santorini nannte ihn Pyramidalis, da ihm der lange Name, den er sonst sührt, nicht gestel.) — Der Zusammendrücker der Nase, Compressor nasi, entspringt von dem Seitenrande der Incisura pyriformis, neben der Anhestungsstelle des Flügelknorpels, läust, vom vorigen bedeckt, und mit ihm verwachsen, zum Rücken der knorpeligen Nase, und verwandelt sich in eine seine Aponeurose, welche mit der der anderen Seite zusammensliesst. Zu dieser Aponeurose kommt nicht selten ein graciles Muskelbündelchen vom Stirnmuskel herunter, als Musculus procerus Santorini. — Der

Niederzieher der Nase, Depressor nasi s. Musculus lateralis nasi, entspringt, von den beiden früheren bedeckt, von der Alveolarzelle des Eckzahns und äusseren Schneidezahns, krümmt sich nach auf- und vorwärts, und befestigt sich am Nasenflügelknorpel. — Der Niederzieher der Nasenscheidewand, Depressor septi mobilis narium, besteht aus Fasern des Orbicularis oris, welche sich nach oben begeben, um am unteren Rande des Nasenscheidewandknorpels zu enden.

3. Muskeln der Mundspalte. Sie liegen grösstentheils in der Richtung der verlängerten Radien der Mundössnung. Nur Einer geht im Kreise um die Mundössnung herum. Letzterer ist ein Verengerer, erstere aber sind Erweiterer der Mundössnung, und folgen, von der Nase zum Kinn, in dieser Ordnung auseinander: 1. Der Ausheber der Oberlippe, Levator labii superioris proprius, einen Querfinger breit, entspringt am inneren Abschnitte des Margo infraorbitalis, und geht schräge nach innen und unten, zur Substanz der Oberlippe. Er deckt das Foramen infraorbitale und die aus ihm hervortretenden Gesässe und Nerven. 2. Der Ausheber des Mundwinkels, Levator anguli oris, kommt aus der Grube der vorderen Fläche des Oberkieserkörpers, und verliert sich, sast senkrecht absteigend, und vom Levator labii an seinem inneren Rande bedeckt, im Mundwinkel. Er liegt unter allen Muskeln der Oberlippe am tiefsten. 3. und 4. Der kleine und grosse Jochbeinmuskel, Musculus zygomaticus major et minor, entspringen von der Gesichtssläche des Jochbeins, der kleine über dem grossen. Sie nehmen vom Orbicularis palpebrarum häufig Fasern auf, und gehen vom Mundwinkel aus in die Substanz der Oberund Unterlippe über, wo sie sich mit den Fasern des Schliessmuskels verweben. 5. Der Lachmuskel, Risorius Santorini, der dünnste dieser Muskelgruppe, entspringt in der Regel von der, den Kaumuskel und die Parotis deckenden Aponeurose (Fascia parotideo-masseterica), und läust quer zum Mundwinkel. Er wird auch als eine unmittelbare Fortsetzung des Platysma myoides (§. 151) beschrieben, welches mir nicht ganz richtig erscheint. 6. Der Niederzieher des Mundwinkels, Depressor anguli oris s. Triangularis, entsteht breit am unteren Rande des Unterkiefers, und verwebt sich, spitzig zulaufend, mit der Ankunstsstelle des Zygomaticus major am Mundwinkel. 7. Der Niederzieher der Unterlippe, Depressor labii inferioris s. Quadratus menti, entspringt am unteren Kieferrande, aber weiter einwärts als der vorige, und von ihm theilweise bedeckt, geht, mit demselben Muskel der anderen Seite convergirend, und mit dessen inneren Faserbünbeln sich wirklich kreuzend, zur Unterlippe hinauf. 8. Der Aufheber des Kinns, Levator menti, füllt den dreieckigen Raum zwischen beiden Quadrati aus, entspringt unter der Zelle des Eckzahns, und verliert sich in die Haut des Kinns. 9. Die Schneidezahnmuskeln, Musculi incisivi Cowperi, zwei obere und zwei untere, nehmen ihren schmalen Ursprung an den Alveolarzellen der seitlichen Schneidezähne, und verlieren sich als gerade, kurze, aber eben nicht schwache Muskeln, in die

innere Oberstäche der betressenden Lippe. — Die bisher genannten Muskeln wirken nur auf Eine Lippe. Auf beide wirken der Backenmuskel und der Schliessmuskel des Mundes. 10. Der Backenmuskel, Musculus buccinator s. buccalis, entspringt von der ausseren Fläche des Zahnfacherfortsatzes beider Kiefer, und vom Hamulus pterygoideus des Keilbeins, lauft mit ziemlich parallelen Fasern quer gegen den Mund, wird von den beiden Zygomaticis, dem Risorius und Depressor anguli oris überschritten, und verliert sich am Mundwinkel, so wie in der Substanz der Ober- und Unterlippe. Wirkt er allein, so erweitert er die Mundöffnung in die Quere. Wird diese Erweiterung durch die gleichzeitige Thätigkeit des Schliessmuskels des Mundes aufgehoben, so drückt er die Wange an die Zähne an, oder comprimirt, wenn die Mundhöhle voll ist, den Inhalt derselben, z. B. die Luft, welche, wenn die Lippen sich ein wenig öffnen, mit Gewalt entweicht, wie beim Blasen, daher der alte Name Trompetermuskel. In der Nähe des ersten oberen Mahlzahnes, wird er durch den Aussührungsgang der Ohrspeicheldrüse durchbohrt. - Der lateinische Name des Muskels stammt von bucca, d. i. die durch Schreien oder Essen aufgeblähte Wange (daher bucco ebenso Schwätzer, als Vielfrass bedeutet). Die nicht aufgeblähte Wange heisst gena.

Der Ring- oder Schliessmuskel des Mundes, Sphincter s. Orbicularis oris, bildet die eigentliche wulstige Fleischlage der Lippen. Er liegt zwischen der äusseren Haut und der Mundschleimhaut, mit letzterer weniger fest als mit ersterer vereinigt, und besteht aus vielen concentrischen Ringfasern, welche nirgends an Knochen befestigt sind, und durch den Hinzutritt so vieler geradliniger Muskelfasern gekreuzt, und mit ihnen so innig verfilzt werden, dass daraus das schwellende Fleisch der Lippen entsteht. Er schliesst den Mund, spitzt die Lippen zum Pfeifen und Küssen, und verlängert sie zu einem kurzen Rüssel beim Saugen. Die vielen Muskeln, die sich in den beiden Mundwinkeln inseriren, sind der Grund, warum die Mundöffnung eine Querspalte, und nicht, wie der After, ein faltig zusammengezogenes Loch bildet.

- 4. Muskeln des Ohres. Sie sind vergleichungsweise sehr wenig entwickelt, woran weder das Tragen der Kinderhäubehen, noch der Mangel an Uebung Schuld ist, da diese Muskeln auch bei Wilden nicht stärker erscheinen. Nur wenig Menschen besitzen das Vermögen, ihre Ohren willkürlich zu bewegen. Robespierre soll es in einem sehr auffallenden Grade besessen haben, ebenso der holländische Anatom Albin. Man zählt folgende Muskeln des äusseren Ohres.
- 1) Der Ausheber des Ohres, Musculus attollens auriculae, platt, dünn, dreieckig, liegt unmittelbar unter der Haut auf der Fascia temporalis, von welcher er breit entspringt, und, im Abwärtssteigen sich zuspitzend, an der hinteren Fläche des Ohrknorpels sich verliert.
 - 2) Der Anzieher des Ohres, Musculus attrahens auriculae, liegt

über dem Jochbogen, entspringt von ihm, und geht horizontal zum vorderen Ende des Helix.

3) Die Rückwärtszieher des Ohres, Musculi retrahentes auriculae, zwei oder drei ebenfalls horizontale kleine Muskeln, entspringen vom Processus mastoideus, und inseriren sich an der hinteren convexen Fläche der Ohrmuschel.

Ueber den von mir entdeckten Musculus stylo-auricularis siehe Note zu §. 152.

§. 149. Muskeln des Unterkiefers.

Die Einrichtung des Kiefergelenks ist auf eine dreifache Bewegung des Unterkiefers berechnet, welcher gehoben und gesenkt, vor- und rückwärts, so wie nach rechts und links bewegt werden kann. Von diesen Bewegungen muss das Heben mit grosser Krast ausgeführt werden, um die Zähne der Kiefer auf die Nahrungsmittel, deren Zusammenhang durch das Kauen aufgehoben werden soll, mit hinlänglicher Stärke einwirken zu lassen. Die Hebemuskeln, oder eigentlichen Beissmuskeln, werden somit die entwickeltsten Bewegungsorgane des Unterkiesers sein. Hieher gehört der Musculus temporalis, masseter, und pterygoideus internus. Die Senkung des Kiefers, die schon durch die Schwere des Kiefers allein erfolgt, kann durch den Musculus biventer beschleunigt werden. Die Vor- und Rückwärtsbewegung. so wie die Seitenbewegung, die mit besonderer Krast ausgeführt werden. sind theils eine Nebenwirkung der Hebemuskeln (weil ihre Insertionsrichtung keine gerade, sondern eine schiefe ist), theils hängen sie vom Musculus pterygoideus externus ab. Da beim Kauen alle drei Bewegungen des Kiefers wechselnd austreten, so bezeichnet man die Muskeln des Unterkiefers vorzugsweise als Kaumuskeln.

- a. Der Schläsemuskel, Musculus temporalis s. crotaphites (xqoráw, pulsare, weil man auf ihm die Schläsenarterie pulsiren sühlt, und bei alten Leuten auch häusig pulsiren sieht), der stärkste Kaumuskel, entspringt vom ganzen Umfange der Schläsensäche des Schädels, Planum temporale, und zum Theil von der inneren Obersäche einer ihn überziehenden, starken, sibrösen Scheide, Fascia temporalis, welche an der Linea semicircularis entsteht, mit der Galea aponeurotica cranii sich verwebt, und am oberen Rande des Jochbogens endigt. Die strahlig zusammenlausenden Bündel des Schläsemuskels werden auf halbem Wege sehnig, und vereinigen sich zu einer breiten Sehne, welche unter den Jochbogen tritt, und sich am Kronensortsatze des Unterkiesers sestsetzt. Der Schläsemuskel hebt den gesenkten Kieser, und drückt ihn mit solcher Gewalt gegen den Oberkieser, dass die zwischen den Stampsen und Schneiden der Zähne besindlichen Nahrungsmittel zerdrückt und zerschnitten werden. War der Kieser vorgestreckt, so wird er durch ihn wieder in die Gelenkgrube zurückgezogen.
- b. Der Kaumuskel, Musculus masseter, ein kurzer, dicker, viereckiger, mit zahlreichen Sehnenstreifen durchzogener Muskel, entsteht mit

zwei Portionen, einer vorderen und einer hinteren, vom unteren Rande und der inneren Fläche des Jochbogens. Die vordere stärkere Portion convergirt mit der hinteren schwächeren und von ihr grösstentheils bedeckten, und beide zusammen befestigen sich an der äusseren Fläche des Unterkieferastes. Er hebt den Kiefer, und streckt ihn auch vor, wenn blos seine vordere starke Portion sich zusammenzieht. Ich finde keinen Schleimbeutel zwischen beiden Portionen.

- c. Der innere Flügelmuskel, Musculus pterygoideus internus, darum so genannt, weil er aus der Fossa pterygoidea kommt, befestigt sich an der inneren Fläche des Unterkieferastes. Seine Richtung ist schief von oben und innen, nach unten, hinten und aussen; er wird deshalh den Kiefer nicht blos heben, sondern ihn zugleich vorschieben, und wenn er nur auf einer Seite wirkte, nach der entgegengesetzten Seite bewegen.
- d. Der aussere Flügelmuskel, Musculus pterygoideus externus, füllt den unteren Theil der Schläsengrube aus, entspringt seinem Namen zusolge von der äusseren Fläche der Lamina externa des Processus pterygoideus und vom Tuber maxillae superioris mit getrennten Portionen, die sich bald an einander legen, verschmelzen, und sich mit einer kurzen, aber starken Sehne an der vorderen Seite des Halses vom Processus condyloideus inseriren. Er wirkt wie sein Vorgänger, nur wird er, seiner fast queren Richtung wegen, die Seitwärtsbewegung sast allein aussühren, und die durch die breiten Kronen der Mahlzähne zu leistenden Reibbewegungen vorzugsweise vermitteln.

Der zweibäuchige Niederzieher des Kiefers wird bei den Halsmuskeln abgehandelt.

Da jede Hälste des Unterkiesers einen einarmigen Winkelhebel vorstellt, und die Hebemuskeln sich nahe am Stützpunkte inseriren, so werden sie nur mit grossem Krastauswande wirken können, und die vom Angrisspunkte der bewegenden Krast weit entsernten Schneidezähne, überhaupt geringerer Krastausserungen sähig sein, als die Mahlzähne. Man beisst eine Birne mit den Schneidezähnen an, und knackt eine Nuss mit den Mahlzähnen aus. — Um die Insertionsstelle des Schläsemuskels zu sehen, muss die Jochbrücke abgetragen, und der Masseter herabgeschlagen werden. Der äussere Flügelmuskel wird nur nach Wegnahme des Kronensortsatzes des Unterkiesers und des daran besetigten Schläsemuskels zugänglich.

Nicht blos der Schläsemuskel, sondern auch der Masseter und Buccinator, sind mit einer Aponeurose überzogen, die, ihres Zusammenhanges mit der Aponeurose des Halses wegen, Erwähnung verdient. Sie kann, da sie die Backengegend des Gesichts einnimmt, Fascia buccalis genannt werden. Ihr hochliegendes Blatt deckt die äussere Fläche des Masseter, und die zwischen diesen Muskel und den Warzensortsatz eingeschobene Ohrspeicheldrüse, Parotis, daher ihr Name Fascia parotideo-masseterica. Dieses Blatt ist mit der unter der Haut liegenden Fettschichte des Gesichtes innig verbunden, setzt sich nach vorn an die äussere Fläche des Musculus buccinator sort, und verschmilzt mit dem, diesen Muskel überziehenden.

tiefen Blatte. Nach oben hängt es an den Jochbogen, nach hinten an den Warzenfortsatz und den Knorpel des Ohres an, und steigt nach abwärts zum Halse, um in das hochliegende Blatt der Fascia colli überzugehen. Ihr tiefliegendes Blatt, Fascia bucco-pharyngea, deckt die äussere Fläche des Musculus buccinator, läuft nach rückwärts, um an der inneren Seite des Unterkieferastes den Musculus pterygoideus einzuhüllen, und mit dem Ligamentum laterale internum des Kiefergelenks zu verschmelzen, überzieht die seitliche und hintere Wand des Pharynx bis zum Schädelgrunde hinauf, und geht nach abwärts in das tiefliegende Blatt der Fascia colli über.

Zwischen dem vorderen Rande des Masseter und der ausseren Fläche des Buccinator bleibt eine Grube, welche durch einen rundlichen Fettknollen ausgefüllt wird. Verschwindet dieser bei allgemeiner Abmagerung, so fällt die Backenhaut über der Grube ein, und bildet die den abgezehrten Gesichtern eigenthümliche hohle Wange.

Der Musculus masseter (μασσάομαι, kauen) ist, wegen seiner constanten Beziehungen zu gewissen Gesassen und Nerven des Gesichts, besonders wich-Am vorderen Rande seiner Besestigung am Kieser, steigt die Arteria maxillaris externa vom Halse zum Gesichte empor, und pulsirt unter dem aufgelegten Finger; an seinem hinteren Rande liegt, von den Körnern der Parotis umgeben, die Fortsetzung der Carotis externa, und der Stamm der hinteren Gesichtsvene; — seine äussere Fläche wird von hinten her durch die Parotis zugedeckt, und der Quere nach von dem Ausführungsgange dieser Druse (Ductus Stenonianus), der queren Gesichtsarterie, und den Zweigen des Antlitznerven (Nervus communicans faciei) gekreuzt. So oft er sich zusammenzieht, und dadurch dicker wird, comprimirt er die zwischen ihm und der unnachgiebigen Fascia parotideo-masseterica eingeschaltete Ohrspeicheldrüse. und befordert dadurch den Speichelzusluss während des Kauens. Es erklärt sich hieraus, warum bei der Ohrspeicheldrüsenentzündung (Parotitis) das Kauen gänzlich aufgehoben, und das Sprechen nur lispelnd möglich ist. - Ruht der Muskel, wie im Schlase, so strömt kein Speichel in die Mundhöhle zu. und ihre Wände trocknen gerne aus, wenn man mit offenem Munde schläft.

Durch Combination der verschiedenen Bewegungen einzelner Gesichtsmuskeln entsteht der eigenthümliche Ausdruck des Gesichts — die Miene. Tritt die Thätigkeit einer gewissen Gruppe von Gesichtsmuskeln häufiger und andauernder ein, so bildet sich ein vorwaltender Grundzug, der bleibend wird. Jede Gemüthsbewegung hat ihren eigenthümlichen Dialekt im Gesichte — dem Spiegel der Seele. Neugeborene Kinder und leidenschaftslose Menschen haben keine markirten Züge; Wilde sehen einander ähnlich, wie die Schafe einer Herde; das Mienenspiel wird bei aufgeregten Seelenzuständen lebhaft und ausdrucksvoll, und haben die Züge einen gewissen bleibenden Ausdruck angenommen, so kann der Physiognomiker daraus einen Schluss auf Gemüth und Charakter wagen. Wer inwendig ein Schurke ist, trägt auch äusserlich den Fluch Gottes im Gesichte (Galgenphysiognomie). Die Physiognomik ist jedenfalls auf wissenschaftlichere Grundlagen basirt, als die Spielerei der Schädellehre.

Die Anatomie der Gesichtsmuskeln, namentlich der sich in der Haut des Gesichtes verlierenden Bündel derselben, ist nichts weniger als erschöpft.

B. Muskeln des Halses.

§. 150. Form, Eintheilung und Zusammensetzung des Halses.

Der Hals, Collum, das Bindungsglied zwischen Kopf und Stamm, ist eine kurze, cylindrische Säule, deren knöcherne Axe nicht in ihrer Mitte, sondern der hinteren Gegend näher als der vorderen liegt. Die Länge und Dicke des Halses steht nicht immer mit der Grösse des Kopfes im Verhältniss. Das Missverhältniss des grossen Kopfes zum kurzen und schmalen Halse ist bei Neugeborenen auffallend. Bei gedrungener, vierschrötiger Statur (Habitus quadratus) ist der Hals kurz und dick, und der Kopf steckt zwischen den Schultern. Bei schmächtigem, lungensüchtigem Habitus, ist der Hals lang und dünn. — Zieht man von den Warzenfortsätzen eine gerade Linie zur Schulter, so hat man die vordere Halsgegend von der hinteren getrennt. Die hintere wird, als dem Rücken angehörender Nacken (Cervix, Nucha), später abgehandelt. Hier nur von der vorderen Halsregion.

Es findet sich keine Gegend im menschlichen Leibe, die, in so kleinem Raume, so viele lebenswichtige Organe einschliesst, wie die vordere Halsregion. Verfolgt man, bei gestrecktem Halse, die Mittellinie derselben vom Kinne bis zum oberen Rande des Brustbeins, so stösst man, drei Querfinger breit unter dem Kinne, auf das Zungenbein. Unter diesem folgt ein bei Männern stark vorragender, stumpfwinkliger Vorsprung (der Adamsapfel, Pomum Adami s. Nodus gutturis), welcher dem Kehlkopfe (besser Kehlknopfe) entspricht, und vor der Pubertätsperiode fehlt. Unter diesem liegt eine weiche, in die Quere sich ausdehnende, gerundete Wulst, der Schilddrüse angehörend, welche an schönen Hälsen entweder gar nicht, oder nur wenig sichtbar und fühlbar ist, bei Dick- und Blähhälsen stärker ausgesprochen ist. Unter dieser Wulst endet die mittlere Halsregion als Drosselgrube (Fossa jugularis) über dem Manubrium sterni. - Seitwärts am Halse liegen zwei vom Brustbeine gegen die Warzenfortsätze aufsteigende, durch die Kopfnicker gebildete Erhabenheiten, hinter welchen über den Schlüsselbeinen flache Gruben (Foveae supraclaviculares) liegen. Bei starken Anstrengungen wird am hinteren Rande des Kopfnickers eine turgescirende Vene (die Vena jugularis externa) bemerkbar, an welcher man zur Ader lassen kann. An mageren Hälsen bejahrter Individuen sind diese Erhabenheiten, und die zwischen ihnen liegenden Vertiefungen, sehr schaff gezeichnet.

Die Haut des Halses ist dunn, beweglich, in Falten aufhebbar, und bildet zuweilen eine, selbst bei der grössten Streckung des Halses nicht auszugleichende Querfurche unter dem Kehlkopfe, welche die Galanterie der französischen Anatomen, wenn sie an Frauenhälsen vorkommt, Collier de Venus nennt. Das subcutane Zellgewebe ist in der Regel fettlos, und verbindet die Haut mit einem darunter liegenden breiten Hautmuskel, dem

Platysma myoides. Unter diesem folgt das bochliegende Blatt der Fascia colli, welches den Kopfnicker einschliesst. In der Mitte des Halses liegen, von oben nach unten, das Zungenbein, der Kehlkopf, die Schilddrüse, die Luströhre, die Speiseröhre, und seitwärts von ihnen das Bündel der grossen Gesässe und Nerven des Halses, welche vom tiesen Blatte der Fascia colli eingehüllt werden. Hat man diese Theile entsernt, so präsentirt sich die vordere Fläche der Wirbelsäule, mit den auf ihr liegenden tiesen Halsmuskeln. — Das über dem Zungenbeine liegende Stück der vorderen Halsgegend bildet mit dem darunter liegenden, bei gerader Richtung des Kopses, einen einspringenden rechten Winkel, und entspricht dem Boden der Mundhöhle, weshalb es auch zu den Kopsregionen gezählt werden kann.

§. 151. Specielle Beschreibung der Halsmuskeln, welche den Kopf und den Unterkiefer bewegen.

Der Hautmuskel des Halses, Platysma myoides (πλάτυσμα μυοeidec, muskelartige Ausbreitung), Subcutaneus colli, Latissimus colli, ein breiter, dünner, viereckiger Muskel, entspringt vom subcutanen Zellgewebe der Brust in der Gegend der zweiten Rippe, steigt über das Schlüsselbein zur seitlichen Halsgegend, und mit dem der anderen Seite convergirend zum Unterkieser hinauf, über welchen hinüber er zum Panniculus adiposus des Gesichts gelangt, und mit zerstreuten Bündeln im Panniculus, im Mundwinkel, und in der Fascia parotideo-masseterica endigt. Der Convergenz wegen kreuzen sich die innern Fasern beider Hautmuskeln unter dem Kinne. Die mittlere Halsgegend wird nicht von ihnen bedeckt. geht ein Theil der binteren Bündel nicht zum Gesichte, sondern um das Ohr herum, zur Linea semicircularis superior des Hinterhauptbeins, oder Er hilft den Kiefer herabziehen, und erhebt, wenn zum Warzenfortsatz. dieser fixirt ist, die Haut des Halses von den tiefer liegenden Schichten, da der nach einwärts concav gebogene Muskel, während seiner Contraction, geradlinig zu werden strebt.

Der Kopfnicker, Musculus sterno-cleido-mastoideus, liegt an der Seite des Halses, zwischen Brustbein und Warzenfortsatz. Er entsteht mit zwei, durch eine dreieckige Spalte von einander getrennten Köpfen, von der vorderen Fläche der Handhabe des Sternum, und von der Extremitas sternalis des Schlüsselbeins. Beide Köpfe schieben sich so über einander, dass die Sternalportion die Schlüsselbeinportion deckt, und vereinigen sich über der Trennungsspalte zu einem gemeinschaftlichen Muskelkörper, der sich am Warzenfortsatze ansetzt. Er zieht, wenn er auf beiden Seiten wirkt, den Kopf nach vorn, dreht, wenn er einzeln wirkt, das Gesicht nach der entgegengesetzten Seite, und neigt den Kopf gegen die Schulter seiner Seite. Bei fixirtem Kopfe kann er wohl den Brustkasten heben, und somit auch bei forcirter Inspiration mitwirken. (Dieses beweist seine oft

bedeutende Massenzunahme bei chronischen Lungenleiden, besonders Emphysema und Oedema pulmonum.)

Da es einmal Grundsatz ist, von den beiden Endpunkten eines Muskels jenen für den Ursprung zu nehmen, der der minder bewegliche ist, so kann ich Sömmerring und Theile nicht beipflichten, welche den Warzensortsatz als den Ursprung des Kopsnickers betrachten. Ebensowenig möchte ich nach Albin und Meckel ihn in zwei besondere Muskeln trennen, und einen Sterno-mastoideus und Cleido-mastoideus unterscheiden. Wenn auch die beiden Köpse bei vielen Säugethieren als getrennte Muskeln bestehen, so wäre ihre Annahme beim Menschen eine nutzlose Vervielsältigung, und wir würden, um consequent zu bleiben, genöthigt sein, alle übrigen beim Menschen vereinigten, bei den Thieren aber getrennten Muskelportionen, als selbstständige Muskeln zu betrachten (z. B. die drei Portionen des Deltamuskels). Ein humoristischer Anatom des Mittelalters zu Nürnberg nannte ihn den Rathsherrnmuskel. — Die Ossa suprasternalia Brescheti (Note zu §. 120) kann man auch für Sesambeine im Sternalkops des Kopsnickers halten.

Der Kopfnicker ist zuweilen dreiköpfig. Der überzählige dritte, gewöhnlich sehr schwache Kopf, liegt entweder zwischen den beiden gewöhnlichen, oder an der äusseren Seite der Clavicularportion. — Als Thierähnlichkeiten sind ferner zwei Abnormitäten interessant. 1. Es löst sich vom vorderen Rande des Muskels ein Bündel ab, um zum Winkel des Unterkiefers zu gehen (beim Pferde setzt sich die ganze Sternalportion am Unterkiefer sett), oder es verlängert sich 2. ein Theil der Sehne der Sternalportion nach abwärts zur vorderen Fläche des Brustbeins, wird sleischig, und besetigt sich entweder am 5., 6. oder 7. Rippenknorpel, oder verliert sich in die Scheide des geraden Bauchmuskels. (Andeutung des bei einigen Säugethieren vorkommenden Musculus sternalis.)

Am hinteren Rande des Sterno-cleido-mastoideus läust die Vena jugularis externa herab; — seine äussere Fläche wird vom schräge aussteigenden Nervus auricularis magnus, und von den aus dem Plexus cervicalis entspringenden Hautnerven des Halses gekreuzt; — seine untere Hälste deckt die Vena jugularis interna, die Arteria carotis communis, und den zwischen beiden liegenden Nervus vagus.

Der zweibäuchige Unterkiefermuskel, Biventer s. digastricus maxillae inferioris, liegt im oberen Theile des Halses, dicht an und unter dem Unterkiefer. Sein hinterer Bauch entspringt aus der Incisura mastoidea, sein vorderer vom unteren Rande des Kinns. Beide Bäuche werden durch eine mittlere rundliche Sehne verbunden, welche durch ein schmales fibroses Blatt an das Zungenbein gehestet wird, und deshalb einen nach unten convexen Bogen bildet, der, wenn man das Zungenbein nach abwärts zicht, ein spitziger Winkel wird. Häufig durchbohrt die Sehne den Griffel-Zungenbeinmuskel vor seiner Insertion am Zungenbeine, und wird in diesem Falle von einem kleinen Schleimbeutel umhüllt. Die vorderen Bäuche beider Digastrici werden oft durch eine sehnige Querbinde mit einander verbunden. - Er zieht den Kiefer herab, und öffnet den Mund. Ist der Kiefer durch die Hebemuskeln sixirt, so gewinnt auch sein vorderer Bauch einen festen Punkt, und der Muskel wird, wenn er sich zusammen-Er kann auch seine Thätigkeit umkehren, zieht, das Zungenbein heben. und den Warzenfortsatz sammt dem Hinterkopf herabziehen, wodurch der Vorderkopf in die Höhe geht, und der Mund durch Bewegung des Oberkiefers geöffnet wird. Man überzeugt sich von der Richtigkeit dieser Angabe, wenn man das Kinn auf die Hand, oder auf den Rand eines Tisches stemmt, und den Mund zu öffnen sucht.

§. 152. Muskeln des Zungenbeins und der Zunge.

Die Muskeln des Zungenbeins bilden eine für sich bestehende Gruppe von Muskeln, welche theils über, theils unter dem Zungenbeine liegen. Die Muskeln der Zunge liegen blos über dem Zungenbeine, und schliessen sich an die Zungenbeinmuskeln so an, dass sie unter Einem mit ihnen abgehandelt werden können.

A. Zungenbeinmuskeln.

- a. Zungenbeinmuskeln, welche unter dem Zungenbeine liegen:
- 1. Der Schulterblatt-Zungenbeinmuskel, Musculus omo-hyoideus. Er entspringt vom oberen Rande der Scapula, nahe am Ausschnitte, oder vom Querbändchen des letzteren, läust als ein langer und dünner Muskelstrang schräge nach innen und oben, kreuzt sich mit dem Kopfnicker, der ihn bedeckt, ist an der Stelle, wo er über die grossen Gesässe des Halses weggeht, sehnig, wird dann wieder sleischig, und setzt sich am unteren Rande der Basis des Zungenbeins sest. Er ist somit ein zweibäuchiger Muskel. Seine mittlere Sehne und sein unterer Bauch hängen mit dem tiesliegenden Blatte der Fascia colli zusammen.
- 2. Der Brustbein-Zungenbeinmuskel, Musculus sterno-hyoideus, entspringt von der hinteren Fläche der Handhabe des Brustblattes, steigt senkrecht zum Zungenbeine hinauf, und inserirt sich einwärts vom Omo-hyoideus. Er ist daumenbreit, dünn, und dem der anderen Seite fast bis zur Berührung nahe gerückt. Hat man ihn quer durchschnitten, so findet man unter ihm zwei ähnliche, flache, aber etwas breitere Muskeln, welche zusammengenommen so lang sind, wie der Sterno-hyoideus. Diese sind:
- 3. Der Brustbein-Schildknorpelmuskel, Musculus sternothyreoideus, welcher von der hinteren Fläche der Brustbeinhandhabe, und vom oberen Rande des ersten Rippenknorpels entspringt, und nicht bis zum Zungenbeine aufsteigt, sondern schon an der Seitenplatte des Schildknorpels endigt. Die Länge seiner Muskelbündel wird durch einen quer eingewebten sehnigen Streifen (Inscriptio tendinea) unterbrochen. Was ihm an Länge sehlt, um das Zungenbein zu erreichen, ersetzt:
- 4. der Schildknorpel-Zungenbeinmuskel, Musculus thyreohyoideus, der dort entspringt, wo der Sterno-thyreoideus endigte, und am unteren Rande der Basis und des grossen Hornes des Zungenbeins sich festsetzt. Der Thyreo-hyoideus kann das Zungenbein unmittelbar, der Sterno-thyreoideus nur mittelbar herabziehen.

- b. Ueber dem Zungenbeine liegen:
- 1. Der Griffel-Zungenbeinmuskel, Musculus stylo-hyoideus. Er entspringt von der Mitte des Griffelfortsatzes, bildet einen schlanken, rundlichen Muskelstrang, läust mit dem hinteren Bauche des Biventer maxillae nach vorn und unten, wird zuweilen von der Sehne des letzteren durchbohrt (Schleimbeutel), oder läust an der ausseren Seite der Sehne herab zum kleinen Zungenbeinhorn. Er wird häusig doppelt gesehen, zu welcher Anomalie seine Durchbohrung durch die Sehne des Biventer disponirt.
- 2. Der Kiefer- oder Mahlzungenbeinmuskel, Musculus mylohyoideus ($\mu \dot{v} \lambda \eta$, Kinnbacke). Er nimmt seinen Ursprung an der Linea obliqua interna s. mylohyoidea des Unterkiefers, und stellt einen breiten, dreieckigen Muskel dar, dessen äusserste Fasern an der vorderen Fläche der Zungenbeinbasis endigen, die übrigen dagegen in denselben Muskel der anderen Seite entweder ununterbrochen, oder durch Vermittlung einer sehnigen Zwischenlinie fortlaufen, und streng genommen somit nur Ein Mylo-hyoideus für beide Seiten besteht, der, als von einer Linea obliqua interna zur anderen laufend, Transversus mandibulae genannt werden könnte. Dieser Muskel liegt sodann nicht in einer horizontalen Ebene, sondern ist nach unten gekrümmt, und seine tiefste Stelle erscheint am Körper des Zungenbeins adhärent. Er wird, wenn er sich zusammenzieht, plan werden, dadurch das Zungenbein und den ganzen Boden der Mundhöhle heben. Um ihn in seiner ganzen Grösse zu sehen, muss der vordere Bauch beider Digastrici weggenommen werden.
- 3. Der Kinn-Zungenbeinmuskel, Musculus genio-hyoideus, liegt über dem vorigen, entspringt schmal von der Spina mentalis interna, läust gerade, und etwas breiter werdend, zum Zungenbeine herab, und besestigt sich an der Basis desselben. Er ist an denselben Muskel der anderen Seite so sest angeschmiegt, dass er häusig sich mit ihm vereinigt, und als unpaariger Muskel erscheint.

B. Zungenmuskeln.

1. Der Kinn-Zungen muskel, Musculus genio-glossus (γένειον, Kinn; γλῶσσα, Zunge). Er liegt über dem Genio-hyoideus, entspringt mit einer kurzen, aber starken Sehne von der Spina mentalis interna, und läust nach rückwärts gegen die untere Fläche der Zunge, in welche er mit strahlig auseinander fahrenden Fasern eindringt. Er bildet unmittelbar den Boden der Mundhöhle, und wird an seiner oberen Fläche von der Schleimhaut derselben überzogen, welche hier, zwischen beiden Kinn-Zungenmuskeln, das Zungenbändchen bildet. Er liegt, wie der Genio-hyoideus, dicht an seinem Gespan. Ein Schleimbeutel zwischen den beiden Genioglossi (dessen hydropischer Zustand die sogenannte Froschgeschwulst, Ranula, bedingen soll) wurde von mir niemals gesehen. (Neuere Untersuchungen haben auch dargethan, dass die sogenannte Froschgeschwulst eine neugebildete seröse Cyste ist.) Er zieht die ausgehobene Zunge nieder, und nähert

ihren Grund dem Kinnstachel, wodurch die Spitze derselben aus der Mundhöhle heraustritt. Man hat ihn deshalb auch Exsertor oder Protrusor linguae genannt.

- 2. Zungenbein-Zungenmuskel, Musculus hyo-glossus. Nach Entfernung des Biventer, Mylo- und Stylo-hyoideus, sieht man ihn vom oberen Rande des Mittelstücks des Zungenbeins, seines grossen und kleinen Hornes, entspringen. Er wurde dieses dreifachen Ursprunges wegen sehr überslüssig in drei besondere Muskeln getheilt: Basio-, Cerato-, und Chondroglossus. Er ist dünn und breit, steigt schief nach vorn und oben zum Seitenrande der Zunge empor, und ist ein Depressor linguae. Seine äussere Fläche wird vom Nervus hypoglossus gekreuzt.
- 3. Der Griffel-Zungenmuskel, Musculus stylo-glossus, entspringt von der Spitze des Griffelfortsatzes und vom Ligamentum stylomaxillare, liegt über und innerhalb des Stylo-hyoideus, geht bogenförmig zum Seitenrande der Zunge, wo er sich mit den aufsteigenden Fasern des Hyo-glossus kreuzt, und theils zwischen den Bündeln desselben in das Zungengewebe eindringt, theils, sich allmälig verjüngend, bis zur Spitze der Zunge ausläuft. Zieht die Zunge seitwärts und rückwärts. Gruber sah ein accessorisches Bündel dieses Muskels von der unteren Wand des knorpeligen Gehörgangs entstehen.

Der innere Muskelbau der Zunge, folgt bei ihrer Beschreibung, §. 228. — Die beste Ansicht von der Grösse, Stärke, und strahligen Verbreitung des Musculus genio-glossus, der den grössten Antheil des eigentlichen Zungen-fleisches erzeugt, erhält man, wenn man den Unterkiefer am Kinne zersägt, alle Weichtheile bis zur Wirbelsäule durch einen senkrechten Schnitt spaltet, und die Schnittsläche der Zunge besieht.

Unter allen hier abgehandelten Muskeln variirt der Stylo-hyoideus am östersten durch Zerfallen in zwei kleinere. Die Spaltung des Muskels durch die Sehne des Biventer scheint zu dieser Anomalie zu disponiren. Ich habe ihn auch dreisach, Otto dagegen auf beiden Seiten sehlen gesehen. Fehlen des Omo-hyoideus, und Ersetztwerden desselben durch einen breiten Sterno-hyoideus auf beiden Seiten beobachtete ich zweimal. Sein Ursprung wird zuweilen auf die Basis des Processus coracoideus, ja sogar auf den oberen Rand der ersten Rippe versetzt, woher die Namen Coraco- und Costo-hyoideus. Seine mittlere Sehne wird nicht selten durch Fleischsasern verdrängt. Der östers vorkommende Musculus coraco-cervicalis Krausii entspringt vom Rabenschnabelsortsatz, läust, bedeckt vom Ursprungsbauche des Omo-hyoideus, nach vorn und oben in die Fossa supraclavicularis, und endet im ties liegenden Blatte der Fascia colli s. cervicalis, welches er anspannt.

Nebst dem Stylo-hyoideus und Stylo-glossus, sinde ich gar nicht so selten einen merkwürdigen Muskel am Grisselfortsatz entstehen, welchen ich im 21. Bande der Oesterr. med. Jahrbücher (Neue Folge): Bemerkungen über die Gesichtsmuskeln und einen neuen Muskel des Ohres, beschrieb und abbildete. Er geht an der Aussenseite des Grissels nach oben zur unteren Wand des knorpeligen Gehörgangs, und wurde von mir Stylo-auricularis genannt. Da er in Theile's Umarbeitung der Sömmerring'schen Muskellehre nicht ausgenommen wurde, so benütze ich diese Gelegenheit, ihm seine Existenz zu vindiciren, und da er unter 30 Fällen sünsmal

auf beiden Seiten vorkam, so ist er wohl mehr als blosse bedeutungslose Anomalie.

Da das Heben und Senken des Zungenbeins eine übereinstimmende Bewegung des mit ihm zusammenhängenden Kehlkopfes bedingt, das Heben und Senken des Kehlkopfes aber mit Reibung des vorspringenden Pomum Adami an der inneren Fläche der Hautdecken des Halses verbunden sein muss, so befindet sich auf und über dem Pomum ein breiter Schleimbeutel, der sich bis zur Basis des Zungenbeins erstreckt, und Bursa mucosa subhyoidea (Malgaigne) genannt wird. Wassersucht desselben kann, wie mir ein Fall bekannt wurde, für Kropf gehalten werden.

§. 153. Tiefe Halsmuskeln.

Sie zerfallen in zwei Gruppen, deren eine auf der vorderen Fläche der Wirbelsäule ausliegt, die andere die Seitengegend der einnimmt.

1. Muskeln auf der vorderen Fläche der Halswirbelsäule.

Der grosse vordere gerade Kopfmuskel, Musculus rectus capitis anticus major, entspringt mit vier sehnigen Zipfeln vom vorderen Rande des zweiten bis sechsten Halswirbel-Querfortsatzes, steigt, etwas nach innen gerichtet, empor, und hestet sich an die untere Fläche der Pars basilaris des Hinterhauptbeins. Beugt den Kopf nach vorn.

Der kleine vordere gerade Kopfmuskel, Musculus rectus capitis anticus minor, entsteht am vorderen Rande des Querfortsatzes des Atlas, geht schief nach innen und oben, wird vom vorigen bedeckt, und hat mit ihm dieselbe Insertion, und somit auch dieselbe Wirkung.

Der lange Halsmuskel, Musculus longus colli, liegt nach innen vom Rectus capitis anticus major, und bedeckt die vordere Wirbelsäulenfläche vom ersten Halswirbel bis zum dritten Brustwirbel herab. Er hat einen sehr complicirten Bau, und besteht, nach Luschka's genauer Untersuchung, eigentlich aus drei Muskeln, welche füglich als selbstständig angesehen werden sollten. Der erste derselben, der Lage nach der innerste, ist ein gerader, gesiederter Muskel, der sich vom Körper des dritten Brustwirbels bis zum Körper des Epistropheus erstreckt. Er beugt die Halswirbelsäule. Der zweite, kleinere, etwas schräg nach aus- und aufwärts gerichtete Muskel entspringt fleischig von der Seite des Körpers des zweiten und dritten oberen Brustwirbels, und inserirt sich, schief aufsteigend, durch zwei oder drei kurze Sehnen am vorderen Rande der zwei oder drei letzten Halswirbel-Querfortsätze. Luschka nennt ihn Obliquus colli (anticus) inferior. Sein Ursprung ist mit jenem des früheren innig verbunden. Er dreht die Halswirbelsäule. Der dritte, etwas stärkere, entspringt mit zwei Zacken von den vorderen Rändern der Querfortsätze des dritten und vierten Halswirbels, läuft schief nach innen und oben, und setzt sich an das Tuberculum des vorderen Halbringes des Atlas. Er beugt die Halswirhelsäule, und dreht sie zugleich, aber in entgegengesetzter Richtung, als der zweite. Luschka nennt ihn Obliquus colli (anticus). superior. Vergleicht man die obere und untere schiese Portion auf beiden Seiten, so bilden sie einen langen Rhombus, durch dessen Ebene die beiden geraden Portionen aufsteigen. — Da alle drei Portionen des Muskels auf beiden Seiten gleichzeitig wirken, so wird ihre Gesammtwirkung wohl allein auf die Beugung des Halses abzielen.

Luschka, der lange Halsmuskel des Menschen, in Müller's Archiv, 1854. pag. 103.

2. Muskeln an der Seitengegend der Halswirbelsäule.

Hier liegen die drei Rippenhalter, Scaleni (σχαληνὸς, ungleich dreiseitig), welche von den Querfortsätzen der Halswirbel zur ersten und zweiten Rippe ziehen, und bei der geringen Beweglichkeit dieser Rippen, lieber den Hals seitwärts (wenn sie nur auf einer Seite wirken), oder vorwärts (wenn sie auf beiden Seiten thätig sind) beugen, als die Rippen heben werden. Jedenfalls können sie auch als Hebemuskeln der ersten Rippen angeschen werden.

Der vordere Rippenhalter, Musculus scalenus anticus, entspringt vom oberen Rande der ersten Rippe, und läuft an der äusseren Seite des Longus colli zu den vorderen Rändern der Querfortsätze des vierten bis sechsten Halswirbels. Der Zwerchfellsnerv kreuzt schief seine vordere Fläche.

Der mittlere Rippenhalter, Musculus scalenus medius, folgt auf und hinter dem vorderen, entspringt vom oberen Rande und von der äusseren Fläche der ersten Rippe, und inserirt sich mit sieben Zacken an die Querfortsätze aller Halswirbel.

Der hintere Rippenhalter, Musculus scalenus posticus, ist der kleinste, und häufig mit dem mittleren verwachsen. Er entspringt an der zweiten Rippe, und besestigt sich an den Querfortsätzen des sünsten bis siebenten Halswirbels.

§. 154. Topographische Anatomie des Ilalses.

Es handelt sich hier nicht um eine Detailschilderung der Lagerungsverhältnisse sämmtlicher am Halse angebrachter Weichtheile, die für Anfänger grossen Theils unverständlich wäre, sondern um die Erörterung des Nebeneinanderseins der wichtigeren Gefässe und Nerven, welche in gewissen constanten Beziehungen zu den Muskeln des Halses stehen. Diese Beziehungen sind so sicher und verlässlich, dass sie bei dem Aufsuchen grösserer Gefässe und Nerven die besten Führer sind. Der Anfänger wird deshalb gut thun, bei der Zergliederung des Halses sein Augenmerk nicht blos auf die Muskeln, sondern auch auf die Gefässe und Nerven zu richten, welche zwischen denselben eingeschaltet liegen.

Nach Entfernung der Haut, des Platysma myoides, und des hochliegenden Blattes der Fascis colli, bemerkt man vorerst, dass die Richtungen

des Sterno-cleido-mastoideus und des Omo-hyoideus sich kreuzen. Ersterer läust von innen und unten nach oben und aussen, letzterer in entgegengesetzter Richtung. Die gekreuzten Muskelrichtungen beschreiben die Seiten zweier mit den Spitzen aneinanderstossenden Dreiecke. Denkt man sich die Richtung des Omo-hvoideus, über das Zungenbein hinaus, bis zum Kinn verlängert, so ist die Basis des oberen Dreiecks der untere Rand des Kiefers; die des unteren der obere Rand des Schlüsselbeins. Wir wollen das obere Halsdreieck deshalb Trigonum inframaxillare, und das untere Trigonum supraclaviculare nennen. Beiden Dreiecken entsprechen schon bei ausserer Ansicht des noch mit der Haut bedeckten Halses magerer Individuen, zwei seichte Gruben: Fossa inframaxillaris und supraclavicularis. - Man beginne mit der Untersuchung des unteren Halsdreieckes. und trenne, um es zugänglicher zu machen, den Schlüsselbeinursprung des Kopfnickers. Ist dieses geschehen, so findet man die Area des Dreieckes durch eine lockere, verschiebbare Aponeurose — tiesliegendes Blatt der Fascia colli - bedeckt, welche mit dem Musculus omo-hyoideus verwachsen ist, und durch ihn gespannt werden kann. Unter dieser Aponeurose folgt laxes, grossblättriges Zellgewebe, welches die Lymphdrüsen des Plexus supraclavicularis enthält, und vorsichtig abzutragen ist, um die im Grunde der Grube liegenden Weichtheile zu schonen. Man stösst nun auf die seitliche Gegend der Halswirbelsäule, und die an ihr entspringenden Scaleni. Wird nun das Schlüsselbein weggenommen, oder durch starkes Niederziehen des Armes so weit gesenkt, dass man den oberen Rand der ersten Rippe erblickt, so findet man an der vorderen Fläche des Scalenus anterior den Zwerchfellsnerv, Nervus phrenicus, von aussen und oben. nach innen und unten zur oberen Brustapertur laufen. Vor der Rippeninsertion des Scalenus anticus zieht die Vena subclavia über die erste Rippe weg nach innen, und vereinigt sich hier (gewöhnlich auf der linken Seite) mit der Vena jugularis externa, wenn diese sich nicht in die Vena juquiaris interna mundet. Zwischen dem Scalenus anticus et medius bleibt eine dreieckige Spalte frei, durch welche die vier unteren Halsnerven und der erste Rückennerv hervortreten, um sich zum Plexus subclavius, der im weiteren Laufe zum Plexus axillaris wird, zu vereinigen. Unter dem ersten Brustnerv kommt die Arteria subclavia aus der Spalte hervor, und krummt sich, dicht an der ersten Rippe liegend, über sie nach abwärts, um unter dem Schlüsselbeine zur Achselhöhle zu laufen. — Das obere Halsdreieck ist viel grösser, und sein Inhalt zahlreicher, aber auch leichter zugänglich. Während der Sterno-cleido-mastoideus noch den vorderen Rand des unteren Halsdreieckes bildete, deckte er die grossen Gefässe und Nerven, die am Halse gerade auf- und absteigen, zu. Durch sein Rück- und Aufwärtslaufen werden diese, im oberen Halsdreiecke, nicht mehr von ihm, sondern nur von der Fascia colli (welche sie zwischen ihre beiden Blätter aufnimmt) bedeckt sein. Nach Abtragung des oberslächlichen Blattes der Halsbinde, findet man hier zuerst, dicht unter

dem Unterkieser, die Glandula submaxillaris, in deren nächster Nachbarschaft Haufen von linsen- bis erbsengrossen Lymphdrüsen vorkommen. Isolirt man die Glandula submaxillaris von dem sie befestigenden Zellgewebe (wobei man am vorderen Rande der Drüse ihren Ausführungsgang zu schonen hat), so kann man sie aus ihrer Nische, gegen das Kinn, herausschlagen. Man überblickt sodann den Musculus biventer, stylohyoideus und mylohyoideus, und sieht den Musculus hyoglossus vom Zungenbein herauskommen, und, gegen den Kiefer hinauf, vom Musculus styloglossus gekreuzt werden. Hat man den Musculus biventer ganz entfernt, so sieht man, vom Zungenbein nach aufwärts gezählt, 1. den Nervus hypoglossus, welcher das Bündel der grossen Blutgefässe nach vorn und oben umgreift, 2. die Verästlung der Carotis externa, und die Zusammensetzung der Vena jugularis interna. Die Aeste der Carotis externa lassen sich ohne Mühe verfolgen, und es sind von ihnen die nach vorn abgehenden Aeste: die Arteria thyreoidea superior, die Arteria lingualis, und Arteria maxillaris externa, in praktischer Beziehung besonders wichtig. - Ist man bis auf den Ursprung des Musculus stylo-hyoideus eingedrungen, so erblickt man zugleich den Nervus lingualis, der ziemlich der Richtung dieses Muskels folgt. - Die schichtenweise Präparation der Muskeln zwischen dem Kinn und dem Zungenbeine, so wie die Darstellung der in der Medianlinie des Halses angebrachten Organe, ist ohne besondere Verhaltungsregeln leicht ausführbar.

Es ist dem Ansanger dringend zu empsehlen, bevor er zur praktischen Zergliederung des Halses schreitet, wenigstens den Stammbaum der hier befindlichen Blutgestasse, und die Verlaussweise der Nerven, in den betressenden \$5. der Gestas- und Nervenlehre nachzusehen.

§. 155. Aponeurose des Halses.

Die Aponeurose des Halses (Fascia colli s. cervicalis) ist eine sehr complicirte, und als ein zusammenhängendes Ganzes nie darzustellende fibrose Membran, welche aus einem hoch- und tiesliegenden Blatte besteht, die sich selbst wieder häusig in zwei Blätter spalten, um Weichtheile scheidenartig zu umfassen, und sich wieder zu vereinigen. Ihre Gegenwart ist bei allen blutigen, chirurgischen Eingrissen am Halse wohl zu berücksichtigen. So ist die Exstirpation von Geschwülsten am Halse, welche extra fasciam liegen, leicht und gefahrlos, jene der intra fasciam gelegenen dagegen schwieriger, und nicht so selten wirklich schwer. Alle intra fasciam gelegenen gelegenen, also tiessitzenden Geschwülste werden, weil sie mit einer Menge hochwichtiger Organe in Contact gerathen, oder dieselben umwachsen, gesährlichere Zusälle erregen, als die oberstächlichen. — Könnte man sich alle Weichtheile des Halses wegdenken, und nur die Fascia colli zurücklassen, so würde sie als ein System von hohlen Röhren und Schläuchen erscheinen, durch welche jene Weichtheile durchgesteckt waren. Das

hochliegende Blatt ist eine Fortsetzung der Fascia parotideo-masseterica des Gesichts. Es liegt unter dem Platysma myoides, deckt das Trigonum inframaxillare, hüllt den Kopfnicker ein, setzt sich über das Trigonum supraclaviculare zum Schlüsselbeine fort, und adhärirt an ihm. Nach hinten geht es in die, unter dem Musculus cucullaris liegende Fascia nuchae tber, und nach vorn bedeckt es den, vom Brustbeine herauskommenden Musculus sterno-hyoideus, sterno-thyreoideus, thyreo-hyoideus, so wie den oberen Bauch des Omo-hyoideus, für welche Muskeln es Scheiden bildet, und hängt in der Medianlinie mit demselben Blatte der anderen Seite zusammen. Es dringt nicht in die Brusthöhle ein, sondern befestigt sich am Manubrium sterni an das Ligamentum interclaviculare. — Das tiefliegende Blatt entspringt an der Linea obliqua interna des Unterkiefers, hängt mit dem Ligamentum stylo-maxillare, und mit der Fascia buccopharyngea zusammen, bildet den Grund des Trigoni inframaxillaris, geht unter dem Kopfnicker zum Trigonum supraclaviculare, dessen Boden es ebenfalls bildet, hängt an dem unteren Bauche des Omo-hyoideus fest an, verschmilzt nach hinten mit der Fascia nuchae, dringt nach vorn gegen die grossen Gesässe des Halses, die es scheidenartig umschliesst, und theilt sich seitwärts von ihnen in zwei Blätter, deren eines hinter dem Pharvnx und der Speiseröhre zur Fascia longitudinalis der Wirbelsäule zieht, um mit ihr sich zu verweben, das andere vor der Schilddrüse und Luftröhre mit dem entgegenkommenden Blatte der anderen Seite verschmilzt, und nach abwärts durch die obere Brustapertur in den Thorax eindringt, um sich an die Beinhaut des Manubrii sterni, und an die vordere Fläche des Herzbeutels festzusetzen. Nur am Körper des Zungenbeins und über dem Pomum Adami sind das hoch- und tiesliegende Blatt der Halsbinde zu einem einfachen fibrösen Stratum verbunden.

C. Muskeln der Brust.

§. 156. Aeussere Ansicht der vorderen und seitlichen Brustgegend.

Es werden hier nur jene Muskeln abgehandelt, welche an der vorderen und den beiden Seitengegenden der Brust vorkommen; die an der hinteren Gegend gelagerten werden mit den Rückenmuskeln beschrieben.

Die vordere Brustgegend setzt sich nach oben und aussen unmittelbar in die convexen Schultergegenden fort, und wird von diesen nur durch eine schwache Depression der Haut (Fossa infraclavicularis) getrennt. Nach unten trennt sie der Umfang der unteren Brustapertur vom Bauche. Die seitliche Brustgegend, welche von der vorderen und hinteren durch keine natürliche scharfe Grenze abgemarkt wird, geht nach oben in die Achselgrube, und nach unten in die Weichen des Bauches über. — In der Medianlinie der vorderen Brustgegend, bemerkt man oben, als Grenze zwischen Brust und Hals, die Incisura jugularis des Brustbeins, und zu bei-

den Seiten derselben einen höckerigen Vorsprung - das Sternalende des Schlüsselbeins. Unter der Incisura jugularis läust bis zum Schwertknorpel herab eine ebene schmale Fläche, die an der Vereinigungsstelle der Handhabe des Brustbeins mit dem Körper einen queren, nicht immer deutlichen Vorsprung bildet, und am Schwertknorpel plötzlich zu einer Grube einsinkt - Magen- oder Herzgrube, Scrobiculus cordis. Rechts und links von der Medianlinie, sind bei mageren Individuen die queren Vorsprünge der Rippen und ihrer Knorpel sichtbar und zählbar. Am äusseren Theile der vorderen Gegend bilden bei Weibern die Brüste zwei halbkugelige, und mit ihren Saugwarzen etwas nach aussen gerichtete Wölbungen, zwischen welchen die Brustbeingegend als Busen sich vertiest. Bei Männern und bei Kindern beiderlei Geschlechts vor dem Erwachen des Geschlechtstriebes. ist diese Gegend mit dem übrigen Thorax mehr gleichförmig gerundet, und von den Brüsten blos die Warzen sichtbar. - Die Haut ist in der Mittellinie dünn, und über dem Brustbeine wenig verschiebbar. Seitwarts wird sie dicker, und lässt sich in Falten aufziehen. Der Panniculus adiposus wuchert an den Seiten um die Brustdrüsen herum; am Brustbeine selbst entwickelt er sich gar nicht, so dass die Sternalregion um so tieser wird, je fetter ein Mensch ist. Unter dem Panniculus adiposus folgt der grosse Brustmuskel, den eine sehr feine zellgewebige Fascia überzieht. Unter ihm stösst man auf die der seitlichen Brustgegend eigene Fascia coracopectoralis, und auf den Musculus subclavius, pectoralis minor, und serratus anticus major. Die Zwischenrippenräume füllen die Musculi intercostales aus.

§. 157. Muskeln an der Brust.

Sie bilden drei über einander liegende Schichten.

A. Erste Schichte.

Der grosse Brustmuskel, Musculus pectoralis major s. Adductor brachii, erstreckt sich von der vorderen Brustgegend zum Oberarm, und bildet die vordere Wand der Achselhühle. Um ihn gut zu präpariren, muss der Arm vom Stamme abgezogen werden. Er hat im Ganzen eine dreieckige Gestalt. Die convexe Basis des Dreiecks entspricht dem Ursprunge des Muskels am Thorax, die Spitze der Insertion am Oberarm. Er entsteht von der Sternalextremität des Schlüsselbeins als Portio clavicularis, von der vorderen Fläche des Sternums und der Knorpel der wahren Rippen als Portio sterno-costalis, häusig noch mittelst eines schmalen Muskelbündels von der Scheide des geraden Bauchmuskels als Portio abdominalis. Von diesem weit ausgedehnten Ursprunge schieben sich die Fascikeln des Muskels im Lause gegen den Oberarm auf einander zu, so dass in der Nähe des Oberarms die oberen die unteren decken, und der Muskel dadurch an Dicke gewinnt, was er an Breite verliert. Seine kurze derbe Endsehne besetigt sich an der Spina tuberculi majoris. Die Wirkung des

Muskels erzielt, allgemein ausgedrückt, eine Näherung der oberen Extremität gegen den Stamm, und wird, nach den verschiedenen Stellungen derselben, in verschiedener Art erfolgen, was durch Versuche am eigenen Arm oder am Cadaver leicht abzusehen ist.

Die Portio clavicularis ist von der Portio sterno-costalis durch eine fast horizontale und enge Spalte geschieden, durch welche die Fascia superficialis eine Fortsetzung in die Tiefe, zur Fuscia coraco-pectoralis, schickt. -Vom Musculus deltoideus wird der Pectoralis major durch eine dreieckige, oben breite, unten gegen den Oberarm spitzig zulaufende Furche geschieden, in welcher, nebst vielem Fette, die Fena cephalica liegt. Nach Herausnahme des Fettes fuhlt man oben die Spitze des Processus coracoideus, und die von ihm entspringende Fascia coraco-brachialis, welche den Grund der Grube bildet. - Von der Sehne des Pectoralis major gehen viele Faserbundel zur Verstärkung der Schnenscheide des Armes ab, und über den Sulcus intertubercularis läust ein ziemlich constantes sehniges Fascikel, unter den Gesässen und Nerven der Achselhöhle, zur Sehne des breiten Rückenmuskels hin. -Manchmal krummt sich sein unterstes Muskelbundel, vor der Insertion am Oberarm, über die Gefässe und Nerven der Achsel brückenförmig nach innen und hinten, um mit der Sehne des breiten Rückenmuskels sich zu verweben. Cruveilhier sah seine Sehne den langen Kopf des Biceps brachii mit zwei Blättern umfassen, und Tiedemann fand zwischen ihm und dem Pectoralis minor, einen hineingeschobenen überzähligen Brustmuskel, der von der zweiten bis sünsten Rippe entsprang, und an das Mehrsachwerden des Brustmuskels in der Klasse der Vögel erinnert. Ich sah an der Leiche eines athletisch gebauten Lastträgers, die mittleren Bundel beider Pectorales auf dem Brustbeine einander so nahe gerückt, dass sie in einander überzugehen schienen. — Im Allgemeinen ist er ein Zuzieher des Arms, z. B. wenn man die Hand auf die andere Schulter legt, oder beide Arme vor der Brust kreuzt. Die verschiedenen Wirkungsarten des Muskels, welche sich nach Verschiedenheit der Stellung des Armes richten, können im mündlichen Vortrage umständlicher entwickelt werden. Seine Sternocostalportion hat bei fixirtem Arm die Bedeutung eines Inspirationsmuskels. Man sieht deshalb Kinder, die am Keuchhusten leiden, oder Erwachsene, die von einem asthmatischen Anfalle heimgesucht werden, unwillkürlich sich mit den Armen aufstemmen, oder einen sesten Körper umklammern. Bei veralteten Verrenkungen im Schultergelenke kann seine Verkürzung ein schwer zu bewältigendes Hinderniss der Einrichtung abgeben.

B. Zweite Schichte.

Der Schlüsselbeinmuskel, Musculus subclavius, entspringt an der unteren Seite des Schlüsselbeins, sammelt seine Bündel zu einer, an seinem unteren Rande verlaufenden Sehne, welche sich am ersten Rippenknorpel ansetzt. Zieht das Schlüsselbein und dadurch die aufgehobene Schulter herunter.

Zwischen dem Musculus subclavius und der ersten Rippe, sieht man die Gefässe und Nerven der oberen Extremität zur Achselhöhle laufen, in der Ordnung, dass die Vena subclavia nach innen, die Nervenstämme nach aussen, und die Arteria subclavia zwischen beiden in der Mitte liegt.

Der kleine Brustmuskel, Musculus pectoralis minor, entspringt mit drei oder vier Zacken von der äusseren Fläche der zweiten oder drit-

ten bis funften Rippe, und setzt sich mit kurzer und schmaler Sehne an die Spitze des Processus coracoideus fest. Zieht die Schulter nieder, oder hebt die Rippen als Inspirationsmuskel. Seines zackigen Ursprunges wegen, heisst er auch Musculus serratus anticus minor.

Der grosse sägeförmige Muskel, Musculus serratus anticus major, nimmt als breiter und flacher Muskelkörper die ganze Seitenfläche des Thorax bis zur achten Rippe herab ein. Er entspringt mit neun Zacken von der äusseren Fläche der acht oberen Rippen (indem er von der ersten oder zweiten mit zwei Zacken entsteht). Seine Bündel umgreifen die Seitenwand der Brust, dringen convergirend zwischen das Schulterblatt und die Brustwand ein, und setzen sich an die ganze Länge des inneren Randes der Scapula an. — Er zieht das Schulterblatt nach vorn, fixirt es am Thorax, und kann auch bei umgekehrter Thätigkeit die Rippen nach aussen ziehen.

Um diesen schönen Muskel in seiner ganzen Grösse zu sehen, muss das Schlüsselbein entzweigesägt, und der Musculus subclavius und pectoralis minor getrennt werden, so dass das Schulterblatt vom Stamme wegfällt, und nur mehr durch den Serratus anticus major mit der Brust zusammenhängt.

C. Dritte Schichte.

Sie besteht aus den, die eilf Zwischenrippenräume ausfüllenden ausseren und inneren Intercostalmuskeln, welche zwei dünne, mit vielen parallelen Sehnenfasern durchzogene Muskellagen bilden. Beide entspringen vom unteren Rande einer Rippe, und endigen am oberen der nächst darunter liegenden. Die Richtung des äusseren geht schräge nach vorn und unten, die des inneren schräge nach hinten und unten. Die Insertion des ausseren erstreckt sich blos bis zum Anfange der Rippenknorpel, die des inneren bis zum Seitenrande des Sternum. Ersterer ist somit um die Länge eines Rippenknorpels kürzer als letzterer, und ersetzt, was ihm fehlt, durch eine dünne, glänzende Aponeurose, das sogenannte Ligamentum coruscans. Die Ursprünge beider Intercostalmuskeln fassen den am unteren Rippenrande befindlichen Sulcus, und die darin laufenden Gefässe und Nerven zwischen sich. Je nachdem die oberen oder die unteren Rippen fixirt sind, können die Zwischenrippenmuskeln die Rippen heben oder senken, und somit beim Ein- und Ausathmen thätig sein.

Nach Entfernung beider Intercostalmuskeln, gelangt man noch nicht auf das Rippenfell, sondern auf eine äusserst dünne, und deshalb bisher übersehene Aponeurose, welche die ganze innere Oberstäche der Brusthöhle auskleidet, und sich zu dieser, wie die Fascia transversa zur Bauchhöhle verhält (§. 158). Ich nenne sie Fascia endothoracica. Sie verdickt sich bei gewissen krankhasten Zuständen der Lunge und des Rippenfells (mit welchem letzteren sie sehr innig zusammenhängt), und ist dann leichter darstellbar. Zieht man in einem durch Wegnahme der vorderen Wand geöffneten Thorax, dessen Inhalt herausgenommen ist, das Rippenfell von der inneren Oberstäche der Rippen ab, so überzeugt man sich ohne Schwierigkeit von dem Dasein

dieser Aponeurose, welche besonders gegen die Wirbelsäule zu als ein selbstständiges fibröses Blatt mit Vorsicht zu isoliren ist. — Sehr oft entwickele sich an unbestimmten Stellen Muskelbündel in ihr, welche vom unteren Rande einer oberen Rippe nicht zur nächsten unteren, sondern, diese überspringend, zur zweiten ziehen, häufig die ganze Seitenwand des Thorax einnehmen, und von Kelch innerer Sägemuskel, von Meckel Musculus infracostalis, von Albin am passendsten Musculus subcostalis genannt wurden.

An der hinteren Fläche des Brustbeins und der Rippenknorpel liegt der Musculus triangularis sterni s. sterno-costalis, ein aus mehreren von unten nach oben auf einander folgenden Zacken bestehender Muskel, welcher aponeurotisch vom Körper und Schwertfortsatz des Brustbeins entspringt, und sich mit fleischigen Zacken an die hintere Fläche des dritten bis sechsten Rippenknorpels inserirt. Er zieht die Rippenknorpel herab, und steht zur Fascia endothoracica in derselben Beziehung, wie die Musculi subcostales. Er bietet auch, wie diese, so viele Spielarten dar, dass Meckel ihn den veränderlichsten aller Muskeln nannte.

D. Muskeln des Bauches.

§. 158. Allgemeines über die Bauchwand.

Bauch oder Unterleib (Abdomen s. venter s. alvus) ist jener Theil des Stammes, der zwischen Brust und Becken liegt. Die grosse Lücke. die am Skelete zwischen dem unteren Rande des Thorax und dem oberen Rande des Beckens existirt, wird nur durch weiche, ausdehnbare Decken geschlossen, welche gemeinhin den Namen Bauchwand führen, und eine Höhle umgürten, die die Organe der Verdauung, und den grössten Theil der Harn- und Geschlechtswerkzeuge enthält. Diese Höhle ist viel grösser. als es nach der äusseren Ansicht der Bauchwand zu vermuthen wäre. Sie setzt sich nämlich nach abwärts in die grosse und kleine Beckenhöhle fort. weshalb auch der knöcherne Beckenring einen Theil ihrer Wandung bildet, und wird nach oben durch die weit in den Thorax hinaufragende Wölbung des Zwerchfells vergrössert, wodurch die unteren Rippen noch an der Bildung der seitlichen Bauchwand Theil nehmen werden. - Da der untere Rand des Thorax mit dem oberen Rande des Beckens nicht parallel läust. muss die Länge der weichen Bauchwand an verschiedenen Stellen des Bauches eine verschiedene sein. Zwischen dem Schwertknorpel und der Schamfuge ist die Bauchwand am längsten, und nimmt nach aus- und rückwärts gegen die Wirbelsäule zu bedeutend ab. Würde man die Bauchwand von ihren Anhestungsstellen ablösen, und in eine Fläche ausbreiten, so erhielte man ein rautenförmiges Viereck, dessen längste Diagonale dem Abstande des Schwertknorpels von der Schamfuge entspricht, und dessen seitliche abgestutzte Winkel an der Wirbelsäule zu liegen kommen. - Da die Peripherie des grossen Beckens grösser ist als die der unteren Brustapertur. so muss die weiche Bauchwand einem stumpfen Kegel mit unterer Basis

gleichen. Nur beim Neugeborenen, wo die Entwicklung des Beckens hinter ijener des Brustkorbes zurücksteht, wird das Verhältniss ein umgekehrtes sein. — Die Wölbung der Bauchwand ist bei mageren Personen und lecrem Bauch nach innen, bei wohlgenährten nach aussen gerichtet, und bei aufrechter Stellung an der unteren Gegend der vorderen Bauchwand stärker, als bei horizontaler Rückenlage. Das Einathmen vermehrt, das Ausathmen vermindert die Wölbung. - Der grosse Umfang der Bauchwand wird durch willkurlich gezogene Linien in kleinere Felder abgetheilt, welche, ihrer Beziehung zu den Eingeweiden wegen, von grossem Belange sind. Man bezeichne an einer Kindesleiche den unteren Thoraxrand und den oberen Beckenrand mit schwarzer Farbe, ziehe von jeder Articulatio sterno-clavicularis eine gerade Linie zur Spina anterior superior des Darmbeins, und eine andere vom unteren Winkel des Schulterblattes zum hinteren Dritttheil der Crista ossis ilei, so hat man die Peripherie der Bauchwand in eine vordere, zwei seitliche, und eine hintere Gegend abgetheilt. Die beiden seitlichen heissen Regiones iliacae oder Darm- oder Bauchweichen, die hintere zerfällt durch die Dornen der Lendenwirbel in eine rechte und linke Halfte, welche Lendengegenden, Regiones lumbales, genannt werden. Führt man nun vom zehnten Rippenknorpel einer Seite zu demselben der anderen Seite eine Querlinie, welche über dem Nabel liegt, und verbindet durch eine ähnliche die beiden vorderen oberen Darmbeinstacheln, so hat man dadurch die vordere Gegend des Bauches in drei Zonen getheilt, von denen die obere Regio epigastrica, die mittlere Regio mesogastrica, und die untere Regio hypogastrica genannt wird. Letztere wird durch den, bei angezogenem Schenkel besonders tiesen Leistenbug (Plica inquinis) vom Oberschenkel getrennt. Die beiden Querlinien entsprechen den Falten, in welche sich die Bauchhaut beim Zusammenkrümmen des Leibes legt. Betrachtet man die Oberstäche der Bauchwand an athletisch-gebauten Menschen, oder an anatomisch-richtig gearbeiteten Statuen, so sieht man eine breite flache Grube in der Medianlinie der vorderen Bauchwand, vom Schwertknorpel an, eine Strecke weit herablaufen - die Magengrube, unrichtig Herzgrube, Scrobiculus cordis. Unter ihr liegt der Nabel, Umbilicus, als faltig eingezogene Narbe des nach der Geburt abgefallenen Verbindungsstranges zwischen Mutter und Kind. Vom Nabel gegen die Schamfuge wölbt sich die Bauchwand durch reichlich angesammeltes Fett, woher der veraltete Name dieser Gegend: Schmerbauch stammt. Rechts und links von der Medianlinie sieht man zwei breite Vorsprünge (durch die geraden Bauchmuskeln gebildet), und nach aussen von diesen zwei Längenfurchen herablaufen, welche die Uebergangsstellen der breiten Bauchmuskeln in ihre Aponeuroscn andeuten. - Die Darm- oder Bauchweichen, sind bei schlanken Individuen concav und leicht eindrückbar, so dass man mit den Fingern bis unter die Rippen gelangen kann (Hypochondria, ὑπὸ τῶν χόνδρων, unter den Knorpeln), werden nach unten durch die leicht fühlbaren Darmbeinkämme begrenzt, und gehen hinten ohne scharfe Grenze in die prallen, dem Rücken angehörenden Lendengegenden über.

Die Haut des Bauches ist an allen Stellen gleichformig dicht, kann bei mageren Leuten leicht, bei fetten nur schwer oder gar nicht in eine Falte aufgehoben werden, und wird, vom Nabel zur Scham herab, mit dichten gekräuselten Haaren besetzt, - während die Scham der Thiere, bei noch so reichem Haarwuchs am ührigen Körper, mehr nackt bleibt. Hat die Haut einen hohen Grad von Ausdehnung erlitten (wie bei wiederholten Schwangerschaften), so gewinnt sie ihre frühere Spannung nicht wieder, und zeigt eine Menge dichtgedrängter, wie seichte Pockennarben aussehender Flecken, welche auf wirklicher Verdünnung des Integuments beruhen. Dass aus ihrem Dasein nicht unbedingt auf vorausgegangene Geburten zu schliessen ist, beweisen die Fälle, wo man sie nach Entleerung des Wassers bei Bauchwassersuchten, und nach schnellem Verschwinden grosser Beleibtheit, austreten sah. - Die Fascia superficialis des Bauches zeigt, besonders in der unteren Bauchgegend, zwei deutlich getrennte Blätter, deren hochliegendes sich mit grossen Fettcysten füllt, und über die Symphysis zu den ausseren Geschlechtstheilen als Mons veneris herabreicht, um den Nabel herum aber nie Fett aufnimmt, so dass die Nabelgrube in demselben Grade tiefer wird, je mehr die Fettleibigkeit am übrigen Bauche zunimmt. In diesem Blatte verlausen die subcutanen Blutgesässe des Bauches. Das tiesliegende Blatt hängt mit der Fascia superficialis der Brust und der Schenkel zusammen. - Auf die Fascia superficialis folgt ein aus zwei longitudinalen und drei breiten Muskeln zusammengesetztes Stratum, welches im nächsten Paragraph beschrieben wird, und dessen innere Oberfläche durch eine dunne Fascia (Fascia transversa) überzogen wird, welche, wenn man die Fascia superficialis als Perimysium externum aussassen wollte, Perimysium internum zu nennen ware. Auf die Fascia transversa folgt eine stellenweise sehr zarte, an gewissen Gegenden aber durch Aufnahme von Fettcysten sich verdickende Zellgewebschicht, welche das Bindungsmittel zwischen Fascia transversa und dem letzten oder innersten Bestandtheil der weichen Bauchwand — dem Bauchfelle, Peritoneum abgiebt.

§. 159. Specielle Beschreibung der Bauchmuskeln.

Die langen Muskeln der Bauchwand nehmen die vordere Gegend, die breiten die Seitengegenden des Bauches ein.

A. Lange Bauchmuskeln.

1. Der gerade Bauchmuskel, Musculus rectus abdominis, entspringt von der äusseren Fläche des fünsten, sechsten, und siebenten Rippenknorpels, und des Processus xiphoideus sterni, und steigt, sich mässig verschmälernd, zur Schamfuge herab, um mit doppelter Sehne am oberen Rande und an der vorderen Fläche derselben zu endigen. Seine longitudinalen Bündel werden durch 3—5 quer eingewebte Sehnenstreisen — Inscriptiones tendineae — unterbrochen. Am häusigsten sinden sich deren vier, drei über, und eine unter dem Nabel, welche letztere nicht die ganze Breite des Muskels, sondern nur die äussere Hälste derselben durchsetzt. Er ist in eine starke Scheide eingeschlossen, welche durch die Aponeurosen der breiten Bauchmuskeln gebildet wird, und aus einem vorderen, mit den Inscriptionibus tendineis verwachsenen, und einem hinteren Blatte besteht, welches nicht mehr an die Inscriptiones adhärirt, und nur bis zwei Quersinger breit unter dem Nabel herabreicht, wo es mit einem scharsen halbmondsormigen Rande — Linea semicircularis Douglasii — aushört.

Die Ausdehnung des Bauches bei Schwangeren beruht vorzüglich auf dem Auseinanderdrängen und Verlängern der beiden Recti. Die Entfernung der inneren Ränder der Recti steigert sich bis auf 4 Zoll, — die Verlängerung beträgt noch mehr.

2. Der pyramidenförmige Muskel, Musculus pyramidalis. Siehe §. 160.

B. Breite Bauchmuskeln.

1. Der aussere schiefe Bauchmuskel, Musculus obliquus abdominis externus, der Richtung seiner Fasern wegen auch oblique descendens genannt, entspringt vom vorderen Theile der ausseren Fläche der acht unteren Rippen mit eben so vielen Zacken. Die vier unteren schieben sich zwischen die Rippenursprunge des Latissimus dorsi ein, die vier oberen interferiren sich mit den vier unteren Ursprungszacken des Serratus anticus major, wodurch eine im Zickzack zwischen beiden Muskelpartien laufende Linie entsteht, welche bei krastvoller Attitude durch die Haut zu erkennen ist. Die hinteren Bündel steigen fast senkrecht zum Labium externum des Darmbeinkammes herab, wo sie sich festsetzen; die vorderen gehen schief zur vorderen Bauchwand, und verlieren sich in eine breite Aponeurose, welche theils über die vordere Fläche des geraden Bauchmuskels weg, zur Medianlinie des Bauches läuft, wo sie sich mit der entgegenkommenden der anderen Seite zur weissen Bauchlinie — Linea alba - versilzt, theils gegen den Leistenbug herabsteigt, um mit einem, nach hinten rinnensormig umgebogenen, Rande zu endigen, der von dem vorderen oberen Darmbeinstachel zum Höcker des Schambeins brückenförmig ausgespannt ist, die Grenze zwischen Bauch und vorderer Fläche des Schenkels bezeichnet, und Ligamentum Poupartii s. Fallopiae, oder Arcus cruralis genannt wird. Will man das Poupart'sche Band nicht als unteren Rand der Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels ansehen, sondern seiner Dicke wegen für ein selbstständiges Band halten, so müsste man sagen, dass die Aponeurose sich am Poupart'schen Bande befestigt, was man nach Belieben thun kann. - Das Poupart'sche Band hängt an drei Stellen sest mit dem Hüstbein zusammen, - 1. an der Spina anterior superior des Darmbeins, 2. am Tuberculum des Schambeins, 3. mit

einer dreieckigen, schief nach hinten gerichteten Ausbreitung seines inneren Endes am Pecten ossis pubis. Diese dritte Insertion führt den Namen Ligamentum Gimbernati.

Einen starken Zoll von der Schamfuge entsernt, zeigt die Aponeurose eine dreieckige, schräge nach aussen und oben geschlitzte Oeffnung die aussere Oeffnung des Leistenkanals oder den Leistenring (Apertura externa canalis inguinalis s. Annulus inguinalis), deren Basis durch das innere Ende des horizontalen Schambeinastes, deren unterer ausserer Rand oder Schenkel durch das Ligamentum Poupartii (deshalb auch Crus externum annuli inquinalis genannt), deren oberer innerer Rand (Crus internum annuli inquinalis) durch jenen Theil der Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels gebildet wird, der nicht zur weissen Bauchlinie, sondern zur vorderen Fläche der Schamfuge herabläuft, wo er sich mit demselben aponeurotischen Schenkel der anderen Seite kreuzt (der linke deckt den rechten), und mit dem Ausbängebande des männlichen Gliedes sich verwebt. - Der Leistenring ist die aussere Oeffnung eines Kanals, der durch die ganze Dicke der Bauchwand durch, schief nach oben und aussen aufsteigt, um nach einem Laufe von anderthalb Zoll Länge. durch die innere Oeffnung (siehe §. 160) in die Bauchhöhle einzumünden. Man nennt deshalb die aussere Oessnung auch die Leistenöffnung. und die innere die Bauchöffnung des Leistenkanals. Durch den Leistenring tritt bei Männern der Samenstrang, bei Weibern das runde Gebärmutterband aus der Bauchhöhle hervor.

2. Der innere schiefe Bauchmuskel, Musculus obliquus abdominis internus, seiner Faserung wegen oblique ascendens genannt, entspringt, vom vorigen bedeckt, zwischen beiden Lefzen des Darmbeinkammes, von der Spina anterior superior, und vom ausseren Ende des Poupart'schen Bandes. Sein hinterer kürzester Rand hängt mit der später zu beschreibenden Scheide der langen Rückenstrecker (Fascia lumbo-dorsalis) zusammen, und entspringt wohl auch von ihr. Die Richtung der Bündel des Muskels geht, für die hintersten, aufwärts zum unteren Rande der drei letzten Rippen, für die mittleren strahlenförmig nach innen und oben, zur vorderen Bauchwand, für die untersten, vom Poupart'schen Bande entspringenden, horizontal nach innen zum Leistenringe, zwischen dessen Schenkeln sie als sogenannte Schenkelfläche, Superficies intercruralis, gesehen werden. Die nittleren und untersten Bündel gehen in eine Aponeurose über, welche sich in zwei Blätter spaltet, deren vorderes mit der Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels verschmilzt. mit ihm die vordere Wand der Scheide des geraden Bauchmuskels bildet, und in der ganzen Länge der weissen Bauchlinie endigt, während das hintere kurzere Blatt, die hintere Wand der Scheide des Rectus erzeugen bilft, welche kurzer als die vordere ist, indem sie 2-3 Querfinger unter dem Nabel mit einem bogenförmig gekrummten Rande (Linea semicircularis Douglasii) aufhört. - Von dem durch den Leistenring sichtbaren Theil des inneren schiefen Bouchmuskels stülpt sich ein Muskelbündel schlingenförmig hervor, welches den Samenstrang bis in den Hodensack begleitet,
und den Hebemuskel des Hodens — Musculus cremaster (πρεμάω,
aufhängen) — darstellt. Beim weiblichen Geschlechte geht es, ungleich
schwächer, zum runden Gebärmutterbande.

- 3. Der quere Bauchmuskel, Musculus transversus abdominis, auf den inneren schiefen folgend, entspringt von der inneren Fläche der Knorpel der sechs unteren Rippen, von den vereinigten Blättern der Fascia hambo-dorsalis, von der inneren Lefze des Darmbeinkammes, und, mit dem obliquus internus vereinigt, von der ausseren Halfte des Poupart'schen Bandes. Seine Fleischbundel laufen quer, und sind nicht alle gleich lang. Die oberen und unteren rücken weiter gegen den geraden Bauchmuskel vor, die mittleren weniger. Der Uebergang des Muskels in seine Aponeurose wird somit eine bogensormig nach aussen gekrummte Linie bilden, welche als Linea semilunaris Spigelii bekannt ist. Die Aponeurose selbst theilt sich am äusseren Rande des geraden Bauchmuskels (wie durch einen Querschnitt) in zwei Blätter, deren oberes, die hintere, nur bis zur Lines Douglasii reichende Wand der Scheide des Rectus verstärkt, deren unteres, die untere Hälfte der vorderen Wand dieser Scheide bilden hilft. Beide endigen, wie die übrigen Aponeurosen der breiten Bauchmuskeln, in der Linea alba. - Eine genaue Revision der Theilnahme der breiten Bauchmuskeln an der Bildung der Scheide des geraden Bauchmuskels, wäre sehr wünschenswerth. Man kann sich nicht verhehlen, dass die gegebene Darstellung, welche zwar einer allgemein angenommenen Vorstellung entspricht, aber kaum durch das Messer entstand, etwas Gezwungenes an sich hat. Dieses gilt besonders von dem Verhalten der Aponeurose des gueren Bauchmuskels.
- 4. Der viereckige Lendenmuskel, Musculus quadratus lumberum, liegt an der hinteren Bauchwand, entspringt am hinteren Abschnitt des Darmbeinkammes, wird durch accessorische Bündel, die vom fünsten Lendenwirbel und vom Ligamentum ileo-lumbale kommen, verstärkt, und inserirt sich mit sehnigen Zacken an den Querfortsätzen der vier oberen Lendenwirbel, und mit einer breiteren Sehne am unteren Rande der zwölsten Rippe.

§. 160. Fascia transversa. Scheide des Rectus, und weisse Rauchlinic.

Die innere Oberstäche des Musculus transversus ist mit der Fascia transversa überzogen, welche an den sleischigen Theil des Muskels durch sehr kurzes und settloses Zellgewebe angehestet wird, mit der Aponeurose dagegen sest und untrennbar verschmilzt, sich aber nicht, wie diese, in zwei Blätter theilt, sondern, ihrer ganzen Länge nach, hinter dem Musculus rectus bis zur weissen Bauchlinie verläust. Sie überzieht, nebst dem

queren Bauchmuskel, noch das Zwerchsell und den Quadratus lumborum. als sehr dünner, fast zellgewebiger Beleg, verdickt sich aber gegen das Poupart'sche Band zu, und besitzt hier eine kleine ovale Oeffnung - die Bauchöffnung des Leistenkanals oder den Bauchring (Apertura interna s. abdominalis canalis inquinalis), deren Entsernung von der Schamfuge um anderthalb Zoll grösser ist, als die der Leistenöffnung des Kanals. Der innere Rand dieser Oeffnung ist faltenartig aufgeworfen, der aussere verslacht sich ohne merkliche Erhebung. Bei genauer Untersuchung ist es leicht sich zu überzeugen, dass die Oessnung nur der Ansang einer Ausstülpung der Fascia transversa ist, welche durch den Leistenkanal nach aussen dringt, den Samenstrang und den Hoden als cylindrische, blind abgeschlossene Scheide umhüllt, und die sogenannte Tunica vaginalis communis des Samenstranges und Hodens bildet. Die Fascia transversa hängt zwar an den Rand des Poupart'schen Bandes fest an, endigt aber hier noch nicht, sondern setzt sich bis zur Crista des horizontalen Schambeinastes fort, wo sie mit den später bei der Beschreibung des Schenkelkanals zu erwähnenden Fascien verschmilzt. Weder die Fossa iliaca, noch die kleine Beckenhöhle, werden von ihr ausgekleidet, sondern erhalten besondere, viel stärkere, selbstständige Fascien.

Die Scheide des geraden Bauchmuskels ist das Erzeugniss der gespaltenen Aponeurosen der breiten Bauchmuskeln, welche, um ihren bestimmten Vereinigungspunkt — die weisse Bauchlinie — zu erreichen, vor oder hinter dem Rectus vorbeilausen müssen. Sie hält das Fleisch des Muskels sest zusammen, steigert seine Krast, und erlaubt den breiten Bauchmuskeln, durch Spannung der Scheide, auf die Spannung des in ihr eingeschlossenen Rectus einzuwirken. Da die hintere Wand der Scheide nur unvollkommen durch die Aponeurosen der Bauchmuskeln gebildet wird, so müsste die hintere Fläche des Rectus (von der Linea Douglasii angesangen, bis zur Schamsuge) auf dem Bauchselle ausliegen, wenn nicht die Fascia transversa das Fehlende der Scheide ersetzte.

So wie die breiten Bauchmuskeln die Scheide der Quere nach anspannen, so kann sie auch ihrer Länge nach gespannt werden, durch den in die Substanz ihres vorderen Blattes eingeschlossenen kleinen Musculus pyramidalis abdominis, der am oberen Rande der Symphysis pubis entspringt, und, dreieckig zulaufend, am inneren, mit der weissen Bauchlinie verwachsenen Rande der Scheide endigt. Er fehlt zuweilen (Thierähnlichkeit), wenn der Rectus unten breiter, als gewöhnlich ist, oder vervielsacht sich aus einer oder auf beiden Seiten, oder wird bedeutend länger (wie beim Neger), weshalb ich ihn im §. 159 als langen Bauchmuskel ausschlichte. — Nach oben wird die Scheide des Rectus durch den von ihr entspringenden Fascikel des grossen Brustmuskels, und durch den seltenen Musculus sternalis brutorum angespannt.

Die weisse Bauchlinie, das Rendez-vous aller Aponeurosen des Bauches, ist der stärkste Theil der Bauchwand, und stellt einen derhen sehnigen Streisen dar, welcher über dem Nabel 4—6 Linien breit ist, unter dem Nabel sich verschmälert, aber von vorn nach hinten an Dicke zunimmt, und sich am oberen Schamsugenrande sestsetzt.

Nach Meckel's Ideen entspricht die Linea alba dem Sternum der Brust, die Inscriptiones tendineas den Rippen, der Musculus obliquus abdominis externus dem ausseren, der Obliquus internus dem inneren Zwischenrippenmuskel, — eine Ansicht, die nur in der Anatomie gewisser beschuppter Amphibien, wo ein wirkliches Sternum abdominale und wahre Bauchrippen vorkommen, eine schwache Stütze findet. — Die verschiedene, sich kreuzende Faserungsrichtung der drei breiten Bauchmuskeln, ist für die Festigkeit der Bauchwand ganz besonders berechnet, und erinnert an das Geslecht eines Rohrsessels, welches, wenn es hinlänglich stark und tragfähig sein soll, niemals blos aus parallelen Streifen bestehen darf. Sie giebt uns bei der Untersuchung von Bauchwunden, oder bei Operationen am Bauche, ein verlässliches Mittel an die Hand, die Tiefe zu bestimmen, zu welcher das Scalpell eindrang, was nicht unwichtig ist, da die Schnittsuhrung um so vorsichtiger geleitet werden soll, je näher man dem Bauchfelle kommt. Die Schichtung der Muskeln erlaubt auch, sie auf untergeschobenen Hohlsonden zu trennen. - Nach Thomson und Velpeau setzen sich die Fasern einer Aponeurose, über die weisse Bauchlinie hinaus, in die der anderen Seite fort, kreuzen sich mit den Fasern dieser, und bilden Maschen, durch welche stellenweise Gefässe und Nerven, von den unter der Aponeurose liegenden Stämmen zur Haut sich erheben. In Krankheitsfällen können diese Maschen so gross werden, dass die grösseren Fettcysten, die unter der Aponeurose sich entwickelten, nach aussen zu dringen erlauben, wodurch die sogenannten Herniae adiposae entstehen.

Sämmtliche Bauchmuskeln verengern die Bauchhöhle. Sie ziehen auch, mit Ausnahme des Transversus, die Rippen nieder, verengern dadurch den Thorax, und wirken als Muskeln des Ausathmens, und können, bei stärkerem fortgesetzten Zuge am Thorax, die Wirbelsäule nach vorn krümmen, z. B. wenn man sich niedersetzt. Bei letzterer Bewegung wird die Bauchwand concav, was, wenn der Musculus rectus allein wirksam wäre, nicht geschehen könnte. Die gleichzeitigen Contractionen der breiten Muskeln, deren Aponeurosen die Scheide des Rectus bilden, krummen letztere nach hinten, und bedingen dadurch ein noch stärkeres Annähern der Brust zum Becken. könnte dieses so ausdrücken: die breiten Bauchmuskeln sind der langen wegen da, - ihre Wirkung steigert jene des Rectus, indem er durch die breiten Bauchmuskeln, welche seine Scheide bilden, nicht blos nach hinten gekrummt, sondern auch von seinem Gespan abgezogen wird. Man wird nun begreifen, warum die Scheide des Rectus mit den Inscriptionen dieses Muskels verwachsen ist, weil nur auf diese Weise eine gleichsormige Spannung des Muskels in seiner ganzen Breite, ohne Zusammenschieben desselben, möglich wurde. - Die Bauchmuskeln üben auf die beweglichen Unterleibsorgane eine fortwährende Compression (daher der Name Bauchpresse, Prelum abdominale s. Cingulum Halleri), durch welche es nie zur Entstehung eines leeren Raumes in der Bauchhöhle kommen kann. Wie gross diese Compression sei, kann man aus der Gewalt, mit welcher die Eingeweide aus Schnittwunden des Bauches hervorstürzen, und aus der Krast entnehmen, die zuweilen erforderlich ist, um einen Leistenbruch von einiger Grösse zurück-

Die Präparation der Bauchmuskeln erfordert sehr viel Zeit und eine geschickte Hand, wenn sie ganz tadellos ausfallen soll. Die Leichen durch plötzliche Todesarten, oder an acuten Krankheiten Verstorbener, sind zu dieser Arbeit vorzuziehen. Niemals wird man die Bauchmuskeln an alten Weibern, welche oft schwanger waren, oder überhaupt an Leichen, deren Bauch bereits durch Fäulniss grün geworden, auch nur einigermassen befriedigend untersuchen können.

§. 161. Leistenkanal und Leistengruben.

Es verdient der Leistenkanal, Canalis inguinalis, eine besondere Würdigung, da er zu einer der häufigsten chirurgischen Krankheiten — den Leistenbrüchen — Anlass giebt, deren Diagnose und richtige Behandlung ohne exacte Kenntnisse des Kanals unmöglich ist.

Der Leistenkanal hat eine äussere Mündung, seitwärts und über der Schamgegend, in der sogenannten Leistengegend (Regio inguinalis). Der Begriff der Leistengegend ist etwas vag, indem diese Region weder durch natürliche, noch künstlich gezogene Linien begrenzt wird. Dem Wortlaute zufolge mag sie ursprünglich wohl nur auf die Gegend des Poupartschen Bandes angewandt worden sein, welches wie eine Leiste zwischen zwei festen Punkten des Beckens ausgespannt ist. Wir verstehen unter Leistengegend die nächste Umgebung der äusseren Leistenkanalsmündung.

Die äussere oder Leistenmündung des Kanals entsteht durch Spaltung der Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels, welche in zwei Schenkel (Crura) aus einander weicht. Das Crus internum befestigt sich, wie oben gesagt, an der vorderen Seite der Schamfuge; das Crus externum, welches so innig mit dem Poupart'schen Bande zusammenhängt, dass es mit ihm Eins zu sein scheint, am Tuberculum ossis pubis. Die Oeffnung zwischen beiden Schenkeln ist dreieckig, und ihr Mittelpunkt von jenem des oberen Randes der Symphyse, bei vollkommen ausgewachsenen Leuten, beiläufig 15 Linien entfernt. Der von der Spitze des Dreiecks gegen die Basis gezogene Durchmesser beträgt im Mittel 1 Zoll. Die Basis misst 6-8 Linien. Die Fascia superficialis hängt an die Ränder der Oeffnung fest an, und verlängert sich von ihnen als zellgewebige Hülle des Samenstrangs nach abwärts. Von der äusseren Oeffnung bis zur inneren durchläust der Leistenkanal einen Weg von 1 1/2-2 Zoll. Schräg nach aus- und auswärtsgehend, hebt er successive die unteren Ränder des inneren schiefen und queren Bauchmuskels auf, entfernt sich dadurch mehr und mehr von der Oberfläche, und endigt an der inneren, von der Fascia transversa gebildeten Oessnung. Die untere Wand des Kanals wird vom Poupart'schen Bande gebildet, welches sich nach hinten aufkrümmt, und dadurch die Form einer Rinne annimmt. Die obere Wand wird durch die vereinigten unteren Ränder des inneren schiefen und queren Bauchmuskels erzeugt; die vordere Wand wird durch das tiefere Eindringen des Leistenkanals in die Bauchwand immer dicker, indem sie anfangs blos aus der Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels, - später, wenn der Leistenkanal unter die unteren Bänder des inneren schiesen und des queren Bauchmuskelseingedrungen ist, auch durch diese beiden Muskeln zusammengesetzt wird. Die hintere Wand verhält sich umgekehrt wie die vordere, indem sie in der Ebene der äusseren Leistenöffnung durch den inueren schiefen und queren Bauchmuskel, und durch die Fascia transversa gebildet wird, in der Nähe der Bauchöffnung dagegen blos aus der letztgenannten Fascia besteht. Die innere Obersäche der Bauchwand zeigt in der Nähe der Bauchöffnung des Leistenkanals folgende Eigenthümslichkeiten.

Hat man die vordere Bauchwand herabgeschlagen, um ihre innere Oberfläche zu besehen, so findet man dieselbe mit dem Bauchfelle hekleidet, welches drei longitudinale Falten, als Ueberzüge nachzunennender Bänder und Gefässe, bildet.

- 1. Die mittlere Falte erstreckt sich vom Scheitel der Harnblase zum Nabel hinauf, als *Plica vesico-umbilicalis media* (Ueberzug des zu einem Bande gewordenen embryonischen Urachus).
- 2. Die darauffolgenden seitlichen Falten convergiren vom Seitentheile der Harnblase gegen die innere Falte, und verbinden sich unterhalb des Nabels mit ihr, *Plicae vesico-umbilicales laterales* (Ueberzüge der vertrockneten Nabelarterien des Embryo, oder der seitlichen Harnblasenbänder).
- 3. Die äusserste Falte ist die kleinste, springt nur sehr wenig vor, und man muss die Bauchdecke stark anspannen, um sie zu sehen. Sie heisst, da sie die Arteria epigastrica einschliesst, Plica epigastrica. Es ist gut, um die Falten sich mehr erheben zu machen, die Harnblase von der Harnröhre aus mässig aufzublasen.

An der ausseren und inneren Seite dieser Plica epigastrica ist das Peritoneum vertiest - wie mit dem Finger eingedrückt - und bildet so die beiden Leistengruben, Foveae inguinales. Die aussere kleinere entspricht genau der Bauchöffnung des Leistenkanals, und dringt zuweilen in den Leistenkanal als blinder Zipf ein, von dessen Spitze man eine dunne strangformige Verlängerung eine Strecke weit am Samenstrange fortlaufen sieht. Die innere grössere, zwischen Plica epigastrica und Plica vesico-umbilicalis lateralis gelegen, liegt mit ihrem inneren und oberen, zugleich tieferen Abschnitt, der äusseren Oessnung des Leistenkanals gerade gegenüber, und stellt somit einen sehr schwachen Theil der Bauch-Hat man das Peritoneum vorwand dar, der sogar durchscheinend ist. sichtig von der darauf folgenden Fascia transversa abgelöst, so sieht man, wie die Fascia a) sich in die Bauchöffnung des Leistenkanals trichterformig fortsetzt, und b) den Grund der inneren Leistengrube bildet, welcher mit dem Finger leicht durch die äussere Oessnung des Leistenkanals herausgestaucht werden kann. Man sieht ferner, dass der Samenstrang nach seinem Eintritte in die Bauchböhle sich in zwei Bundel theilt, deren eines zur Lumbalregion aufsteigt (Blutgefasse des Samenstrangs), während das andere. blos aus dem Aussuhrungsgange des Hodens (Vas deferens) bestehende. sich nach innen und unten zur kleinen Beckenhöhle wendet, und dicht am inneren Umsange der Bauchöffnung des Leistenkanals, sich mit der von aussen nach innen und oben laufenden Arteria epigastrica kreuzt.

Die Aussere und innere Leistengrube sind somit nur durch die Ptica epigastrica von einander getrennt. Krause nennt die Grube zwischen der inneren und mittleren Bauchfellsalte: Fossa inguinalis interna, — die Grube zwischen der mittleren und Ausseren Bauchfellsalte: Fossa inguinalis media, — und die kleine Grube an der Ausseren Seite der Ausseren Bauchfellsalte: Fossa inguinalis externa. Da der innere Leistenbruch, wie im solgenden Paragraphe gezeigt wird, in der Regel nicht durch die Fossa inguinalis interna Krause, sondern durch dessen media (unsere interna) heraustritt, und die Fossa inguinalis interna Krause nur sehr selten als Austrittsstelle eines Bruches von mir gesehen wurde, so kann die im Texte ausgestellte Unterscheidung der Leistengruben als die praktisch brauchbarere gelten. Auch ist Krause's Fovea inguinalis interna nur bei voller Harnblase merklich ties.

Um die Präparation des Leistenkanals vorzunehmen, eröffnet man anfangs die Bauchhöhle nicht, sondern präparirt zuerst die äussere Leistenöffnung, trennt hierauf die Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels, um die Fortsetzung des inneren schiefen und queren zum Cremaster zu sehen, und öffnet dann die Bauchhöhle durch einen Kreuzschnitt, schlägt einen der unteren Lappen gegen den Schenkel herab, und lässt ihn durch einen Gehilfen schief nach abwärts anspannen, worauf man das Peritoneum ablöst, und die innere Leistenöffnung, sammt dem Samenstrange und den in den Plicis inquinalibus des Peritoneum enthaltenen Gefässen und Bändern, bloslegt.

§. 162. Einiges zur Anatomie der Leistenbrüche.

Der Leistenkanal ist beim Weibe enger und länger als im Manne. Enger, weil das runde Mutterband dünner als der Samenstrang ist; länger, weil der Abstand der Schamfuge vom Darmbeinstachel größer ist. Kindern ist er mehr gerade von vorn nach hinten gerichtet, weil die Bauchöffnung nicht so sehr auswärts, als hinter der Leistenöffnung liegt. -Wenn ein Baucheingeweide durch irgend eine Oeffnung des Bauches nach aussen tritt, und eine unter der Haut liegende Geschwulst bildet, so heisst dieser Zustand Bruch oder Vorlagerung, Hernia, und führt seinen besonderen Beinamen von der Oeffnung, durch welche er hervorgetreten, z. B. Leistenbruch, Nabelbruch, Schenkelbruch etc. Jedes Eingeweide, welches einen Bruch bilden soll, muss die natürlichen Verschlussmittel der Oeffnung, also das Bauchfell (und die Fascia transversa) vor sich hertreiben oder ausstülpen, so dass es in diesen wie in einem Sacke (Bruchsack) eingeschlossen liegt. Ein Eingeweide, z. B. eine Darmschlinge, kann die Grube an der äusseren oder an der inneren Seite der Plica epigastrica (oder, was dasselbe ist, der Durchkreuzungsstelle der Arteria epigastrica mit dem Vas deferens) zum Anfangspunkte seines Austrittes wählen. ersteren Falle wird es sich in den Leistenkanal hincinschieben, seine schräge Richtung annehmen, und seine ganze Länge durchlaufen müssen, bevor es nach aussen gelangt. So entstehen die äusseren Leistenbrüche (Herniae inquinales externae), deren Name ihren Ursprung an der Ausseren

Seite der Plica epigastrica angiebt. Im zweiten Falle wird das Eingeweide, weil die innere Leistengrube der ausseren Oeffnung des Leistenkanals direct gegenüberliegt, gerade nach vorn treten, und durch die äussere Oeffnung des Leistenkanals herauskommen, ohne durch die innere eingetreten zu sein. Dies sind die inneren oder directen Leistenbrüche (Hernige inquinales internae), die sich durch ihre gerade Richtung, durch ihre Kurze, so wie durch ihr Verhältniss zur Arteria epigastrica, von den äusseren unterscheiden, und, wenn sie eingeklemmt sind, den Erweiterungsschnitt nicht nach aussen, sondern nach oben oder innen erheischen, indem bei der Schnittrichtung nach aussen die Arteria epigastrica unsehlbar unter das Messer käme. Da der äussere Leistenbruch nur das dünne und zuweilen schon als kleines Blindsäckchen in den Leistenkanal etwas hineingehende Bauchfell als Bruchsack vor sich herzuschieben hat (die Fascia transversa ist ohnedies schon als gemeinschaftliche Scheidenhaut des Samenstranges in den Leistenkanal trichtersurmig hineingestülpt), so wird er jedenfalls leichter entstehen, als der innere, der nebst dem Bauchfelle auch die Fascia transversa, welche den Grund der inneren Leistengrube bildet, herauszutreiben hat. Wenn man jenen Theil des Bruchsackes. der in der Austrittsöffnung der Bauchwand liegt, Bruchhals nennt, so muss der aussere Leistenbruch einen längeren Hals, als der innere oder directe haben; und da die Leichtigkeit der Zurückbringung eines Bruches mitunter von der Kürze und Weite seines Halses abhängt, so wird ein innerer Leistenbruch leichter, und fast immer von selbst, bei Rückenlage des Kranken, zurückgehen. Ist ein äusserer Leistenbruch alt, gross und schwer geworden, so ist die schräge Richtung des Leistenkanals durch den Zug der Bruchgeschwulst in eine gerade, wie beim inneren oder directen Bruch. übergegangen, und es ist in solchen Fällen sehr schwer, durch äussere Untersuchung zu entscheiden, ob man es mit einem äusseren oder inneren Leistenbruche zu thun hat.

Die grössere Länge und Enge des weiblichen Leistenkanals erklärt das seltene Vorkommen der Leistenbrüche bei Weibern. Einer Erhebung der Londoner Bandagisten zufolge, waren unter 4060 Leistenbrüchkranken, nur 34 Weiber. Wenn die von Jobert angenommene grössere Weite des rechten Leistenkanals keine Chimäre wäre, würde sie das häufigere Vorkommen der Hernien auf der rechten Seite erklären. — Wird das vorgefallene Eingeweidestück von der Oeffnung, durch welche es austrat, so eingeschnürt, dass ihm die Blutzufuhr abgeschnitten, seine Ernährung sistirt, und seine Function aufgehoben wird, so heisst dieser Zustand Einklemmung, Incarceratio. Die Ursachen der Einklemmung, deren Erörterung in das Gebiet der praktischen Chirurgie gehört, können sehr verschieden sein. Vom anatomischen Standpunkte aus kann hier nur erwähnt werden, dass die Möglichkeit einer krampfigen Einklemmung eines Leistenbruches nicht zu bezweifeln ist, da die obere Wand des Leistenkanals durch die aufgehobenen, und dadurch bogenförmig gekrümmten Ränder des inneren.

schiefen und gueren Bauchmuskels erzeugt wird. Suchen diese nach oben gebogenen Muskelränder ihre normale, mehr geradlinige Richtung wieder anzunehmen, so drücken sie die im Leistenkanal besindlichen vorgefallenen Eingeweide gegen das resistente Ligamentum Poupartii, wodurch eine Art Zwinge zu Stande kommt, welche die Einklemmung setzt. Da die Leistenund die Bauchöffnung des Leistenkanals nur von aponeurotischen Gebilden begrenzt werden, so kann von krampfiger Einschnürung an diesen beiden Punkten keine Rede sein. - Die Einschnürung muss, wenn sie nicht durch gelindere Mittel (warme Bäder und Klystiere, zweckmässige manuelle Hilfe — Taxis) zu beseitigen ist, durch Erweiterung der Bruchpforte mittelst Schnitt (Herniotomie) gehoben werden. Die Richtung des Schnittes wird beim inneren Leistenbruche eine andere, als beim ausseren sein müssen. Der innere Leistenbruch hat die Kreuzungsstelle der Arteria epigastrica mit dem Vas deferens an seiner ausseren Seite, der aussere Leistenbruch dagegen an seiner inneren. Um die Verwundung der Arteria epigastrica zu vermeiden, wird also der Erweiterungsschnitt beim inneren Leistenbruch nach innen, beim ausseren nach aussen gerichtet sein müssen. In Fällen, wo man nicht ganz entschieden weiss, ob man es mit einem äusseren oder inneren Leistenbruch zu thun hat, wird der Schnitt nach oben gerichtet werden müssen. - Befindet sich ein Bruch in seinem ersten Entwicklungsstadium, d. h. gerade am Eintritt in den Leistenkanal, so heisst er Hernia incipiens; ist er etwas vorgerückt, ohne durch die aussere Oessnung herausgetreten zu sein, so bildet er die Hernia interstitialis. Beide sind, wegen Fehlen äusserer Geschwulst, mit Sicherheit schwer zu diagnosticiren. Ist der Bruch über das Niveau der Leistenöffnung getreten, oder bis in den Hodensack herabgestiegen, so nennt man ihn Hernia inquinalis oder scrotalis. Ist endlich der grüsste Theil des Gedärmes aus der Bauchhöhle in den Hodensack versetzt, der zur Grösse eines Mannskopfes aufgetrieben werden kann, so ist dieses die Eventration, - der höchste Punkt, auf den es eine Hernie bringen kann.

Da man sich, wenn man einmal weiss, was ein Bruch ist, selben an jedem Cadaver erzeugen kann, so hielt ich die Aufnahme dieser praktischen Bemerkungen in ein anatomisches Handbuch nicht für nutzlos. Es wird dieses zugleich den Anfängern, die den Werth der Anatomie nur von Hörensagen kennen, eine kleine Probe von ihrer Nützlichkeit geben. Die angeborenen Leistenbrüche können nur durch den embryonalen Zustand des Bauchfelles, ihre Erklärung finden.

Nebst den Handbüchern über chirurgische Anatomie, handeln über Bruchanatomie noch: A. Cooper, The Anatomy and Surgical Treatment of Inguinal
and Congenital Hernia. London, 1804. fol. Deutsch von Kruuge. Breslau,
1809. — C. Hesselbach, über Ursprung und Vorschreiten der Leisten- und
Schenkelbrüche. Würzburg, 1814. 4. — J. Cloquet, recherches anat. sur les
hernies. Paris, 1817—1819. 4. — A. Thomson, sur l'anatomie du bas ventre et des hernies. Paris. 1. Livr. — J. Morton, Surgical Anatomy of the
Groin. London, 1837. — A. Scarpa, sull'ernie. Paris, 1821. 4
Seiler. Leipzig. 2 Bände. 1822. — J. F. Malgaigne.

les hernies. Paris, 1840. — E. W. Tuson, Anatomy of Inguinal and Femoral Hernia. London, 1834. fol. — Flood, On the Anatomy and Surgery of Inguinal and Femoral Hernia. Dublin. fol. Ein Prachtwerk wie das vorige. — Langenbeck. Abhandlung von den Leisten- und Schenkelbrüchen. Göttingen, 1821. — L. Jacobson, zur Lehre von den Eingeweidebrüchen. Königsberg, 1837. — Tk. Morton, Inguinal Hernia, Testis and Coverings. London, 1840. — A. Nukn, über den Bau des Leistenkanals, in dessen Beobachtungen aus dem Gebiete der Anatomy etc. Heidelberg, 1850. fol.

Ueber den angeborenen Leistenbruch siehe §. 255.

§. 163. Zwerchsell.

Das Zwerchfell (Diaphragma, von διαφράττειν, abgrenzen, Septum transversum, Musculus phrenicus) bildet die natürliche Scheidewand zwischen Brust- und Bauchhöhle. Es ist in der unteren Brustapertur so eingepasst, dass es eine convexe Fläche nach oben und etwas nach hinten, eine concave Fläche nach unten und etwas nach vorn kehrt. Es wird in den musculösen und den sehnigen Theil getheilt, und ersterer zerfählt, nach Verschiedenheit seines Ursprunges, wieder in den Lenden- und Brusttheil. Der musculöse Theil schliesst den sehnigen ringsum ein.

- a) Der Lendentheil (Pars lumbalis) besteht aus drei Schenkelpaaren, die keineswegs symmetrisch am Lendentheile der Wirbelsäule entsteben. 1. Das innere Schenkelpaar ist das längste und stärkste. Seine Schenkel entspringen von der vorderen Fläche des dritten und vierten Lendenwirbels, steigen convergirend aufwärts, kreuzen sich vor dem Körper des ersten Lendenwirbels, und bilden mit der vorderen Fläche der Wirbelsäule eine dreieckige Spalte - den Aortenschlitz, Iliatus aorticus - durch welche die Aorta aus der Brust- in die Bauchhöhle, und der Ductus thoracicus aus der Bauchhöhle in die Brust gelangt. Nach geschehener Kreuzung werden sie divergent, um gleich darauf neuerdings zu convergiren. und sich zum zweiten Mal zu kreuzen, wodurch eine zweite, über dem Hiatus corticus, und etwas links von ihm liegende Oeffnung zu Stande kommt, durch welche die Speiseröhre und die sie begleitenden Nervi vagi in die Bauchhöhle treten - das Speiseröhrenloch, Foramen oesopkageum. Jenseits dieses Loches verlieren sich beide innere Schenkel in den hinteren Rand des sehnigen Theils. 2. Das mittlere Schenkelpaar entspringt mit zwei schlanken Strängen von der seitlichen Gegend des zweiten Lendenwirbels, und 3. das äussere von der Seitenstäche und dem Querfortsatz des ersten Lendenwirbels. Beide Paare verlieren sich. so wie das erste, in den hinteren Rand des sehnigen Theils. Die linken Schenkel sind in der Regel etwas schwächer, und entspringen um einen Wirbel höher, als die rechten. Die Ursprungsweise, die Kreuzung, und die Zahl der Schenkel variirt so oft, dass vorliegende Beschreibung nicht für alle Fälle gelten kann, und nur auf das häufigere Vorkommen passt.
- b) Der Rippentheil (Pars costalis) entspringt beiderseits von den Knorpeln der sechs unteren Rippen, und vom Schwertfortsatz, mit spitzigen

Zacken, welche in die Ursprungszacken des queren Bauchmuskels und des dreieckigen Brustmuskels eingreifen, und von diesen durch eine ähnliche Zickzacklinie getrennt sind, wie sie zwischen den Ursprüngen des Obliquus abdominis externus, Serratus anticus major und Latissimus dorsi erwähnt wurde. Sämmtliche Zacken convergiren gegen den Umfang des sehnigen Theils, und verlieren sich in ihm.

c) Der sehnige Theil (Pars tendineu s. Speculum Helmontii s. Centrum tendineum) nimmt so ziemlich die Mitte des Zwerchfells ein, besteht aus convergirenden, glänzenden Sehnenfasern, mit vielen unregelmässig eingewirkten breiteren Streisen, und hat die Gestalt eines Kleeblattes, in dessen rechten Lappen, unmittelbar vor der Wirbelsäule, eine viereckige Oessnung mit abgerundeten Winkeln liegt, die die aussteigende Hohlvene in die Brusthöhle passiren lässt, und deshalb Foramen venosum s. quadrilaterum heisst. — Nebst den genammten drei grossen Oessnungen, kommen noch mehrere kleinere, für den Verlauf minder umsangreicher Gestässe und Nerven bestimmte Spalten vor, welche keine besonderen Namen führen, und dort erwähnt werden sollen, wo über das, was durch sie läust, gesprochen wird.

Die rechte Hälste des Zwerchsells wird durch die voluminöse Leber um einen bis zwei Zoll weiter in die Brusthöhle hinaufgedrängt, als die linke. -Nur im erschlassen Zustande (beim Ausathmen, und in der Leiche) bildet das Zwerchfell eine gegen die Brusthöhle convexe Kuppel, deren höchster Punkt rechterseits mit dem Knorpel der sunsten Rippe in einer horizontalen Ebene liegt. Beim Einathmen, also im activen Zustande, verflacht sich die Wölbung des Zwerchfells, steigt gegen die Bauchhöhle nieder, und verengert diese um so viel, als die Brusthöhle vergrössert wurde. — Durch den Druck, den es von oben her auf die Baucheingeweide ausübt, bethätigt es die Fortbewegung der Contenta des Darmschlauches, fordert den Kreislauf, und unterstützt mechanisch die Secretion der drüsigen Nebenorgane des Verdauungssystems. Da die von oben her gedrückten Eingeweide dem Drucke weichen müssen, so drängen sie sich gegen die nachgiebige vordere Bauchwand, und wölben sie stärker. Hört der Druck des Zwerchfells auf, so schiebt die nun beginnende Zusammenzichung der musculösen Bauchwand, die dislocirten Eingeweide wieder in ihre normale Lage, und zwingt die Kuppel des relaxirten Zwerchfells, wieder bis zum fünsten Rippenknorpel aufzusteigen. Die Eingeweide befinden sich sonach fortwährend in einer hin- und hergehenden Bewegung, welche in demselben Masse gesteigert wird, als der Athmungsprocess lebhafter angeht. Sollte in demselben Moment, als das Zwerchfell niedersteigt, auch die musculöse Bauchwand sich zusammenziehen, so können die Eingeweide ihren Platz nicht ändern, sie werden nur zusammengedrückt, und enthalten sie Entleerbares, so wird dieses herausgeschafft. Zwerchfell und Bauchmuskeln bilden in diesem Falle die sogenannte Bauchpresse (Prelum abdominale), welche bei allen hestigen Anstrengungen, beim Drängen, Brechen, bei harten Stuhlentleerungen, beim Verarbeiten der Wehen der Gebärenden etc., in Thätigkeit tritt, und unter besonderen disponirenden Umstäuden ein lose befestigtes Eingeweide durch eine bestehende Oeffnung der Bauchwand (Nabel-, Schenkel-, Leistenring) heraustreiben, und die Entstehung eines sogenannten Bruches (Hernia) veranlassen kann.

Bei angeborenen Zwerchsellspalten, bei Verwundungen to

desselben, kann ein Eingeweide des Bauches (am häufigsten Milz, Netz oder Magen) in die Brusthühle schlüpfen, und eine Hernia diaphragmatica bilden. Die durch Fall und Erschütterungen entstandenen Zwerchfellsrisse finden sich häufiger auf der linken Seite, da auf der rechten die Leber das Zwerchfell stützt. — Die obere Fläche des Zwerchfells ist mit dem Rippenfelle, die untere mit dem Bauchfelle bekleidet. Auf der oberen Fläche der Pars tendinea ist der Herzbeutel angewachsen. — Zwischen dem Costalzacken, welcher vom 7. Rippenknorpel kommt, und jenem, der am Processus ziphoideus entspringt, existirt eine dreieckige Spalte, durch welche Brustfell und Bauchfell in Contact gerathen. Larrey rieth, durch diese Spalte den Herzbeutel zu punktiren. — Der veränderliche Stand des Zwerchfells erklärt es, warum eine und dieselbe penetrirende Wunde ganz andere Theile verletzt haben wird, wenn sie im Momente des Ein- oder Ausathmens beigebracht wurde.

E. Muskeln des Rückens.

§. 164. Allgemeine Betrachtung des Rückens, und Eintheilung seiner Muskeln.

Wir begreifen unter Rücken, Dorsum, die hintere Seite des Stammes. welche, von oben nach unten, aus dem Nacken (hintere Halsgegend), dem eigentlichen Rücken (hintere Thoraxwand), den Lenden (hintere Bauchwand) und dem Kreuze (hintere Beckenwand) besteht. - Die Nackengegend ist leicht concav, und unten durch den Vorsprung des siebenten Halsdornes vom Rücken abgegrenzt. Die eigentliche Rückengegend ist convex, und längs der Mittellinie durch die Spitzen der Brustdornen markirt. An ihrer oberen äusseren Abtheilung liegen die beweglichen Schulterblätter, die bei musculösen Körpern einen mehr gleichförmig gerundeten, bei Mageren und Lungensüchtigen, einen durch die Spina scapulae scharf gezeichneten Vorsprung bilden. Die concave Lendengegend besitzt in der Medianlinie eine verticale Rinne, die den Lendendornen entspricht, und, seitwärts von ihr, pralle Stränge, die den Fleischmassen der grossen Rückenstrecker angehören. Die Kreuzgegend ist am wenigsten von Weichtheilen bedeckt, daher hart, und nur den Sehnen der Rückenmuskeln zum Ursprunge dienend.

Die Haut des Rückens ist dick, derber als irgendwo (die Rückenhaut der Thiere liefert deshalb das beste Leder), und über den Dornfortsätzen weniger verschiebbar als an den Seiten. Sie ist an den Leichen, wegen Senkung des Blutes in den Capillargefässen, meist blau- oder dunkelroth gesleckt (Todtenslecke), und ist am Kreuzbeine, der harten Unterlage wegen, dem Verbranden durch Ausliegen (Sphacelus) bei Kranken am meisten ausgesetzt. — Da das Schulterblatt bei den Bewegungen des Armes sich leicht verschiebt, so konnte die Haut mit den tieseren Schichten nicht durch kurzes und sestes, sondern durch blätteriges und sehr dehnbares Bindegewebe verbunden sein, welches beim Lebenden Fettcysten ausnehmen, und durch Senkung des Wassers an hydropischen Leichen zu einer be-

deutenden Dicke außschwellen kann. Eine Fascia superficialis existirt nur als äusserst dünner Bindegewebsüberzug der ersten Muskelschichte. Den ganzen Raum zwischen Haut und Knochen, der zu den Seiten der Dornfortsätze bedeutend tief ist, nehmen Muskeln ein. Weder Gestasse noch Nerven von einiger Bedeutung verzweigen sich auf oder zwischen ihnen. Daher sind Fleischwunden des Rückens minder gesahrvoll, und es liegt somit eine Art von Rücksicht in der Barbarei gewisser Körperstrasen.

Wenn man die Muskeln des Rückens allgemein in vier Schichten theilt. so ist dabei doch sehr viel Willkürliches. Würden alle Rückenmuskeln gleich lang sein, so würde jeder derselben ein besonderes Stratum bilden. Die Zahl der über einander liegenden Muskeln ist aber im Nacken eine andere, als am Mittelrücken oder an den Lenden, und man sieht sich deshalb genöthigt, stellenweise über einander geschichtete Muskeln doch in Ein Stratum aufzunehmen, wodurch die durch die Aufstellung von Schichten beabsichtigte Klarheit des räumlichen Verhältnisses gewiss nicht vermehrt wird. So gehören streng genommen der Musculus cucullaris und Latissimus dorsi, obwohl sie die ersten unter der Haut liegen, doch nicht in Eine Schicht, weil der Cucullaris theilweise den Latissimus dorsi deckt, und dieses Decken wiederholt sich bei den Muskeln einer tieferen Schichte so oft, dass es fast gerathener wäre, die Idee der Schichtung ganz aufzugeben, und die Muskeln so zu nehmen und zu beschreiben, wie sie nach Entfernung der darüber liegenden zum Vorschein kommen. - Die Ursprünge und Enden der einzelnen Rückenmuskeln sind in verschiedenen Individuen bei weitem nicht dieselben. Sie können sich vermehren oder vermindern, höher oder tiefer rücken, und bieten dadurch eine so grosse Fülle von Varietäten dar, dass nicht leicht die Beschreibung eines Autors mit der eines anderen stimmt. Jede Veränderung der Ursprunge oder Insertionen Eines Muskels, bedingt nothwendig eine entsprechende Verrückung der übrigen, und die Anomalie erstreckt sich auf viele Nachbarn. Unter diesen möglichen Schwankungen giebt es jedoch eine gewisse constante Grösse, und auf diese ist bei der folgenden Beschreibung der einzelnen Rückenmuskeln vorzugsweise Rücksicht genommen. Ihrer Gestalt nach bilden die Rückenmuskeln drei Kategorien. die breiten, die langen, und die kurzen, von welchen die ersteren über den letzteren liegen.

§. 165. Breite Rückenmuskeln.

Der Kappenmuskel, Musculus cucullaris s. trapezius (Musculus mensalis, Tischmuskel der älteren Autoren), entspringt von der Linea semicircularis superior und der Protuberantia externa des Hinterhauptbeins, vom Ligamentum nuchae, den Spitzen der Dornfortsätze des siebenten Halswirbels und aller Brustwirbel. Zwischen den Dornspitzen gehen die Fasern eines Cucullaris mittelst Zwischensehnen in die des anderen über. Von dieser langen Ursprungsbasis laufen die einzelnen Bündel convergirend zur Schulter, wo sich die oberen an den hinteren Rand der Spina scapulae in seiner ganzen Länge, an den inneren Rand des Akromium, und an das Schulterende des Schlüsselbeins befestigen, während ran der inneren Hälfte der Spina angreifen. Ke kei

die äussere Hälfte der Spina heben, und die innere senken, was nur durch eine Drehung des Schulterblattes möglich wird. Die Convergenz seiner Bündel giebt ihm eine dreieckige Gestalt, und hat man beide Cucullares präparirt, so geben die mit ihren langen Bases an einander stossenden Dreiecke ein ungleichseitiges Viereck, woher der Galen'sche Name Musculus trapezius abzuleiten ist. Der lange untere spitzige Winkel dieses Vierecks ähnelt durch seine Lage einer zurückgeschlagenen Münchskappe (Cucullus), weshalb Spigelius die Benennung Musculus cucullaris einführte, damit die armen Sterblichen sich, wie er sagt, erinnern mögen: vitam homini religiosam ducendam esse. — Wenn er mit allen seinen Bündeln zugleich wirkt, so nähert er nicht die Schultern, sondern dreht sie, ohne sie zu verschieben. Einzelne Abtheilungen des Muskels werden sie nach ihrer Richtung ziehen.

Der Zusammenhang des einen Kappenmuskels mit dem anderen ist zuweilen so evident, dass man beide in Einen vereinigen sollte, was schon
durch den Namen geboten wird, indem ein dreieckiger Muskel weder eine
Kapuze noch ein Trapez ist. Die Einheit beider Muskeln wird nur durch
eine gar nicht seltene Abweichung gestört, wo der Cucullaris einer Seite,
um ein oder zwei Wirbel weniger herabreicht, als der andere. Bass der
Cucullaris, wenn er mit allen Fascikeln, und mit geringer Kraft wirkt, eine
Drehbewegung des Schulterblattes (mit dem unteren Winkel nach aussen)
hervorruft, ist aus dem Verhältnisse seiner oberen und unteren Bündel zur
Spins scapulas begreiflich (Winslow).

Der breiteste Rückenmuskel, Musculus latissimus dorsi, hat unter allen Muskeln die grüsste Ausdehnung. Er entspringt mit einer breiten Sehne (welche zugleich das hintere Blatt der Fascia lumbo-dorsalis ist) von den Dornfortsätzen der 6-8 unteren Brustwirbel, aller Lenden- und Kreuzwirbel, und von dem hinteren Theile des Labium externum der Darmbeincrista. Zu diesem sehnigen Ursprunge gesellen sich noch 3-4 fleischige Zacken, die von den untersten Rippen kommen, und sich an den ausseren Rand des Muskels anschmiegen. Er läuft, die hintere und die Seitenwand der Brust umgreisend, und zusehends schmäler werdend, über den unteren Winkel des Schulterblattes zum Oberarmknochen, bildet die bintere Wand der Achselhöhle, und inserirt sich mit einer ungesähr zollbreiten platten Sehne in die Spina tuberculi minoris. Die Sehne des Musculus teres major verwächst mit der Sehne des Latissimus, und es wäre gar nicht unpassend, den Teres major, der vom unteren Winkel des Schulterblattes entspringt, als die Scapularportion des breitesten Rückenmuskels zu beschreiben. Seine Wirkung ist ebenso mannigfaltig, wie die des Pectoralis major, und hängt von der Stellung des Arms ab. Den herabhängenden Arm zieht er nach rückwärts, und nähert die Hand dem Gesässe, woher sein obsconer älterer Name Tersor s. Scalptor ani.

Seine merkwürdigste Varietät ist ein Zusammenhang mit der Sehne des grossen Brustmuskels durch ein über die Armnerven und Gesässe weglausendes Bündel, — eine Einrichtung, die beim Maulwurf und in der Klasse des Vöge! Norm ist. Ueber das Verhältniss des Latissimus dorsi zur Fascia axillaris siehe Langer's Abhandlung in der österr. medic. Wochenschr. 1846. Nr. 15 und 16. — Die oberen Ursprünge des Latissimus werden von dem unteren Winkel des Kappenmuskels bedeckt. Da der Muskel den im Schultergelenk auswärts gedrehten Arm nach innen drehen hilft, so liegt, um das Abwickeln seiner Sehne ohne Reibung möglich zu machen, ein constanter Schleimbeutel zwischen ihr und dem Oberarmbein.

Nach Abtrennung dieser beiden erscheinen:

Der grosse und kleine rautenförmige Muskel, Musculus rhomboidens major et minor. Sie machen eigentlich nur Einen Muskel aus, der vom Cucullaris bedeckt wird, von den Dornfortsätzen der zwei unteren Halswirbel und der vier oberen Brustwirbel entspringt, schräge nach ab- und auswärts läust, und am inneren Rande des Schulterblattes endet. Ist die von den Halswirbeln entspringende Portion von dem Reste des Muskels getrennt, so nennt man sie Musculus rhomboideus minor s. superior, und was übrig bleibt, Musculus rhomboideus major s. inserior. Beide unterstützen den Cucullaris; auch nähern sie die Schulter der Wirbelsäule.

Der Ausheber des Schulterblattes, Musculus levator scapulae s. Musculus angularis, entspringt mit vier sehnigen Köpsen von den hinteren Höckern der Querfortsätze der vier oberen Halswirbel, und steigt zum inneren oberen Winkel des Schulterblattes herab. Er hebt die Schulter, und heisst scherzweise Musculus patientiae. Bei vielen Säugethieren ist er mit dem Serratus anticus major zu einem Muskel verwachsen.

Nun entsernt man den Musculus rhomboideus, und sindet unter ihm:
Den hinteren oberen sägeförmigen Muskel, Musculus serratus posticus superior. Ursprung: Dornsortsätze der zwei unteren Halsund zwei oberen Brustwirbel. Ende: mit vier Zacken an die 2-5. Rippe.
Richtung also schies. Wirkung: Rippenheben.

Der hintere untere sägeförmige Muskel, Musculus serratus posticus inferior, liegt in der Gegend der zwei unteren Brust- und oberen Lendenwirbel, ist ganz von der oberen Portion des Latissimus bedeckt, von dessen Ursprungsaponeurose er seine Entstehung nimmt, und befestigt sich, schräge aus- und aufwärts laufend, mit breiten, dünnen, fleischigen Zacken an die vier letzten Rippen, welche er niederzieht.

Der bauschähnliche Muskel des Kopfes und Halses, Musculus splenius capitis et colli, liegt unter dem oberen Theile des Cucullaris, und wird an seinem Ursprunge vom Rhomboideus und Serratus pesticus superior bedeckt. Er entspringt von den Dornfortsätzen des dritten Halswirbels bis zum vierten Brustwirbel herab, steigt mit schräge aus- und aufwärts gehenden Fasern zum Hinterhaupt und zur Seite der Halswirbelsäule empor, und befestigt sich theils an der Linea semicircularis superior des Hinterhauptes, und am hinteren Rande des Warzenfortsatzes (Splenius capitis), theils an den Querfortsätzen der zwei oder drei oberen Halswirber

(Splenius colli). Dreht den Kopf und Hals. Seine beiden Portionen werden sonst als zwei verschiedene Muskeln beschrieben.

§. 166. Lange Rückenmuskeln.

Während die im vorigen Paragraphe beschriebenen Muskeln durch schräge nach aussen gerichtete Faserung übereinkommen, folgen die nun zu erwähnenden mehr der Längenrichtung der Wirbelsäule, und liegen in den zwei langen Furchen eingebettet, welche zwischen Dorn- und Querfortsätzen sämmtlicher Wirbel herablaufen.

Der gemeinschaftliche Rückgratstrecker, Musculus extensor dorsi communis (bei den Alten opistothenar) entspringt mit einem dicken, fleischigen Bauche von der hinteren Fläche des Kreuzbeins, der Tuberositas und dem hinteren Theile der Crista ossis ilei, und den Dornfortsätzen der Lendenwirbel. Dieser Knochenursprung des Muskels ist in einer starken, aus zwei Blättern bestehenden Scheide (Vagina s. Fascia lumbo-dorsalis) eingeschlossen, deren innere Oberstäche neue Ursprungsfascikel erzeugt. Das hochliegende Blatt ist mit der Ursprungssehne des Latissimus dorsi fest und untrennbar verwachsen, und hat somit denselben Ursprung wie diese. Das tiesliegende Blatt ist viel kleiner, entspringt an den Querfortsätzen der Lendenwirbel, und süllt den Raum zwischen der letzten Rippe, und dem hinteren Theile der Darmbeincrista aus. Beide Blätter vereinigen sich, nachdem sie den sleischigen Ursprungsbauch des gemeinschastlichen Rückenstreckers umfangen haben. Das hochliegende Blatt erstreckt sich weit am Rücken hinauf, dringt unter dem Rhomboideus zum Serratus posticus superior, mit dessen Ursprungssehne es verschmilzt, und setzt seinen Weg über ihn hinaus, also zwischen Cucullaris und Splenius (wo es Fascia nuchae heisst) bis zum Hinterhaupte fort. — Krause beschrieb einen eigenen, unconstanten Spanner der Fascia nuchae, welcher vom ausseren Ende der Linea semicircularis superior des Hinterhauptes entspringt, und, hinter dem Splenius herabsteigend, in der Fascia sich verliert.

Während des Lauses nach auswärts, giebt der in der Vagina lumbodorsalis eingeschlossene Bauch des gemeinschastlichen Rückenstreckers, Befestigungsbündel an die Querfortsätze (besser Processus costarii) und die
Processus accessorii der Lendenwirbel, und theilt sich, am ersten Lendenwirbel angekommen, in zwei Portionen, welche über den Rücken bis zum
Halse hinauslausen, und als Musculus sacro-lumbalis (äussere Portion) und
Musculus longissimus dorsi (innere Portion) beschrieben werden.

a) Der Sacro-lumbalis hestet sich mit 12 sehnigen Zacken an die Tubercula und unteren Ränder aller Rippen, und schickt zuweilen eine dreizehnte Zacke zum Querfortsatze des letzten Halswirbels. Die von den sunf oder sechs oberen Rippen entstehenden Fleischbundel vereinigen sich zu einem länglichen Muskelkörper, der sich schief nach aussen zu den

Querfortsätzen des sechsten bis vierten Halswirbels begiebt, wo er mit drei sehnigen Spitzen endet. Er bildet eine Zugabe oder Verlängerung des Sacro-lumbalis, und wird auch als besonderer Muskel unter dem Namen Musculus cervicalis ascendens genommen.

b) Der Longissimus dorsi steigt mit dem früheren parallel in die Höhe, bezieht unconstante Verstärkungsbündel von den oberen Lenden- und unteren Brustwirbeln (welche erst gesehen werden, wenn man den Körper des Muskels auf die Seite drängt), und spaltet sich in eine Reihe aufsteigender, kurzer, fleischig-sehniger Zacken, welche theils an die hinteren Enden der Rippen (mit Ausnahme der obersten und untersten), theils an alle Brustwirbelquerfortsätze sich inseriren. — Das obere Ende des Longissimus dorsi geht in den Musculus transversalis cervicis über, welcher von den Querfortsätzen der vier oberen Rücken- und zwei unteren Halswirbel, zu den Querfortsätzen der fünf oberen Halswirbel läuft.

Die vereinigte Thätigkeit des Sacro-lumbalis und Longissimus dorsi auf beiden Seiten, streckt den Rücken; auf einer Seite wirkend, krümmen sie die Wirbelsäule seitlich. Der Sacro-lumbalis kann auch die Rippen beim Ausathmen herabziehen, und der Cervicalis ascendens und Transversalis cervicis werden die Drehungen der Halswirbelsäule unterstützen.

Nach Theile bildet der Musculus sacro-lumbalis mit dem Longissimus dorsi, keinen gemeinschaftlichen, als Extensor trunci communis bezeichneten Ursprungsbauch. Es ist vielmehr das Ursprungsfleisch des Sacrolumbalis, nur an die Aussenstäche der Sehne des Longissimus gehestet, und entspringt durch eine, an die äussere Lefze der Crista ossis ilei gehestete Sehne. Theile hat deshalb den alten Namen Sacro-lumbalis in Ilio-costalis umgeformt.

Eine sorgaltige Revision dieser Muskeln, welche zur Aufstellung eines neuen Musculus costalis dorsi führte, hat Luschka vorgenommen (Müller's Archiv, 1854. pag. 153.).

Nach Entfernung der Insertionen des Sacrolumbalis (*Ilio-costalis*, Theile) kommt man zur Ansicht der Rippenheber, Levatores costarum, welche an den Spitzen der Querfortsätze, vom 7. Halswirbel bis zum 11. Brustwirbel herab, entspringen, und sich, etwas breiter werdend, an der nächst unteren Rippe, auswärts vom Tuberculum, festsetzen. Dies sind die Levatores costarum breves. An den unteren Rippen finden sich noch die Levatores longi, welche die nächst untere Rippe überspringen, und erst an der zweitfolgenden sich inseriren.

Unter dem Splenius capitis et colli, zwischen den Dornfortsätzen der Wirbelsäule und dem Transversalis cervicis, liegen drei, durch quer eingewebte Sehnenstreifen ausgezeichnete Muskeln: der Zweibäuchige, der grosse und kleine Durchflochtene.

Der zweibäuchige Nackenmuskel, Musculus biventer cervicis, entspringt mit drei oder vier tendinösen Zacken von den Spitzen der Querfortsätze eben so vieler oberer Rückenwirbel, einwärts von den Insertionen des Longissimus dorsi, wird bald nach seinem Ursprunge fleischig (unterer Bauch), steigt nach innen in die Höhe, und geht in eine zwei bis drei Zoll

lange Sehne über, welche in der Gegend des letzten Halswirbels am deutlichsten ist. Sie verwandelt sich über dem sechsten Halswirbel wieder in einen Muskelstrang (oberer Bauch), welcher häufig einen quer eingewebten Sehnenstreifen zeigt, und sich zuletzt unter der Linea semicirculeris superior des Hinterhauptes ansetzt. Zieht den Kopf nach hinten.

Der grosse durchflochtene Muskel, Musculus complexus major, liegt neben dem vorigen nach aussen, und ist oft ganz mit ihm verwachsen. Er entspringt gewöhnlich mit sieben Bündeln von den Processibus transversis der vier unteren Halswirbel, und der drei oberen Brustwirbel, so wie von den schiefen Fortsätzen des dritten bis sechsten Halswirbels, und endigt, mit mehreren Sehnenfasern durchflochten, in dem
Zwischenraume der oberen und unteren halbmondförmigen Linie des Hinterhauptbeins. Wirkt wie der Zweibäuchige.

Der kleine durchflochtene Muskel, auch Nackenwarzenmuskel, Musculus complexus minor s. trachelo-mastoideus (τράχηλος,
Nacken), liegt zwischen Complexus major und Transversalis cervicis, und
ist mit dem letzteren häusig so innig verwachsen, dass er nur ein Theil
desselben zu sein scheint. Er entspringt von den queren und schiesen
Fortsätzen der vier unteren Halswirbel, und der drei oberen Brustwirbel,
jedoch nicht immer von allen, steigt gerade auswärts, und besetigt sich
am hinteren Rande des Warzensortsatzes. Zieht den Kopf nach hinten,
und dreht ihn zugleich.

Der Dornmuskel des Rückens, Musculus spinalis dorsi, liegt zwischen dem Longissimus dorsi und den Dornfortsätzen der Rückenwirbel. Er entspringt von den Dornfortsätzen der zwei oberen Lendenwirbel und der drei unteren Brustwirbel, gebt am Dornfortsatz des neunten Brustwirbels vorbei, und setzt sich an die darüber folgenden Dornen bis zum zweiten Brustwirbel hinauf fest. Er ist nach aussen mit dem Longissimus dorsi, nach vorn mit dem Multifidus spinae, welchen er bedeckt, sehr innig verwachsen. Hilft die Wirbelsäule strecken.

Der Halbdornmuskel des Rückens, Musculus semispinalis dorsi, entspringt mit sechs langen sehnigen Fascikeln von den Querfortsätzen des sechsten bis eilsten Brustwirbels. Die Ursprungssehnen sammeln sich zu einem slachen Muskelbauch, der sich nach oben und innen in sechs Spitzen auszieht, welche, nachdem sie in glatt rundliche Sehnen sich verlängerten, an den Dornfortsätzen des letzten Halswirbels und der sünf oberen Brustwirbel endigen. Er unterstützt die Seitwärtsbiegung und vielleicht die Axendrehung der Wirbelsäule.

Der Dornmuskel des Nackens, Musculus spinalis cervicis, verbält sich durch Lage und Wirkung zur Halswirbelsäule, wie der Spinalis dorsi zur Brustwirbelsäule. Er variirt so häufig, dass er selten auf beiden Seiten desselben Cadavers übereinstimmt. Man kann deshalb seine Bildung nur ungefähr angeben, und sagen, dass er von den Dornen der unteren Halswirbel, und einiger oberer Rückenwirbel entspringt, um sich an den

Dornen der oberen Halswirbel (ohne Atlas) zu besestigen. Er streckt den Halstheil der Wirbelsäule. Cowper nannte ihn Superspinalis. Man hatte ihn allgemein sür eine Varietät der später zu erwähnenden Musculi interspinales gehalten, bis durch Henle und Heilenbeck die wahre Bedeutung desselben sestgestellt wurde.

Der Halbdornmuskel des Nackens, Musculus semispinalis cervicis, ist eine Wiederholung des Semispinalis dorsi. Er wird vom Biventer cervicis und Complexus major bedeckt, und deckt selbst den Spinalis cervicis und den Multifidus spinae. Er entspringt von den Spitzen der Querfortsätze des fünsten bis sechsten oberen Rückenwirbels, läust schräge nach oben und innen, und besestigt sich mit vier sehnigen Zacken an die Dornfortsätze des zweiten bis fünsten Halswirbels. Da die Richtung seiner Fasern mit der des Semispinalis dorsi ganz übereinstimmt, und sich sein unterstes Bündel an das oberste des letzteren anschmiegt (was aber nicht immer der Fall ist, indem Ein Wirbel zwischen beiden frei bleiben kann), so hat Krause aus beiden Einen Muskel: den Semispinalis colli et dorsi gemacht.

Ueber die Analogie der Rückenmuskeln an verschiedenen Stellen des Rückens siehe J. Müller, vergleichende Anatomie der Myxinoiden. 1. Thl. p. 234 seqq.

§. 167. Kurze Rückenmuskeln.

Sie liegen, unter den vorausgegangenen verborgen, unmittelbar auf den Wirbeln auf, und bilden kurze, fleischig-sehnige Muskelkörper, welche entweder zwischen je zwei Wirbeln sich wiederholen, oder einen Wirbel, seltener zwei, vom Ursprung bis zu ihrem Ende überspringen.

Der vielgespaltene Rückenmuskel, Musculus multifidus spinae, ist eigentlich nur eine Reihenfolge vieler schiefer Muskelbundel, welche von den Gelenk- und Querfortsätzen unterer Wirbel, zu den Dornfortsätzen oberer Wirbel hinziehen. Die Ursprungsstellen dieser zahlreichen Bundel sind a. am Kreuzbeine: die durch das Verschmelzen der falschen Gelenkfortsätze entstandenen höckerigen Linien, β . an den Lendenwirbeln: die Processus accessorii und obliqui, y. an der Brust: die oberen Ränder der Querfortsätze, d. am Halse: die Gelenkfortsätze der vier unteren Halswirbel. Von jedem dieser Punkte entspringen Muskelbundel, welche (die tieseren) zum nächst darüber liegenden Dornfortsatze, oder (die höheren) zum zweiten, auch dritten oberen Dorne, schräge nach innen und oben laufen. Die tiefsten Faserbundel, welche also fast quer vom Ursprungspunkt, zum unteren Rand des Bogens und zur Basis des Dornfortsatzes des nächst darüber liegenden Wirhels sich erstrecken, sind in der Brustwirhelsäule besonders stark entwickelt, und wurden von Theile als Rotatores dorsi beschrieben. Es ist klar, dass, je mehr die Richtung eines Bündels sich der queren nähert, seine Zusammenziehung desto leichter eine Drehung des darüber liegenden Wirbels auf dem unten liegenden bewirken, und dass, je schiefer die Bündel aufsteigen, ihre Wirkung desto mehr auf ein Strecken der Wirbelsäule abzielen wird.

Die Zwischendornmukeln, Musculi interspinales, finden sich, mit Ausnahme des dritten bis zehnten Brustwirbels, zwischen je zwei Dornfortsätzen. Sie sind, wo sie vorkommen, immer paarig, und werden durch die Zwischendornbänder von einander gehalten.

Die Zwischenquerfortsatzmuskeln, Musculi intertransverseri, füllen den Zwischenraum zweier Querfortsätze aus. Am Halse sind sie am grössten, und auf beiden Seiten doppelt, als vordere und hintere, vorhanden, indem sie an den vorderen und hinteren Schenkeln der durchbohrten Querfortsätze entspringen und endigen. An der Brust sehlen sie für die oberen Brustwirbel gänzlich, und treten zwischen den unteren nur einsach aus. Am Lendensegment der Wirbelsäule werden sie wieder doppelt, und sind breit und dünn. Die vorderen liegen zwischen je zwei Querfortsätzen, die hinteren zwischen den Processibus obliquis.

In einzelnen Fällen findet sich, zwischen der hinteren Fläche des letzten Kreuzwirbels und der unteren Steissbeinstücke, ein doppelter sehniger Muskelstrang, als Wiederholung des bei mehreren Säugethieren vorkommenden Sacro-coccygeus posticus s. Extensor coccygis.

Zwischen dem Hinterhauptbein, dem ersten und zweiten Halswirbel, trifft man einen, aus vollkommen isolirten, paarigen, kurzen, aber starken Muskeln gebildeten Bewegungsapparat, der in die drei hinteren geraden, und zwei hinteren schiefen Kopfmuskeln zerfällt.

Der grosse hintere gerade Kopfmuskel, Musculus rectus capitis posticus major, entspringt vom Dorn des zweiten Halswirbels, wird im Aufsteigen breiter, grenzt mit dem der anderen Seite, und befestigt sich an der Linea semicircularis inferior des Hinterhauptbeins. Hebt man ihn auf, so folgen auf ihn:

Der kleine hintere gerade Kopfmuskel, Musculus rectus capitis posticus minor, der vom Tuberculum posterius atlantis zur selben Insertionsstelle, wie der grosse, zieht. Beide strecken den Kopf, und sind den Zwischendornmuskeln des Rückens analog.

Der seitliche hintere gerade Kopsmuskel, Musculus rectus capitis posticus lateralis, entspringt von den Seitentheilen des Atlas, und besestigt sich, gerade aussteigend, hinter dem Foramen jugulare an den Processus jugularis des Hinterhauptbeins. Ist zuweilen doppelt, und erscheint dadurch als wahrer Intertransversarius primus.

Der untere schiefe Kopfmuskel, Musculus obliquus capitis inferior s. major, entspringt seitwarts am Dornfortsatz des Epistropheus, und endigt, schräge nach aussen und oben ziehend, am hinteren Rande des Querfortsatzes des Atlas. Dreht den Atlas, und somit auch den Kopf, um den Zahnfortsatz des Epistropheus.

Der obere schiefe Kopfmuskel, Musculus obliquus capitis su-

perior s. minor, entsteht an der Spitze des Querfortsatzes des Atlas, und endigt, schräge nach innen und oben laufend, an der Linea semicircularis inferior des Hinterhauptes, nach aussen von den Rectis. Streckt den Kopf, und kann nicht, wie Theile anführt, als eine Wiederholung der Rotatores angesehen werden, da das Hinterhauptbein auf dem Atlas keine Drehbewegung ausführen kann.

Die zwei Obliqui beider Seiten bilden zusammen einen Rhombus, durch dessen Ebene die Recti so aufsteigen, wie die geraden Portionen der beiden Longi colli durch den Rhombus der schiefen. (§. 153.)

F. Muskeln der oberen Extremität.

§. 168. Allgemeine Betrachtung der oberen Extremität.

Von den Knochen der ersten Abtheilung der oberen Extremität, ist das Schlüsselbein an seiner vorderen Seite gar nicht, und an seiner oberen nur theilweise von Muskeln bedeckt, während das Schulterblatt so allgemein von Muskeln eingehüllt erscheint, dass nur der Rand seiner Spina, und das Akromium davon frei bleiben. Es lassen sich deshalb die Clavicula und die Spina scapulae durch die Haut hindurch leicht mit dem Finger fühlen, und bis zu ihrer Verbindung am Akromium verfolgen. Unter dem Akromium folgt die durch den Oberarmkopf und den darauf liegenden Deltamuskel bedingte Wölbung des Schultergelenks, an dessen innerer Seite eine bei herabhängendem Arme tiefe, bei aufgehobenem seichter werdende Grube liegt (Axilla oder Ala. Ita vestra axilla, ala facta est, elisione syllabae vastioris. Cic.). Sie wird vorn durch den Pectoralis major und minor, hinten durch den Latissimus dorsi und den damit verbundenen Teres major, innen durch die Seitenwand des Thorax, und aussen durch das Schultergelenk begrenzt. — Unter der Wölbung des Schultergelenks läust der Oberarm gleichsormig gerundet zum Ellbogen herab, wo er etwas breiter und flacher wird, an seiner vorderen Seite die seichte Grube der Ellbogenbeuge, an seiner kinteren den Vorsprung des Olekranon, aussen und innen die leicht fühlbaren Condyli erkennen lässt. Der Vorderarm, der am Ellbogen am dicksten und fleischigsten ist, verschmächtigt sich gegen die Handwurzel zu, verliert seine Rundung und wird breiter, lässt die Ulna ihrer ganzen Länge nach, den Radius nur an seiner unteren Hälfte durchs Gefühl wahrnehmen, und geht durch das Carpalgelenk in den Handteller mit seinen bekannten Eigenthümlichkeiten über.

Die Hautbedeckung der oberen Extremität schiebt sich von der Brust und dem Rücken gegen die Schulter hin, bedeckt das Schlüsselbein und die Schulter nur lose, hängt an das Akromium fester an, und lässt sich von ihm nicht als Falte aufheben. Einem für den Stamm, so wie für beide Gliedmassen geltenden Gesetze zufolge, ist sie an der Streckseite derher und dicker, an den Beugestellen um so feiner und zarter, je tiefer die

sind. Sie wird somit in der Achselgrube feiner, als im Ellbogenbug, und in diesem wieder dünner, als in der Beugeseite der Handwurzel sein. An letzterer Stelle fällt eine, den Vorderarm von der Hand trennende, nach unten convexe Hautfurche auf, welche bei der Beugung der Hand tieser wird, und selbst bei grösster Streckung der Hand nie ganz verschwindet. Bei neugeborenen Kindern, so wie an settreichen oder hydropischen Armen überhaupt, erscheint die Furche besonders tief, und die Carpalgegend bekommt das Ansehen, als wenn sie mit einem Faden zusammengeschnürt wäre. Diese Furche entspricht genau der Articulation zwischen Vorderarm und erster Handwurzelreihe. Unter ihr fühlt man die harten Vorsprünge der Eminentiae carpi, auf welche die musculösen Wülste des ausseren und inneren Handballens folgen, welche beim Hohlmachen der Hand die seitlichen Begrenzungen einer seichten Vertiefung bilden, in welcher mehrere. auch bei flach gemachter Hand fortbestehende Furchen auffallen, welche dem Aberglauben das Schicksal des Menschen verkünden, dem Anatomen aber, nur ihrer constanten Beziehungen zu gewissen tief liegenden Gebilden der Hohlhand wegen, merkwürdig sind, und deshalb Erwähnung verdienen. Die Furchen bilden sich keineswegs in Folge des österen Hohlmachens der Hand, denn sie sind schon im Embryoleben mit derselben Schärfe gezeichnet, wie im Erwachsenen. Die erste Hohlhandfurche (Linea mensalis der Chiromanten) entspringt zwischen Zeige- und Mittelfinger, und endet am Ulnarrande der Hohlhand. Sie entspricht genau der Articulatio metacarpo-phalangea der drei letzten Finger. Die zweite (Linea vitalis) entsteht zwischen Daumen und Zeigefinger, und zieht durch die Hohlhand nach aufwärts, um in der früher erwähnten Grenzsurche zwischen Vorderarm und Hand (die Rasceta der Chiromanten) zu endigen. Sie umkreist den Ursprung des Zuziehers des Daumens, und führt, an ihrem oberen Ende eingeschnitten, auf den Mediannerv. Die erste und zweite Furche kehren sich wie ein schieses)(ihre convexen Seiten zu, welche entweder durch zwei kleinere, im Winkel zusammenlaufende Furchen vereinigt werden. und die Gestalt eines M annehmen, oder unvereinigt bleiben, und eine dritte Furche zwischen sich aufnehmen, welche mit der zweiten gemeinschastlichen Ursprung hat, und nicht ganz bis zum Ulnarrand der Hand verläuft. Wenn man in ihr einschneidet, kommt man präcis auf die Ursprünge der Musculi lumbricales. — Die Dorsalseite der Hand lässt bei dürren Händen die Sehnen sämmtlicher Streckmuskeln der Finger erkennen, welche, wenn sie sich anspannen, durch Zwischengruben getrennt werden. Bei schönen Händen muss der Ulnarrand gerade, nicht durch ein vorspringendes Capitulum ossis metacarpi digiti minimi höckerig aufgetrieben sein; die mässig konisch zulaufenden Finger müssen, wenn sie aneinander gelegt werden, mit ihren Spitzen etwas convergiren; man darf weder Muskelsehnen, noch blaue Venen am Handrücken sehen, und an jeder Articulatio metacarpophalangea muss bei Streckung der Finger ein kleines Grübchen einsinken. ---

Das subcutane Zellgewebe ist an der vorderen und hinteren Seite der Schulter gleich lax, und adhärirt fester an die Haut, als an die unter ihm liegende Aponeurose. Es kann sich mit ziemlich reichlichen Fettcysten füllen, bleibt jedoch über den Knochenvorsprüngen auch bei grosser Wohlbeleibtheit fettarm. Am Akromium nimmt es gerne eine subcutane Bursa mucosa auf, welche nach meinen Erfahrungen bei Individuen, welche häufig Lasten auf den Schultern, oder mittelst breiter Schulterbänder auf dem Rücken trugen, nie fehlt. Am Oberarme ist es bei Kindern und Weibern in den Furchen zwischen den Muskeln mächtiger, und rundet dadurch die Form der Gliedmasse. Schwindet es durch harte Arbeit oder colliquative Krankheiten, so treten die Muskelstränge deutlicher hervor, was besonders vom zweiköpfigen Armmuskel gilt, an dessen äusserer und innerer Seite ein longitudinaler Eindruck, der Sulcus bicipitalis internus et externus, entsteht. In der Achsel verschmilzt es mit der Aponeurose, und bleibt fettlos; nimmt dagegen Lymphdrüsen auf. In seinen tieferen Schichten verlaufen die subcutanen Gefässe und Nerven. Besonders sind die Venen bemerkenswerth, welche bei ungewolinter Anstrengung, und bei gewissen Herzsehlern turgescirend, als blaue Wülste ihren Lauf durch die Haut verrathen, und deshalb allgemein in der Ellbogenbeuge zur Vornahme der Aderlässe benützt werden. Am Olekranon bleibt es fettlos, und zeigt daselbst einen subcutanen Schleimbeutel, der, wenn er durch Zunahme seines Inhalts anschwillt, eine ausserlich sichtbare Geschwulst bildet, die unter den Arbeitern in den englischen Kohlengruben häufig vorkommen soll, und dort unter dem Namen the miners elbow bekannt ist. Gegen den Carpus vermindert sich der Fettreichthum des subcutanen Zellgewebes, und ist am Rücken der Hand immer geringer, als in der Hohlhand. Unter dem subcutanen Zellgewebe folgt eine dunne Fascia superficialis, und auf diese die Aponeurose der oberen Extremität, deren Untersuchung die Kenntniss der Muskeln voraussetzt, und deshalb später (§. 173) folgt.

§. 169. Muskeln an der Schulter.

Die Muskeln, die die sleischigen Lager um und auf der Schulter bilden, dienen entweder dazu, das Schulterblatt zu sixiren, oder den Oberarm, ja selbst den Vorderarm, zu bewegen. Erstere (Cucullaris, Rhomboideus, Serratus anticus major, und Pectoralis minor) wurden, da sie anderen Gegenden angehören, so wie der Latissimus dorsi und Pectoralis major, schon früher geschildert.

Das Schulterblatt, welches nur durch die sehr kleine Gelenkstäche am Akromium mit dem Skelete in Verbindung steht, bietet die ganze Ausdehnung seiner Flächen, seine Fortsätze, und seinen äusseren Rand den Muskeln des Armes zum Ursprunge dar, und ist insosern als Muskelknochen der oberen Extremität anzusehen. Seine grosse Verschiebbarkeit verändert vielfältig den Standpunkt des Schultergelenkes, und begünstigt wesentlich

dessen freie Beweglichkeit. Würden die hier zu erörternden Muskeln des Armes nicht vom Schulterblatte, sondern von fixen Punkten des Stammes entspringen, so würden sie bei den Lagenveränderungen des Schulterblattes eine Zerrung erleiden müssen, die mit der Freiheit des Schultergelenkes unvereinbar ist.

Der Delta muskel, Musculus deltoides (Δ-ειδής, oder besser \(\neq -ειδής \), Attollens humerum, deckt als dreieckige, aus vielen versiochtenen Bündeln gebildete Muskelmasse, den kugeligen Vorsprung des Schultergelenks, entspringt mit breiter Basis von der Extremitas acromialis des Schlüsselbeins, vom äusseren Rande des Akromium, und von dem grösseren Theile der Spina scapulae (also an denselben Punkten, an welchen der Cucullaris endigte), und besetigt sich, in eine stark sehnige, stumpse Spitze zulausend, an der Rauhigkeit in der Mitte der äusseren Fläche des Oberarmknochens. Zwischen ihm und dem Kapselbande des Schultergelenks liegt ein ansehnlicher Schleimbeutel, der zuweilen doppelt wird. Er hebt den Arm, und entsernt ihn von der Seitenstäche des Stammes. Dass hiebei seine mittlere Portion, welche vom Akromion entspringt, besonders thätig ist, kann man an der eigenen Schulter mittelst der ausgelegten Hand deutlich sühlen.

Seine aussere und innere Flache sind mit einer dunnen Aponeurose überzogen, welche sich in die Sehnenbinde des Oberarms fortsetzt, und mit der Kapsel des Schultergelenks so zusammenhängt, dass der Muskel, wenn er sich zusammenzieht, zugleich die Kapsel anspannt, und ihrer möglichen Einklemmung vorbeugt. - Meckel (Handbuch der menschl. Anat. II. p. 493) beschrieb ein östers vorkommendes, von der Aponeurose des Infraspinatus, und von der Mitte des inneren Schulterblattrandes entspringendes, accessorisches Fascikel, und Albin ein kürzeres, vom vorderen Schulterblattrande entstehendes. — Häufig bildet der Grätenursprung eine besondere Portion. — Man hat seinen Clavicularursprung auf Kosten des grossen Brustmuskels bis zum Sternum sich erstrecken (Seiler, Obs. anat. Fasc. I.), oder mit dem Pectoralis major verschmelzen gesehen (Otto, pathol. Anat. p. 249). — Theile (in Sommerring's Muskellehre, pag. 230) beobachtete einen zweiten, tiesliegenden, 1 1/2 Zoll breiten Armheber, der von der Kapsel des Schultergelenks entsprang, und ich sah mehrmals einen vom Akromium entstehenden Spanner der Schulterkapsel, als ein vom Fleische des Deltoides losgerissenes, und selbstständig gewordenes Bündelchen.

Der Obergrätenmuskel, Musculus supraspinatus, wird von der Gräteninsertion des Cucullaris bedeckt, liegt in der Fossa supraspinata, von welcher er entspringt, und geht unter dem Akromium zum Tuberculum majus des Oberarmknochens, an dessen obersten Muskeleindruck er sich inserirt. Rollt den Arm nach aussen, und hilft ihn heben.

Der Untergrätenmuskel, Musculus infraspinatus, entspringt, wie sein Name ausdrückt, von der Fossa infraspinata, wird vom Grätenursprung des Deltoides bedeckt, und geht nach aus- und aufwärts zum mittleren Eindruck des Tuberculum majus. Rollt den Arm nach aussen, und zieht ihn, wenn er aufgehoben war, nieder.

Der kleine runde Armmuskel, Musculus teres minor, entspringt

vom oberen Theile des äusseren Schulterblattrandes, schmiegt sich an den unteren Rand des Infraspinatus an, mit welchem er sehr oft verschmilzt, und endigt am unteren Eindruck des *Tuberculum majus*. Wirkt wie der Infraspinatus.

Da das Tuberculum majus den drei Auswärtsrollern des Oberarms als Angriffspunkt dient, könnte es als Tuberculum supinatorium, — und das Tuberculum minus, welches als Hebelarm für die Einwärtsroller dient, als Tuberculum pronatorium bezeichnet werden. Die quere Richtung der Rollmuskeln, und die Grösse der Tubercula, lässt die Rollbewegung mit geringem Kraftverluste ausführen.

Der grosse runde Armmuskel, Musculus teres major, der ganz zweckmässig als Scapularursprung des Latissimus dorsi genommen werden könnte, entsteht unter dem vorigen bis zum unteren Winkel des Schulterblattes herab; läust nach auf- und vorwärts, lässt seine platte Sehne sich mit der des Latissimus dorsi vereinigen, und besestigt sich, wie diese, an der Spina tuberculi minoris. Zieht den Arm an den Stamm und etwas rückwärts, dreht ihn zugleich nach innen.

Der grosse und kleine runde Armmuskel sind durch eine Spalte getrennt, durch welche der lange Kopf des Triceps läuft.

Der Unterschulterblattmuskel, Musculus subscapularis, nimmt die concave vordere Fläche des Schulterblattes ein. Er ist deshalb, so lange die Extremität noch mit dem Stamme in Verbindung ist, sehr schwer zugänglich, wie versenkt zwischen Schulterblatt und Brustkasten (daher wohl der alte Name Musculus immersus). Er ist mit dem Musculus serratus anticus major in Flächenberührung, von welchem er durch die Fascia subscapularis und sehr laxes Zellgewebe getrennt wird, entspringt mit breiten Bündeln vom inneren Rande der Scapula, und mit spitzigen sehnigen Fascikeln von den erhabenen wellensormigen Linien der vorderen Schulterblattsläche. Die Bündel schieben sich im Laufe nach auswärts auf einander zu, und verschmelzen zu einer starken Sehne, welche an das Tuberculum internum tritt. Rollt den Arm nach innen. Zwischen seiner Sehne, dem Halse der Scapula, und der Basis des Processus coracoideus, liegt ein grosser Schleimbeutel, der mit der Höhle des Schultergelenks häufig communicirt, und eine Ausstülpung seiner Synovialauskleidung ist. Unter ihm findet sich nicht ganz selten ein kleinerer, allseitig geschlossener.

§. 170. Muskeln am Oberarme.

Es finden sich am Oberarme an seiner inneren und äusseren Seite Längenmuskeln, welche entweder an ihm entspringen (Brachialis internus, mittlerer und kurzer Kopf des Triceps), oder an ihm endigen (Coracobrachialis), oder, von der Schulter kommend, blos über ihn weglaufen, um zum Vorderarme zu gelangen (Biceps, langer Kopf des Triceps).

Der zweiköpfige Armmuskel, Musculus biceps brachii, liegt an der vorderen inneren Seite des Oberarms. Er entsteht mit zwei sehnigen

Köpfen vom Schulterblatte, und endigt an der Tuberositas radii. Sein kurzer Kopf, der zugleich der schwächere ist, Caput breve s. Musculus coraco-radialis, entspringt, mit dem Musculus coraco-brachialis verwachsen, voin Processus coracoideus, sein langer Kopf, Caput longum s. Musculus gleno-radialis, vom oberen Ende der Gelenkstäche des Schulterblattes, wo er eine plattrundliche Sehne bildet, welche in der Rinne zwischen den beiden Tuberculis des Oberarms liegt, und durch einen scheidenartigen Fortsatz der Synovialhaut des Schultergelenks umhüllt wird. Beide Köpfe vereinigen sich in der Mitte des Oberarms zu einem gemeinschaftlichen Muskelbauch, welcher über dem Ellbogengelenke in eine starke rundliche Sehne übergeht, welche sich in der Tiese der Ellbogenbeuge an die Tuberositas radii hestet. (Schleimbeutel.) Vom inneren Rande dieser Endsehne geht, bevor sie in die Beuge des Ellbogens tritt, ein plattes, breites, aponeurotisches Fascikel zur Verstärkung der Sehnenscheide des Vorderarms schräg nach innen ab, welches brückenartig über die Plica cubiti hinwegläuft. Der Biceps dreht im ersten Grade seiner Wirkung den pronirten Radius nach auswärts, und beugt hierauf den ganzen Vorderarm.

Eine ostmals vorkommende Abweichung des Muskels ist die Gegenwart eines dritten Ursprungskopfes, der gewöhnlich schwächer als einer der beiden normalen ist, und von der Mitte der inneren Fläche des Oberarms, über dem Brachialis internus, entsteht. Er ist, durch Ursprung und Richtung seiner Fasern, dem Brachialis internus so nahe verwandt, dass ich ihn für ein von diesem Muskel losgerissenes, und dem Biceps zugetheiltes Muskelbündel halte. was dadurch bestätigt wird, dass, wenn ein dritter Kopf vorkommt, der Brachialis internus immer schwächer, als gewöhnlich, erscheint. Die gleiche, auf Beugung des Vorderarms berechnete Bestimmung des Biceps und Brachialis internus, erlaubt ihnen einen Austausch ihrer Fasern. - In seltenen Fällen vermehrt sich die Zahl der Köpfe sogar bis auf fünf (Pietsch in Roux Journal de méd. T. 31. p. 245). Die überzähligen Köpse treten zuweilen nicht an die Endsehne des Biceps, sondern gehen getrennt von ihr zum Radius, auch zur Kapsel des Ellbogengelenks (Theile). Ich sah den langen Kopf gänzlich fehlen, und zweimal durch eine Sehnenschnur, die von der Kapsel des Schultergelenks entsprang, ersetzt werden.

Unter dem Verstärkungsbündel, welches von der Endsehne des Biceps zur Sehnenscheide des Vorderarms abgeht, liegt die Arteria brachialis, und einwärts von ihr der Nervus medianus; — auf demselben befindet sich die Vena mediana basilica, welche hier von den Aesten des mittleren Hautnerven gekreuzt wird, und da sie zur Vornahme der Aderlässe gewählt wird, dieser gefährlichen Nachbarschast wegen, mit besonderer Vorsicht geöffnet werden soll.

Im Zustande der Contraction bildet der Biceps einen Längenvorsprung (Eminentia bicipitalis), an dessen Rändern der Sulcus bicipitalis internus et externus herabläust. In der Mitte des ersteren schneidet man ein, um die Arteria brachialis zur Unterbindung auszusinden. Man trist zuerst auf die Vena basilica, unter ihr auf die Fascia brachii, nach deren Spaltung der Nervus medianus zum Vorschein kommt, welcher die Gestssscheide kreuzt, und mit dem Haken nach innen gezogen wird. Die Scheide wird geössinet, und man sindet die Arteria brachialis, zwischen den beiden Venae brachiales (welche zuweilen in eine einzige, an der inneren Seite der Arterie gelegene,

verschmelzen) in der Mitte liegen. — Im Sulcus bicipitalis externus, der sich nach oben zwischen Deltoides und Pectoralis major fortsetzt, trifft man die Vena cephalica, extra fasciam, und in der unteren Hälfte desselben den Nervus cutaneus externus, intra fasciam gelegen. — Die alten Anatomen nannten den Biceps Pisciculus, und bei italienischen Anatomen liest man heut zu Tage noch östers Pescetto.

Der Rabenarmmuskel, Musculus coraco-brachialis, entspringt, mit dem kurzen Kopse des Biceps verwachsen, vom Processus coracoideus, und endigt in der Mitte des Oberarmknochens, am unteren Ende der Spina tuberculi minoris. Er ist durch einen längeren oder kürzeren Schlitz, zum Durchgang des Nervus cutaneus externus, gespalten, und heisst deshalb auch Musculus perforatus Casserii. Er zieht den Arm nach innen und vorn.

Eine höhere Entwicklung seines Schlitzes führt zu einer totalen Längenspaltung und zu dadurch bedingtem Doppeltwerden des Muskels, wie bei den Affen. Er liegt vor den Gesässen und Nerven der Achselhöhle, und wird, so wie der mit ihm verschmolzene Kops des Biceps, vom Pectoralis major bedeckt. Oesters setzen sich seine hinteren Bündel in die innere Zacke des Brachialis internus sort.

Der innere Armmuskel, Musculus brachialis internus, entspringt mit seiner äusseren Zacke von der äusseren Fläche des Oberarmknochens, von der Insertionsstelle des Deltamuskels angefangen, und mit der inneren, von der Superficies interna ossis humeri, unterhalb dem Ende des Coracobrachialis. Er liegt unmittelbar auf dem Oberarmknochen auf, bedeckt die innere (vordere) Wand der Ellbogenkapsel, mit welcher er durch festes Zellgewebe zusammenhängt, bildet den Boden der Ellbogengrube, und inserirt sich am Processus coronoideus der Ulna. Beugt den Ellbogen, und spannt zugleich die Kapsel, um sie vor Einklemmung zu schützen.

Die Stelle, wo der Deltamuskel endigt, und die äussere Zacke des Brachialis internus beginnt, ist als eine leichte Depression schon durch die Haut kennbar, und dient als gewöhnlicher Applicationspunkt der Fontanellen am Oberarm. — Bei krastvoller Armmusculatur trennt sich sein äusserstes Bündel von ihm, um mit dem Supinator longus zu verschmelzen.

Der dreiköpfige Armmuskel, Musculus triceps s. Extensor brachii, liegt an der hinteren und äusseren Seite des Oberarms. Die alten Anatomen nannten seine 3 Köpfe Anconaei, wegen der Insertion am Olekranon (welches auch Processus anconaeus genannt wurde). Ich schiebe diese kurze historische Bemerkung hier ein, weil sich der Schüler ohne sie nicht erklären könnte, wie so auf der nächsten Seite auf einmal ein Anconaeus quartus daher kommt. — Sein langer Kopf, Caput longum s. Anconaeus longus, entspringt vom äusseren Schulterblattrande, gleich unter der Cavitas glenoidalis, und geht zwischen Teres major und minor nach abwärts. Sein äusserer Kopf, Caput externum s. Anconaeus externus (von Cruveilhier, der Analogie mit dem Extensor cruris wegen, Vastus externus genannt), entspringt von der Aussenseite des Oberarms, längs einer Linie, die unterhalb der Insertion des kleinen runden Armmuskels anfängt, und

bis unter die Mitte des Knochens herabreicht. Der innere Kopf, Caput internum s. Anconaeus internus (nach Cruveilhier, Vastus internus) beginnt an der inneren Seite des Oberarms, neben dem Ansatze des Teres major, bis zum Condylus internus herab, so wie von der hinteren Fläche und der äusseren Kante der unteren Hälfte des Oberarms (Theile). Alle drei Köpfe vereinigen sich zu einem dicken Muskelbauche mit einer platten mächtigen Sehne, welche schon in der Mitte des Oberarms anfängt, und am Olecranon ulnae (auf welchem ein Schleimbeutel liegt) endigt. Sie schickt Verstärkungsbündel zur Scheide des Vorderarms. Streckt den Ellbogen.

In der Spalte zwischen dem äusseren und inneren Kopfe, verläuft der Radialnerv von der Achsel zur Radialseite des Arms. Da bei der Streckung des Ellbogens die äussere (hintere) Kapselwand sich faltet, und zwischen den Knochen eingeklemmt werden könnte, so befinden sich unter dem gemeinschaftlichen Bauche des Triceps zwei kleine Muskelbündel, ein äusseres und inneres, die von den entsprechenden Winkeln des Oberarmknochens nach abwärts zur Kapsel gehen, um sie in demselben Momente zu spannen, als sie durch die Streckbewegung gefaltet wird. Theile entdeckte sie, und gab ihnen den bezeichnenden Namen Subanconaei. Aussührliches Detail über die Faserung des Triceps enthält Theile's Aufsatz in Müller's Archiv. 1839. p. 420.

Als eine Zugabe des Triceps erscheint der kurze Ellbogenhöckermuskel, Anconaeus quartus, welcher mit einer runden, am äusseren Rande des Muskels sich fortsetzenden Sehne, vom Condylus externus humeri entspringt (Schleimbeutel), und sich mit einem breiten Rande an den äusseren Winkel und die äussere Fläche der Ulna inserirt. Sein oberer Rand ist mit dem unteren Rande des Bauches des Triceps häufig untrennbar verschmolzen. Wirkt wie der Triceps.

Um ihn zu sehen, muss die starke Scheide des Vorderarms, die ihn deckt, weggenommen werden. Nach Isenflamm (Anat. Untersuchungen, 1822. pag. 64) ist er bei Kindern verhältnissmässig grösser.

§. 171. Muskeln am Vorderarme.

Sie entspringen grösstentheils an der unteren Extremität des Oberarmbeins von den heiden Condyli, in dem Verhältnisse, dass die Beuger und einer der beiden Einwärtsdreher vom Condylus internus, — die Strecker und Auswärtsdreher vom Condylus externus herabkommen. Da der Oberarmknochen den zahlreichen Muskeln des Vorderarms nicht hinlängtiche Ursprungspunkte darbietet, so nehmen viele ihrer Faserbundel von der inneren Fläche der sehnigen Vorderarmscheide, und von den Fortsätzen derselben, welche zwischen einzelne Muskelbäuche eindringen, ihren Ursprung. Die fleischigen Bäuche derselben liegen um oder unter dem Ellbogengelenk, und setzen sich, gegen die Hand zu, in dünne Sehnen fort, wodurch die Gestalt des Vorderarms einem langen, abgestutzten Kegel ähnlich wird, dessen grösste Peripherie um den Ellbogen, dessen kleinste und

die Handwurzel geht. Die einzelnen Muskeln befestigen sich entweder am Radius (Aus- und Einwärtsdreher), oder überspringen den Vorderarm, um an der Handwurzel, der Mittelhand, oder den Gliedern der Finger zu endigen.

A. Muskeln an der inneren Seite des Vorderarms.

Sie bilden drei Schichten oder Lagen, von welchen die erste den Pronator teres, Radialis internus, Palmaris longus, und Ulnaris internus, neben einander liegend, enthält. Diese vier Muskeln divergiren während ihres Laufes nach abwärts, und lassen, zwischen ihren Sehnen, die zweite Lage durchsehen, welche blos vom hochliegenden Fingerbeuger gebildet wird. Das dritte Stratum besteht aus dem tiesliegenden Fingerbeuger, dem langen Beuger des Daumens, und dem viereckigen Einwärtsdreher (welch letzteren einige Autoren ein viertes Stratum bilden lassen).

a) Erste Schichte.

Der runde Einwärtsdreher, Musculus pronator rotundus s. teres, entspringt vom Condylus internus des Oberarmbeins, geht schief nach vorn und unten zur inneren Fläche des Radius, in deren Mitte er angreift. Die Wirkung sagt der Name.

Er wird viel öfter vom Mediannerv durchbohrt, als nicht. Der kleine Durchhohrungsschlitz kann sich zu einer durchgreifenden Spaltung des Muskels in zwei kleinere entwickeln, was bei vielen Quadrumanen Regel ist. Ein Sesambein in seiner Ursprungssehne habe ich nur einmal gesehen.

Der innere Speichenmuskel, Musculus radialis internus s. Flexor carpi radialis, entspringt mit und neben dem vorhergehenden, läuft schief zum unteren Ende des Radius, von wo er über dem Ligamentum carpi transversum die Handwurzel überspringt, um an die Basis des Metacarpus indicis et digiti medii zu treten. Beugt die Hand, und unterstützt die Pronation derselben.

Gar nicht selten schickt er kurze Sehnensasern an das Os multangulum majus, wo man ihn auch ganz endigen liess. Von der Insertionsstelle des Pronator teres angesangen, heginnt der Radialis internus sehnig zu werden, und hat die Sehne des Supinator longus neben sich. Zwischen beiden Sehnen bleibt ein Zwischenraum, in welchem die Arteria radialis verläust, deren Pulsschlag hier leicht zu suhlen ist.

Der lange Hohlhandmuskel, Musculus palmaris longus, entspringt, wie die früheren, mit einem schlanken spindelförmigen Muskelbauche; und verwandelt sich in eine lange schmale Sehne, welche am Carpus an das Ligamentum carpi proprium fest anhängt, gewöhnlich einen Fortsatz zum Adductor pollicis sendet (Meckel), und in die dreieckige Hohlhand-Aponeurose ausstrahlt. Spannt die Aponeurose, und beugt die Hand.

Kaum hat ein anderer Muskel so viele Nuancen seiner Bildung, wie dieser. Er fehlt bei Gegenwart der Hohlhand-Aponeurose (letztere kann somit nicht, wie Meckel meinte, eine Entfaltung seiner Sehne sein). Zuweilen wird sein Abgang durch eine Sehne des oberstächlichen Fingerbeugers ersetzt. Er entspringt nicht vom Condylus internus, sondern von der Sehnenscheide

des Vorderarms, oder, was als Affenbildung vorkommt, vom Kronenfortsatze der Ulna (Perrault und Vicq-d'Azyr). Er ist umgekehrt; hat seine Sehne oben, seinen Fleischbauch unten; oder er wird zweibäuchig mit mittlerer Sehne; oder oben und unten sehnig und in der Mitte fleischig, oder doppelt, oder inserirt sich nur an das Handwurzelband.

Der innere Ellbogenmuskel, Musculus ulnaris internus s. Flexor carpi ulnaris, ist der letzte im ersten Stratum, läust mit der Ulna parallel, ist halbgesiedert, und entspringt vom Condylus internus und von der inneren Kante der Ulna, um mit starker rundlicher Sehne am Os pisisorme sich setzusetzen. Beugt die Hand, und abducirt sie.

Sein Ursprung wird vom Nervus ulnaris durchbohrt, der nachher mit der Arteria ulnaris und den beiden Venae ulnares in eine gemeinschaftliche Scheide eingeschlossen, zwischen ihm und dem hochliegenden Fingerbeuger gegen die Hand verläust. Alle Muskeln der ersten Schichte sind an ihren Ursprüngen unter sich und mit dem hochliegenden Fingerbeuger zu einem gemeinschastlichen Fleischkörper verbunden.

Man versuche es, an der eigenen Hand, die Sehnen der genannten Muskeln zu bestimmen.

b) Zweite Schichte.

Der hochliegende Fingerbeuger, Musculus flexor digitorum sublimis s. perforatus, entsteht vom Condylus internus humeri, vom oberen Ende der Ulna, und bezieht in der Regel auch Verstärkungsbündel von der Mitte des Radius, theilt sich am unteren Dritttheil des Vorderarms in vier dicht an einander liegende Sehnen, welche unter dem queren Handwurzelbande in die Hohlhand treten, und divergirend zum zweiten bis fünsten Finger laufen. Am ersten Gliede des betreffenden Fingers hat jede Sehne einen Längenschlitz, zum Durchgang der Sehne des tiesliegenden Beugers. Die Spaltungsschenkel vereinigen sich am zweiten Gliede so mit einander, dass ihre inneren Fasern sich kreuzen (Chiasma Camperi, χιάζω, kreuzen), trennen sich aber neuerdings, um sich am Seitenrande des zweiten Gliedes zu inseriren. Zuweilen fehlt die Sehne für den kleinen Finger, oder besetstgt sich, nicht gespalten, am Radialrand des zweiten Gliedes, welches sie sammt dem dritten beugt.

Zwischen dem starken Ulnar- und schwachen Radialursprung des Muskels läuft der Mediannerv.

c) Dritte Schichte.

Der tiefliegende Fingerbeuger, Musculus flexor digitorum profundus s. perforans, ist stärker als der vorige, der ihn bedeckt, entspringt vom Processus coronoideus und der inneren Fläche der Ulna, so wie auch vom Ligamentum interosseum, und spaltet sich, etwas tiefer als der hochliegende, in vier Sehnen, welche auf dieselbe Weise, wie die Sehnen des hochliegenden Beugers verlaufen, am zweiten Fingergliede sich durch die Spalte des hochliegenden Beugers durchschieben, und am dritten Gliede endigen. Beugt das letzte Glied. — Beim Eintritt in die Hohlhand entspringen vom Radialrand der Sehnen des tiesliegenden Beugers die vier spulensormigen, länglich rundlichen Regenwurm-Muskeln, Musculi lumbricales, welche zu den Radialrändern der ersten Fingerglieder lausen, und, die Hohlhand verlassend, in die Rückenaponeurose der Finger übergehen. Sie beugen die drei Fingerglieder, und können auch, wenn sie mit den Streckern der Finger gleichzeitig thätig sind, die Streckung unterstützen. Von den alten Anatomen wurden sie Musculi sidicinales, Geigermuskeln, genannt.

Ueber die genauere Anatomie des tiefliegenden Beugers, und seinen Einfluss auf das Beugevermögen einzelner Finger, handelt Theile, in Müller's Archiv. 1839. pag. 420.

Der lange Beuger des Daumens, Musculus stexor policis longus, liegt neben dem tiesen Fingerbeuger, wird von ihm durch den Nervus interosseus und die Arteria interosseu getrennt, entspringt von der inneren Fläche des Radius, und nimmt vom hochliegenden Fingerbeuger ein constantes Fleischbündel auf; geht, nachdem er sehnig geworden, mit den übrigen Beugesehnen unter dem Ligamentum carpi transversum zum ersten Daumengelenke, läust zwischen beiden Sesambeinchen desselben zur zweiten Phalanx, und besetigt sich daselbst. Entsernt man am unteren Ende des Vorderarms seine Sehne von denen des tiesliegenden Beugers, so sindet man:

den viereckigen Einwärtsdreher, Musculus pronator quadratus (Pronator transversus von Winslow), der an der inneren Fläche der Ulna entspringt, und über das Ligamentum interosseum quer zum Radius herüber läuft, an dessen innerer Fläche und innerem Winkel er endigt.

Das Convolut der Fingerbeugesehnen wird, während seines Durchganges unter dem Ligamentum carpi transversum, von einer weiten, mehrfach gefalteten Synovialscheide eingehüllt, welche für jede einzelne Sehne einen besonderen Ueberzug bildet, und bis zum Ursprunge der Lumbricalmuskeln herabreicht. - Jede Sehne des Flexor perforans und perforatus wird an der unteren Fläche der Finger durch eine starke sehnige Scheide umgeben, welche von den Radialrändern der einzelnen Phalanges zu den Ulnarrändern derselben geht, und einen fibrüsen Halbkanal bildet, der durch die Volarflächen der Phalanges zu einem ganzen Kanal geschlossen wird, durch welchen die Beugesehnen am Finger niedergehalten werden. Jede solche Sehnenscheide kann keinen ununterbrochen fortlausenden Halbkanal bilden, sondern muss durch Querschnitte in mehrere Stücke getheilt werden, welche sich bei der Beugung einander nähern, und bei der Streckung von einander entsernen können. Ein ununterbrochener Halbkanal könnte nur durch österes Einknicken gebeugt werden. Diese einzelnen Stücke nehmen nach der Richtung ihrer Fasern den Namen der Querbänder, Kreuzbänder, und schiefen Bänder an. Die innere Oberstäche des theils knöchernen, theils sehnigen Kanals, ist mit einem Synovialüberzuge ausgekleidet,

der vom Knochen aus bandartige Verlängerungen zu den eingeschlossenen Beugesehnen hinschickt — Vincula tendinum s. Tenacula.

Diese Tenacula sind offenbare Ueberreste einer in den ersten Entwicklungszeiträumen stattgefundenen Einstülpung der Synovialhaut der Scheide durch die Beugesehnen. Sie sinden sich regelmässig am ersten Fingergliede, und enthalten immer sehnige Fasern, welche vom Periost des Fingergliedes zur Sehne treten, oder umgekehrt, und erhalten dadurch einen Grad von Festigkeit, der es ihnen möglich macht, nach Amputationen der zwei letzten Phalanges, als Beugesehne für das erste Glied wirken zu können. Sie leiten zugleich die für die Ernährung der Sehnen nöthigen Blutgesässe zu diesen, und sind insofern, den sogenannten Schleimbändern des Kniegelenks, und dem runden Bande des Schenkelkopfes analog. — Speciellen Untersuchungen der Beugesehnenscheiden zufolge (Gazette méd. 1839. N. 18), setzt sich der Synovialsack, der sämmtliche Beugesehnen unter dem gueren Handwurzelbande einhullt, in die Synovialauskleidung der Sehnenscheide des Daumens und kleinen Fingers fort, indem, wenn man die dritten Phalanges aller funf Finger einer Leiche amputirt, und Wasser in den Synovialsack unter dem queren Handwurzelbande einspritzt, dieses nur aus den Stumpfen des kleinen Fingers und des Daumens, nicht aber aus denen der drei mittleren Finger ausströmt. (Gilt nicht als allgemeine Regel.)

B. Muskeln an der äusseren und Radialseite des Vorderarms.

Sie sind vorzugsweise Strecker und Auswärtsdreher, und laufen theils longitudinal, mit der Vorderarmaxe parallel, theils kreuzen sie diese, und drängen sich schief zwischen den Längenmuskeln gegen die Radialseite des Vorderarms vor. An der Dorsalgegend des Carpus gehen ihre Sehnen unter dem Ligamentum carpi dorsale durch, welches für einzelne oder mehrere derselben besondere Scheiden bildet, indem es Fortsätze zwischen sie einschiebt.

Der lange Auswärtsdreher: Musculus supinator longus, spindelförmig und stark, entspringt vom unteren Drittheile der äusseren Kante des Oberarmbeins und dem daran besestigten Ligamentum intermusculare externum, läust an der Radialseite des Vorderarms herab, und inserirt sich über dem Processus styloideus radii. Da die Arteria radialis sehr constant längs des inneren Randes des Supinator longus verläust, nannte Cruveilhier diesen Muskel: Musculus arteriae radialis.

Der innere Rand des Supinator longus bildet, mit dem oberen Rande des Pronator teres, die Seiten einer nach unten spitzig zulaufenden dreieckigen Grube — Fovea s. Plica cubiti — deren Grund den Insertionsstellen des Biceps und Brachialis internus entspricht. Sie wird durch die Fascia antibrachii bedeckt, und schliesst die Arteria brachialis, nebst ihren beiden begleitenden Venen und dem Nervus medianus ein. Erstere liegt am inneren Rande der Sehne des Biceps auf dem Brachialis internus, und theilt sich hier in die Arteria radialis, und den kurzen gemeinschastlichen Stamm der Ulnarund Zwischenknochenarterie. Letzterer, der Nervus medianus, liegt an der inneren Seite der Arteria brachialis.

Der lange und kurze äussere Speichenmuskel, Musculus

radialis externus longus et brevis, s. Extensor carpi radialis longus et brevis, liegen neben dem vorigen nach aussen, und haben mit ihm gleiche Richtung. Der lange entspringt, über dem Condylus externus brachii, vom äusseren Winkel dieses Knochens, unmittelbar unter dem Ursprunge des Supinator longus; der kurze kommt vom Condylus externus selbst, und vom Ringbande des Radius. Beide gehen auf dem Rücken des Vorderarms herab, und befestigen sich, der lange an der Basis des Metacarpus indicis, der kurze an derselben Stelle des Metacarpus digiti medii. Sie strecken die Hand und adduciren sie.

Der gemeinschaftliche Fingerstrecker, Musculus extensor digitorum communis, entsteht, mit den beiden Speichenmuskeln verwachsen. vom Condylus externus und der Fascia antibrachii, trennt sich in der Mitte des Vorderarms in vier Bäuche, welche bald plattsehnig werden, bis über die Handwurzel hinaus mit einander parallel laufen, am Handrücken divergiren, durch dünne sehnige Zwischenbänder unter sich zusammenhängen, und am Rücken des ersten Fingergliedes in eine breite Aponeurose übergehen, welche durch die Sehnen der Musculi interossei et lumbricales verstärkt wird, und sich in drei Schenkel spaltet, deren mittlerer am oberen Ende der zweiten Phalanx, die beiden seitlichen erst an den Seiten der dritten Phalanx sich besestigen. Streckt alle drei Fingerglieder. Die Spaltungen und Verbindungen der Sehnen am Handrücken sind in Hinsicht ihrer Lage, Breite, und Stärke sehr veränderlich. Am stärksten und constantesten ist die Verbindung der Strecksehne des Ringfingers mit jener des kleinen und des Mittelfingers. Dieses erklärt uns, warum man, wenn alle Finger zur Faust eingebogen sind, den Ringfinger allein nicht vollkommen strecken kann, was doch bei den übrigen Fingern leicht geschieht.

Der eigene Strecker des kleinen Fingers, Musculus extensor digiti minimi, ist mit dem gemeinschaftlichen Fingerstrecker, an dessen Ulnarseite er liegt, verwachsen, und geht am unteren Ende des Vorderarms in eine dünne Sehne über, welche längs des Metacarpus digiti minimi zur vierten Sehne des Extensor communis geht, und mit ihr zusammensliesst. Er sehlt zuweilen, und wird dann durch eine sünste Sehne des Extensor communis ersetzt. Seine Sehne kann sich auch in zwei Sehnen theilen, die an den Ring- und kleinen Finger treten (Säugethierbildung).

Der äussere Ellbogenmuskel, Musculus ulnaris externus s. Extensor carpi ulnaris, ist ein länglicher, scharskantiger Muskel, entspringt vom Condylus externus brachii, und von der Fascia antibrachii, kreuzt das Capitulum radii, während er schief zur Ulna tritt, an welcher er herabläust; wird im unteren Vorderarmdrittel sehnig, und besestigt sich an der Basis des Metacarpus digiti minimi. Streckt und abducirt die Hand. Ostmals geht von seiner Sehne eine sadensormige Verlängerung zur Rückenaponeurose des kleinen Fingers. Zwischen seinem Ursprungsbauche und dem Capitulum radii liegt ein Schleimbeutel.

Die hier aufgezählten Muskeln der äusseren Seite des Vorderarms fol-Lehrbuch der Anatomie. 5. Aus. 24 gen in der Ordnung, wie sie aufgeführt wurden, vom Radius gegen die Ulna zu, auf einander, und laufen unter einander und mit der Vorderarmaxe parallel. Die nun zu beschreibenden sind zwischen sie eingeschaltet, drängen sich schief zwischen ihnen hervor, und kreuzen somit ihre Richtung.

Der kurze Auswärtsdreher, Musculus supinator brevis, wird vom Supinator longus und den beiden äusseren Speichenmuskeln bedeckt, entspringt vom Condylus externus brachii, und dem Ringbande des Radius, schlägt sich mit oberen queren und unteren schiesen Fasern um das obere Ende des Radius herum, und besetigt sich an der inneren Fläche desselben, unter der Tuberositas. Nach Umständen dreht er den Radius nach aussen, oder beugt den Vorderarm.

Er wird, wie so viele andere Muskeln der oberen Extremität, von einem Nerven — Ramus profundus nervi radialis — durchbohrt, und kann bei stärkerer Entwicklung der Durchbohrungsspalte auch doppelt werden. Wirkt jedenfalls krästiger als der Supinator longus, da seine oberen Fasern sast senkrecht aus der Richtung des Radius stehen. Er ist, wenn die Hand nach innen gedreht wird, um die Oberstäche des Radius spiral geschlungen, und wickelt sich, wenn er die Auswärtsdrehung aussührt, von ihr wieder ab.

Der lange Abzieher des Daumens, Musculus abductor policis longus, platt und ziemlich stark, liegt zwischen Extensor digitorum communis und den beiden Radiales externi, entspringt von der äusseren Fläche der Ulna, des Ligamentum interosseum und des Radius, läust, nachdem er theilweise sehnig geworden, zugleich mit der dicht an ihm liegenden Sehne des Extensor pollicis brevis, über die Sehnen der beiden Radiales externi nach vorn und unten, und besestigt sich an der Basis des Metacarpus des Daumens. Seine Sehne schickt häusig Nebenbündel zum Os multangulum majus (Fleischmann), zum Abductor pollicis brevis, selbst zum Opponens (Meckel).

Der kurze Strecker des Daumens, Musculus extensor pollicis brevis, ist klein, schwach, liegt an der Ulnarseite des vorigen, mit welchem er gleichen Ursprung und Verlauf hat. Schickt eine platte dünne Sehne zur Dorsalstäche der ersten Phalanx.

Es ist nicht zu verkennen, dass er und seine Vorgänger, ihres um den Radius gewundenen Verlaufes wegen, die Auswärtsdrehungen der Hand unterstützen müssen. Bei sehr krästigen, so wie bei sehr abgezehrten Armen lebender Menschen, sieht man den schiesen Verlauf beider Muskeln ganz deutlich am unteren Rande der Radialseite des Vorderarms.

Der lange Strecker des Daumens, Musculus extensor pollicis longus, entspringt von der Crista ulnae und dem Ligamentum interosseum, wird bis zum Handgelenk vom Extensor communis digitorum bedeckt, kreuzt mit seiner langen starken Sehne die Sehnen der beiden Radiales externi, verschmilzt auf der Dorsalseite des Metacarpus pollicis mit der Sehne des kurzen Streckers, und inserirt sich am Nagelgliede des Daumens.

Streckt und abducirt man den Daumen, so sieht man an der eigenen Hand zwischen der Sehne dieses Muskels, und jenen des Extensor brevis und

Abductor longus, eine dreieckige Grube einsinken, die bei älteren französischen Anatomen tabatière genannt wird.

Der eigene Strecker des Zeigefingers, Musculus indicator, liegt an der Ulnarseite des vorigen, und bedeckt ihn zum Theil; entspringt von der Crista und der äusseren Fläche der Ulna, und verschmilzt am Handrücken mit der vom Extensor communis abgegebenen Strecksehne des Zeigefingers.

Er bietet sehr zahlreiche Spielarten, als Vorbereitungen zum Doppeltwerden oder zur Bildung eines eigenen Streckers des Mittelfingers, dar. Man findet seine Sehne, oder seinen Ursprungsbauch, gespalten. — Ein Schenkel der gespaltenen Sehne geht zum Mittelfinger (Albin, Heymann) oder sendet selbst ein Fascikel zum ersten Gliede des Ringfingers (Meckel). — Der Muskel erscheint zweibäuchig (Rosenmüller), oder fehlt auch ganz, und wird durch einen besonderen kleinen Muskel ersetzt, der vom Ligamentum carpi dorsale entspringt (Moser, — auch von mir zweimal gefunden). — Als Thierähnlichkeiten sind diese überzähligen Bildungen interessant, indem bei vielen Quadrumanen, der Strecker des Zeigefingers einen Sehnenschenkel zum Mittelfinger abgiebt, oder, wie bei Cebus, ein besonderer Strecker des Mittelfingers vorkommt.

Sämmtliche an der Streckseite der Handwurzel herablaufende Sehnen werden durch einen, aus queren Fasern bestehenden, 6-8 Linien breiten Bandstreisen, das sogenannte Rückenband, Ligamentum carpi dorsale s. armillare, an den Knochen niedergehalten, so dass sie sich selbst bei der stärksten Streckung nicht von ihm entfernen. Das Ligamentum carpi dorsale ist eigentlich nur ein durch quereingewebte Sehnensasern, die vom Griffel des Radius bogenformig zum dreieckigen und Erbsenbeine herüberlaufen. verstärkter Theil der Fascia antibrachii, und schickt von seiner inneren Oberfläche fünf Scheidewände coulissenartig gegen das untere Ende der Vorderarmknochen, wodurch sechs isolirte Fächer für die Aufnahme einzelner Sehnen entstehen. Diese Fächer werden vom Radius gegen die Ulna gezählt. und enthalten, das erste: den langen Abzieher und kurzen Strecker des Daumens, das zweite: die beiden Speichenstrecker der Hand, das dritte: den langen Daumenstrecker, das vierte: den gemeinschaftlichen Fingerstrecker, und den eigenen Strecker des Zeigefingers, das fünfte: den Strecker des kleinen Fingers, und das sechste: den Ulnarstrecker der Hand. dingen die unveränderliche Verlaufsweise der Muskeln, und erlauben ihnen keine Verrückung. Wird durch eine plötzliche forcirte Bewegung eines Muskels sein Fach zersprengt, so schnellt er sich aus seiner Lage, und ist ver-Alle Fächer sind innen mit Synovialmembranen geglättet, welche durch ihr schlüpfriges Secret die Reibung der Sehnen vermindern. Vermehrung und Verdickung ihres flüssigen Inhalts kann nicht die unter dem Namen der Ueberbeine bekannten Geschwülste erzeugen, weil diese immer die längliche Gestalt der betreffenden Fächer haben müssten, welche ihnen aber niemals zukommt. Die Ueberbeine (ihrer Härte wegen so genannt) sind ganz gewiss entweder wirkliche Neubildungen (Cysten), oder abgeschnürte Aussackungen der Synovialmembran der Sehnenscheiden. — Es ist eine sehr gute praktische Uebung, nachdem man die Muskeln der oberen (und unteren) Extremität studirt hat, die Frage zu beantworten, welche Muskeln beim Amputiren an verschiedenen Stellen durchschnitten werden müssen, und welche ganz bleiben. Man wird daraus die Bewegungen entnehmen, deren der Stumpf noch fähig ist.

§. 172. Muskeln an der Hand,

Die Muskeln der Hand bilden drei natürliche Gruppen, deren eine die kurzen, den Ballen des Daumens zusammensetzenden Muskeln, die zweite die Muskeln am Ballen des kleinen Fingers, und die dritte die in die Zwischenräume des Metacarpus eingesenkten Musculi interossei begreift. Die Spulmuskeln wurden schon beim tiefliegenden Fingerbeuger geschildert.

A. Muskeln des Daumenballens, Thenar.

Der kurze Abzieher des Daumens ist der ausserste, und zugleich der oberstächlichste am Ballen, entspringt vom Ligamentum carpi transversum, und 'endigt am ersten Gliede des Daumens. Seine Sehne schliesst das äussere Os sesamoideum des ersten Daumengelenks ein.

Der Gegensteller des Daumens wird vom vorigen bedeckt, hat mit ihm gleichen Ursprung, und hestet sich an den Radialrand und das Köpschen des Metacarpus pollicis.

Der kurze Beuger ist zweiköpfig. Der oberflächliche Kopf, der fast immer mit den beiden eben beschriebenen verwachsen ist, entsteht vom queren Handwurzelbande, der tiefe Kopf vom Os multangulum majus, capitatum, und hamatum. Beide Köpfe fassen eine Rinne zwischen sich, in welcher die Sehne des Flexor pollicis longus sich einbettet, und setzen sich am ersten Gliede des Daumens, die beiden Ossa sesamoidea desselben umwachsend, fest. Er wiederholt den gespaltenen oder hochliegenden Beuger der übrigen Finger.

Der Zuzieher des Daumens liegt ganz im Grunde der Hohlhand, ist vom tiefen Kopfe des kurzen Beugers oft nicht zu trennen, entspringt breit vom dritten und vierten Metacarpus, und hestet sich zugespitzt an das innere Sesambein des ersten Daumengelenks.

B. Muskeln des kleinen Fingers.

Der Abzieher liegt am äussersten Ulnarrande der Hand, entspringt vom Os pisiforme, und tritt zur Rückenaponeurose des kleinen Fingers.

Der kurze Beuger geht vom queren Handwurzelbande und vom Haken des Hakenbeins zur Rückenaponeurose, und ist mit dem Abzieher zuweilen ganz untrennbar verwachsen, weshalb er auch zu fehlen scheint.

Der Gegensteller des kleinen Fingers, entspringt wie der kurze Beuger, ist aber mehr gegen die Mitte des Handtellers vorgerückt, und endigt am Mittelstück und am Köpfchen des Metacarpus digiti minimi.

C. Die bischenknochenmuskeln, Musculi interossei.

Sie zerfahen in innere und äussere. Innere finden sich drei. Sie sind nur an Eine Seitensläche eines Mittelhandbeins gehestet, verschliessen somit das *Spatium interosseum* nicht vollständig, und erlauben dadurch den äusseren sich bis in die Hohlhand vorzudrängen. Der erste *Interosseus*

internus entspringt von der Ulnarsläche des Metacarpus indicis, der zweite und dritte von der Radialsfäche des Metacarpus des Ring- und kleinen Fingers. Ihre Endsehnen steigen nehen den Köpschen der betreffenden Mittelhandknochen zur Rückenfläche des ersten Fingergliedes empor, und verlieren sich in dessen Rückenaponeurose. Sie ziehen die ausgespreiteten Finger gegen den Mittelfinger zu. - Aeussere finden sich vier, in jedem Interstitium interosseum einer. Sie sind sämmtlich zweiköpfig, und entspringen von den einander zugekehrten Flächen je zweier Ossa metacarpi, füllen ihren Zwischenraum ganz aus, und lassen vom Handrücken her die Interossei interni nicht sehen. Der erste geht zur Radialseite der Rückenaponeurose des Zeigefingers, der zweite und dritte zur Radial - und Ulnarseite des Mittelfingers, und der vierte zur Ulnarseite des Ringfingers. Die beiden Köpfe des ersten bleiben viel länger getrennt als die der übrigen, ein Grund, warum man den vom Mittelhandknochen des Daumens entspringenden Kopf auch als Musculus abductor indicis beschrieb, und den übrig bleibenden Kopf des ersten Interosseus externus als ersten Interosseus internus gelten liess, wonach somit nur drei Externi, aber vier Interni angenommen wurden (Albin). Die Interossei externi ziehen die Finger ab.

Die Wirkung der Musculi interossei und ihr Zahleuverhältniss wird am besten folgendermassen aufgefasst, Jeder Finger muss der Mittellinie der ganzen Hand genähert oder adducirt, und von ihr entfernt oder abducirt werden können. Da nun der Daumen bereits einen besonderen Abductor und Adductor, der kleine Finger aber nur einen Abductor besitzt, so waren nur noch sieben Zwischenknochenmuskeln erforderlich, um jeden der vier Finger ab- und zuziehbar zu machen. Die Interossei externi sind sämmtlich Abductores, die interns Adductores. Da der Interosseus externus primus den Zeigefinger abducirt, so kann sein Zeigefingerkopf nicht nach Albin als erster Interosseus internus genommen werden.

§. 173. Aponeurose der oberen Extremität.

Sie zerfällt in die Schulter-, Oberarm-, Vorderarm- und Handaponeurose, welche ununterbrochen in einander übergehen, und eine complete sehnige Hülle für alle Abtheilungen der oberen Extremität, und für einzelne Muskellager derselben bilden.

Die Aponeurose des Schulterblattes, Fascia scapularis, welche das ganze Schulterblatt umhüllt, verwandelt die Fossa supra- et infraspinata, und die Fossa subscapularis, in geschlossene Räume, welche durch die gleichnamigen Muskeln ausgefüllt werden. Man unterscheidet somit eine Fascia supraspinata, infraspinata, und subscapula. Letztere ist viel schwächer, als die beiden anderen. Sie begleiten die von ihnen bedeckten Muskeln zu ihren respectiven Insertionen am Oberarm, verlieren sich theils in die Fascie des Oberarms, theils in die fibrose Kapsel des Schultergelenks.

Die Aponeurose des Oberarms, Fascia humeri, entspringt an den Ursprungspunkten des Deltamuskels, hängt mit der dünnen Fascia des grossen Brustmuskels zusammen, und hat auf dem Deltamuskel mehr den Charakter einer schwachen Zellgewebsmembran. Sie dringt zwischen Deltamuskel und Pectoralis major in die Tiefe, und verschmilzt mit dem vom Ligamentum coraco-claviculare und dem unteren Rande des Schlüsselbeins entspringenden, hinter dem Pectoralis minor herablausenden, tendinösen Blatte - Fascia coraco-clavicularis. Vom unteren Rande des grossen Brustmuskels geht die Fascia humeri zu demselben Rande des Latissimus dorsi, mit einem freien, bogenformigen, den Gefässen und Nerven der Achselhöhle zugekehrten Rande hinüber (Langer's Achselhogen), und wurde über die Achselgrube quer hinübergespannt sein, so dass es eigentlich gar nicht zur Bildung einer von aussen sichtbaren Grube käme, wenn nicht die Fascia coraco-clavicularis sich an ihre obere Fläche befestigte, und sie so stark in die Achselgrube hineinzöge, dass die mit ihr verbundene allgemeine Decke ihr nachzufolgen gezwungen wird. Unter der Insertion des Deltamuskels wird die Fascia durch Fortsetzungen der Sehnen des Deltoides, Pectoralis major, Latissimus dorsi, so wie durch eine Verlängerung der Fascia coraco-clavicularis (welche mit dem Biceps und Coraco-brachialis von der Achsel herabkommt), verstärkt, und schickt zur ausseren und inneren Kante des Oberarmknochens, bis zu den Condulis herab, zwei sehnige Blätter, welche eine natürliche Scheidewand zwischen den Bezirken der Strecker und Beuger vorstellen, und als wahre Ligamenta intermuscularia (externum et internum), den angrenzenden Muskeln zugleich zum Ursprunge dienen. Zwischen Biceps und Brachialis internus geht ein drittes Blatt quer durch, und hüllt zugleich den Mediannerv und die Armgefässe ein.

Die Aponeurose des Vorderarms, Fascia antibrachii, wird am Ellbogen durch Aufnahme der von der Sehne des Biceps und Triceps stammenden Verstärkungsbundel, und durch Ringfasern, die längs des hinteren Winkels der Ulna entspringen, besonders an der Streckseite des Vorderarms gekrästigt, lässt an ihrer inneren Fläche viele Bündel der um das Ellbogengelenk gruppirten Muskeln (die am Knochen nicht genug Platz zum Ursprung fanden) entspringen, und schieht zwischen ihre Bäuche zahlreiche sehnige Fortsätze zu demselben Zwecke ein. In der Ellbogenbeuge liegt sie nur lose auf den Gestässen und Nerven der Plica cubiti, von welchen sie durch fettreiches Zellgewebe getrennt wird, besitzt hier eine grössere Oessnung, durch welche die tiesliegenden Brachialvenen mit der extra fasciam gelegenen Vena mediana durch einen ansehnlichen Verbindungsast communiciren, und adhärirt fester an die Muskeln, welche die Seiten der Ellbogengrube bilden. Fast alle Muskeln des Vorderarms, und die zwischen ihnen laufenden Gesässe und Nerven, erhalten Scheiden von ihr. In der Nähe der Articulatio carpi verdichtet sie sich zum Ligamentum carpi commune dorsale et volare. Ersteres verhält sich zu den unter ihm durchgehenden Streckmuskeln, wie oben schon gesagt wurde; letzteres liegt auf dem Ligamentum carpi transversum seu proprium auf, verschmilzt stellenweise mit ihm, und wird von ihm, gegen den Radius zu, durch die Sehne des Radialis internus, gegen das Erbsenbein zu, durch den Nervus und die Arteria ulnaris, und in der Mitte durch die Sehne des Palmaris longus getrennt. Das Ligamentum carpi dorsale setzt sich in die sehr zarte Dorsalaponeurose der Hand fort, welche ein hochliegendes, die Strecksehnen deckendes, und ein tiefes, etwas stärkeres, die Rückensläche der Musculi interossei überziehendes Blatt unterscheiden lässt.

Das Ligamentum carpi commune volare geht in die Aponeurose der Hohlhand (Aponeurosis palmaris) über, welche in der Mitte der flachen Hand am stärksten ist, auf der Musculatur des äusseren und inneren Ballens der Hand sich verdünnt, und am Ulnar- und Radialrande der Hand mit der Dorsalaponeurose zusammenhängt. Ihr mittlerer, starker, die Beugesehnen der Finger deckender Theil ist dreieckig, kehrt seine Spitze der Sehne des Palmaris longus zu, welche in sie übergeht, und divergirt, gegen die ersten Fingergelenke hin, in vier durch Querfasern verbundene Zipfe, welche theils mit den Sehnenscheiden der Fingerbeuger zusammensliessen, theils in die prallen Fettpolster der Haut übergehen, welche beim Hohlmachen der Hand an den Köpfen der Mittelhandknochen bemerkbar werden (Monticuli der Chiromanten).

An ihrem Ulnarrande entspringt ein kleiner, aus mehreren queren Bündeln zusammengesetzter Muskel, Musculus palmaris brevis, — der gegen den inneren Rand der Hand verläuft, und durch zerstreute sehnige Fasern auf der Scheide des Abziehers des kleinen Fingers, vorzugsweise aber in der Haut sich verliert.

Die vielen Fortsätze, die die Aponeurose der oberen Extremität in die Tiefe sendet, sind der Grund, warum man sie beim Amputiren nicht zugleich mit dem Hautlappen von den Muskeln lospräparirt, was viel zu umständlich wäre. - Einzelne Abtheilungen der Aponeurose umschliessen als Scheiden die Musculatur so fest, dass, wenn sie eingeschnitten werden, das Muskelfleisch über die Oeffnung der Scheide vorquillt, welches, wenn die Oeffnung der Scheide ein zufällig entstandener Riss ist, von den Chirurgen Muskelbruch (Hernia muscularis) genannt wird, und namentlich am Supinator longus schon mehrmals gesehen wurde. - Da die grossen Gefässe und Nerven innerhalb der Fascien liegen, so müssen für die zur Haut gehenden Aeste derselben, Oeffnungen vorhanden sein, welche erst in der Gefäss- und Nervenlehre näher bezeichnet werden können. - Die ungemeine Festigkeit und Unnachgiebigkeit einiger Fascien (am Ellbogen, in der Hohlhand) erklärt hinlänglich die hestigen Zusälle, welche gewisse tief liegende Entzundungen und Eiterungen veranlassen, und rechtfertigt die häufige und frühzeitige Anwendung des Messers bei Abscessen unter den Fascien.

G. Muskeln der unteren Extremität.

§. 174. Allgemeine Betrachtung der unteren Extremität.

Die untere Extremität, die die Last des Stammes zu stützen und zu tragen hat, ist aus diesem Grunde länger, stärker, mit kraftvolleren Muskeln versorgt, und auf eine viel weniger bewegliche Weise mit dem Stamme verbunden, als die obere. Ihre Länge, im Vergleich zur oberen, ist der triftigste Beweis gegen Moscati's Behauptung, dass der Gang auf allen Vieren der naturgemässe sei. Moscati selbst hat es übrigens, wie alle Menschenkinder, bequemer gefunden, auf zwei Füssen zu gehen, statt auf vieren. - Da die erste Abtheilung der unteren Extremität, die Hüste, durch eine seste Symphyse mit dem Rückgrat zusammenhängt, so wird der ganze Apparat von Muskeln, welcher an der oberen Extremität die bewegliche Schulter fixiren musste, an der unteren entbehrlich; dagegen erreichen die vom Darmbeine (Analogon des Schulterblattes) zum Oberschenkel gehenden Muskeln, die das Becken auf den Schenkelköpfen beim aufrechten Gange feststellen, eine Stärke, die mit dem zu dieser schweren Thätigkeit erforderlichen Krastauswande im Verhältnisse steht, und sich durch die starke Wölbung der Fleischmassen der Hinterbacken (Gesäss), die nur dem menschlichen Geschlechte eigen ist, ausserlich kennbar macht. (Les fesses n'appartiennent qu'à l'espèce humaine. Busson.) — Beide Hinterbacken berühren sich in der Spalte des Gesässes (Crena ani), welche den After birgt, und vor ihm zum Mittelsleische, Perineum, wird, welches beim Manne bis zur Basis des Hodensacks, beim Weibe nur bis zum hinteren Winkel der Schamspalte sich erstreckt. Bei schlaffen und ausgezehrten Individuen. schlottert die hangende Hinterhacke, und wird vom Oberschenkel durch einen tiefen, schief vom Steissbeine gegen den grossen Trochanter gerichteten Bug, den Sulcus subischiadicus, getrennt, welcher bei der Fülle eines gesunden und derben Gesässes nur als Contour erscheint. - Die mächtigen Muskel- und Fettlager lassen nur die Crista des Darmbeins, und bei zusammengekauertem Stamme, auch das Tuber ossis ischii, obwohl minder deutlich, fühlen. Die Haut des Gesässes ist dick, bei setten Menschen nicht zu falten, verdünnt sich gegen den Aster, wo sie viele Talgdrüsen enthält, und wird im Mittelsleische hinter dem Hodensack so zart, dass man die subcutanen Venen durchscheinen sieht. Das subcutane Zellgewebe ist durch Fettablagerung zu einem zwei Zoll dicken Stratum entwickelbar, und schliesst zuweilen auf dem Tuber ischii, so wie an der Spina ossis ilei anterior superior, eine Bursa mucosa subcutanea ein. Bei den Frauen der Buschmänner erreicht es, so wie bei einigen Affengeschlechtern, eine monströse Entwicklung. Abgehildet von der Venus hottentottica in Paris. - Das dicke Fleisch des Oberschenkels hüllt das Femur so vollkommen ein, dass nur der grosse Trochanter, und die beiden Condylen des unteren Endes, der Hand zugänglich sind, und ersterer deshalb.

bei der Ausmittlung von Verrenkungen des Hüftgelenks, einen verlässlichen Orientirungspunkt abgiebt. — Da die Muskeln am Oberschenkel, gegen das Knie herab, sämmtlich sehnig werden, so vermindert sich der Umfang des Schenkels in derselben Richtung, und man kann am Knie, die Enden des Ober- und Unterschenkels, die Kniescheibe, die Spina tibiae, das Ligamentum patellae proprium, und selbst die Seitenbänder des Kniegelenks, bei manueller Untersuchung fühlen. - Die Haut des Oberschenkels ist an der äusseren Seite derber, und minder empfindlich, als an der inneren, wo sie sich, besonders gegen das Leistenband zu, so verdünnt, dass man bei mageren Schenkeln die Leistendrüsen, die Hautvenen, ja selbst den Pulsschlag der Arteria femoralis sehen kann. An der Kniescheibe wird sie hart und rauh, und bei häufigem Knieen schwielig. Das Unterhautzellgewebe ist über dem grossen Trochanter und auf der Kniescheibe immer fettarm, und enthält an heiden Stellen eine Bursa mucosa subcutanea. Unter der Bursa mucosa patellaris liegt noch eine zweite, tiesere, von Luschka in 12 Leichen 10mal beobachtete (siehe §. 176). Diese Schleimbeutel veranlassen, durch copiose Secretion ihres Inhaltes, die unter dem Namen des Ilygroma cysticum patellare bekannte chirurgische Krankheitssorm, welche, da sie bei Dienstboten, welche den Fussboden zu scheuern haben und dabei auf den Knieen herumrutschen, häufig vorkommt, in England ..the housemaids knee" genannt wird. - An der hinteren Gegend des Kniegelenks fühlt man hei starken Beugebewegungen, die Sehnen der Unterschenkelbeuger sich anspannen, und eine dreieckige, nach oben spitzige Grube begrenzen, welche als Wiederholung der Plica cubiti, Kniekehle. Fossa poplitea (bei den Englandern "hollow of the leg") genannt wird.

Der Unterschenkel gleicht noch viel mehr, als der Oberschenkel, einem abgestumpsten Kegel, dessen Spitze dem Sprunggelenke, dessen Basis dem Fleische der Wade entspricht. Nur seine aussere und hintere Seite sind von Muskeln eingenommen, - an der inneren deckt nur die Haut und fettloses Zellgewebe das leicht zu fühlende Schienbein. — Der Fuss besitzt an seiner Dorsalgegend nur ein dünnes bewegliches Integument, durch welches die Sehnen der Streckmuskeln, und die Vorsprünge der Knochen dem Gefühle zugänglich werden, wenn nicht, wie bei Kindern und Frauen, eine stärkere Fettschichte die Ungleichheiten des Fussrückens verschwinden macht. der Fusssohle, Planta, ist die unverschiebbare Haut an der Ferse und am Ballen der Zehen callos, die Epidermis zu 2 Linien Dicke verhornt', und der sehnige Charakter des fettreichen Unterhautzellgewebes lässt die tiefer liegenden Gebilde nicht fühlen. Unter der Tuberositas calcanei, und den Köpfen des ersten und fünsten Metatarsusknochens, liegen Schleimbeutel. deren Entstehung nicht dem Drucke zuzuschreiben ist, welchen diese drei Punkte beim Gebrauche des Fusses auszuhalten haben, indem sie schon im neugeborenen Kinde vorkommen.

§. 175. Muskeln an der Hüfte.

Es werden unter dem Namen der Hüftmuskeln nur jene verstanden, welche die äussere und innere Fläche des Hüftbeins einnehmen, und am oberen Ende des Oberschenkels endigen. Viele der vom Hüftbeine entspringenden Muskeln gehen weiter am Schenkelknochen herab, überspringen sogar das Kniegelenk, um am Unterschenkel anzugreisen, und werden deshalb im nächstsolgenden Paragraphe beschrieben.

A. Aeussere Muskeln der Hüfte.

Der grosse Gesässmuskel, Musculus glutaeus magnus (γλουτός, Hinterbacke), der erste nach Entfernung der Haut am Gesässe, hat eine rautenförmige Gestalt, und entspringt mit seinem hinteren Rande vom hinteren Theile der äusseren Darmbeinlefze, von dem die hintere Kreuzbeinsläche deckenden sehnigen Blatte der Fascia lumbo-dorsalis, dem Seitenrande des Steissbeins, und dem Ligamentum tuberoso-sacrum.

Seine zahlreichen, parallelen, groben, und locker zusammenhaltenden Bundel, bilden eine Muskelmasse von 1 Zoll Dicke, welche schräge nach aussen und unten herabzieht, und in eine breite starke Sehne übergeht, welche sich theils an die äussere Fläche des grossen Trochanters, theils an den oberen Theil der ausseren Lefze der Linea aspera femoris festsetzt, theils in die Fascia lata übergeht. Zwischen seiner Endsehne und dem grossen Trochanter liegt ein ansehnlicher Schleimbeutel, dem im weiteren Lause der Sehne noch zwei bis drei kleinere solgen. Die Wirkung des Muskels ist bei verschiedenen Stellungen des Oberschenkels eine verschiedene. Er streckt den Schenkel, und rollt ihn nach auswärts, zieht ihn durch seine oberen Bündel ab, und durch seine unteren zu; beim Stehen auf einem Beine dreht er das Becken, beim Stehen auf beiden Beinen, hilst er den nach vorn gebogenen Stamm strecken und aufrichten.

Zuweilen verlieren sich einzelne seiner unteren Bündel in dem starken Fettpolster des Gesässes. Tiedemann (Meckel's Archiv für Physiologie 4. Bd. p. 412) sah ihn auf beiden Seiten doppelt bei einem Manne, bei welchem auch der Cucullaris und beide Pectorales doppelt waren. Bei aufrechter Stellung decken seine unteren Bündel den Sitzknorren, und gleiten beim Niedersitzen von ihm ab, so dass die Last des Körpers den Muskel nicht drückt. Es kann deshalb der quere Durchmesser des Beckenausganges nur bei sitzender Stellung, oder im Liegen mit gegen den Bauch angezogenen Schenkeln, ausgemittelt werden.

Der mittlere Gesässmuskel, Musculus glutaeus medius, liegt unter dem vorigen, von welchem nur sein hinterer Theil bedeckt wird. Entspringt vom vorderen Theile der äusseren Darmbeinlefze, welche der Glutaeus magnus frei liess, so wie von jener Zone der äusseren Darmbeinfäche, welche zwischen der Crista und der Linea semicircularis externa liegt, steigt mit convergenten Faserbündeln gerade abwärts, und setzt sich

ألما

mit einer kurzen starken Sehne an die Spitze und die äussere Fläche des grossen Trochanter fest (Schleimbeutel). Abducirt den Schenkel — wie beim Aufsitzen des Reiters — und rollt ihn, wenn er gebeugt ist, mit seinen vorderen Bündeln nach innen. Sein vorderer Rand grenzt an:

den Spanner der Schenkelbinde, Musculus tensor fasciae latae, der vom vorderen oberen Darmbeinstachel entspringt, gerade vor dem grossen Trochanter herabsteigt, und in das obere Dritttheil der Fascia lata übergeht. Spannt die Fascia, und hilft den Schenkel einwärts rollen. Er gehört streng genommen nicht dem Gesässe, sondern der äusseren Seite des Oberschenkels an.

Der kleine Gesässmuskel, Musculus glutaeus minimus, gleicht einem entfalteten Fächer. Er liegt, vom mittleren bedeckt, auf der äusseren Darmbeinfläche auf, von welcher er, bis zur Linea semicircularis externa hinauf, entspringt. Er zeigt, wenn er rein präparirt ist, das strahlige Ansehen des Musculus temporalis, und besestigt sich an die innere Fläche der Spitze des Trochanter major (Schleimbeutel). Wirkt wie der vorige.

Der birnformige Muskel, Musculus pyriformis s. pyramidalis, länglich kegelformig, entspringt von der vorderen Fläche des Kreuzbeins in der Gegend des zweiten bis vierten vorderen Foramen sacrale, und vom unteren Theile der Symphysis sacro-iliaca; tritt quergerichtet aus der Beckenhöhle durch das Foramen ischiadicum majus heraus, 'und besestigt sich mit einer runden starken Sehne unter dem Glutaeus minimus. Rollt den Schenkel auswärts. Auf ihn solgt nach unten:

der innere Verstopfungs- oder besser Hüstbeinlochmuskel, Musculus obturator s. obturatorius internus, welcher in der kleinen
Beckenhöhle vom Umsange des Foramen obturatum, und von der inneren
Fläche des Verstopsungsbandes entspringt, seine Fleischsasern gegen das
Foramen ischiodicum minus zusammendrängt, hieraus in eine glatte Sehne
übergeht, welche das genannte Foramen passirt, und nach ihrem Austritte
ein Paar musculöse Zuwächse, die beiden Zwillingsmuskeln, Gemelli,
ausnimmt, welche ich als subalterne Ursprungsköpse des Obturator betrachte.
Der obere kommt von der Spina, der untere von der Tuberositas ossis
ischii. Sie hüllen die Sehne des Obturatorius vollständig ein, und verschmelzen mit ihr, bevor sie ihren Insertionspunkt — die Fossa trochanterica — erreicht. Rollt nach aussen.

Da die Direction dieses Muskels keine geradlinige, sondern eine winklige ist, so muss an der Spitze dieses Winkels, welcher in der Incisura ischiadica minor liegt, die Sehne sich am Knochen reiben, welcher deshalb an der Reibungsstelle mit einem knorpeligen Ueberzuge versehen wird, auf welchem die Sehne mittelst eines zwischenliegenden Schleimbeutels ohne Nachtheil gleitet. Häufig ist dieser Knorpelüberzug der Incisura ischiadica minor durch scharfe Riffe in mehrere Furchen getheilt, welchen entsprechend die Sehne des Obturator internus in mehrere neben einander liegende Bündel gespalten erscheint. — Der obere Zwillingsmuskel fehlt als Affenähnlichkeit. Meckel vermisste sie beide einmal (Regel beim Schnabelthier und den

Fledermäusen). — Columbus und Spigelius betrachteten beide Gemelli als Einen Muskel, der die Sehne des Obturatorius beutelartig einhüllt, und nannten ihn deshalb Marsupium carneum. Lieutaud folgte dieser Annahme, und nannte den Muskel Cannelé. Da der fleischige Ursprung des Obturatorius internus an der inneren Seite des Hüstbeins liegt, so wird seine Präparation unter Einem mit jener des Psoas und Iliacus internus vorgenommen.

An den Gemellus inferior schliesst sich der viereckige Schenkelmuskel, Musculus quadratus femoris, an, welcher vom Sitzknorren entspringt, und quer zur rauhen Linie läust, die vom grossen Trochanter herabsteigt. Er ist, seiner senkrecht zum Femur gehenden Richtung wegen, gewiss der krästigste Auswärtsroller.

Er deckt den Obturator externus zu, welcher aber nicht von hinten her, sondern viel bequemer von vorn her zu präpariren ist, und deshalb erst nach Bearbeitung der Muskeln an der inneren Seite des Schenkels dargestellt werden soll. Riolan machte aus dem Pyriformis, den beiden Gemelli, und dem Quadratus, einen einzigen Muskel, den er Quadrigeminus nannte.

Der aussere Hüftbeinlochmuskel, Musculus obturator s. obturatorius externus, platt, dreiseitig, entspringt vom vorderen und unteren Umfange des Foramen obturatum, aber nicht von der Membrana obturatoria, welche er blos bedeckt. Seine quer laufenden Faserbündel gehen, hinter dem Hüftgelenke, dicht an der Kapsel vorbei, nach aussen, und convergiren in eine starke Sehne, welche sich am Grunde der Fossa trochanterica inserirt. Wirkt wie seine Vormänner.

B. Innere Muskeln der Hüfte.

Der grosse Lendenmuskel, Musculus psoas major ($\mathring{\eta}$ $\psi \acute{o} \alpha$, Lende), entspringt von der Seitenfläche und den Querfortsätzen des letzten Brustwirbels, und der vier oberen Lendenwirbel, so wie von den Intervertebralknorpeln derselben, läuft als länglich-runder, starker Muskelstrang, der an der Symphysis sacro-iliaca sehnig zu werden beginnt, über der Linea arcuata interna herab, tritt unter dem Poupart'schen Bande zwischen Spina anterior inferior und dem Tuberculum ileo-pubicum aus der Beckenhöhle, krümmt sich nun nach innen und unten, und setzt sich an den kleinen Trochanter fest, welchen er nach oben und vorn zieht, dadurch den Schenkel auswärts rollt, und beugt. Zwischen ihm und dem nächstfolgenden findet sich bisweilen ein kleinerer accessorischer Lendenmuskel, Psoas parvus, welcher von den Querfortsätzen der oberen Lendenwirbel entsteht, und seine schmale Sehne mit der des Psoas major verwebt.

Der innere Darmbeinmuskel, Musculus iliacus internus, nimmt die ganze concave Fläche des Darmbeins ein, von welcher er, so wie vom Labium internum der Crista entspringt, wird im Herabsteigen gegen das Poupart'sche Band schmäler, aber dicker, und inserirt sich, ohne eine eigene Endsehne zu besitzen, an die Sehne des Psoas major. Wirkt wie dieser.

Die den Iliacus internus bedeckende Fascia iliaca, kann durch einen schlanken, vom letzten Rückenwirbel entspringenden Muskel — den kleinen Lendenmuskel, Psoas minor — ausgespannt werden, der an dem inneren Umfange des Psoas magnus liegt, nach Theile unter zwanzig Leichen nur einmal vorkommt, und seine platt-rundliche Sehne, theils an die Grenzlinie des grossen und kleinen Beckens schickt, theils sie mit der Fascia iliaca zusammensliessen lässt.

Zwischen Psoas und Iliacus schiebt sich der Schenkelnerv vor, und läust in der Rinne zwischen beiden aus der Beckenhöhle heraus.

Es wäre einfacher, beide Muskeln, den Psoas und lliacus, als Köpfe eines zweiköpfigen Muskels zu beschreiben (wie Cruveilhier und Theile bereits gethan), und diesen Ilio-psoas zu nennen. Bei allen Säugethieren, mit Ausnahme der Fledermäuse, bilden sie blos Einen Muskel. - Die Richtung des Ilio-peoas ist nicht geradlinig, sondern winkelig. Die Spitze des Winkels liegt am Darmbein, auswärts vom Tuberculum ileo-pubicum, unter dem Poupart'schen Bande. Um die Reibung zu eliminiren, wird hier ein grosser Schleimbeutel — der grösste von allen — zwischen Muskel und Knochen eingeschaltet, welcher zuweilen, und wie ich gefunden habe, vorzugsweise im höheren Alter, mit der Höhle des Hüstgelenks communicirt. Auf den lustdichten Verschluss der Pfanne hat dieses nicht den geringsten nachtheiligen Einfluss, da die Communicationsöffnung ausserhalb des Limbus cartilagineus liegt. Da der Winkel, welchen der Ilio-psoas bildet, bei Kindern, wegen geringer Entwicklung des Beckens, ein grösserer ist, und erst mit der vollendeten Ausbildung des Beckens spitziger wird, so könnte man daraus vielleicht die beim Gehen und Stehen erwachsener Menschen übliche Auswärtsdrehung des Fusses erklären.

Die Muskeln an der äusseren Seite der Hüste und die an der inneren sind, ihrer Richtung und Insertion nach, grösstentheils Auswärtsroller. Die Einwärtsroller werden nur durch den Tensor fasciae, und die vorderen Bündel des Glutaeus medius repräsentirt. Die Trochanteren wirken in diesem Falle wie Radspeichen oder Hebelarme, um der bewegenden Kraft ein grösseres Moment zu geben. Da nun aber die Auswärtsrollung nur durch Muskeln gemacht zu werden braucht, deren Stärke den wenigen Einwärtsrollern gleichkommt, so muss wohl die zahlreiche und starke Gruppe der Auswärtsroller eine schwerer zu leistende Nebenausgabe haben, die darin besteht, dass sie das Becken, an welchem sie entspringen, und durch das Becken auch die Last des Oberleibes, auf den Schenkelküpsen balanciren.

Die tiesliegenden Muskeln der äusseren Seite der Hüste, haben zu gewissen, aus der Beckenhöhle kommenden Gesässen und Nerven, sehr wichtige Beziehungen. Zwischen dem unteren Rande des Glutaeus minimus und dem oberen des Pyrisormis, tritt die Arteria glutaea superior mit dem homonymen Nerven am oberen Rande des grossen Hüstloches aus der Beckenhöhle heraus. Zwischen Pyrisormis und Gemellus superior solgt der Nervus ischiadicus, und zwei seiner Nebenäste (Glutaeus inferior und Cutaneus semoris posticus). Der Nervus ischiadicus kreuzt, nach abwärts

lausend, die Gemelli und die Sehne des Obturatorius internus, so wie den Quadratus femoris, und zieht zwischen Tuber ossis ischii und grossen Trochanter zur hinteren Seite des Oberschenkels. Man würde, wenn man in der Mitte des unteren Randes des Glutaeus magnus einschnitte, sicher auf ihn kommen. Da der grosse Trochanter sich dem Sitzknorren nähert, wenn das Bein nach aussen gerollt wird, und sich von ihm bei entgegengesetzter Drehung entfernt, so kann die Lage des Nervus ischiadicus zwischen beiden Knochenpunkten keine unveränderliche sein. Er muss vielmehr sich auf dem Quadratus femoris bei jeder Rollbewegung verschieben, und die damit verbundene Reibung ist der Grund der unerträglichen Schmerzen, die bei Rheumatismus und entzündlichem Ischias jede Bewegung des Schenkels begleiten. Der Druck, den dieser Nerv beim Sitzen auf einer Hinterbacke erleidet, erklärt das allgemein gekannte Einschlafen und Prickeln des Fusses. Durch dieselbe Muskelspalte verlassen die Arteria ischiadica und die Arteria pudenda communis (vor dem Nervus ischiadicus liegend) die Beckenhöhle. Erstere begleitet den Nerv, letztere schlingt sich um die Spina ischii herum, um durch das Foramen ischiadicum minus wieder in die kleine Beckenhöhle einzutreten, und zu den Geschlechtstheilen zu gehen. Da sie beim Steinschnitt im Mittelsleisch verletzt werden, und gefährliche Blutung veranlassen kann, so ist die Stelle, wo sie die Spina ischii von aussen umschlingt, ein geeigneter Punkt, sie gegen den Knochen zu comprimiren.

Die Stärke der Muskeln, welche vom Darmbeine zum grossen Trochanter gehen, nähert den verrenkten Schenkelkopf der Darmbeincrista, und setzt den Einrichtungsversuchen ein schwer zu bewältigendes Hinderniss entgegen. Dass die Fussspitzen, wenn man horizontal liegt, nicht gerade nach oben, sondern nach aussen stehen, ist nicht Folge von Muskelzug, sondern wird durch die ungleiche Vertheilung der Muskelmasse um die imaginäre Drehungsaxe des Oberschenkels (welche nicht im Knochen liegt, sondern wegen des Winkels zwischen Hals und Mittelstück an seine innere Seite fällt) verständlich.

§. 176. Muskeln an der vorderen Peripherie des Oberschenkels.

Sie gehen entweder vom Becken zum Oberschenkelbein, oder überspringen dieses, um zu den Knochen des Unterschenkels herabzusteigen, oder entspringen am Oberschenkelbein, um am Unterschenkel zu endigen.

Von aussen nach innen gehend, trifft man sie in folgender Ordnung:
Der längste Schenkelmuskel oder Schneidermuskel, Musculus sartorius s. sutorius, platt, einen Zoll breit, der längste aller Muskeln, entspringt vor dem Tensor fasciae latae von der Spina anterior superior des Darmbeins, läuft schräge nach innen und unten, kreuzt somit
alle übrigen der Schenkelaxe parallelen Muskeln, windet sich hinter den
inneren Knorren des Schenkel- und Schienbeins zur inneren Fläche des

letzteren, an welcher er neben der Spina tibiae mit einer kurzen platten Sehne endigt. Hilft das Bein zuziehen, und den Unterschenkel beugen, dreht ihn auch um seine Axe nach innen, wenn er schon gebogen ist.

Die Benennung Schneidermuskel, die ihm von Adr. Spigelius (De hum. corp. fabrica. Cap. 23) zuerst gegeben wurde (Sutorius von Riolan), ist einer irrigen Vorstellung über die Thätigkeit dieses Muskels entsprossen. Vergleicht man seine geringe Stärke mit dem Gewichte der ganzen unteren Extremität, so ist er wohl zu ohnmächtig, ein Bein über das andere zu schlagen. Dass er vielmehr den Unterschenkel um seine Axe nach innen dreht, fühlt man mit der aufgelegten Hand, wenn man sitzend die Spitze des Fusses durch die Ferse des andern fixirt, und Drehbewegungen mit dem Unterschenkel auszuführen versucht.

Zuweilen corrigirt die Natur das Missverhältniss seiner Schwäche zu seiner Länge durch Anbringung einer queren Inscriptio tendinea. Ich erinnere mich mehrerer solcher Fälle, deren einer außbewahrt wird. Längsspaltung und Doppeltwerden ist nur eine höhere Entwicklung seiner Perforation, durch einen nicht unbedeutenden Hautast des Nervus cruralis. Meckel sah ihn fehlen, und Kelch fand ihn durch eine anderthalb Zoll lange Zwischensehne zweibäuchig. — Die Alten nannten den Sartorius auch Musculus fascialis, weil er lang, dünn und schmal ist, wie eine Aderlassbinde. Es ist sonach ein Missgriff, den Musculus tensor fasciae latae auch Musculus fascialis zu nennen.

Der vierköpfige Unterschenkelstrecker, Extensor cruris quadriceps. So nenne ich den an der vorderen Seite des Oberschenkels gelegenen, aus vier Ursprungsköpfen gebildeten, kraftvollen und schönen Muskel, der, aller vernünstigen Analogie zuwider, von den meisten Autoren in vier besondere Muskeln zerrissen wird. Nur sein erster oder langer Kopf (sonst Musculus rectus cruris genannt) entspringt vom Darmbein, an der Spina anterior inferior und am Pfannenrande, die übrigen drei Köpfe nehmen die drei Seiten des Schenkelbeins ein, und entspringen: der aussere (Vastus externus) von der Basis des grossen Rollhügels, und der oberen Hälste der äusseren Lesze der Linea aspera semoris, der innere (Vastus internus) von dem grösseren oberen Theile der inneren Lefze der Linea aspera, der mittlere (Cruralis s. Vastus medius) von der Linea intertrochanterica anterior, und dem oberen Theile der vorderen Fläche des Schenkelbeins, und ist mit dem Vastus externus häufig ohne Trennungsspur verwachsen. Diese vier Köpfe vereinigen sich an der Kniescheibe zu einer gemeinschaftlichen Sehne, welche in der verlängerten Richtung des Rectus cruris liegt, sich an der Basis und den Seitenrändern der Patella sestsetzt, diese in die Höhe zieht, und weil sie mit der Tibia durch das Ligamentum patellae proprium zusammenhängt, den Unterschenkel streckt.

Es inseriren sich jedoch nicht alle Fasern dieser Sehne an der Kniescheibe. Die oberstächlichsten von ihnen ziehen sub forma einer breiten Aponeurose über die Kniescheibe weg, um in die sehnige Binde des Unterschenkels überzugehen. Zwischen dieser Aponeurose und der Haut liegt die Bursa patellaris subcutanea; — zwischen der Aponeurose und der Beinhaut der Knieschen

scheibe Luschka's Bursa patellaris profunda (§. 174). Oesters communiciren beide Schleimbeutel durch eine umsängliche Oessnung. Die tiese Bursa ist zuweilen mehrsächerig. Luschka, über die Bursa patellaris profunda, in Müller's Archiv, 1850, pag. 520.

Betrachtet man das Ligamentum patellae proprium als Fortsetzung der Sehne des Extensor quadriceps, so ist die Kniescheibe ein Sesambein, als welches sie schon von Tarin (l'os sesamoide de la jambe) angesehen wurde. — Der lange Kopf des Extensor quadriceps ist doppelt gesiedert, der äussere und innere besteht aus schiesen Muskelbündeln, deren Schiesheit um so grösser wird, je tieser unten am Schenkel sie entspringen. Der mittlere Kopf besteht aus longitudinalen Fasern, denen am äusseren Rande sich einige schiese zugesellen.

Unter dem Pfannenursprung des langen Kopfes liegt gewöhnlich ein kleiner Schleimbeutel (Isenflamm), zwischen dem unteren Ende des Cruralis und dem Schenkelbein ein zweiter, viel grösserer, der häufig mit der Synovialkapsel des Kniegelenks communicirt. Ueber die Verschiedenheiten dieses Schleimbeutels siehe Gruber's Abhandlung in der Prager Vierteljahresschrift. II. Bd. 1. Heft.

Theile fand zweimal schleimbeutelartige Höhlungen in der Substanz des Unterschenkelstreckers (sollten sie nicht Cysten gewesen sein?). Zwischen dem Kniescheibenbande und der Tibia liegt eine constante Bursa mucosa, die nie mit der Kapselhöhle in Verbindung steht.

Die Spanner der Kniegelenkkapsel, Musculi subcrurales s. articulares genu sind meistens zwei dünne, platte, vom Cruralis bedeckte Muskelstreisen, welche von der vorderen Fläche der unteren Extremität des Schenkelbeins entspringen, und sich in die obere Wand der Kniegelenkkapsel verlieren.

Albin hat sich die Ehre ihrer Entdeckung zugeschrieben (Annot. acad. Lib. IV). Der eigentliche Entdecker jedoch war Dupré, Wundarzt am Hötel-Dieu zu Paris, der sie in seinem Werkchen: "Les sources de la synovie. Paris. 1799. 12.", als Souscruroux anführte.

Der schlanke Schenkelmuskel, Musculus gracilis s. rectus internus, entspringt von der Schamfuge, dicht neben dem Aufhängeband der Ruthe, liegt auf den gleich zu erwähnenden Zuziehern auf, wird unter der Mitte des Schenkels sehnig, windet sich, unter dem Sartorius, um die inneren Condyli des Schenkel- und Schienbeins, und setzt sich mittelst einer dreieckigen, mit dem Sartorius verwachsenen Ausbreitung seiner Sehne (Gänsefuss bei den älteren Anatomen), an der inneren Schienbeinsläche sest (Schleimbeutel). Er zieht das Bein zu, und dreht, wenn das Knie gebeugt ist, den Unterschenkel nach innen.

Die Zuzieher des Schenkels, Musculi adductores femoris. Es finden sich deren vier, an der inneren Seite des Schenkels liegend. Drei davon werden von der älteren Anatomie als Ein selbstständiger Muskel, Adductor triceps, beschrieben. Da sie sich jedoch nicht in eine gemeinschaftliche Sehne verlieren, so können sie nicht als Köpfe Eines Muskels, sondern müssen als drei verschiedene Muskel-Individuen aufgestellt werden. Wollte man sie blos als drei Ursprungsköpfe Eines Muskels gelten lassen,

so müsste man den vierten Zuzieher, der als Kammmuskel, Musculus pectineus, neben dem Triceps beschrieben wird, als vierten Kopf eines Adductor quadriceps nehmen, da sein Ursprung, seine Richtung und seine Insertion, somit auch seine Wirkung, mit den Köpfen des Triceps übereinstimmt. Es ist nichtsdestoweniger noch immer üblich, der Kürze wegen, die Bezeichnung Triceps zu gebrauchen.

Der lange Zuzieher, Musculus adductor longus (früher Caput longum tricipitis), entspringt kurzsehnig neben dem Gracilis unter dem Tuberculum pubis, breitet sich, zugleich dünner werdend, von oben nach unten zu aus, und hestet sich mit einem kurzsehnigen Rande an das dritte Viertel der inneren Lesze der Linea aspera femoris, hinter dem Ursprung des Vastus internus.

Der kurze Zuzieher, Musculus adductor brevis (Caput breve tricipitis), entspringt, vom langen Zuzieher und vom Kammmuskel bedeckt, vom inneren Theile der vorderen Fläche des horizontalen Schambeinastes, und endigt an der inneren Lefze der Linea aspera femoris, über dem langen Zuzieher, bis zum kleinen Trochanter hinauf.

Der grosse Zuzieher, Musculus adductor magnus (Caput magnum tricipitis), entspringt breit am absteigenden Schambein- und außteigenden Sitzbeinaste, so wie vom Tuber ischii, deckt den Obturator externus, und wird von hinten durch den Semitendinosus und Semimembranosus bedeckt. Seine oberen Bündel laufen fast quer, und grenzen an den unteren Rand des Quadratus (Schleimbeutel dazwischen?). Die übrigen nähern sich allmälig der geraden Richtung. Die lange und breite Endsehne, an welche sich alle Bündel einpflanzen, befestigt sich längs der ganzen Linea aspera femoris, vom kleinen Trochanter bis zum Condylus internus herab, ohne jedoch an allen Punkten derselben festzuhängen. Theilt man nämlich diese Endsehne in drei Theile, so wird sie, wo das mittlere Dritttheil an das untere grenzt, durch einen Schlitz unterbrochen, durch welchen die Schenkelgefässe, Arteria et Vena cruralis, zur Kniekehle treten. Nebst dieser grossen Oeffnung hat die Sehne noch mehrere kleine, für untergeordnete Blutgefässe.

Krästige Zuziehung, wie beim Schenkelschluss des Reiters, ist die Aufgabe der Adductores. Ihr alter Name ist: Custos virginum. — Wirken sie gleichzeitig mit dem Extensor cruris quadriceps, so solgt der Schenkel der Diagonale beider rechtwinkelig auf einander stehenden Bewegungsrichtungen, und wird über den anderen geschlagen. Die Adductores und Extensores sind somit, wenn sie simultan wirken, die eigentlichen Schneidermuskeln. — Der lange Zuzieher ist zuweilen in zwei Portionen getheilt.

Der Kammmuskel, Musculus pectineus s. lividus, entspringt vom Kamme des Schambeins, und von einem Bande, welches am Darmbein in der Gegend der Pfanne entsteht, und längs des Pecten pubis bis zum Tuberculum pubis verläuft (Ligamentum pubicum Cooperi). Deckt den Obturator externus und den kurzen Kopf des Triceps, und befestigt sich an Lehrbuch der Anatomie. 5. Auf.

die innere Lefze der rauhen Schenkellinie unter dem kleinen Trochanter. Zieht zu, und rollt nach aussen.

Der sonderbare Name Lividus, den ihm die alten Myologen beilegten, stammt wohl davon her, dass der Muskel, der in so nahe Berührung mit der grossen Vena cruralis tritt, sich mit dem Blutserum tränkt, welches bei beginnender Fäulniss durch die Venenwand dringt, und den zersetzten Färbestoff des Blutes aufgelöst enthält. Riolan, Spigelius und Bartholin, welche diesen Namen gebrauchten, sagen nichts über seinen Ursprung.

§. 177. Topographisches Verhältniss der Muskeln und Gefässe am vorderen Umfang des Oberschenkels.

Die im vorigen Paragraphe abgehandelten Muskeln stehen mit den übrigen Weichtheilen dieser Gegend in so praktisch-wichtigen Verhältnissen, dass der Anfänger nie unterlassen soll, bei der Zergliederung der Muskeln auch auf die Gefässe und Nerven Rücksicht zu nehmen, deren Verlaufsgesetze von der Anordnung der Muskelstränge abhängen.

Hat man die Fascia lata (deren Verlauf erst am Schlusse der Muskeln der unteren Extremität geschildert wird) vom Ligamentum Poupartii losgetrennt, und sie so weit abgelöst, dass die einzelnen Muskelkörper nett zu Tage liegen, so bemerkt man, unmittelbar unter dem Poupart'schen Bande, einen dreieckigen Raum, dessen Basis durch dieses Band, dessen Seiten nach aussen vom Sartorius, nach innen vom Gracilis und den Adductoren gebildet werden. Dieser Raum, von Velpeau Triangulus inquinalis, von mir Triangulus subinguinalis genannt, schliesst ein zweites Dreieck ein, welches mit ihm gleiche Basis hat, dessen Seitenränder aber auswärts durch den vereinigten Psoas und Iliacus, innen durch den Pectineus dargestellt werden. Der Rauminhalt dieses Dreiecks vertiest sich konisch gegen den kleinen Trochanter zu; der an seinem Grunde zu fühlen ist, und ist die in chirurgischer Beziehung so hochwichtige Fossa ileopectinea. Sie wird von abundantem Fette, und den tiesliegenden Leistendrüsen ausgefüllt, und schliesst die grossen Gefässe und Nerven ein, welche unter dem Poupart'schen Baude zum oder vom Becken gehen. Man kann von dieser Grube aus die Hand in die Bauchhöhle einführen, durch eine grosse, querovale Oeffnung, welche vom Ligamentum Poupartii überspannt wird. Diese geräumige Oeffnung wird durch eine mit dem Iliacus aus der Beckenhöhle herabsteigende Aponeurose (Fascia iliaca), deren oberer Rand mit dem Poupart'schen Bande, deren unterer mit dem Tuberculum ileopectineum verwachsen ist, und deshalb an dieser Stelle Fascia ileo-pectinea genannt wird, in zwei seitliche Lücken abgetheilt. Die aussere Lücke ist die Lacuna muscularis. Sie lässt den Psoas, Iliacus, und zwischen beiden den Nervus cruralis heraustreten, - die innere heisst Lacuna vasorum cruralium, und ist die Austrittsoffnung für die Arteria und Vena eruralis, welche sich in das Fettlager der Fossa ileo-pectinea so einhüllen.

dass wenig Fett auf ihnen, vieles hinter ihnen liegen bleibt. Beide Gefasse sind in eine gemeinschaftliche, durch eine Zwischenwand in zwei Fächer abgetheilte, fibrose Scheide eingeschlossen. Sie folgen, während sie blos vom hochliegenden Blatte der Fascia lata bedeckt sind, einer Linie, die man beiläufig vom Beginne des inneren Drittels des Poupart'schen Bandes. gegen die Spitze des Trianguli subinguinalis herabzieht. Die Arteria cruralis liegt dicht an der Fascia ileo-pectinea, die Vena cruralis neben ihr nach innen, und nimmt hier die Vena saphena interna auf. Beide sullen die Lacuna vasorum nicht ganz aus, indem zwischen der Vena cruralis und der dritten Insertion des Poupart'schen Bandes (am Pecten pubis, als Ligamentum Gimbernati bekannt) ein Raum frei bleibt, der nur von der Fascia transversa des Bauches und dem Bauchfell verschlossen wird. Da durch diesen, nur durch zwei dünne häutige Wände verschlossenen Raum, die Eingeweide aus der Bauchhöhle, so gut wie durch den Leistenkanal oder die innere Leistengrube austreten können, um eine Hernia cruralis zu bilden, so nennt man ihn Bauchöffnung des Schenkelkanals -Annulus cruralis. Die Schenkelöffnung des Schenkelkanals, und die Bildung des Kanals selbst werden im §. 184 beschrieben. — Vom unteren Winkel des Triangulus subinquinalis angefangen, wird die Arteria und Vena cruralis vom Musculus sartorius bedeckt, und liegen beide, bis zu ihrem Durchtritte durch die Oessnung der Sehne des grossen Zuziehers, in einer Rinne, welche durch die Insertion der Adductoren und den Vastus internus gebildet wird. Der Nervus cruralis wird von der Arteria cruralis durch die Fascia ileo-pectinea und die Sehne des Psoas getrennt, liegt also ziemlich weit von ihr, und theilt sich gleich unter dem Poupart'schen Bande in hoch- und tiesliegende Zweige. Erstere gehen nach Durchbohrung der Fascia lata zur Haut, letztere versorgen die Musculatur an der vorderen Seite des Schenkels. Zwei von ihnen begleiten die Cruralarterie. Sie liegen ansangs an der ausseren Seite des Gesasses, dann kreuzt sich der schwächere mit der vorderen Seite der Arterie, kommt an ihren inneren Rand zu liegen, verlässt sie beim Eintritt in den Schlitz der Adductorensehne, und begleitet im fortgesetzten Verlause die Fena saphena magna bis zum Fusse hinab, weshalb er Nervus saphenus genannt wird.

Es erhellt aus diesen Verhältnissen, dass die Arteria cruralis, deren Unterbindung bei gewissen chirurgischen Krankheiten nothwendig wird, im Triangulus subinguinalis, wo sie nicht von Muskeln bedeckt wird, am leichtesten zugänglich ist, und man sie hier, wenn die Wahl der Unterbindungsstelle frei steht, am liebsten bloslegt. Da sie während ihres Lauses durch dieses Dreieck, die meisten ihrer Seitenäste abgiebt (von denen die Prosunda semoris, 1—1½ Zoll unter dem Poupart'schen Bande, die stärkste ist), und man so weit als möglich unter dem letzten Collateralast die Unterbindung vornimmt, so ist nach Hodgson die beste Ligaturstelle der Arteria cruralis, am unteren Winkel des Triangulus subinguinalis gegeben, der, wenn man den inneren Rand des Sartorius versolgt, leicht zu sinden ist. Die Haut, das hochliegende Blatt der Fascia lata, und das die Gesasscheide deckende sett-

haltige Bindegewebe wird gespalten, die Scheide, nach vorsichtigem Zufühlen mit dem Finger, mit der Pincette in eine Kegelspitze aufgehoben und abgetragen, eine gefurchte Sonde nach oben in die Scheide geschoben, diese gespalten, die Arterie unterminirt, und die Ligatur von innen nach aussen durchgezogen. Die leider sehr veränderliche Kreuzungsstelle der Arteria cruralis mit dem Nervus saphenus erheischt Vorsicht. — Von der Spitze des Triangulus subinguinalis bis zum Durchgang durch die Spalte der Adductorsehne, muss, wenn hier die Unterbindung nach dem Hunter'schen Versahren vorgenommen werden sollte, der Sartorius durch einen Haken nach aussen gezogen werden, was die Operation complicirt, und da fremde Hände zu Hilfe genommen werden, sie minder bequem verrichten lässt. Unmittelbar an der Eintrittsstelle in die Sehne des Adductor, wäre dem Gefässe vom äusseren Rande des Sartorius her, oder durch eine Längenspaltung seines Fleisches leichter beizukommen. Da man, wenn Geschwulst und Infiltration eines kranken Beins seine natürlichen Formen anderte, eines Orientirungsmittels bedarf, um beim Aufsuchen der Arteria cruralis zu wissen, welcher Muskel im Grunde der Wunde vorliegt, so braucht man sich nur an die Faserung desselben zu halten, welche, wenn es der Sartorius ist, eine longitudinale, wenn es der Vastus internus wäre, eine schräge nach aussen und unten gehende sein wird. Das Verhältniss der Vena cruralis zur Arteria, welches dem Operateur genau bekannt sein soll, ist so beschaffen, dass am horizontalen Schambeinaste die Vena an der inneren Seite der Arterie liegt, sich aber im Herabsteigen so hinter sie schiebt, dass über der Oeffnung der Sehne des Adductor, die Arterie die Vene genau deckt. — An keiner anderen Stelle des Verlauss der Arteria eruralis ist eine Compression derselben leichter zu bewirken, als am horizontalen Schambeinaste, wo sie durch den Finger, der ihren Pulsschlag fühlt, einfacher und sicherer als mit künstlichen Vorrichtungen ausgeführt werden kann. - Wie wohlthätig anatomische Kenntnisse auch dem Nichtarzte sein könnten, beweist folgender Fall. Ein Prager Student schnitt sich auf einem Spaziergange einen Weidenstock zu. Um ihn zu schälen, zog er ihn unter der Schneide eines Taschenmessers durch, welches er an den Schenkel stemmte. Einer seiner Gefährten stiess ihn, das Messer fuhr in den Schenkel, schnitt die Arteria cruralis durch, und, bevor Hilfe kam, war er - eine verblutete Leiche. Ein Fingerdruck auf den horizontalen Schambeinast hätte ihn gerettet.

§. 178. Muskeln an der hinteren Peripherie des Oberschenkels.

Sie sind bei weitem einfacher als die vorderen, und gehen sämmtlich, mit Ausnahme eines einzigen (Popliteus), vom Tuber ischii zum Unterschenkel, welchen sie beugen.

Vom Sitzknorren entspringen ihrer drei. Sie divergiren im Herabsteigen so, dass der eine schief gegen die äussere Seite des Kniegelenks, die beiden anderen gerade gegen dessen innere Seite laufen. Der erste nimmt im Herabsteigen einen von der äusseren Lesze der Linea aspera femoris entspringenden kurzen Kopf auf, und heisst deshalb der Zweiköpsige, Biceps femoris. Seine Endsehne besestigt sich unter dem Ligamentum laterale externum (Schleimbeutel) am Wadenbeinköpschen. Die beiden anderen sind der halbsehnige und halbhäutige Muskel, — Musculus semitendinosus und semimembranosus. Der Halbsehnige be-

deckt den Halbhäutigen, ist an seinem Ursprunge mit dem langen Kopf des Biceps femeris verwachsen, verschmächtigt sich pfriemenformig, und geht in eine lange schnursormige Sehne über, welche mit der Sehne des Gracilis (und unter ihr) zur inneren Schienbeinsläche gelangt, und neben der Spina tibiae mit der Sehne des Gracilis und Sartorius endigt (Schleimbeutel). Sein Bauch wird durch eine die ganze Dicke des Muskels schräge schneidende Aponeurose durchsetzt, an welcher die Fleischfasern der oberen Hälste endigen, und die der unteren beginnen. - Der Halbhäutige. liegt zwischen Semitendinosus und Adductor magnus. Seine dreieckige breite Ursprungssehne reicht an der einen Seite seines Muskelfleisches bis zur Mitte des Oberschenkels herab, wo zugleich seine Endsehne an der anderen Seite des Fleisches entspringt. Das Fleisch des Muskels nimmt von oben nach unten an Dicke zu, so dass es drei Querfinger breit über dem Knie, einen runden starken Bauschen bildet, welcher plötzlich wie abgeschnitten aushört, und durch eine krästige Sehne sich an die innere Fläche des Schienbeins einpstanzt. Zwischen dieser Sehne, dem inneren Seitenbande des Kniegelenks, und dem inneren Kopfe des zweiköpfigen Wadenmuskels, liegt ein grosser Schleimbeutel (zuweilen mit der Synovialkapsel des Kniegelenks in Verbindung), - ein zweiter zwischen der Sehne und dem Schienbein.

Ein breites Faserbündel löst sich vom inneren Rande der Endsehne des Semimembranosus ab, geht gegen den Condylus externus semoris nach aussen und oben, verwebt sich mit der Kniegelenkkapsel, und verschmilzt mit der Ursprungssehne des äusseren Kopses des zweiköpfigen Wadenmuskels. Dieses ist das eigentliche Ligamentum popliteum, welches, als sehnige Verbindungsbrücke zweier Muskeln, in der Knochenlehre nicht berücksichtigt werden konnte. Da die Beugung des Unterschenkels nicht durch die drei hier betrachteten Muskeln allein, sondern zugleich durch Mithilse des zweiköpfigen Wadenmuskels vollzogen wird, so muss sich, wenn der Semimembranosus und der äussere Kops des zweiköpfigen Wadenmuskels sich contrahiren, das Ligamentum popliteum anspannen, wodurch die damit verwachsene Kapsel aufgehoben, und vor Einklemmung geschützt wird.

Der Kniekehlenmuskel, Museulus popliteus, gehört eigentlich der hinteren Gegend des Unterschenkels an, entspringt starksehnig an der äusseren Fläche des Condylus externus femoris, und von dem äusseren Zwischenknorpel des Kniegelenks, wird nach innen und abwärts gehend breiter, und befestigt sich an der inneren Kante und der Linea poplitea des Schienbeins. Beugt den Unterschenkel, und dreht ihn nach innen.

Er ist mit der hinteren Wand der Kniegelenkkapsel verwachsen, wird von einer ziemlich sesten Fascia bedeckt, und besitzt, unter seiner Ursprungssehne, einen Schleimbeutel, der mit der Kniegelenkhöhle sehr ost communicirt. — Da sich die Beuger und Strecker des Unterschenkels alle am oberen Schienbeinende, in der Nähe der Spina tibias inseriren, so soll der Unterschenkel nie über der Spina amputirt werden.

§. 179. Topographie der Kniekehle.

Durch die Divergenz der Muskeln an der hinteren Seite des Oberschenkels wird ein dreieckiger Raum zwischen ihnen entstehen, dessen aussere Wand durch den Biceps, dessen innere durch den Semitendinosus, Semimembranosus, Gracilis und Sartorius erzeugt wird. In die nach unten offene Basis dieses Dreiecks schieben sich die beiden divergirenden Ursprungsköpfe des zweiköpfigen Wadenmuskels (Gastrocnemius) ein, und verwandeln den dreieckigen Raum in ein ungleichseitiges Viereck, dessen obere Seitenränder lang, die unteren viel kürzer sind. Dies ist die Fossa poplitea, Kniekehle. Sie schliesst die grossen Gefässe und Nerven dieser Gegend in folgender Ordnung ein.

Nach Abnahme der Haut und des subcutanen Zellgewebes, welches sich hier zu einer wahren Fascia superficialis verdichtet, und an der inneren Seite des Kniegelenks die vom inneren Knöchel heraufsteigende Vena saphena interna einschliesst, gelangt man auf die Fascia poplitea (Fortsetzung der Fascia lata), welche die Kniekehle deckt, und die vom äusseren Knöchel heraufkommende Vena saphena posterior s. minor einschliesst. Unter der Fascia solgen die zwei Theilungsäste des Norvus ischiadicus, dessen Stamm unter dem Musculus biceps in den oberen Winkel der Fossa poplitea eintritt. Der aussere (Nervus popliteus externus), der im weiteren Verlause zum Nervus peroneus wird, läust mit der Sehne des Biceps, und an ihrer inneren Seite, zum Wadenbeinköpschen herab; der innere. starkere (Nervus popliteus internus, im weiteren Verlauf Nervus tibialis posticus genannt) bleibt in der Mitte der Fossa, und kann bei gestrecktem Knie sehr leicht durch die Haut gefühlt werden. Um die im Grunde der Kniekehle verborgenen Blutgefässe zu finden, geht man am inneren Rande des Nervus popliteus internus in das reiche Fettlager ein, welches die ganze Grube auspolstert, und findet zuerst die Vena poplitea, welche hier gewöhnlich die Saphena minor aufnimmt, und unter ihr (etwas nach innen) durch kurzes festes Zellgewebe knapp an sie gehestet, die schwer isolirbare Arteria poplitea (Fortsetzung der Arteria cruralis), welche unmittelbar auf dem unteren Ende des Schenkelbeins, und der hinteren Wand der Kniegelenkkapsel aufliegt.

Der Raum der Kniekehle ist bei activer Beugebewegung des Knies tiefer, als im gestreckten Zustande, indem die Muskeln, welche die langen Seitenwände derselben bilden, sich während ihrer Contraction erheben. Da die Arteria cruralis, einem allgemein giltigen Gesetze zusolge, die Beugeseiten der Gelenke an der unteren Extremität aussucht, also von der Leistengegend zur Kniekehle läust, auf welchem Zuge ihr die Adductorsehne im Wege steht, so solgt hieraus die Nothwendigkeit der Durchbohrung der letzteren. — Es ist eine ganz unrichtige Vorstellung (die durch die französischen Autoren über chirurgische Anatomie verbreitet wurde), dass die Arteria cruralis sich um den Schenkelknochen windet. Man braucht

nur einen Schenkelknochen in jene schiese Lage zu bringen, in welcher er im aufrecht stehenden Menschen sich befindet, um zu sehen, dass eine Arterie, ohne sich im Geringsten zu winden, von der Leistenbeuge zur Fossa intercondyloidea verlausen kann, wenn sie die innere Fläche des Knochens kreuzt. — Die tiefe Lage der Arteria poplitea, macht ihre Unterbindung sehr schwer, und sie ist heut zu Tage nur mehr ein anatomisches Problem, da die Wundärzte, wenn sie die Wahl der Unterbindungsstelle frei haben, seit Hunter lieber die Arteria cruralis unterbinden. Die Häusigkeit des Vorkommens krankhaster Erweiterungen (Aneurysmata) an der Arteria poplitea, lässt sich aus den anatomischen Verhältnissen derselben nur gezwungen erklären, wenn man annimmt, dass bei jeder forcirten Streckbewegung des Kniegelenks, die hintere Gegend desselben etwas convex wird, und dadurch die auf ihr ruhende Arterie eine Zerrung erleidet, die die Spannkraft ihrer Wände schwächt, und ihre passive Ausdehnung durch den Stoss der Blutsäule möglich macht. Es ist schon geschehen, dass man Abscesse in der Kniekehle, oder grosse Ausdehnungen der Schleimbeutel, deren flüssiger Inhalt die Pulsationen der Arteria poplitea fortpflanzte, für Aneurysmen hielt.

§. 180. Muskeln an der vorderen und äusseren Seite des Unterschenkels.

Sie sind sämmtlich lange Muskeln, und erscheinen so um die Knochen des Unterschenkels herumgelagert, dass nur die innere Schienbeinfläche, die vordere Schienbeinkante, und die beiden Knöchel von ihnen unbedeckt bleiben. Sie entspringen von den Knochen des Unterschenkels, und schicken ihre Sehnen zu den Knochen des Fusses, bis zu den Zehen.

A. Vordere Seite.

Von innen nach aussen gehend, findet man die Muskeln an der vorderen Seite des Unterschenkels in folgender Ordnung:

Der vordere Schienbeinmuskel, Musculus tibialis anticus s. hippicus, der stärkste unter ihnen, entspringt vom äusseren Knorren und der äusseren Fläche des Schienbeins, vom Zwischenknochenbande, und von der Fascia cruris, verwandelt sich am unteren Drittel des Unterschenkels in eine platte, starke Sehne, welche über das Sprunggelenk schräge nach innen läust, um am ersten Keilbeine, und an der Basis des Os metatarsi hallucis zu endigen (Schleimbeutel). Hebt den Fuss in die Höhe, und dreht ihn zugleich ein wenig so um seine Längenaxe, dass der innere Fussrand nach oben sieht.

Spigelius nennt ihn den Musculus catenae "quia dissecto per transversum hujus tendine, catenam aegri, cujus beneficio ambulantes pedem flectant eleventque, portare coguntur". De corp. hum. fabr. cap. XXIV.

ن.

Der lange Strecker der grossen Zehe, Musculus extensor hal-

Bucis longus, halbgesiedert, entsteht vom Mittelstück der inneren Wadenbeinsläche, und vom Zwischenknochenbande. Seine schrägen Fleischssern inseriren sich an die lange, am vorderen Rande des Muskels besindliche Sehne, welche auf dem Rücken des Os metatarsi hallucis zum zweiten Gliede der grossen Zehe geht. Nach Gruber ist die bisher als Anomalie betrachtete Nebensehne zur ersten Phalanx, ein constantes Vorkommniss.

Der lange gemeinschaftliche Strecker der Zehen, Musculus extensor digitorum communis longus, entspringt von dem Köpschen und der vorderen Kante des Wadenbeins, dem Condylus externus tibiae, und dem Ligamentum interosseum. Die am vorderen Rande des Muskels laufende Sehne, theilt sich über dem Sprunggelenk in fünf platte Sehnenschnüre, von welchen die vier inneren, zur zweiten bis fünsten Zehe laufen, um mit den Sehnen des kurzen gemeinschaftlichen Streckers die Rückenaponeurose der Zehen zu bilden, welche wie jene der Finger endigt. Die fünste oder äusserste Sehne setzt sich an den Rücken des fünsten Mittelfussknochens sest, nahe an dessen Basis, und schickt sehr häusig eine sedensörmige Strecksehne zur kleinen Zehe. Da es sich ost ereignet, dass das Fleisch des Extensor communis, welches dieser sünsten Sehne den Ursprung giebt, weit hinauf vom gemeinschastlichen Muskelbauche des Zehenstreckers abgetrennt erscheint, so nennen es Winslow und Albin: Musculus peroneus tertius, welcher zuweilen sehlt.

Am Rücken des Sprunggelenks geht das Sehnenbündel des langen Zehenstreckers durch eine Bandschlinge, welche von Retzius als Ligamentum fundisorme tarsi, Schleuderband, beschrieben wurde (Müller's Archiv. 1941. p. 497). Man sieht dieses Band, nach vorsichtigem Lospräpariren des Kreuzbandes, als ein selbstständiges, aus dem Sinus tarsi herauskommendes und dahin zurückkehrendes Ligament. Die Innenfläche der Schlinge oder Schleuder ist dort, wo sie sich an den Sehnen des genannten Muskels reiht, verknorpelt, und zwar nicht selten in solchem Grade, dass man diese Stelle des Bandes bei mageren Füssen durch die Haut sehen, und mit dem Finger fühlen kann. Das Band verhindert die Entsernung der Strecksehnen vom Fussrücken, während der Zusammenziehung des Muskels. — Da die Sehnen der drei genannten Muskeln über die Beugeseite des Sprunggelenks laufen, und sich bei jeder Spannung von ihr emporheben würden, so müssen sie durch starke, in die Fascia cruris kreuzweis eingewebte Sehnenstreisen, welche sich tiber das Gelenk werfen, niedergehalten werden. So entsteht das Ligamentum cruciatum s. annulare anterius, von welchem ein Schenkel vom inneren Knöchel zur äusseren Fläche des Fersenbeins geht, während der zweite vom Os naviculare und cuneiforme primum entspringt, bis zur Kreuzungsstelle mit dem ersten stark ist, und von hier an nur selten bis zum äusseren Knöchel deutlich ausgeprägt erscheint. Zwei an der inneren Oberflache des Kreuzbandes entspringende Scheidewände, schieben sich zwischen die Sehnen des Tibialis anticus, Extensor hallucis longus, und Extensor communis digitorum longus ein, und bilden gesonderte Fächer, welche mit Synovialhauten, die die Sehnen auch über das Kreuzband hinaus begleiten, gefüttert werden.

Die Arteria tibialis antica, ein Zweig der Arteria poplitea, welcher durch die obers Ecke des Zwischenknochenraums zur vorderen Seite des

Unterschenkels gelangt, befindet sich zu den Muskeln dieser Gegend in folgendem Verhältnisse. Sie läust auf dem Zwischenknochenbande, zwischen Tibialis anticus und Extensor communis eingeschaltet, herab, nähert sich unten dem Schienbeine, auf dessen ausserer Fläche sie ausliegt, und folgt im Ganzen einer geraden Linie, welche von der Mitte des Abstandes zwischen . Capitulum fibulae und Spina tibiae zur Mitte einer, beide Knöchelspitzen verbindenden Linie herabgezogen wird. Da die Sehnen der vorderen Unterschenkelmuskeln nicht mit ihr parallel laufen, so werden sich die Beziehungen derselben zu ihr andern, und die Arterie wird an ihrem oberen Drittel zwischen Tibialis anticus und Extensor hallucis longus, und weiter unten, nachdem sich die nach innen gehende Sehne des Extensor hallucis longus mit ihr kreuzte, zwischen dieser und dem vereinigten Sehnenbundel des Extensor digitorum communis longus zu liegen kommen. Nebst zwei Venen hat sie den Nervus tibialis anticus zum Begleiter, welcher aus dem Nervus popliteus externus stammt, unter dem Wadenbeinköpschen sich nach vorn krummt, den Musculus peroneus longus und Extensor digitorum communis longus durchbohrt, und anfänglich an der äusseren, später an der inneren Seite der Arterie, deren vordere Fläche er kreuzt, herabläust. - In ihrem oberen Dritttheil ist die Arterie so tief gelegen, und die sie bergenden Muskeln unter sich und mit der dicken Fascia cruris so innig vereinigt, dass man ausser der oben genannten Linie keinen weiteren Führer zum Gestsse hat, und die Unterbindung desselben somit sehr schwer wird. In den beiden unteren Dritteln des Unterschenkels leitet die Kenntniss der Sehnen ganz sicher zu ihrer Aussindung. Sie giebt keinen Ast von Bedeutung ab, und kann somit an jeder Stelle unterbuuden werden. Am Fussrücken, wo sie dicht auf dem Tarsus liegt, wird sie zwischen den Sehnen des Extensor hallucis longus und Extensor digitorum longus dem Finger zum Pulssuhlen und den verwundenden Werkzeugen zugänglich.

B. Acussere Seite.

Der lange Wadenbeinmuskel, Musculus peroneus longus, entspringt mit zwei, durch den Wadenbeinnerv von einander getrennten Portionen, mit der oberen vom Köpschen des Wadenbeins, mit der unteren unter dem Köpschen bis zum letzten Viertel der Knochenlänge herab. Die von beiden Köpsen gebildete Sehne, tritt hinter dem äusseren Knöchel an die äussere Seite des Fersenbeins, dann in den Sulcus ossis cubeidei am Plattsuss, und endigt am inneren Fussrande (am ersten Keilbeine, und an der Basis des ersten und zweiten Mittelsussknochens). Streckt den Fuss, abducirt ihn, und wendet die Sohle etwas nach aussen.

In der Sehne des Peroneus longus finden sich an jenen Stellen, wo sie sich während ihrer Verschiebungen an Knochen reibt (am äusseren Knöchel, am Eintritt in den Sulcus ossis cuboidei, auch in der Sohle selbst), faser-knorpelige Stellen, von welchen die am Würselbeine nicht ganz selten verknöchert, und ein wahres Sesambein vorstellt.

Der kurze Wadenbeinmuskel, Musculus peroneus brevis s. semifibularis, entspringt vom zweiten Drittel des Wadenbeins bis zum äusseren Knöchel herab, wird vom vorigen bedeckt, lässt seine Sehne hinter dem Malleolus externus zum äusseren Fussrande laufen, wo sie sich an die Tuberositas ossis metatarsi quinti befestigt. Wirkt wie der vorige. Um das Ausschlüpsen der Sehnen beider Peronei aus der Furche des ausseren Knöchels zu verhüten, verdickt sich die gemeinschaftliche Sehnenscheide des Unterschenkels zu einem starken Haltbande — Retinaculum s. Ligamentum annulare externum — welches vom ausseren Knöchel zur ausseren Fläche des Fersenbeins herabgespannt ist, und in zwei Fächer getheilt wird. — Varietäten dieses Muskels beschrieben Otto, Meckel, und Theile.

§. 181. Muskeln an der hinteren Seite des Unterschenkels.

Sie werden durch eine, zwischen sie eingeschobene Fortsetzung der fibrösen Hülle der Wade, in ein hochliegendes und tiefliegendes Stratum geschieden, entspringen theils vom Ober- theils vom Unterschenkel, und befestigen sich nur an den Knochen des Fusses, bis zu den Zehen.

A. Hochliegendes Stratum.

Es enthält die Strecker des Fusses, den Gastrocnemius, Soleus und Plantaris, welche, da sie in eine gemeinschaftliche Endsehne — Tendo Achillis s. Chorda Hippocratis — zusammenstiessen, besser als Köpse Eines Muskels, denn als besondere Muskelindividuen zu nehmen sind.

Der zweiköpfige Wadenmuskel, Musculus gemellus surae s. gastrocnemius (γαστής, Bauch; κνήμη, Wade), entspringt mit zwei Köpfen, welche den unteren Winkel der Fossa poplitea bilden, unmittelbar über den beiden Condyli femoris. Der äussere Kopf ist schwächer, und steigt nicht so tief herab, wie der innere. Beide Köpfe berühren sich in der Mitte, sind an ihrer hinteren Fläche mit einer schimmernden Fortsetzung ihrer Ursprungssehne bedeckt, und gehen jeder durch eine halbmondförmige, nach unten scharf begrenzte Linie, in die gemeinschaftliche breite und platte Sehne über, welche sich mit der des Schollenmuskels zur Achillessehne vereinigt. Wird auch Zwillingsmuskel der Wade genannt.

Im sehnigen Ursprunge beider Köpfe finden sich gar nicht selten faserknorpelige Kerne, welche auch verknöchert vorkommen — die Vesal'schen Sesambeine. Camper liess nur das Sesambeinchen im äusseren Kopfe zu. Nach meinen Beobachtungen (Oesterr. med. Jahrbücher. Bd. 26. p. 24 seqq.) kommt es in beiden Köpfen vor, obwohl das rechte häufiger (hei Männern) und grösser getroffen wird. Bei kletternden und springenden Säugethieren werden sie sehr gross.

Der Schollenmuskel, Musculus soleus (von Spigelius Gastrocnemius internus genannt), ist weit stärker als der vorausgehende, unter
welchem er liegt. Er nimmt seine Entstehung vom hinteren Umfange des
Köpfchens, und von der oberen Hälste der hinteren Kante des Wadenbeins,
von der Lines poplites, und dem oberen Theile des inneren Randes des
Schienbeins. Der Fibular- und Tibialursprung sind durch eine kleine Spalte
(durch welche die hintere Schienbeinarterie mit ihrem Gesolge tritt), von
einander getrennt. Ein schmales, aber starkes sehniges Bündel, welches
die beiden Ursprungsportionen des Muskels verbindet, läust über die Spalte

weg. Der Muskelbauch ist in seiner Mitte am breitesten und dicksten, und geht durch eine platte starke Endsehne, welche an ihrer vorderen Fläche noch Muskelfasern aufnimmt, und mit der Endsehne des Gastrocnemius verschmilzt, in die Achillessehne über, welche von oben nach unten schmäler und zugleich dicker wird, und sich an die hintere Fläche der Tuberositas calcanei ansetzt, woselbst ein Schleimbeutel zwischen ihr und dem Knochen liegt.

Der lange oder dünne Wadenmuskel, Musculus plantaris, dem Palmaris longus ähnlich, und östers sehlend, ist ein krastloser Hilssmuskel der beiden vorausgegangenen. Er entspringt, über dem äusseren Kopse des Gastrocnemius, mit welchem er zusammenhängt, vom Condylus externus semoris und der Kniegelenkkapsel, und verwandelt sich bald in eine lange, schmale und slache Sehnenschnur, welche zwischen dem Fleische des Gastrocnemius und Soleus nach abwärts und einwärts zieht, an den inneren Rand der Achillessehne gelangt, und theils mit ihr zusammensliesst, theils mit zerstreuten Fasern im Zellgewebe zwischen Achillessehne und Fersenbein, und zuweilen in der hinteren Wand der Sprunggelenkkapsel endigt. Da er gar nicht an die Sohle kommt, so wäre sein Name Plantaris mit Gracilis surae zu wechseln, welchen Winslow zuerst anwendete (le jambier greile).

Galen, der sich, wie aus vielen Stellen seiner Werke erhellt, vorzugsweise der Affenleichen zu seinen Zergliederungen bediente, und die Ergebnisse derselben auf den Menschen übertrug, liess den Musculus plantaris, der nur bei einigen Säugethieren in die Aponeurosis plantaris übergeht, auch beim Menschen dahin gelangen (de usu partium, lib. 2. cap. 3). Daher der absurde, jedoch allgemein angenommene Name Plantaris. Douglas, der den Gastrocnemius und Soleus zusammen als Extensor tarsi magnus erwähnt, nannte den Plantaris ganz consequent Extensor tarsi minor.

Der Name Achillessehne schreibt sich wohl davon her, dass der griechische Held, den die Mythe nur an dieser Stelle verwundbar sein liess, an den Folgen eines Pfeilschusses in die Ferse starb.

Die Aerzte des Alterthums hielten die Wunden und Quetschungen der Achillessehne für tödtlich (eum partibus principibus societatem habet, unde contusus hie tendo et sectus, febres continuas et acutissimas movet, singultus excitat, mentem perturbat, tandemque mortem accersit. Hippocrates), und da sich der Glaube an die Gesthrlichkeit der Sehnenwunden bis auf unsere Zeit vererbte, so mag dieses wohl die Ursache sein, warum die Tenotomie (ein Operationsversahren, durch welches die Sehnen jener Muskeln durchschnitten werden, deren andauernde und permanent gewordene Contraction, Entstellung, Steischeit und Unbrauchbarkeit eines Gliedes veranlasst) so spät in Ausnahme kam.

Der Schollenmuskel entlehnt seinen Namen aus der Zoologie (a figura piscis denominatus. Veslingii Syntagma anat. cap. 19), indem seine länglich-ovale Gestalt an die der Scholle, eines in den europäischen Meeren häufigen Fisches (Pleuronectes solea Linn., Solea vulgaris Cuv.) erinnert. Die in die anatomische Nomenclatur allgemein aufgenommene Benennung Sohlenmuskel ist somit absurd, da der Musculus soleus mit der Sohle gar nichts zu schaffen hat.

B. Tiefliegendes Stratum.

Nach Beseitigung der in A. beschriebenen Muskeln und des tiefliegenden Blattes der Vagina surae, kommt man auf drei, in der Rinne zwischen beiden Unterschenkelknochen eingebettete Muskeln, welche als Antagonisten der an der vorderen Seite des Unterschenkels gelegenen Muskeln functioniren, und ihre Sehnen hinter dem inneren Knöchel zum Plattfusstreten lassen, um den Fuss als Ganzes zu strecken, oder die Zehen zu beugen.

Der hintere Schienbeinmuskel, Musculus tibialis posticus s. nauticus, ist ein halbgesiederter Muskel, entspringt zwischen dem Flexor digitorum communis longus und Flexor hallucis longus, von der hinteren Fläche des Schienbeins, dem Zwischenknochenbande, und dem inneren Winkel des Wadenbeins. Die rundlich platte Sehne lagert sich in die Rinne des inneren Knöchels, wendet sich über die innere Seite des Sprungbeinkopses (wo sie durch Ausnahme von Faserknorpelmasse sich verdickt) und hinter der Tuberositas ossis navicularis zum Plattsus, und hestet sich, in mehrere Zipsel gespalten, an das Kahnbein, die drei Keilbeine, das Würselbein, und an die Basis des zweiten und dritten Mittelsusknochens. Streckt den Fuss, hebt seinen inneren Rand, und zieht ihn zu, so dass man sitzend mit beiden Füssen eine Last zu sassen und auszuheben, oder beim Klettern sich mit den Füssen zu stützen und nachzuschieben vermag.

Theile nennt ihn Schwimmmuskel. Diese Benennung ist jedoch eine unrichtige Uebersetzung des alten Namens Musculus nauticus, indem nauta nicht Schwimmer, sondern Schiffer bedeutet, und der Tibialis posticus beim Schwimmen nicht mehr als ein anderer Muskel des Fusses in Anspruch genommen wird. Ebenso unpassend ist es, den Namen nauticus von der Anhestung an das Schiffbein herleiten zu wollen. Ich sinde bei Spigelius, der erste, der diese sonderbare Bezeichnung gebrauchte, folgende ganz tressende Stelle: hic a me nauticus vocari solet, quod co nautae polissimum utuntur, dum malum scandunt (De hum. corp. fabr. lib. 1V. cap. XXIV) — also Matrosenmuskel, weil er beim Erklettern der Masten besonders thätig mitwirkt.

Der lange Beuger der Zehen, Musculus slexor communis digisorum longus s. perforans (aach Riolan Pernodactyleus, von πέρνα, Schenkel), entspringt mit seinem langen Kopfe en der hinteren Fläche des Schienbeins, und geht hinter dem inneren Knöchel in eine lange Sehne über, welche die des Tibialis posticus bedeckt, sich an der inneren Seite des Talus zur Fusssohle wendet, vom Musculus abductor hallucis und vom Musculus slexor digitorum brevis bedeckt wird, und in der Mitte der Sohle die Fleischsasern eines zweiten accessorischen Kopfes aufnimmt, welcher von der unteren und inneren Fläche des Fersenbeins entsteht, und gewöhnlich Caro quadrata Sylvii genannt wird (obwohl J. Sylvius ihn als Massa carnea aussuhrt). Hierauf theilt die Sehne sich in vier kleinere Stränge, sur die vier äusseren Zehen, welche aich so wie die des tiesliegenden Fingerbeugers verhalten, den vier Musculi lumbricales zum

Ursprunge dienen, die Sehnen des Flexor digitorum brevis durchbehren, und am dritten Zehengliede endigen.

Er bietet häufig Spielarten dar. Die wichtigsten sind: 1. der Ursprung des kurzen Kopfes reicht bis zum Schienbein hinauf (Theile). 2. Vom unteren Ende des Wadenbeins gesellt sich ein Fleischbündel zum langen Kopfe, welches auch isolirt zum Fersenbeine herabläuft, und sich im Fette zwischen Achillessehne und Sprunggelenk verliert, wo dann gewöhnlich der Plantaris fehlt. Wir haben dieses Bündel ungewöhnlich lang werden, und in der Kniekehle von der sehnigen Hülle des Musculus popliteus entspringen gesehen. Rosenmüller (Hallische Lit. Zeit. 1808. Nr. 153) sah dieses abnorme Fleischbündel an ein besonderes, accessorisches Knöchelchen am Sprunggelenke treten. 3. Die vier Endsehnen verschmelzen mit jenen des kurzen Beugers mehr weniger vollkommen (Affenbildung), oder werden durch eine fünste vermehrt, wenn der kurze Beuger keine Sehne zur kleinen Zehe sendet. 4. Die Beugesehne der zweiten Zehe entwickelt sich, wie ich östers sah, nur aus einem besonderen Fascikel der Massa carnea Sylvii.

Der lange Beuger der grossen Zehe, Musculus slexor hallucis longus, ist der stärkste im tiesen Stratum, und am meisten nach aussen liegend, entspringt von den beiden unteren Dritteln des Wadenbeins, entwickelt eine runde Sehne, welche hinter dem Malleolus internus zum inneren Fussrande, und unter dem Sustentaculum tali in die Sohle dringt, sich hier mit der Sehne des langen Zehenbeugers kreuzt, mit ihr durch ein tendinöses Bündel zusammenhängt, und vom Abductor hallucis bedeckt, zwischen beiden Sesambeinen an der Articulatio metatarso-phalangea hallucis zum Nagelgliede der grossen Zehe gelangt, wo sie endet, und östers ein Sesambeinchen einschliesst.

Die Sehnen der drei heschriebenen Muskeln werden hinter dem inneren Knöchel durch ein von diesem entspringendes, zum Fersenbein und zur Ursprungssehne des Abductor hallucis herablausendes Band, Ligamentum lasiniatum s. annulare internum, in ihrer Lage besetigt. Ich sinde häusig nur Eine sibröse Scheidewand, durch welche der Raum unter dem Bande in zwei Fächer getheilt wird, deren vorderes die Sehnen des Tibialis posticus und Flexor digitorum communis longus, deren hinteres die des Flexor hallucis longus enthält. Synovialscheiden existiren dagegen immer drei.

Der Nervus tibialis posticus, welcher längs der Medianlinie der Kniekehle zum unteren Winkel derselben herabläuft, birgt sich zwischen den beiden Köpfen des Gastrocnemius, dringt unter dem oberen Rande des Soleus in die Tiefe, und gesellt sich zur Arteria tibialis postica, welche auf dem Musculus popliteus aus der Kniekehle herabkommt. Beide durchbohren nun das tiesliegende Blatt der Fascia surae, und lausen (die Arterie einwärts vom Nerven liegend) längs einer Linie herab, welche von der Mitte der Kniekehle zur Mitte des Raumes zwischen Achillessehne und innerem Knöchel gezogen wird, in welchem man die Arterie pulsiren fühlt. Die Arterie ist in ihrer oberen Hälfte, wo sie vom Gastrocnemius und Soleus bedeckt wird, äusserst schwer der Unterbindung zugänglich. Es müsste, nach Wilson (Practical and Surgical Anatomy. London, 1838. pag. 58), einen halben Zoll vom inneren Rande der Tibia entfernt, durch Haut und Fascia ein sechs Zoll langer Einschnitt gemacht, der innere Rand des Gastrocnemius aufgehoben, der Tibialursprung des Soleus in derselben Ausdehnung getrennt, das tiefe Blatt der Vagina surge aufgeschlitzt, und das Gestss, welches hier no

culus tibialis posticus liegt, mit Umgehung des Nerven und der beiden Begleitungsvenen isolirt werden. In der Nähe des Knöchels ist die Unterbindung leicht und einsach. Ein zwei Zoll langer Haut- und Fascienschnitt, zwischen Tendo Achillis und Malleolus internus, sällt direct auf die Gesässscheide. — Die Arteria peronea, die kleinste von den drei Arterien des Unterschenkels, entspringt vom tiesliegenden oberen Stücke der Arteria tibialis postica, zwei Zoll unter dem unteren Rande des Popliteus, geht, bedeckt vom Flexor hallucis longus, am inneren Winkel der Fibula herab, und theilt sich, über dem unteren Drittel derselben, in einen vorderen und hinteren Zweig. Ueber der Theilungsstelle wäre sie nur auf dieselbe Weise, wie das obere Stück der Arteria tibialis postica, zugänglich, und wurde auch hier von Guthrie bei einer mit Verletzung der Arteria peronea complicirten Schusswunde des Unterschenkels unterbunden.

§. 182. Muskeln am Fusse.

A. Dorsalseite.

Hier findet sich nur Ein Muskel, der dieser Seite allein angehört, und die Rolle eines kurzen Streckers der Zehen, Musculus extensor digitorum communis brevis, übernimmt. Er entspringt, vor dem Eingange des Sinus tarsi, von der äusseren und oberen Fläche des Fersenbeins, wird von den Sehnen der langen Strecker bedeckt, theilt sich in vier Bündel, welche in platte dünne Sehnen übergehen, die schief nach innen und vorn über den Fussrücken laufen, und, mit den Sehnen des Extensor communis longus verschmelzend, in die Dorsalaponeurose der vier inneren Zehen übergehen. Nur selten existirt eine fünste Endsehne für die kleine Zehe. Häusig dagegen ist die zur grossen Zehe gehende Portion (welche allein genommen, so stark ist, wie die drei übrigen) ein besonderer Muskel.

Die Arteria dorsalis pedis, die Fortsetzung der Arteria tibialis antica, folgt einer Richtungslinie, die von der Mitte des Sprunggelenks zum ersten Interstitium interosseum gedacht wird. Sie liegt unmittelbar auf den Fusswurzelknochen, zwischen den Sehnen des Extensor hallucis und Extensor digitorum communis longus, und wird, bevor sie zum bezeichneten Zwischenknochenraum gelangt (durch welchen sie sich in den Plattfuss krümmt), von der kurzen Strecksehne der grossen Zehe gekreuzt. Die chirurgische Unterbindung derselben wird durch die leichte Ausführbarkeit einer anhaltenden Compression enthehrlich gemacht.

B. Plantarseite.

Die Muskeln der Plantarseite zerfallen in vier Gruppen, deren eine längs des inneren, deren zweite längs des äusseren Fussrandes liegt, die dritte zwischen diese beiden, und die vierte in den Zwischenräumen je zweier Ossa metatarsi eingeschaltet ist.

1. Längs des inneren Fussrandes liegen die eigenen Muskeln der grossen Zehe. Diese sind:

der Abzieher der grossen Zehe. Er ist zweiköpfig, entspringt mit seinem langen Kopfe vom Tuber, und von der inneren Fläche des

Fersenbeins, mit seinem kurzeren vom Os cuneiforme primum, scaphoideum, und Os metatarsi hallucis, und endigt am ersten Gliede des Hallux und dessen Sesambein.

Der kurze Beuger der grossen Zehe entspringt vom Os cunsiforme secundum et tertium, und von den starken Bändern der Fusssohle, und theilt sich in zwei, an die beiden Ossa sesamoidea der grossen Zehe angewachsene Enden, zwischen welchen die Sehne des Flexor hallucis longus läuft.

Der Anzieher der grossen Zehe, hat zwei Köpse. Der eine entspringt, neben dem kurzen Beuger liegend, von der Basis des zweiten, dritten, und vierten Metatarsusknochens, wohl auch von der Sehne des Peroneus longus oder Tibialis posticus, und geht zum ausseren Sesambein des ersten Gelenkes der grossen Zehe, wo er mit dem anderen Kopse verschmilzt, welcher vom vorderen Ende des vierten, selten auch des fünsten Metatarsusknochens entspringt, und quer hinter den Köpschen des zweiten, dritten und vierten Metatarsusknochens zur selben Stelle zieht.

Casserius entdeckte diesen zweiten Kopf des Anziehers der grossen Zehe, betrachtete ihn aber nicht als einen zweiten Kopf des Anziehers, sondern als selbstständig, und nannte ihn, seiner Richtung wegen, Transversalis. Walter (Myolog. Handbuch. pag. 94) bezeichnete ihn als Adductor brevis, und da man glaubte, er könne durch seine Zusammenziehung die Sohle hohl machen, und ein festeres Stemmen derselben auf unebenem Boden oder schiefen Ebenen bewirken, 'so heisst er bei älteren französischen Anatomen auch le couvreur (Muskel der Ziegeldecker).

- 2. Längs des äusseren Fussrandes liegt die Musculatur der kleinen Zehe. Sie besteht:
- α. Aus dem Abzieher der kleinen Zehe. Dieser entspringt von der unteren Fläche des Fersenbeins und der Fascia plantaris, und inserirt sich theils am Höcker des fünsten Mittelfussknochens, theils am ersten Gliede der kleinen Zehe.
- β. Aus dem Beuger der kleinen Zehe. Derselbe ist viel schwächer als der vorige, entspringt vom Ligamentum calcaneo-cuboideum und vom fünsten Mittelfussknochen, und befestigt sich mit zwei Endzipsen am fünsten Mittelfussknochen, und an der Sehnenrolle des ersten Gelenks der kleinen Zehe.
- 3. Zwischen dem äusseren und inneren Fussrande liegt der kurze gemeinschaftliche Zehenbeuger, welcher die in die Sohle eingehenden Sehnen der an der hinteren Seite des Unterschenkels gelegenen Muskeln bedeckt. Der kurze gemeinschaftliche Zehenbeuger wird unmittelbar von der Aponeurosis plantaris bedeckt, von welcher, und vom Tuber calcanei er entspringt, theilt sich in vier sleischige, später sehnige Portionen, sur die vier kleineren Zehen. Jede Sehne spaltet sich am ersten Gliede, lässt die Sehne des Flexor communis longus durchgehen, und besestigt sich, in allen übrigen Punkten dem Flexor persoratus der Finger entsprechend, am zweiten Gliede.

4. Die Zwischenknochenmuskeln.

Nach Theile's richtiger Beurtheilung müssen nicht vier äussere und drei innere, sondern umgekehrt drei äussere und vier innere gezählt werden. Nimmt man abweichend vom Verhältnisse der Hand (deren Längenaxe durch den Mittelfinger gedacht wurde), aber harmonirend mit der Grösse der Zehen, die Axe des Fusses durch die grosse Zehe gehend, so wird für die vier kleineren Zehen die Adduction in einer Annäherung zur grossen, und die Abduction in einer Entfernung von ihr bestehen. Die Adductionsmuskeln liegen in der Sohle, die Abductoren am Rücken des Fusses. Erstere sind die Interessei interni, vier an der Zahl - letztere die Interossei externi, deren nur drei vorhanden zu sein brauchen, da die kleine Zehe schon einen besonderen Abductor besitzt. - Die drei externi entspringen zweiköpfig von den beiden neben einander liegenden Mittelfussknochen des zweiten, dritten und vierten Zwischenknochenraums, und verlieren sich an der ausseren Seite des ersten Zehengelenks in der Faserknorpelrolle desselben. Die vier interni nehmen alle vier Interstitis interossea ein, entspringen jedoch nur an der inneren Seite Eines Mittelfussknochens, und endigen an derselben Seite des entsprechenden ersten Zehengliedes.

§. 183. Aponeurose der unteren Extremität. Eintheilung derselben.

Sie bildet eine vollkommen geschlossene Scheide für die ganze Museulatur der unteren Gliedmasse, und wird, der leichteren Uebersicht wegen, in eine Fascia femoris (Fascia lata), Fascia cruris, und Fascia pedis abgetheilt. Jede dieser Abtheilungen sendet, nach gewissen Gesetzen, tiefdringende Blätter zwischen einzelne Muskeln oder Muskelgruppen, wodurch eben so viele Scheiden entstehen, welche die Richtung der Muskeln bestimmen, ihr Fleisch umfassen, und ihnen so viel Halt und Festigkeit geben, dass nach ihrer Entfernung beim Präpariren der Muskeln, diese von selbst aus einander fallen, und länger erscheinen, als die Scheide war, die sie umhüllte.

§. 184. Schenkelbinde und Schenkelkanal.

Die Schenkelbinde, Fascia femoris s. Fascia lata, entspringt theils vom Labium externum der Darmbeincrista, und hängt am Kreuz-bein mit der Fascia lumbo-dorsalis zusammen, theils von den Aesten des Sitz- und Schambeins. Man könnte sie deshalb in eine Portio ileo-sacralis und ischio-pubica abtheilen.

Die Portio ileo-sacralis besteht aus zwei Blättern, welche sich trennen, um den Musculus glutseus magnus zwischen sich zu fassen. Das die äussere Fläche dieses Muskels deckende Blatt ist so schwach, dass es kaum den Namen einer Aponeurose verdient, das innere dagegen sehr stark, und dient zugleich dem Musculus glutaeus medius zum Ursprunge. Vom oberen Rande des Glutaeus magnus läuft die Fascia nach vorn und innen, hüllt die Muskeln, denen sie begegnet, in Scheiden ein, und schickt zwischen Rectus femoris und Tensor fasciae ein starkes, bis auf das Hüftgelenk und den Oberschenkelknochen eindringendes Blatt ab. An der äusseren Seite des Oberschenkels läuft sie über den grossen Trochanter (Schleimbeutel) nach abwärts, ist hier am stärksten (½—1 Linie dick), und sendet zwischen den Streckern des Unterschenkels und dem Biceps femoris einen starken Fortsatz (Ligamentum intermusculare externum) zur äusseren Lefze der Linea aspera femoris.

Die Portio ischio-pubica, die sich an der inneren Seite des Oberschenkels ausbreitet, und schwächer als die äussere ist, hüllt den Gracilis ein, und schickt zwischen dem Vastus internus und den Adductoren das Ligamentum intermusculare internum zur inneren Lefze der Linea aspera femoris, welches erst in der unteren Hälfte des Oberschenkels deutlich wird, und in der oberen, bis zum kleinen Trochanter hinauf, zu fehlen scheint.

Das Verhalten der Fascia lata in der Fossa ileo-pectinea verdient, seiner Beziehung zum Schenkelkanale wegen, eine aussührlichere Be-Es ist bekannt, dass in der Fossa ileo-pectinea die Arteria und Vena cruralis liegen, nachdem sie durch die Lacuna vasorum unter dem Poupart'schen Bande aus dem Becken hervortraten. Eine gemeinschastliche Scheide umhüllt beide Gesasse (Vagina vasorum cruralium). Sie wird an ihrer ausseren Peripherie durch eine Fortsetzung der Fascia iliaca (die unter Poupart's Bande Fascia ileo-pectinea heisst), an ihrer inneren Peripherie durch eine Verlängerung der bei den Bauchmuskeln als Fascia Mit dieser Gesässcheide vertransversa berührten Aponeurose gebildet. bindet sich die Fascia lata auf folgende interessante, und für die Anatomie der Schenkelbrüche (Herniae crurales) höchst wichtige Weise. Ein Stück der früher genannten Fascia ischio-pubica, entspringt längs des Pecten ossis pubis, mag somit Fascia pectinea heissen, deckt den Musculus pectineus, geht hinter der Schenkelgestssscheide nach aussen, und verbindet sich mit dem tiefliegenden Blatte der Fascia ileo-sacralis. Ein Stück der Fascia ileo-sacralis nämlich entspringt, einwärts vom Sartorius, am Poupart'schen Bande, und theilt sich in zwei Blätter, von denen das tiesliegende über die Vereinigungsstelle des Psoas- und Iliacus internus hinüber nach einwärts läuft, um theils mit der Fascia ileo-pectinea zu verschmelzen, theils an die Schenkelgesässscheide zu treten. Das hochliegende Blatt dagegen legt sich blos oberflächlich auf die Gefässscheide, von welcher es durch Fett und Zellgewebe getrennt wird, und hört mit einem freien halbmondformig-ausgeschnittenen Rande auf (die Plica falciformis von Allan Burns), dessen oberes Horn an das Poupart'sche Band anhängt, dessen unteres Horn ununterbrochen in die Portio ischio-pubica thergeht. Raum, der zwischen der Plica falciformis und der Fascia ischio-publica

ubrig bleibt, hat eine länglich ovale Form, und wurde von Scarpa Fossa ovalis genannt. Diese Fossa ovalis benützt die extra fasciam verlaufende Vena saphena magna, um durch sie zur Schenkelgesässscheide zu gelangen, welche sie durchbohrt, und in die Vena critralis einmundet. die Plica falciformis auf, so kann man mit dem Finger die Schenkelgesassscheide nach oben verfolgen, und gelangt an ihrer inneren Seite zu jener zwischen dem Gimbernat'schen Bande und den Schenkelgefässen übrig bleibenden Lücke (siehe §. 177), welche blos durch die Fascia transversa (bevor sie zur Gestässscheide tritt), und hinter ihr vom Bauchselle ver-Hat eine Eingeweideschlinge, die einen Schenkelbruch schlossen wird. bilden soll, das Bauchfell und die Fascia transversa hervorgestülpt, und sich dadurch einen Bruchsack gebildet, so wird dieser, wenn der Bruch an Grösse zunimmt, sich auf demselben Wege nach abwärts begeben, durch welchen der Finger nach aufwärts geschoben wurde, und endlich in der Ebene der Fossa ovalis zum Vorschein kommen. Der Bruch hat dann einen Kanal durchwandelt, dessen aussere Oeffnung die Fossa ovalis, dessen innere Oeffnung der Annulus cruralis ist, und dessen Längenaxe mit der Richtung der Schenkelgesässe parallel geht, aber etwas einwärts von ihr liegt. Die Fossa ovalis kann in diesem Falle auch Schenkelöffnung des Schenkelkanals genannt werden, so wie der Annulus cruralis im §. 177 als Bauchöffnung des Schenkelkanals bezeichnet wurde. Es fliesst aus dieser Darstellung (die dem wahren Sachverhalte an Leichen mit und ohne Schenkelhernien entnommen ist), dass ein Mensch, der keinen Schenkelbruch hat, eo ipso keinen Canalis cruralis hat, und dass, wenn ein solcher durch den Verlauf einer Schenkelhernie entsteht, seine Wande folgende sein werden: hintere Wand: Fascia pectinea nach innen, Vagina vasorum cruralium nach aussen; - vordere Wand: fehlt grossentheils, wegen des Ausschnittes der Plica falciformis, und wird oben nur durch das am Poupart'schen Bande befestigte obere Horn der Plica gebildet.

§. 185. Einiges zur Anatomie der Schenkelbrüche.

Man war lange der Meinung, dass der zwischen den Schenkelgestässen und dem inneren Ende des Poupart'schen Bandes (am Tuberculum ossis pubis) besindliche Raum, d. i. der Annulus cruralis, blos durch Bindegewebe verschlossen wäre. Im Jahre 1783 bewies der spanische Wundarzt, Ant. de Gimbernat (Nuevo metodo de operar en la hernia crural, Madrid), die Existenz eines krästigeren Verschlussmittels, indem er die Anhestung eines breiten dreieckigen Fortsatzes des Poupart'schen Bandes am Pecten ossis pubis entdeckte, und die Beziehungen dieses Fortsatzes (der seitdem als Ligamentum Gimbernati, oder dritte Insertion des Poupart'schen Bandes, gilt) zu den Schenkelhernien bestimmte. Das Ligamentum Gimbernati ist eine seste und unnachgiebige sibröse Platte, welche vom inneren

Ende des Poupart'schen Bandes zum Pecten pubis läuft, beim aufrecht stehenden Menschen fast horizontal liegt, seine Spitze gegen das Tuberculum pubis, und seine concave Basis gegen die Austrittsstelle der Schenkelgestasse richtet - ohne sie zu erreichen. Was dem Ligamentum Gimbernati hiezu an Länge fehlt, wird durch ein Stück der Fascia transversa ersetzt, welches den Annulus cruralis (Raum zwischen Gimbernat's Bande nach innen, Vena cruralis nach aussen, Poupart's Band nach vorn, horizontalem Schambeinast nach hinten) schliesst, und deshalb von J. Cloquet Septum crurale, und von Astley Cooper Fascia propria herniae cruralis (weil sie mit dem Bauchfelle zugleich als Bruchsack sich ausstülpt) genannt wurde. Das Septum crurale hat mehrere kleine Oeffnungen, durch welche die an der inneren Seite der Cruralvene heraussteigenden tiefliegenden Lymphgesässe des Schenkels in die Beckenhöhle eindringen. Diese Gesässössnungen werden zuweilen so zahlreich, dass das Septum die Gestalt eines grossmaschigen Gitters annimmt (Malgaigne), und eine oder die andere dieser Oeffnungen hinreicht, wenn sie gehörig ausgedehnt! wird, eine Darmschlinge aus der Bauchhöhle austreten zu lassen, in welchem Falle die Hernia cruralis keinen Ueberzug von der Fascia transversa (und somit keine Fascia propria Cooperi) haben wird. - Schon J. Cloquet bemerkte, dass die Hernia cruralis entweder das ganze Septum transversum ausstülpt, oder nur durch eine Oeffnung desselben hervortritt. Man kann diesen ganz richtigen und erfahrungsmässigen 'Ansichten, noch eine dritte Varietät des Ursprungs der Schenkelhernie hinzusügen. Die Scheide der Schenkelgesässe nämlich ist unter dem Poupart'schen Bande weiter, als im ferneren Verlause durch die Fossa ileo-pectinea. Sie bildet also eine Art Trichter, den die französischen Autoren über Hernienanatomie schon lange als entonnoir anführen, und der in Wilson's Practical and Surgical Anat. pag. 27 als funnel shaped cavity beschrieben und trefflich abgebildet ist. Es ist müglich, und gewiss nicht selten, dass eine Darmschlinge sich in diesen Trichter senkt, ihn allmälig von den Gefässen lospräparirt, und somit seine Hülle, statt vom Septum transversum, von der Gefässscheide erhält. Die englischen Anatomen sprechen nur von dieser Form der Hernien. In der Regel füllt eine Lymphdrüse jenen Raum des breiten Trichtereingangs aus, den die Gesässe frei lassen, und diese Drüse kann, wie ich zweimal zu beobachten Gelegenheit hatte, wenn sie sich abnormer Weise vergrössert und herabrückt, eine Hernia omenti täuschend vorspiegeln.

Die Fossa ovalis (äussere Mündung des Schenkelkanals) setzt dem Vordringen einer Hernie insofern ein Hinderniss entgegen, als sie durch eine fibruse, mit vielen Oeffnungen für die hochliegenden Lymphgefässe und die Vena saphena interna durchbrochene Platte, unvollkommen verschlossen wird, welche an den Umfang der Oeffnung fest anhängt, und von Hesselbach zuerst nachgewiesen, von Thomson aber Fascia cribrosa benannt wurde. Diese Platte ist, streng genommen, nichts Anderes, als ein Stück der Fascia superficialis, welches die Fossa evalis deckt, und mit dem

Rande derselben verwachsen ist. Der Schenkelbruch tritt gewöhnlich durch jene Oeffnung der Fascia cribrosa aus, durch welche die Vena sapkena eintritt, und da diese Eintrittsstelle bald höher, bald tiefer liegt, so wird die Länge des Schenkelkanals von sechs Linien bis fünfzehn Linien variiren. Es kann auch geschehen, dass der Bruch durch mehrere Oeffnungen der Fascia cribrosa zugleich austritt, oder, durch keine derselben gehend, sie in ihrer ganzen Breite in die Höhe hebt. Combinirt man diese Verschiedenheiten mit jenen am Ursprunge (Annulus cruralis) des Schenkelbruchs, so begreift man, dass die Hüllen des Bruches in verschiedenen Fällen verschieden sein können, und dass ein Fall denkbar ist, wo die den Schenkelbruch bildende Darmschlinge, keine andere Hülle als das Bauchfell haben wird, weil sie durch ein Loch des Septum crurale und durch ein Loch der Fascia cribrosa herausging.

Die Erfahrung am Cadaver lehrt, dass, wenn man den Finger durch den Schenkelkanal in das Becken einführt, der Druck, den er durch die aponeurotischen Gebilde erfährt, bei verschiedenen Stellungen der Gliedmasse ein verschiedener ist. Er vermehrt sich bei gestrecktem und abducirtem Schenkel, und wird kleiner bei dessen Zuziehung und halber Beugung (in Hüfte und Knie). Letztere Stellung soll der Schenkel haben, wenn man eine Schenkelhernie zu reduciren sucht, und da die Richtung des Bruches beim Eintritte in den Schenkelkanal (Annulus cruralis), und beim Austritte (Loch in der Fascia cribrosa) einen Winkel bildet, so muss die Richtung des Reductionsdruckes darnach modificirt werden.

Die Einklemmungen des Schenkelbruchs, die durch das Messer gehoben werden müssen, und die niemals krampshasten Ursprungs sein können, kommen am Anfange oder am Ende des Schenkelkanals vor. In letzterem Falle, wo die Einklemmung durch die Lücke der Fascia cribrosa bedingt wird, ist die Hebung derselben leicht, und ohne Gefahr einer Verletzung wichtiger Gefässe auszusühren. Sitzt die Einklemmung hingegen im Annulus cruralis, so wurde durch einen nach aussen gerichteten Erweiterungsschnitt die Arteria epigastrica verletzt werden, weshalb in dieser Richtung nie erweitert werden darf. Die Erweiterung nach innen, durch Einschneidung des Gimbernat'schen Bandes, und die nach oben durch Einschneidung des Poupart'schen Bandes, sind nur in jenen Fällen gefahrlos, wo die Arteria obturatoria aus der Arteria hypogastrica, also normal, entspringt, und ohne mit dem Annulus cruralis in nähere Berührung zu kommen, an der Seitenwand des kleinen Beckens zum Canalis obturatorius Entspringt sie dagegen aus der Arteria cruralis, oder aus der Arteria epigastrica, unter dem Poupart'schen Bande (was nach Scarpa unter zehn Fällen, nach J. Cloquet unter vier Fällen einmal geschieht), so schlingt sie sich um die obere und innere Seite des Bruchsackhalses herum, und die Schnitte nach oben und nach innen können sie treffen. Nur durch grosse Vorsicht, und durch mehrere kleinere Einschnitte, statt eines tieferen, und durch deren unblutige Erweiterung, ist die Gefahr zu

umgehen. Verpillat's Vorschlag, in keiner der genannten Richtungen, sondern direct nach unten, durch Einschneiden des Ligamentum pubicume Cooperi, die Einklemmung des Schenkelbruchhalses zu heben, verdient um so mehr Beachtung, als das Ligamentum pubicum mit dem Gimbernat'schen ununterbrochen zusammenhängt, und eine Trennung des ersteren, welche durch keine Gefässanomalie gefährdet wird, eine Abspannung des letzteren, und somit Lösung der Einklemmung, nothwendig herbeiführt.

Die Literatur über die Anatomie der Schenkelhernien ist theils in jener über die Leistenhernien (§. 150) enthalten, theils in folgenden Specialabhandlungen zu suchen: R. Liston, On the Formation and Connexions of the Crural Arch. Edinb., 1819. 4. — W. Lawrence, Abhandlung von den Brüchen, nach der dritten engl. Originalausgabe übersetzt von Busch. Bremen, 1818. — G. Breschet, sur la hernie femorale. Paris, 1819. 4. — J. B. Demeaux, recherches sur l'évolution du sac herniaire, avec 8 planches. Paris, 1842. — E. Kirchner, Lehre von den Unterleibsbrüchen. Hamburg, 1842. Mit 5 Tafein. — W. Linhart, über die Schenkelhernie. Erlangen, 1852.

§. 186. Binde des Unterschenkels und des Fusses.

Die Fascia lata wird in der Gegend des Knies durch Aufnahme ringformiger Schnenfasern, welche vom Ligamentum intermusculare externum stammen, bedeutend verstärkt, deckt hinten die Fossa poplitea, und adhärirt vorn an die Kuiegelenkkapsel, die Seitenbänder des Knies und die Condyli femoris, bekommt von den Sehnen der Unterschenkelbeuger ansehnliche Verstärkungen, und wird zur Binde des Unterschenkels. Diese macht keine vollständige Kreistour um die Muskeln des Unterschenkels herum, sondern lässt die innere Fläche des Schienbeins unbedeckt. — Der die Wadenmuskeln umhüllende Theil der Binde heisst Fascia suras. Er ist in ein hoch- und tiefliegendes Blatt gespalten. Das letztere geht. straff gespannt, vom inneren Winkel des Schienbeins zum hinteren Winkel des Wadenbeins, und bildet die Scheidewand zwischen der hoch- und tiefliegenden Musculatur an der hinteren Seite des Unterschenkels. vorderen Seite des Unterschenkels werden der Tibialis anticus, Extensor hallucis und Extensor digitorum longus, von den beiden Wadenbeinmuskeln durch die Insertion der Binde an der vorderen Wadenbeinkante getrennt. Die Binde ist gewöhnlich in der ganzen Länge dieser Gegend sehr stark, und dient in ihrer oberen Hälfte selbst dem Muskelsleische zum Ur-Eine Hand breit über dem Sprunggelenk wird sie durch Querfasern, welche von der Crista tibiae zur Crista fibulae laufen, gekrästigt, und nimmt den Namen Ligamentum transversum an. Am Sprunggelenke selbst bildet sie vorn das Ligamentum cruciatum s. annulare anterius, innen das Ligamentum laciniatum s. annulare internum, und aussen das Retinaculum tendinum peroneorum s. annulare externum, — deren Verhältniss zu den Sehnen der über das Sprunggelenk zum Fusse weglaufenden Muskeln schon oben geschildert wurde, und geht in die Binde des

Fusses über, welche in eine Fussrücken- und Sohlenbinde zerfällt. Erstere (Aponeurosis dorsalis pedis) ist dünn und schwach, hestet sich an die Seitenränder des Fusses, und bildet drei Lagen, welche auf, zwischen und unter den Sehnen der Zehenstrecker sich verbreiten; letztere (Aponeurosis plantaris) ist der stärkste Theil der ganzen sehnigen Binde der unteren Extremität. Sie ist in der Mitte der Sohle am dicksten, und an der Tuberositas calcanei, wo sie fest adhärirt, eine Linie und darüber stark. Die Seitentheile derselben verdünnen sich, und hesten sich an die Ränder des Fusses; wo sich die Fussrückenaponeurose befestigt. Zwei Scheidewände, welche in die Tiefe der Sohle eindringen, theilen die Muskeln des Plattsusses in drei Gruppen, und verweben sich mit einem sehnigen Blatte, welches unmittelbar an den Knochen des Fusses anliegt, und die untere Fläche der Musculi interossei überzieht. Gegen die Zehen zu wird die Aponeurosis plantaris breiter und dünner, und spaltet sich vor den Capitulis ossium metatarsi in funf Schenkel, welche theils an die Scheiden der Beugesehnen treten, theils mit den Querbändern der Köpschen der Mittelfussknochen sich verweben.

Die Stärke und Unnachgiebigkeit der sehnigen Binde der unteren Extremität erklärt die hestigen Schmerzen, welche bei entzundlicher Anschwellung tief gelegener Organe nothwendig entstehen müssen, macht die grossen Zerstörungen begreislich, welche tiesliegende Abscesse veranlassen, und rechtfertigt den frühzeitigen Gebrauch des Messers zur Eröffnung derselben. Die Aponeurosis plantaris wirkt, ausser dass sie die tiesen Gestsse und Muskeln beim Gehen gegen Druck in Schutz nimmt, zugleich als Band, um die Wölbung des Fusses ausrecht zu erhalten, und kann, wenn sie in Folge ursprünglicher Bildungssehler zu kurz ist, abnorme Krümmung des Fusses bedingen, deren Beseitigung eine subcutane Trennung der Aponeurose erheischt.

§. 187. Literatur der Muskellehre.

Nach Galen's Berichten hat Lycus zuerst über die Muskeln geschrieben, und eine grosse Anzahl derselben entdeckt. Rufus von Ephesus belegte einige Muskeln mit besonderen Namen, während die meisten von Galen und seinen Nachfolgern blos durch Zahlen von einander unterschieden wurden. Jacob Sylvius, Professor der Medicin am Collège royal de France (1550) bildete aus der griechischen Sprache die meisten Muskelnamen, welche jetzt noch üblich sind.

- B. S. Albini, historia musculorum hominis. Lugd. Bat., 1734—1736. 4. Spätere Auflagen: 1784, Frankfurt und Leipzig. 1796, Bamberg u. Würzburg.
- Ejusdem tabulae sceleti et musculorum hom. Lugd. Bat., 1747. fol.
- B. Sandifort, descriptio musculorum hom. Lugd. Bat., 1781. 4.
- J. G. Walter, myologisches Handbuch zum Gebrauch derjenigen, die sich in der Zergliederungskunst üben. 2. Aufl. Berlin, 1784. 8.
- J. Quain, The Muscles of the Human Body. London, 1836. fol.
- J. C. M. Langenbeck, icones anat. Myologiae tab. XXVIII. Gött., 1838. fol.
- J. B. Günther und J. Milde, die chirurgische Muskellehre in Abbildungen. Hamburg, 1839. 4.

S. T. Sömmerring, Lehre von den Muskeln und Gestssen. Herausgegeben von Theile. Leipzig, 1841. 8.; durchaus genaue, und auf eigene Untersuchungen gestützte Beschreibungen, mit zahlreichen Angaben über Muskelvarietäten.

Ueber die Muskeln einzelner Gegenden handeln:

- D. C. Courcelles, icones musculorum capitis. Lugd. Bat., 1743. 4. Ejusdem icones musculorum plantae pedis. Amstel., 1760. 4.
- D. Santorini, observ. anat. Venet. 1714. 4. Reich an sorgfältigen Beobachtungen über die kleineren Muskeln des Gesichts, des Kehlkopfes, und der Genitalien.
- J. Heilenbeck, de musculis cervicis et dorsi comparatis. Berol., 1836.
- A. Fr. Walter, anatome musculorum teneriorum corp. hum. Lips., 1731. 4.
- F. W. Theile, de musculis rotatoribus dorsi. Bernae, 1838. 4. Desselhen: Ueber den Triceps brachii und den Flexor digit. sublimis. Müller's Archiv. 1839. pag. 420.
- R. B. Sabatier, sur le mouvement des côtes, et sur l'action des muscles intercostaux, in den mém. de l'acad. de scienc. Paris, 1778.
- A. Haller, de musculis diaphragmatis, in dessen Opp. minor. Vol. 1.
- P. Camper, de fabrica brachii, in dessen Demonstr. anat. pathol. Amstel., 1760. fol.
- J. B. Winslow, observations sur la rotation, la pronation, la supination etc. in den mém. de l'acad. de Paris, 1729.
- Desselben, remarques sur le muscle grand dorsal, et ceux du bas ventre, in den mém. de l'acad. de Paris, 1726.
- A. Thomson, sur l'anatomie du bas ventre. 1. livr. Paris.
- G. Ross, die Extremitäten des menschlichen Körpers, ein chirurg. anat. Versuch, in Oppenheim's Zeitschrift 26. und 31. Bd.
- Langer, über die Achselbinde und ihr Verhältniss zum Latissimus dorsi, in der österr. med. Wochenschrift. 1846.
- E. Dursy, Beiträge zur Kenntniss der Muskeln, Bänder, und Fascien der Hand. Heidelb., 1852.

Unter den Gesammtwerken über die Anatomie, welche der Muskellehre eine besondere Aufmerksamkeit widmen, zeichnet sich vor allen: Winslow's Exposition anatomique de la structure du corps humain. Amstelod., 1752.

4., aus, wo dem Mechanismus der Muskeln ein eigener sehr lehrreicher Abschnitt gewidmet ist.

Ueber Muskelvarietäten handeln:

- A. Fr. Walter, observationes novae de musculis. Lips., 1733. 4.
- A. Haller, observationes myologicae. Götting., 1742. 4.
- J, F. Isenflamm, de musculorum varietatibus. Erlang., 1765. 4.
- J. G. Rosenmüller, de nonnullis musculorum varietatibus. Lips., 1804. 4. und in Isenflamm's und Rosenmüller's Beiträgen für die Zergliederungskunst. Leipzig, 1800. 1. Bd.
- F. L. Gantzer, diss. musculorum varietates sistens. Berol., 1813. 4.
- W. G. Kelch, Beiträge zur pathol. Anatomie. Berlin, 1813. 8.
- H. J. Sels, diss. musculorum varietates sistens. Berol., 1815. 8.
- G. Fleischmann, anat. Wahrnehmungen über noch unbemerkte Varietäten der Muskeln, in den Abhandlungen der phys. med. Societät in Erlangen. 1. Bd. Frankfurt a. M., 1810.

- Moser, Beschreibung mehrerer Muskelvarietäten. In Meckel's Archiv. VII. Bd. Benedek, dissertatio de lusibus naturae praecipuis in disponendis musculis faciei. Vindob., 1836. 8.
- C. H. Hallett, An Account of the Anomalies of the Muscular System etc. Edinb., 1847.
- W. Gruber, Abhandlungen aus dem Gebiete der med. chir. Anatomie. Berlin, 1847 (Omohyoideus, Sternocleidomastoideus, Cucullaris), und in seinen anat. Abhandlungen. Petersburg, 1852. pag. 121.
- A. Nuhn, Beobachtungen aus dem Gebiete der Anatomie etc. Heidelberg, 1850. fol. (Anomalien von Muskeln und Gefässen).
- In F. Meckel's pathol. Anatomie, und dessen Handbuch der menschlichen Anatomie, 2. Band, finden sich zahlreiche Angaben über Muskelspielarten.

Ueber Schleimbeutel:

- Ch. M. Koch, diss. de bursis tendinum mucosis. Lips., 1789. 4.
- A. Monro, A Description of all the Bursae Mucosae of the Human Body. Edinb., 1788. fol. Deutsch von Rosenmüller. Leipzig, 1799. fol.
- E. Gerlach, de bursis tendinum mucosis in capite et collo reperiundis. C. tab. Viteb., 1793. 4.
- N. G. Schreger, de bursis mucosis subcutaneis. Erlang., 1825. fol.

Praktische Zergliederung der Muskeln.

- J. F. Cassebohm, methodus secandi musculos. Halae, 1739. 8. Deutsch, Halle, 1740.
- F. M. Duvernoy, myotomologie, ou l'art de disséquer méthodiquement les muscles du corps humain. Paris, 1749. 12.

Ueber Aponeurosen und topographische Anatomie handeln die in der allgemeinen Literatur angeführten Werke über chirurgische Anatomie, und über die Beziehungen der äusseren Form zum Muskelsystem die Werke über plastische Anatomie.

- J. H. Lavater, Anleitung zur anatom. Kenntniss des menschlichen Körpers für Zeichner und Bildhauer. Zürich, 1790. 8.
- J. G. Salvage, anatomie du gladiateur combattant. Paris, 1812. fol.
- P. Mascagni, anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura. Firenze, 1816. fol. Prachtwerk.

VIERTES BUCH.

Sinnenlehre.

,		

§. 188. Begriff der Sinneswerkzeuge und Eintheilung derselben.

Organe oder zusammengesetzte Apparate, welche von aussen kommende Einslüsse - Reize - aufnehmen, und vermittelst der Empfindung. die sie veranlassen, zum Bewusstsein bringen, heissen Sinnes werkzeuge. und jener Zweig der Anatomie, der sich mit ihrer Untersuchung beschäftigt, Sinnenlehre, Aesthesiologia. Empfindungen, und durch diese, Vorstellungen anzuregen, ist die gemeinsame physiologische Tendenz aller Sinneswerkzeuge; die Art der Empfindung dagegen in jedem einzelnen eine verschiedene. Da die Empfindung blos ein zum Bewusstsein gelangter Erregungszustand eines Nerven ist, so ist eine für die Aufnahme eines äusseren Eindruckes zweckmässig organisirte Nervenausbreitung, anatomische Grundbedingung aller Sinnesorgane. Dem Wesen nach ist somit jedes Sinneswerkzeug nur eine besonders modificirte Nervenendigung, und die Sinnenlehre ein Theil der Nervenlehre. Da jedoch die organischen Vorrichtungen, durch welche die äusseren Eindrücke auf das peripherische Nervenende geleitet werden, bei gewissen Sinnen sehr complicirt erscheinen, und eine eigene Darstellung erfordern, so bilden die Sinneswerkzeuge mit Recht das Object einer besonderen Lehre der beschreibenden Anatomie. Sie als sensitive Eingeweide in die Splanchnologie auszunehmen, erlauben die anatomischen Verhältnisse des Tastorgans nicht, welches, als an der äusseren Oberstäche des Leibes gelegen, unmöglich den Eingeweiden einverleibt werden kann.

Die Sinneswerkzeuge werden in die einfachen und zusammengesetzten eingetheilt. Erstere sind das Tast-, Geruchs-, und Geschmacksorgan, letztere das Seh-, und Hörorgan. Bei jenen trifft der äussere Eindruck die sensitive Nervenausbreitung direct, bei diesen kann er nur durch die Vermittlung besonderer Vorrichtungen, die ihn leiten, dämpsen, oder verstärken, auf sie wirken. Alle Sinneswerkzeuge sind paarig, oder wenigstens symmetrisch unpaar, und nehmen, mit Ausnahme des Tastorgans, die am Gesichtstheil des Kopses für sie bereiteten Höhlen ein, um, wie der Geruchs- und Geschmackssinn, über den Eingängen des Leibes zu wachen, oder, wie der Gehörs- und Gesichtssinn, möglichst freien Spielraum, und leichte Zugänglichkeit zu gewinnen.

Die Sinneswerkzeuge bilden das Band, welches die Seele des Menschen an die körperliche Welt knüpst, geben den ersten Impuls zu seiner intellectuellen Entwicklung, erregen seinen Geist, und bereichern ihn mit Vorstellungen und Begriffen. (Nihil est intellectu, quod non prius suerit in sensu.) Wir ersahren durch die Sinne zunächst nur einen gewissen Erregungszustand gewisser Nerven, nicht die Qualität eines äusseren Einstusses. Da jedoch derselbe Erregungszustand des Sinnesnerven sich so ost wiederholt, so ost derselbe äussere Einstuss wiederkehrt, so sind wir durch Gewohnheit dahin gelangt, die durch die Sinne zum Bewusstsein gebrachten Eindrücke, als Attribute der Körper ausser uns zu nehmen, und Farbe, Ton, Geruch als etwas Objectives auszusassen, obwohl diese Worte nur das Bewusstsein eines subjectiven Zustandes ausdrücken. — Der Geschmackssinn wird nicht hier, sondern in der Eingeweidelehre §. 227 abgehandelt.

A. Tastorgan.

§. 189. Begriff des Tastsinnes.

Das allen organischen Gebilden, mit Ausnahme der Horngewebe, in verschiedenem Grade zukommende, durch die Gegenwart sensitiver Nerven vermittelte Empfindungsvermögen, entwickelt sich in der Haut zum Tastsinn, der uns über die mechanischen Eigenschaften der Körper der Aussenwelt, Gestalt, Schwere, Cohasion etc. belehrt. Die Haut tritt somit in die Reihe der Sinnesorgane, obwohl ihr noch eine Menge Nebenbestimmungen zukommen. Das Vermögen der Haut zu empfinden, hängt von der Menge und Feinheit ihrer sensitiven Nerven ab, deren durch verschiedene äussere Einflüsse hervorgerusener Erregungszustand, die grosse Verschiedenheit von Gefühlen bedingt, welche zwischen Schmerz und Wollust liegen. Dieses Empfindungsvermögen ist jedoch noch kein Tastsinn. Um zu letzterem zu werden, wird die Muskelthätigkeit in Anspruch genommen. Die blosse Berührung eines äusseren Körpers erregt kein Tastgefühl, und verschafft uns höchstens eine Vorstellung von der Grösse des Druckes, welchen ein schwerer Körper auf die Haut ausübt. Zur Bestimmung der Ausdehnung, Form, Härte, Beschaffenheit der Oberstäche eines Körpers, muss eine mit hoher Empfindungssähigkeit begabte Hautpartie - wie am tastenden Finger - durch Muskelwirkung an der Oberstäche des zu betastenden Körpers herumgeführt, und an ihn angedrückt werden. Wir werden der Grösse der Muskelanstrengung, welche hiezu erforderlich ist, bewusst, combiniren dieses Bewusstsein mit der durch die einfache Berührung entstandenen Gefühlsperception, und gelangen auf diese Weise zu einer sehr genauen Vorstellung über die mechanischen Eigenschaften eines Körpers. Der Tastsinn bildet mithin den natürlichen Uebergang von der Muskel- zur Sinnenlehre.

§. 190. Structur der Haut. Tastwärzchen.

Die Haut des menschlichen Leibes (Integumentum commune) besteht aus drei in anatomischer und vitaler Beziehung sehr verschiedenen Schichten,

welche von aussen nach innen als Oberhaut, Lederhaut und Unterhaut-Bindegewebe auf einander folgen. Nur die mittlere - die Lederhaut, Derma, Cutis, - erscheint als Träger und Vermittler der Tastempfindungen, und wird deshalb vor den übrigen abgehandelt. Sie besteht aus äusserst feinen und kurzen, in allen möglichen Richtungen sich kreuzenden Zellstossbündeln, welche so dicht in einander versilzt sind, dass der Schnittrand der Haut, mit freiem Auge gesehen, vollkommen glatt und homogen erscheint. Erst durch sorgfältige Entwirrung eines kleinen Stückchens dieses Hautfilzes, mittelst seiner Nadeln auf einer Glasplatte, erkennt man bei grossen mikroskopischen Vergrösserungen die faserige Textur der Lederhaut, welche im gegerbten Zustande auch ohne Hilfe des Mikroskops gesehen wird. In den tieferen Schichten der Haut werden den Zellstofffibrillen noch gewundene, hin und wieder selbst spiral geschlängelte, elastische Fasern beigemengt. Glatte Muskelfasern finden sich ebenfalls in ihr vor, und zwar nur an solchen Hautstellen, welche behaart sind. Diesen Muskelfasern verdankt die Haut ihre lebendige Zusammenziehungsfähigkeit, welche durch Einwirkung von Kälte, und bei gewissen Verstimmungen des Nervensystems, als sogenannte Gansehaut, Cutis anserina, in die Erscheinung tritt. Man kann die Cutis anserina auch künstlich hervorrusen, wenn man die Pole eines magneto-elektrischen Apparates auf die beseuchtete Haut eines lebenden Menschen applicirt. Der eigentliche Vorgang bei der Entstehung der Cutis anserina ist der, dass die von den obersten Schichten der Haut in tiefere eindringenden glatten Muskelfasern, sich an die Haartaschen besestigen, diese somit gegen die freie Fläche der Haut emporheben, wodurch ihre Mündungsstellen vorspringender werden, ungefähr wie die zahlreichen kleinen Hügel, welche man an der Haut gerupfter Gänse sieht. - Die Haut hängt mit den Fascien der Muskeln durch Faserbundel zusammen, deren Dehnbarkeit, Länge und Dicke, mit der Faltbarkeit der Haut im Verhältnisse steht. Diese Bündel, welche das Unterhaut-Zellgewebe durchsetzen müssen, um auf eine Fascie zu treffen, bilden geräumige Maschen von verschiedener Grösse, in welchen die Fettcysten des Unterhaut-Zellgewebes eingeschaltet werden. Jedes dieser Bündel bildet eine Art Haltband für die Haut, und nimmt dort, wo die Haut nicht in Falten aufgehoben werden kann, sehnigen Charakter an (Handteller, Plattfuss, behaarte Kopfhaut). An gewissen Stellen der Haut erscheinen sie kurz, straff, und mehrere neben einander liegende verschmelzen zu breiten Streisen, welche die Haut noch inniger an die tieferen Fascien hesten, und durch den Zug, den sie auf jene ausüben, rinnensormige Vertiesungen - Furchen - erzeugen, welche im Gesichte, in der Hohlhand, am Carpus, an den Beug- und Streckseiten der Finger und Zehengelenke, und bei settleibigen Personen (besonders Kindern) an der inneren und hinteren Seite des Knies sehr markirt erscheinen. Diese Furchen machen die Streckung der Haut ohne Zerrung möglich, und verhüten beim Beugen eine zusällige, mit Knickung und Einklemmung verbundene Faltung derselben. Von die

Furchen sind jene zu unterscheiden, welche temporär durch die Wirkung der subcutanen Muskeln entstehen (an der Stirne, im Gesichte, am Hodensack, am Ballen des kleinen Fingers), sich während der Ruhe des Muskels wieder ausgleichen, und erst mit den Jahren zu bleibenden Runzeln werden. Ueberdies ist die ganze äussere Fläche der Haut durch unregelmässig gekreuzte, kleinere Furchen oder Einschnitte wie facettirt, uud verliert dieses gewürfelte Ansehen nur durch hohe Ausdehnungsgrade bei Wassersuchten, wo sie glatt, weiss, und glänzend wird.

Die Dicke der Lederhaut ist an verschiedenen Körperstellen sehr verschieden. Es kann als Gesetz gelten, dass die behaarte Kopshaut, die Haut an der Streckseite des Stammes und der Gliedmassen, derher und dicker ist, als am Gesichte und an den Beugeseiten der Gelenke, wo sie sich so verdunnt, dass subcutane Gestsse durch sie durchscheinen (Leistengegend, Brüste, Hodensack, Wangen, Augenlider etc.). Wo sie Gruben bildet, oder in tiefe Spalten einsinkt, wie in der Achsel, am Mittelsleisch, am Asterrande, wird sie durch Wärme und Hautausdünstung fortwährend gebäht, und erhält dadurch einen Grad von Empfindlichkeit, der den durch häufigen Druck abgestumpften Hautpartien des Gesässes und des Rückens abgeht. — Das Gesetz, nach welchem sich die Fasern des Hautfilzes kreuzen, ist noch nicht bekannt, und scheint überhaupt an verschiedenen Hautstellen bedeutenden Modificationen zu unterliegen. Die Gestalt, welche eine an verschiedenen Punkten durch dasselbe Instrument erzeugte Hautwunde annimmt, könnte über diese Frage, und über das Vorwalten einer bestimmten Spannungsrichtung Aufschluss geben. Nach den Versuchen von Filhol, Dupuytren, Malgaigne, hat eine, mit einem konischen Pfriemen erzeugte Stichwunde, nie eine runde, sondern eine winkelig verzogene, longitudinale oder dreieckige Gestalt, nach Verschiedenheit der Wundstelle. Selbst an sehr nahe gelegenen Punkten variirt die Form der Stichwunde bedeutend, und folgt nur an den Extremitäten der Längenaxe derselben.

Die Zusammenziehungssthigkeit ist die sür den Wundarzt wichtigste Lebenseigenschaft der Haut. Sie erklärt ihm die successive Verkleinerung grosser Hautwunden (z. B. nach Amputationen der weiblichen Brust) durch allmälige Zusammenschiebung der ganzen, den Wundrand bildenden Hautpartie, — die sternsürmig convergirenden Faltungen der Haut, nach der Anwendung des Glüheisens und der Moxen, — die bedeutende Zurückziehung der Haut bei Amputationen (so dass es ihm Regel geworden, die Haut tieser als die Muskeln zu durchschneiden, um die zur Deckung der Wunde nöthige Haut zu ersparen), — das Klassen der Wundränder überhaupt, — und die Nothwendigkeit der Anlegung der Näthe. An den letzten beiden Erscheinungen hat jedoch die physische Elasticität der Haut ebensalls bedeutenden Antheil, welche sich auch nach dem Tode erhält, indem ein kreissörmiges, an der Leiche ausgeschnittenes Hautstück die Lücke nicht mehr ausfüllt, die durch seine Wegnahme entstand.

Grössere Hautverluste ersetzen sich nie durch Regeneration der Haut. Sie werden nur durch die allmälig von Statten gehende Zusammenziehung der Wundränder, und durch das neugebildete blutarme Narbengewebe ersetzt, welches in anatomischer und physiologischer Beziehung vom normalen Hautgewebe verschieden ist, indem es zwar wie die Haut aus Bindegewehfasern in allen möglichen Entwicklungsstadien besteht, aber weder Schweiss- noch Talgdrüsen enthält, und niemals Tastwärzchen erzeugt.

Zahlreiche Gesässe und Nerven dringen durch die seinen Maschen des Faserfilzes gegen die freie Oberfläche der Cutis vor, um in den Bau der Tastwärzchen, Papillae tactus, einzugehen, mit welchen die Haut wie besätet ist, und deren Summe als eine eigene Schichte der Haut genommen, und als Corpus s. Stratum papillare bezeichnet wird. Sie sind jedoch kein eigenthümliches Attribut der äusseren Haut, sondern finden sich auch an gewissen Schleimhäuten, welche dadurch für Tastgefühle empfänglich werden: Schleimhaut der Augenlider, der Zunge, der grossen und kleinen Schamleszen, des Scheideneinganges, und des Gebärmuttermundes. Die Verbreitung der Tastwärzchen ist keine gleichförmige. An der Tastfläche der Finger, an den Lippen, an der Eichel, an den kleinen Schamlefzen der Weiber, sind sie dicht gedrängt, und erscheinen länger, als an minder empfindlichen Stellen. An der Brustwarze und Eichel stehen sie in Gruppen oder Inselchen von 4-10 gehäuft. An der Volarseite der Fingerspitzen stehen sie in gekrümmten, concentrisch verlaufenden Linien oder Riffen, welche Ellipsen bilden (die sogenannten Tastrosetten), deren lange Axe am Daumen und Zeigefinger mit der Längenaxe des Fingers übereinstimmt, an den übrigen Fingern gegen den Ulnarrand abweicht. Die Gestalt der Tastwärzchen entwickelt sich vom kaum merkbaren Höckerchen (Haut des Rückens) bis zu einem eine halbe Linie hohen Kegel mit abgerundeter Spitze (Ballen der grossen Zehe), oder zu einer schlanken. fast fadenformigen Papille, von noch grösserer Länge (Ballen der Ferse). An gewissen Orten, z. B. im Handteller, theilt sich das freie Ende der Tastwärzchen in mehrere Spitzen, wodurch die zusammengesetzten Formen derselben bedingt werden. Jede Tastwarze besteht aus demselben faserigen Grundgewebe, wie die Cutis (nur nehmen die Bindegewebbündel mehr parallele und zugleich longitudinale Richtung an, und werden, gegen die Axe der Tastwarze zu, von elastischen Fasern in verschiedenen Entwicklungsstufen gekreuzt). An vielen Tastwärzchen bemerkt man noch als äussere Hülle derselben einen structurlosen Saum.

Zu jeder kleineren Papille tritt eine capillare Arterie, welche unverästelt in ihr aufsteigt, um als Vene zurückzukehren — Gefässschlinge der Warze. Nur an grösseren Wärzchen treten mehrere Arterien in die Basis derselben ein, und kehren wohl auch nicht durch einfaches Umbiegen in eine Vene zurück, sondern wiederholen das Auf- und Niedersteigen zwei bis drei Mal. Letzteres Verhalten trifft man besonders an den zusammengesetzten Formen der Tastwärzchen.

Ueber die Nerven der Tastwärzchen disserien die Angaben der gewandtesten Beobachter. Wagner spricht nur jenen Tastwärzchen Nerven zu, welche die von ihm und Meissner ausgesundenen Tastkörperchen enthalten (§. 62). Die übrigen sollen nur Gesässschlingen besitzen. Kölliker dagegen berust sich auf die allbekannte Schwierigkeit der mikroskopischen Untersuchung der seinsten Tastnerven, und hält es bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Mikrotomie der Haut nicht an der Zeit, den

Papillen, welche keine Tastkörperchen enthalten, die Nerven abzusprechen. Ueber die eigentliche Endigungsweise der Nerven in den Papillen stehen sich die Ansichten der genannten Autoritäten gleichfalls feindlich gegenüber. Wagner lässt die feinsten Tastnerven in seine Tastkörperchen eindringen, und daselbst enden (unbestimmt wie), während Kölliker sie nur an den Seiten der Tastkörperchen geschlängelt, und Meissner in Spiralen um die Oberstäche derselben herumlausen lässt. Das eigentliche Ende derselben ist noch nicht ermittelt. Gerlach nimmt Endschlingen an.

Die Papillae tactus werden durch Entfernung der Epidermis mittelst Abbrühen der Beobachtung zugänglich. Zur mikroskopischen Untersuchung ihres Baues müssen feine Durchschnitte der Haut mit Essigsäure beseuchtet, oder mit concentrirter Natronlösung behandelt werden. — Ein merkwürdiges Verhalten zeigen die Gesässe der unter dem Nagel in Längenreihen gelagerten Tastwärzchen. Das arterielle Gefäss, welches zu der ersten Papille einer Warzenreihe tritt, geht, nachdem es die einsache Ansa vascularis gebildet, zur zweiten, zur dritten und so fort, und es ist somit der absteigende Schenkel einer Ansa nicht als Vene zu nehmen. Die von Gerber aufgefundenen Verknäuelungen der Nerven in den Papillen (Tastrosetten), welche durch feine, getrocknete, und dann mit Terpentinöl beseuchtete Schnitte der Haut (wodurch die Nervensubstanz milchweiss gefärbt wird) zur Anschauung gebracht werden, sind wohl wahre Tastkörperchen. - Die auf den Fingern und auf dem Rücken der Hände bei jungen Individuen häufig vorkommenden, und oft von selbst wieder vergehenden Warzen (Verrucae), enthalten mehrere, 3-4mal verlängerte, und an ihrem Ende kolbig verdickte Tastwärzchen.

§. 191. Drüsen der Haut.

a) Talgdrüsen, Glandulae sebaceae. Um den als Epidermis später zu beschreibenden, feinen, hornigen Ueberzug der Haut, und die in der Haut wurzelnden Hornsäden (Haare) gegen die Einwirkung der äusseren Lust und des Schweisses zu schützen, sie geschmeidig zu machen, und ihre Dauerhastigkeit zu vermehren, werden diese Gebilde mit einer fetten Salbe beölt, welche in den Talgdrüsen der Haut bereitet, und durch deren Ausführungsgänge als sogenannte Hautschmiere oder Hauttalg, Sebum s. Smegma cutaneum, an die Obersläche des Integuments geschasst wird. Nur der Handteller, die Sohle, die Dorsalstäche der zweiten und dritten Phalangen, und die Haut des männlichen Gliedes (ohne dessen Wurzel) entbehren der Talgdrüsen. Ihre Gestalt geht vom einfachen keulen- oder birnstrmigen Schlauche (wie am Rücken) in eine mehrsach zellig ausgebuchtete Höhle über (an der Nase, den Lippen, am Umfange des Asters), welche sich, über das Fasergewebe der Cutis hinaus, bis in das darauf folgende Unterhautzellgewebe erstreckt. Ihre innere Oberstäche ist mit einer dunnen Schichte Epidermiszellen bekleidet, welche gelegentlich abfallen, und mit dem fetten Drüsensecrete ausgeleert werden. Ihre Ausführungsgange, deren Dicke zwischen 0,10" und 0,06" variirt, münden entweder frei an der Oberstäche der Epidermis (Hodensack, kleine Schamleszen, hintere Kante des Augenlidrandes), oder senken sich in einen Haarbalg ein, der zwei bis fünf solcher Ausführungsgänge aufnehmen kann. Jene Stellen der Haut, die häufiger mit scharfen Feuchtigkeiten in Berührung kommen, also alle Körperöffnungen, sind mit zahlreichen und grossen Drüsen dieser Art umgeben, welche besondere Namen führen, und an den betreffenden Gegenden besonders erwähnt werden.

Bei gewissen Thieren erreichen sie an bestimmten Stellen einen sehr grossen Umfang, und besitzen sehr complicirte Structur. Ihr Secret besteht aus fetthaltigen Zellen, mit abgestossenen Epidermiszellen gemischt, öfters noch aus Pigmentkörnern (Henle), und ist zuweilen mit winzigen Oktaëdern oder vierseitigen Prismen mit ähnlichen Zuspitzungspyramiden (Stearinkrystallen) gemengt. Es enthält überdies noch einen flüchtigen, specifisch riechenden Stoff, dessen copiösere Absonderung, wenigstens bei Thieren, mit der periodischen Steigerung des Geschlechtslebens in Verbindung steht. Werden die trichterformigen Ausmündungsstellen einzelner Talgdrüsen durch Staub und Schmutz, oder durch ein dickeres, mit vielen Epithelialzellen gemischtes Smegma verstopft, so sammelt sich der Inhalt an, dehnt die Wand des Drusenschlauches zu einem grösseren Beutel aus, welcher, wenn er comprimirt wird, seinen Inhalt als weissen geschlängelten Faden mit schwarzem Kopfe herausschiesst, der vom gemeinen Manne für einen Wurm (Mitesser, Comedo) gehalten wird. Mundete die Talgdruse in einen Haarbalg ein, so kann auch dieser durch die Ansammlung des eingedickten Smegma erweitert werden, und zuletzt mit der erweiterten Talgdrüse zu Einer Höhle verschmelzen, in welcher man einen Rest des abgestorbenen Haares als geraden Schaft, das neugebildete Haar (welches durch die verkleisterte Oeffnung des Haarbalges nicht mehr herauskonnte) als zusammengebogenes Härchen antrifft. -Simon entdeckte eine, in dem Inhalte der Mitesser und gesunder Talgdrüsen, parasitisch lebende, winzige Milbe, den Acarus folliculorum, und Erdl eine zweite verschiedene Art derselben; abgebildet in Vogel's Erläuterungstafeln zur pathol. Histologie, Tab. XII. Ich fand bei Katzen den äusseren Gehörgang zur Sommerszeit von vollkommen entwickelten Acaris wimmeln. Der Acarus folliculorum des Menschen wird am besten gesehen, wenn man sich die Talgdrüsen des eigenen Nasenflügels mit den Fingernägeln ausdrückt, das weisse, dickliche Sebum mit etwas Olivenöl zwischen zwei dunne Glasplättchen bringt, und dieselben einigemal auf einander verschiebt, wodurch das Sebum auf eine grössere Fläche vertheilt, und die etwa in ihm vorhandenen Acari bei einer Vergrösserung von 200 ganz leicht aufgefunden werden. Die zuweilen schnappende, gewöhnlich aber nur träge Bewegung ihrer Krallenfüsse, führt den Anfänger zuerst auf ihre Gegenwart.

b) Schweissdrüsen, Glandulae sudoriferae. Die Mündungen der Schweissdrüsen waren schon älteren Anatomen bekannt, wurden aber seit Haller für die Endöffnungen fingirter aushauchender Gefässe gehalten. Purkinje's und Breschet's fast gleichzeitigen Forschungen verdanken wir die Kenntniss des schweissbereitenden Drüsenapparates der Haut, der eine so reiche Entwicklung darbietet, dass, nach Krause's approximativem Calcul, 2,381,248 solcher Drüsen in der menschlichen Haut angenommen werden können. Jede Schweissdrüse hat die Gestalt eines knäuelformig zusammengewundenen, feinen Drüsenschlauches, der nicht in der Cutis, sondern im Unterhautzellstoff eingesenkt liegt, und in einen korkzieher-

Lehrbuch der Anatomie. 5. Aufl.

artig 10—30 Mal gewundenen Aussührungsgang übergeht, dessen Lumen 0,05"—0,08" Durchmesser bat, und der in kleinen Trichtergrübchen an der Oberstäche der Epidermis mündet, welche auf den erhabenen Linien der Hohlhand mit freiem Auge gesehen werden, und, wenn die Haut schwitzt, winzige Schweisströpschen aussickern lassen. Die spirale Windung des Aussührungsganges ist besonders während seines Durchganges durch eine dickere Epidermis ausgesprochen. Bei schwieliger Verdickung der Epidermis wird die spirale in eine gerade Linie ausgezogen. — Die concave Seite der Ohrmuschel, der äussere Gehörgang, und die Eichel besitzen keine Schweissdrüsen. Die Schweissdrüsen bestehen aus einer zarten Bindegewebmembran mit innen aussiegenden Epithelialzellen. Eine structurlose, glashelle Zwischenschicht bekommt man nur selten zur Ansicht. An den Schweissdrüsen der Achsel lassen sich deutliche glatte Muskelfasern erkennen, welche der Längsrichtung der Drüse folgen.

Zur Untersuchung der Schweissdrüsen genügt es, einen aus freier Hand oder mit dem Valentin'schen Doppelmesser gemachten feinen senkrechten Hautschnitt, mit dem Compressorium flachzudrücken, und bei einer Linearvergrösserung von 60 zu betrachten. — Die grössten Schweissdrüsen werden in der Fusssohle und Achselhöhle gefunden, wo ihre Länge (mit Inbegriff des Aussührungsganges) 1—1¹/₂" misst. Der Schweiss, Sudor, der nur bei grosser ausserer Hitze, bei Anstrengungen, oder Krankheiten, in Tropfenform zum Vorschein kommt, sonst in der Regel gleich nach seiner Absonderung verdunstet, und seine fixen Bestandtheile an der Hautobersläche zurücklässt, ist eine klare, wässerige, sauer reagirende (besonders der Fussschweiss, der zuweilen blaue Strümpfe roth färbt), oder neutrale Flüssigkeit, von specifischem Geruche, welche nur in der Achsel und an den Plattsussen die Wäsche gelblich färbt und steift. Das quantitative Verhältniss der fixen Bestandtheile des Schweisses (Chlornatrium, schwefelsaure Salze, nach Lander er Spuren von Harnstoff, freie Milchsäure, und milchsaure Salze etc.) ist durch die Menge innerer und ausserer auf die Hautabsonderung einwirkender Momente ein sehr veränderliches, und überhaupt im gesunden und kranken Zustande nur wenig bekannt. — Abgestossene Epidermiszellen finden sich immer im Schweisse, so wie auch Spuren von Fett aus den Talgdrüsen, was der Speck in dem Futter alter Hüte, und auf den Krägen vielgetragener Röcke, beweisen kann.

§. 192. Oberhaut.

Man kann an jedem beliebigen Punkte der Körperoberstäche, durch verschiedene Mittel, ein seines, trockenes Häutchen ablösen, welches weder schmerzt, noch blutet, somit weder Nerven noch Gesässe enthält, gelblich weiss, durchscheinend, und pergamentartig zähe ist, und Oberhaut genannt wird (Epidermis s. Cuticula, bei den alten Anatomen Heidenhaut, wahrscheinlich weil sie nach der Tause sich abschuppt). Man hat die Oberhaut lange für einen vertrockneten und verhornten Auswursstoff der Haut, sur thierische Schlacke gehalten, und weiter keine lebendige Bedeutung, als die Leistung mechanischen Schutzes sur das empsindliche

Hautorgan, in ihr gesucht. Henle's umfassenden Untersuchungen verdanken wir eine richtigere Ansicht über die organische Bedeutung, so wie über die Lebens- und Ernährungsweise der Epidermis. Wird die Cutis ihrer Oberhaut durch was immer für Mittel beraubt, so scheidet sie an ihrer äusseren Fläche eine dunne Schichte eines halbslüssigen, durchsichtigen, structurlosen Stoffes aus, der nicht über 0,005" mächtig wird, und das Materiale vorstellt, aus welchem sich durch einen bestimmten Organisationsact die Epidermis bildet. Es entstehen nämlich, in und aus diesem halbstüssigen Grundstoffe, solide Kerne, welche sich mit einer Hüllungsmembran umgeben, oder zu kernhaltigen Zellen werden. kommen in dem Masse oberflächlicher zu liegen, als die Absonderung des halbslüssigen Grundstoffes in der Tiefe zunimmt, drängen sich an einander, werden eckig, und platten sich ab, verlieren durch Austrocknen ihren Gohalt an Flüssigkeit, und werden endlich zu feinen, trocknen, hornigen Schüppchen oder Blättchen, welche abfallen. Was die Epidermis durch das Lostrennen der oberstächlichsten Blättchen (Abschuppung) an Dicke verliert, wird durch neuen Nachschub von unten her wieder ersetzt, und sie befindet sich somit in einem fortwährenden Umwandlungsprocess, wie alle übrigen organischen Gebilde. Nur jene Schichte der Epidermis, welche aus verhärteten Zellen besteht, wird als Oberhaut genommen, die halbflüssige Grundlage, von welcher der Zellenbildungsprocess ausgeht, und die als jungste Schichte der Epidermis die tiefste Lage einnimmt, ist der sogenannte Mucus Malpighii, der, weil er nach Entfernung der eigentlichen Oberhaut zurückbleibt, und eine netzförmige, weiche Masse bildet, aus deren Maschen die Spitzen der Hautpapillen hervorragen, auch Rete Malpighii genannt wird. Der Kern der jungen, sastigen Epidermiszellen, der einen Durchmesser von 0,001"-0,003" hat, ist selbst bei weissfarbigen Menschenracen braun tingirt, welche Färbung am Hodensack, den grossen Schamlefzen, und in der Achselhöhle saturirter wird, und bei brünetten Leuten am Warzenhofe der Brust ins Schwarze übergeht. Auch die den Kern umschliessende Zellenhülle nimmt an der dunkleren Färbung, obwohl in geringerem Grade, Theil. Die schwarze Farbe des Negers hat denselben Ursprung aus der dunklen Pigmentirung der Zellen und Zellenkerne. Je höher die tiefer liegenden Zellen, durch das Abschuppen der obersten, zu liegen kommen, desto mehr entsärben sie sich, und die eigentliche Oberhaut des Negers ist nicht schwarz, sondern schmutzig gelb gesärbt. Nach Henle's, theilweise von Krause bestätigten Beobachtungen, kommen im Rete Malpighii des Negers auch wahre Pigmentzellen vor, welche jenen des schwarzen Augenpigments ähnlich gebaut sein sollen. Die Cutis erscheint, nach Abstreisen des Rete Malpighii, bei farbigen Racen so weiss, wie die der weissen.

Die Epidermis schmiegt sich an alle Unebenheiten und Hervorragungen der Cutis genau an, zeigt also an ihrer inneren Oberfläche einen Abdruck der Tastwärzchen und deren Aggregationslinien. Ihre Dicke variirt von 0,04"—1" und darüber. Der Unterschied der Dicke hängt nicht von der Einwirkung äusserer mechanischer Potenzen ab, wie man nach der Dicke der Epidermis in der Fusssohle und an den Handballen der Grobschmiede schliessen könnte, sondern wird von besonderen Entwicklungsgesetzen bedingt, 'da die genannten Stellen schon im Embryoleben eine doppelt bis dreifach so dicke Epidermis haben, als andere.

Durch ihre physikalischen Eigenschasten ist die Epidermis ein schlechter Wärme- und Elektricitätsleiter, beschränkt die Absorptionskrast des Hautsystems, und hindert die zu rasche Verdampfung des Hautdunstes. Von letzterer Wirkung kann man sich an Leichen überzeugen, an denen die Epidermis durch Anwendung von Vesicatoren während des Lebens entfernt, oder durch mechanische Einwirkungen bei Verletzungen abgestreift wurde. Die der Epidermis beraubten Stellen der Haut vertrocknen sehr schnell zu pergamentartigen, harten Flecken. Man kann, auf diese Beobachtung hin, über wirklichen oder Scheintod ein Urtheil abgeben. - Durch anhaltenden Druck verdickt sie sich zu hornigen Schwielen (welche in höherem Entwicklungsgrade an den Zehen den trivialen Namen der Hühneraugen, besser Leichdorne — Clavi — führen), die ich bei Lastträgern auch am Rücken, auf dem Dornfortsatze des siebenten Halswirbels fand, und die von älteren Anatomen auch an der Darmbeinspina bei Frauen, welche feste, bis über die Hüsten reichende Mieder trugen, beobachtet wurden. - Die oberslächlichsten, vertrockneten Epidermiszellen, schwellen in Wasser oder Wasserdunst auf, erweichen sich, und werden in diesem Zustande leicht durch Reiben entfernt, wonach die Hautausdünstung leichter von Statten geht, und die heilsame Wirkung der Bäder zum Theile erklärt wird. Noch schneller erweichen sie sich in Kalilösung, weshalb man sich zum Waschen der Hände allgemein der Seife bedient. Die hygroskopische Eigenschaft der Epidermis bedingt das Anschwellen, und dadurch das jeden Witterungswechsel begleitende Schmerzen der Leichdorne, und erklärt hinlanglich den Umstand, dass bei Leuten, die an den Füssen schwitzen, zur Sommerzeit die Qualen dieser Oberhautwucherungen hestiger zu sein pslegen. - Die partielle, wie gesprenkelte Färbung der Haut bei Sommersprossen und Leberslecken, beruht, wie die Racensarbung der Haut, auf dunklerer Pigmentirung der Zellen und Zellenkerne. Die auf den inneren Gebrauch von Höllenstein sich einstellende schwarze Hautsärbung, welche auf einer durch den Lichteinfluss bewirkten Zersetzung des in der Haut abgelagerten Silbersalzes beruht, ist durch neuere Erfahrungen hinreichend constatirt. - Alle reizenden und Entzündung veranlassenden Schädlichkeiten, trennen im Leben die Epidermis von der Cutis, durch Blasenbildung (Verbrennung, Zugpflaster), viele Ausschlagskrankheiten heben sie als Bläschen oder Pusteln auf, selbst Erschütterungen (wie bei Knochenbrüchen), oder faulige Zersetzung der Säste (beim Brande), bewirken diese Ablösung mit Blasenbildung. An der Leiche wird die Epidermisdurch Fäulniss oder Abbrühen gelockert, und kann, bei vorsichtiger Behandlung, von den Extremitäten wie ein Handschuh abgestreist werden. Die Epidermis senkt sich in alle Hautöffnungen, kleine wie grosse, ein, und geräth dadurch in Verbindung mit jenem ebenfalls aus Zellen gebildeten Ueberzuge der inneren Körperhöhlen — dem Epithelium.

Das Hühnerauge hat seinen Namen von dem dunklen Fleck, welcher sich in seiner Mitte an der Schnittsläche sindet, und dadurch entsteht, dass sich zwischen der Basis des Hühnerauges und der Cutis ein Tröpschen Blut ergossen hat, welches, zwischen den sich fortwährend neu bildenden Epidermisschichten eingeschlossen, allmälig gegen die Obersläche des Hühnerauges gehoben wird, wobei der Blutstrbestoff eine Umwandlung in dunkles Pigment erleidet. Oft umschliesst das Hühnerauge einen weissen Kern, welcher aus phosphorsaurer Kalkerde besteht, und durch seine Härte die Beschwerden beim Drucke auf das Hühnerauge steigert. Die vielfach gerühmte Anwendung von verdünnter Schweselsäure, oder vegetabilischen Säuren (z. B. in den Blättern von der sogenannten Hauswurzel, Sedum acre) löst diesen Kern, und schafft oft anhaltende Linderung. — Unter alten Hühneraugen entwickelt sich regelmässig ein kleiner Schleimbeutel, welcher in so fern von Interesse ist, als vermuthlich auf seiner Gegenwart die Gefahr beruht, welche ein allzutiefes Ausschneiden eines Hühnerauges veranlassen kann, indem die chirurgische Erfahrung lehrte, dass Verletzungen von serösen und Synovialhäuten häufig langwierige Eiterungen und die gefürchtete Eiterresorption zur Folge haben. P. Frank berichtet in seinen Opp. posthumis über zwei Fälle solcher unglücklichen Exstirpationen, die mit Tod endigten.

§. 193. Nägel.

Nägel, Unques, sind harte, elastische, viereckige, durchscheinende, convex-concave Hornplatten, welche die Rückenseite der letzten Finger- und Zehenphalangen einnehmen, der pulpösen, tastenden Fläche der Fingerspitze Halt und Festigkeit geben, ihr Ausweichen und allzu grosse Abplattung beim Tasten und Greisen beschränken, die Gewalt des Fingerdruckes steigern, und insofern zunächst dem Tastsinne zu Gute kommen. Der hintere und die beiden Seitenränder des Nagels stecken in einer tiefen Hautfurche oder Falze (Matrix unguis). Die untere Fläche steht mit der papillenreichen Haut im innigen Contact, und vermehrt durch Gegendruck die Schärfe der Tastempsindungen. Sie ist mit Längenrinnen gesurcht, in welche die linear gereihten Tastwärzchen der Cutis hineinragen. Der hintere weiche Theil des Nagels, welcher in der über 2" tiefen Hautfurche, dem sogenannten Nagelfalz, steckt, heisst Radix unguis, und ist der jungste Theil des Nagels, welcher, bei dem nach vorne strebenden Wachsthum des Nagels, allmälig dem freien Rande näher rückt, bis auch ihn das Loos trifft, beschnitten zu werden. Ein weisses Kreissegment - die Lunula - ziert zuweilen die Wurzel schöner Nägel.

Der Nagel besteht aus denselben Zellenelementen, wie die Oberhaut, und ist eigentlich nur eine verdickte Stelle derselben. Die tiefgelegenen, mit der Haut in Berührung stehenden Zellen sind weich, saftig, die oberflächlichen aber verhornt und zu compacten Platten versche

wenn sie trocken sind, beim Durchschneiden zersplittern. Durch Kochen in kaustischem Natron lassen sich die kernhaltigen Zellen der obersten, verhornten Nagelschichte, leicht darstellen. Die weicheren, also tieferen Schichten der Epidermis an der Dorsalfläche eines Fingers, dringen in die Matrix ein, umgeben den Rand der Nagelwurzel, und vereinigen sich unter dem Nagel mit derselben von der Volarfläche der Phalanx herkommenden Epidermisschichte. Nur die äusserste Epidermisschichte setzt sich, vom Fingerrücken kommend, an der Dorsalfläche, — und von der Volarseite kommend, an der unteren Fläche des Nagels, ungefähr eine Linie hinter seinem freien Rande fest, wodurch, wenn die Epidermis vom Finger abgezogen wird, der Nagel mitgehen muss.

Ich beobachtete einen Fall, wo, bei der Häutung nach Scharlach, die Nägel der zwei letzten Finger mit der Epidermis abgestossen wurden. Nach Verbrennungen und Erfrierungen der Hand ist das Abfallen der Nägel keine Seltenheit. — Dass der Nagel nicht blos in der Matrix gebildet, und von hier aus vorgeschoben wird, bemerkt man, wenn ein durch Quetschung des Fingers abgegangener Nagel regenerirt wird. Es bedeckt sich hiebei die ganze, sonst vom Nagel bedeckte Hautsläche (das Nagelbett) mit weichen Hornplättchen, welche nach und nach verhärten, und zu einem grösseren Nagelblatte zusammensliessen. Auch spricht das Dickerwerden des Nagels nach vorn zu, für einen von unten her stattfindenden Anschuss von Nagelzellen. — Der grosse Nervenreichthum der Nagelfurche und des Nagelbettes erklärt die Schmerzhastigkeit des zur Heilung gewisser Krankheiten der Nagelsurche nothwendigen Ausreissens des Nagels. Da das Nagelbett, als Secretionsorgan des Nagelstoffes, sehr gefässreich ist, so sind besonders dünne Nägel röthlich durchscheinend, erblassen bei Ohnmachten und Blutungen, und werden blau bei venösen Stasen, beim Herannahen eines Fieberanfalls, oder an der Leiche. -Man will bemerkt haben, dass, während der Heilung von Knochenbrüchen, das Wachsthum der Nägel stille steht.

Der Nagel theilt die physikalischen und Lebenseigenschaften der Epidermis. Er ist unempfindlich, gestss- und nervenlos, nützt dem Organismus nur durch seine mechanischen Eigenschaften, wird spröde, wenn er vertrocknet, und erweicht sich durch Saugen oder Kauen an den Fingern. Nur wenn er beschnitten wird, wächst er nach; hat man ihn auf eine gewisse Grösse wachsen lassen, so verändert er sich nicht weiter, wie der Huf der Thiere, der bei Pferden, welche beschlagen werden, sortwährend nachwächst, bei den Wiederkäuern dagegen, wenn er einmal gebildet ist, stationär bleibt, und nur so viel Stosszuwachs erhält, als durch Abnützung oberstächlich verloren geht. Die Wichtigkeit des Nagels bezeugen die von Pauli, de vulnerum sanatione, pag. 98, gesammelten Fälle, wo nach Verlust des letzten, oder der zwei letzten Fingerglieder, ein Nagelrudiment am Stumpse des Fingers entsteht. Mir ist ein Fall bekannt, wo nach Amputation des Nagelgliedes des Daumens (wegen Caries) ein 2" langer und 3" breiter Nagel, am ersten Gliede sich bildete.

§. 194. Haare.

Die Haare, Pili, sind in der Haut wurzelnde Hornsäden, deren Erzeugung und Wachsthum, wie bei der Oberhaut und den Nägeln, auf der

Zellenmetamorphose beruht. Jedes Haar wird in die Wurzel, Radix, und den Schaft, Scapus, eingetheilt. Haarwurzel ist der in die Cutis eingesenkte kleinere Abschnitt des Haares; Haarschaft der freie Theil des Haares, welcher an den Kopfhaaren cylindrisch, an den Bart-, Achsel-, Schamhaaren beim Querschnitt oval oder bohnenförmig erscheint. Krause Haare sind in der Regel platt, und schwarze Haare häufig an ihrer Spitze gespalten. Einzelne Unebenheiten am Haarschaft entstehen zuweilen durch Splitterung des Haares beim Knicken desselben, durch Zerklüften und Rissigwerden trockener Haare, durch Ankleben von Epidermisfragmenten oder Schmutz. Die Haarwurzel steckt in einer taschenförmigen Höhle der Haut (Haarbalg, Folliculus pili), welche durch Einstülpung der obersten Lage des Corium entsteht, und bei den feinen und kurzen Wollhaaren, Lanugo, welche die ganze Leibesoberfläche, mit Ausnahme der Hohlhand und Fusssohle, so wie der Streckseiten der Finger- und Zehengelenke, einnehmen, nicht in die Tiefe über das Corium hinaus sich verlängert, bei den übrigen Haaren dagegen bis in den Unterhautzellstoff eindringt, und bei den Spürhaaren der Thiere zuweilen bis in die subcutanen Muskeln ragt. In jeden Haarbalg münden benachbarte Talgdrüsen der Haut ein. Am Grunde des Haarbalges sitzt ein kleines, gefäss- und nervenreiches Wärzchen, Papilla pili (unrichtig Haarkeim, Pulpa s. Blastema pili genannt) auf, welche das Secretionsorgan für jenen formlosen Stoff ist, aus welchem sich die Haarzellen erst bilden müssen. Auf dieser meist kegelförmig zugespitzten Warze, sitzt der breite Theil der Haarwurzel, von Henle Haarknopf, sonst Haarzwiebel genannt, auf, und besteht an seinem untersten, von der Haarwarze napfförmig eingedrückten Ende, aus einer Schichte frischer, kernhaltiger Zellen, von welchen die äussersten sich spindelförmig verlängern, und zu Fasern an einander reihen, welche die Rinde des Haarschaftes bilden, während die inneren Zellen ihre Form behalten, und durch ihre Uebereinanderlagerung, die bis gegen die Spitze des Schaftes aufsteigt, das sogenannte Haarmark erzeugen, welches sich zur Rinde des Haares verhält, wie die frischen Epidermiszellen zur verhornten Oberhaut. An dunkel gefärbten Kopfhaaren, und an den feinen Wollhaaren, ist das Haarmark von der Rinde nicht deutlich zu unterscheiden. Die Zellen des Markes sind mit Bläschen gefüllt, welche 0,0002"-0,002" Durchmesser besitzen, und Lust enthalten, welche man durch Kochen des Haares in Terpenthin austreiben kann. - Die Obersläche des Haarschastes ist mit einem zarten Oberhäutchen umgeben, welches sich durch Behandlung mit Alkalien in grösseren oder kleineren Lamellen ablöst, und in seine Elemente zerfällt, welche platte, viereckige, kernlose Schüppchen darstellen.

Die Rinde des Haarschaftes zeigt bei passender Vergrösserung eine Menge dunkler Fleckehen und Streifen, deren Gegenwart die Untersuchung des Haarmarkes sehr erschwert. Sie rühren theils von körnigem Pigment her, welches in den spindelförmigen Zellen der Rinde abgelagert wird, theils sind sie lufterfüllte Hohlräume oder Ritzen zwischen den Zellen (nach Kölliker auch langgezogene dunkle Kerne).

Die tiese und die oberstächliche Schichte der Epidermis stülpt sich durch die Austrittsöffnung des Haares in den Haarbalg hinein, und bildet sofort eine doppelte Scheide für die Wurzel. Die tiefe Epidermisschichte, in ihrer Beziehung zur Haarwurzel, äussere Wurzelscheide genannt, setzt sich in die, die Haarwarze unmittelbar deckende Zellenschichte des Haarknopfes fort. Die oberstächliche Epidermisschichte, oder innere Wurzelscheide des Haares, reicht nicht so weit herab, und liegt dicht an der Haarwurzel an, an welcher sie beim Ausreissen des Haares in Fetzen hängen bleiben kann. — Kölliker hat zwischen der äusseren Wurzelscheide und dem Haarbalge eine glashelle, structurlose Zwischenmembran aufgefunden, und im Haarbalge selbst zwei Faserschichten nachgewiesen, deren aussere aus longitudinalen, deren innere aus queren Fasern mit spindelförmigen Kernen besteht. Nur die äussere Faserschicht enthält Blutgesässe und Nerven. Letztere lassen deutliche Theilungen ihrer Primitivsasern erkennen. Die mikroskopischen Elemente jener beiden Faserschichten haben die grösste Aehnlichkeit mit glatten Muskelfasern.

Die Schüppehen der Oberhaut des Haarschaftes decken sich einander dachziegelförmig so, dass die der Wurzel näheren Schüppehen, sich über die entfernteren legen. Sie kehren sich bei Befeuchten des Haares mit Schwefelsäure vom Haarschaft ab, so dass dieser wie ästig oder filzig erscheint. Auch durch Streichen eines Haares von der Spitze gegen die Wurzel, werden sie stärker abstehend, und durch Schaben in dieser Richtung völlig abgestreift.

Der Durchmesser des Haarschastes steigert sich von 0,005 (seines Wollhaar aus dem Gesichte eines Mädchens) bis 0,06 (Basis eines Wimperhaares des Augenlides). Die Richtung des Haares steht nie senkrecht auf der Hautoberstäche. An seinen Durchschnitten gehärteter Cutis sieht man, dass auch die Haarbälge schief gegen die Cutis streben. Im Allgemeinen sind die Haare einer Gegend gegen die stärkeren Knochenvorragungen gerichtet (Ulna, Tibia, Rückgrat), und stehen in Linien, welche nie gerade, sondern gebogen, und auf beiden Körperseiten symmetrisch verlausen, und zusammen jene Figuren bilden, welche von Eschricht als Haarströme oder Haarwirbel beschrieben wurden (Müller's Archiv, 1837). Nach With of standen bei einem mässig behaarten Manne auf 1/4 Quadratzoll Haut, am Scheitel 293, am Kinne 39, an der Scham 34, am Vorderarme 23, an der vorderen Seite des Schenkels nur 13 Haare.

Zur mikroskopischen Untersuchung der Haare wählt man am zweckmässigsten weisse Haare. Längenschnitte derselben bereitet man sich durch vorsichtiges Schaben des Haares, Querschnitte der eigenen Haare erhält man am schönsten, wenn man sich in kurzer Zeit zweimal rasirt. Beseuchtung der Haarschnitte mit Alkalien oder Säuren erleichtert wesentlich die Erkenntniss der Structur der verhornten Haarbestandtheile.

§. 195. Physikalische und physiologische Eigenschaften der Haare.

Die Substanz des Haares stimmt mit jener der Epidermis überein, und besitzt dieselben physischen und vitalen Eigenschaften. Das Haar vereinigt einen hohen Grad von Festigkeit, mit Biegsamkeit und Elasticität, und nimmt, wie immer gebogen, seine normale Richtung leicht wieder an. Ein dickes Haupthaar trägt ein Gewicht von drei bis fünf Loth, ohne zu zerreissen, und lässt sich, bevor es entzwei geht, um ein Drittel seiner

Länge ausdehnen. Trockene Haare werden durch Reiben elektrisch, und können selbst Funken sprühen. Von Katzen und Rappen ist dieses vielfältig bekannt geworden, und die Entwicklung der Elektricität im Harzkuchen, der mit einem Fuchsschwanze gepeitscht wird, gehört auch hicher. Die hygroskopische Eigenschaft der Haare ist in der Physik zu Feuchtigkeitsmessern benützt worden, und Saussure fand selbst das Mumienhaar noch hygroskopisch. Das fette Oel, welches die Haare von den Talgdrüsen erhalten, und welches ihnen ihren Glanz und ihre Geschmeidigkeit giebt, beeinträchtigt die Empfänglichkeit der Haare gegen Feuchtigkeitsänderungen, und muss durch Kochen in Lauge oder durch Aether entfernt werden, um ein Haar als Hygrometer zu verwenden. Das Haar widersteht der Fäulniss ausserordentlich lange, wie die übrigen Horngebilde der Haut, löst sich aber im Papinianischen Digestor auf, und schmilzt beim Erhitzen, verbrennt mit Horngeruch, und hinterlässt eine Asche, welche Eisen- und Manganoxyd, Kiesel- und Kalksalze enthält.

Die Farbe der Haare durchläust alle Nuancen vom Schneeweiss bis Pechschwarz (bei Arbeitern in Kupfergruben hat man grüne Haare gesehen, Th. Bartholin, hist. anat. rar. cent. 1.), steht mit der Farbe der Haut in einer, wenn auch nicht absoluten Beziehung, und erhält nur bei einem Säugethiere - dem Cap'schen Maulwurf - metallischen Schimmer. Die Pigmentirung der Zellen und Zellenkerne bedingt die Haarfarbe. Gelblich weiss erscheinen die Haare bei den Kakerlaken (Leucaethiopes, Dondos, Blafards) wegen Mangel des Pigments. Rothe Haare enthalten mehr Schwefel, als andere, und ändern deshalb ihre Farbe durch Bleisalben, selbst durch den Gebrauch bleierner Kämme. - Dass das Haar, so wenig wie Oberhaut und Nagel, als ein abgestorbener Ejectionsstoff der Haut angesehen werden könne, beweisen die mit der Vitalität der Haut übereinstimmenden und durch sie bedingten Lebenszustände des Haares. Henle bemerkt: "das Verhalten der Haare ist ein Hilfsmittel der Diagnose; - sie sind weich und glänzend bei turgescirender, dustender Haut; trocken, spröde, und struppig bei Collapsus der Körperoberstäche." Das plötzliche, in wenig Stunden erfolgte Ergrauen der Haare durch Schreck oder Verzweiflung (Thom. Morus, Marie Antoinette), welches von der Spitze des Haares gegen die Wurzel vorschreitet, kann durch eine Umstimmung der lebendigen Thätigkeit im Haare, vielleicht auch durch die chemische Einwirkung eines in der Hauttranspiration enthaltenen unbekannten Stoffes bewirkt werden. Auch das Festwerden mit der Wurzel ausgezogener und auf ein zweites Individuum verpflanzter Haare (Dieffenbach, Dzondi) spricht für eine lebendige Thätigkeit im Haare. Das Fortwachsen der Haare an Leichen erklärt sich vielleicht nur aus dem Einfallen und Schrumpfen der Hautdecken, wodurch die Haarstoppeln vorragender werden. Die von Garman (De miraculis mortuorum) angeführten Fälle von Nachwuchs des Bartes an Leichen (nach wiederholtem Rasiren), scheinen mehr auf dem Glauben ans Wunderbare, als auf verlässlicher Erfahrung zu beruhen. Bei Operationen an behaarten Stellen, müssen die Haare vorläufig abrasirt werden, da ihre Gegenwart die reine Schnittführung erschwert, einzelne Haare. welche zwischen den Wundrändern liegen, ihre schnelle Vereinigung hindern, und die Abnahme der Hestpslaster beim Wechseln des Verbandes schmerzhaft machen.

Die physiologische Bedeutung der Haare ist nicht ganz klar. Als mecha-

nisches Schutzmittel können sie nur bei den Thieren gelten, deren obere Körperseite in der Regel stärker behaart ist als die untere; der Nutzen der Borsten- und Wollhaare ist nicht zu verkennen. Die Spurhaare übernehmen die Rolle von Tastorganen, und auch der Mensch fühlt die Bewegungen eines feinen Körpers, z. B. einer Nadelspitze, welche, ohne die Haut zu berühren, blos an den Flaumenhaaren der Wange vorbeistreift. Als natürliches Schönheitsmittel erfreuen sich die Haare einer besonderen Pslege bei allen gebildeten und ungebildeten Nationen, insonderheit den Frauen, und man ist darauf bedacht, den Verlust derselben durch die Kunst zu verbergen. Ein schönes Haar ist eine wahre Zierde des menschlichen Hauptes. Scheren des Kopfes war im Mittelalter mitunter Strafe der Prostitution, und bei den alten Deutschen wurde nach Tacitus den Ehebrecherinnen das Haupthaar abgeschnitten. - Das Keimen der Scham - und Antlitzhaare ist ein Vorbote des erwachenden Geschlechtstriebes. Warum die Frauen keinen Bart bekämen, erklärte das Alterthum: "Marem ornat barba, quam ob gravitatem natura concessil; feminis eam negavil, quas ad suavilatem magis, quam ad gravitatem factas esse voluit."

Ueber den Haarwechsel bei Menschen und Thieren handelt nebst Gegenbaur und Steinlin, vorzüglich C. Langer, im 1. Band der Denkschristen der kais. Acad. der Wissensch. Wien, 1849.

§. 196. Unterhautzellgewebe und Fetthaut.

Das Unterhautzellgewebe - Tela cellulosa subcutanea - ist eine weiche, dehnbare, aus Bindegewebsfasern und elastischen Fasern (stellenweise auch aus glatten Muskelfasern) gebildete Unterlage der Haut, welche mit dieser die allgemeine Decke, Integumentum commune, des Körpers zusammensetzt. Es vermittelt die Verbindung der Haut mit den aponeurotischen Hüllen der Muskeln, geleitet die Gefässe und Nerven zur inneren Hautoberstäche, und gestattet der Haut eine gewisse Verschiebbarkeit, die mit seiner Dichtheit im umgekehrten Verhältnisse steht. Seine Blätter kreuzen sich, bilden eckige Räume oder Lücken (Zellen, nicht im histologischen Sinne), welche unter einander communiciren, und mit einem wässerigen Exhalate der Gesässe gesüllt sind (Zellgewebsserum). Diese Zellen nehmen unter besonderen Umständen auch Fettcysten auf, wodurch das subcutane Zellgewebe sich zu einer mächtigeren Schichte austreibt, und bei grossem Embonpoint eine Höhe von 1"-2" und darüber erreicht. In diesem mit Fett geschwängerten Zustande wird das Unterhautzellgewebe auch Fetthaut - Panniculus adiposus - genannt.

Das Fett (von welchem schon im §. 62 gehandelt wurde) ist in kleinen häutigen, structurlosen Bläschen eingeschlossen. Sie heissen Fettcysten. Ihre Grösse ändert sich von 0,009"—0,05" Durchmesser; ihre Oberfläche ist, da mehrere auf Haufen zusammengedrängt, eine Zellgewebszelle einnehmen, nicht sphärisch, sondern hin und wieder eingebogen, wie verdrückt, sogar polyëdrisch. Ihre Hülle, welche von dem fetten Inhalte sehr oft kaum zu unterscheiden ist, besitzt, trotz ihrer Feinheit, eine bedeutende Festigkeit, verträgt einen hohen Grad von Compression ohne zer-

sprengt zu werden, und lässt, wenn sie erwärmt wird, ihren Inhalt in kleinen Tröpschen aussickern. Selbst an den grössten Zellen habe ich im Innern derselben nie Blutgesasse gesehen, obwohl Henle sie zugiebt. Die Blutgefässe, welche durch den Panniculus adiposus lausen, gehören den Zellgewebsblättern an, welche die Logen für einen Klumpen Fettzellen bilden. Nerven besitzen sie nicht. - Das Fett entwickelt sich sehr schnell, und kann eben so schnell durch Aufsaugung weggeschafft werden. Die Idee, dass das Fett ein Ueberschuss von Nahrungsstoff sei, den die Natur im Zellgewebe ablagert, um ihn im Falle der Noth neuerdings in den Kreislauf zu bringen, und zur Ernährung zu verwenden, ist durch die Fortschritte der thierischen Chemie als unstatthast erkannt. Da das Fett eine stickstofffreie Substanz ist, so kann es nie den Verlust von stickstoffhaltigen organischen Materien ersetzen. Es steht vielmehr zum Athmungsgeschäst in chemisch-vitaler Beziehung. — Die Structur des Fettes bleibt sich an den verschiedensten Körperstellen gleich. Wo immer Zellstoff in grösseren Lagern vorkommt, kann Fettentwicklung stattfinden, welche durch fettreiche Nahrung, bei Körper- und Gemüthsruhe begünstigt wird, bei Weibern und Kindern häufiger als bei Männern vorkommt, und so überhand nehmen kann, dass das Fett andere organische Gewebe, besonders Muskeln, verdrängt, sie zum Schwinden bringt (fettige Umwandlung), und jene uppige Beleibtheit erzeugt, die man bei den Thieren absichtlich durch Mästung erzielt, beim Menschen als Krankheit ansieht. — Bei den Mauren gilt grosse Fettleibigkeit einer Frau für grosse Schönheit.

Der Unterhautzellstoff des männlichen Gliedes, des Hodensackes, der Augenlider, der Nase, und der Ohrmuschel, bleibt immer fettlos. — Die tiefsten Schichten des Unterhautzellgewebes sind bei mässiger Beleibtheit fettlos; die Blättchen desselben bilden durch ihre Uebereinanderlagerung eine continuirliche Schichte, welche an gewissen Gegenden (Unterleib, Schenkel, Vorderarm) die Derbheit einer fibrösen Haut annimmt, und in diesem Zustande Fascia superficialis heisst. Durch Godmann, Paillard, Velpeau, ist dieses in chirurgischer Beziehung wichtige Gebilde, als ein ununterbrochenes, der ganzen Körperobersläche zukommendes, theils zellgewebiges, theils fibröses Stratum festgestellt. Je mehr die Fettablagerung auch in die Fascia superficialis eingreist, desto mehr verliert sie ihr membranöses Ansehen, und ist überhaupt um so deutlicher, je magerer das Individuum ist. Bei den Thieren besteht sie sogar aus zwei Blättern, welche den sogenannten Panniculus carnosus einschliessen, und welche beim Menschen nur am Halse vorkommen, wo sie das Platysma myoides enthalten.

Merkwürdig ist es, dass das Fett an jenen Stellen, welche starken und anhaltenden Druck aushalten (Gesäss, Fusssohle), nicht zum Weichen gebracht, oder aus seinen Bläschen herausgedrückt wird. Die Stärke der Wand der Fettbläschen und der Zellgewebszellen, so wie der Umstand, dass Fett, in feuchte Iläute eingeschlossen, selbst bei hohem Drucke nicht durch die Poren derselben entweicht, erklärt dieses Verhalten. Ob, wenn das Fett bei Abmagerung schwindet, auch die Fettbläschen resorbirt werden, ist noch nicht entschieden. Nach meinen Erfahrungen bleibt das leere Iläutchen der Fettbläschen zurück. — Die Armuth an Blutgefässen, der Nervenmangel, und die geringe Vitalität des Fettes, sind der Grund, warum Operationen im Pass-

niculus adiposus wenig schmerzhaft sind, Wunden desselben wenig Tendenz zur schnellen Vereinigung haben, und die Vernarbung äusserst träge erfolgt. Die unglücklichen Resultate des Steinschnittes bei fetten Personen sind allen Wundärzten bekannt, und die Beobachtung am Krankenbette lehrt, dass bei Amputations- und anderen grösseren Wunden das Fett früher resorbirt werde, ehe die Cicatrisation erfolgt.

Die Communication der fettlosen Zellgewebszellen erklärt die leichte Verbreitung von Lust im Zellgewebe bei Emphysemen, das Zuströmen des Wassers zu den tiefsten Körperstellen bei allgemeiner Wassersucht, die Senkungen von Blut, Eiter, Jauche, und das Wandern fremder Körper (Nadeln, Schrot) unter der Haut.

B. Geruchorgan.

§. 197. Aeussere Nase.

Die äussere Nase ist das Vorhaus des Geruchorgans, und besteht, nebst seiner unbeweglichen, durch die Nasenbeine und die Stirnfortsätze des Oberkiefers gebildeten Grundlage, aus einem unpaaren, und zwei paarigen, beweglichen Knorpeln.

Der unpaare Scheidewandknorpel, Septum cartilagineum s. Cartilago quadrangularis, bildet den vorderen Theil der Nasenscheidewand, hat eine ungleich vierseitige Gestalt, und ist mit seinem hinteren Winkel in den zwischen der senkrechten Siebbeinplatte und dem Vomer übriggelassenen einspringenden Winkel hineingeschoben. Sein hinterer oberer Rand passt somit auf den unteren Rand der senkrechten Siebbeinplatte, sein hinterer unterer an den vorderen Rand des Vomer, sein vorderer oberer liegt in der Verlängerung des knöchernen Nasenrückens, und sein vorderer unterer ist frei, geht aber nicht bis zum unteren Rande der die beiden Nasenlöcher trennenden, und blos durch das Integument gebildeten Scheidewand (Septum membranaceum) herab. Wenn man Daumen und Zeigesinger einer Hand in beide Nasenlöcher einsührt, und das Septum membranaceum nach rechts und links biegt, fühlt man den freien Rand des Scheidewandknorpels ganz deutlich.

Da im Embryo die ganze Nasenscheidewand knorpelig ist, und das Pflugscharbein als Deckknochen des Knorpels entsteht, so wird letzteres aus zwei Platten bestehen, zwischen welchen der ursprüngliche Nasenscheidewandknorpel noch existirt. Dieser Knorpel schwindet erst mit der vollständigen Entwicklung des Pflugscharbeins (zwischen dem 30. und 50. Lebensjahre). So lange er wächst, findet sich zwischen dem oberen Rande des Vomer und der unteren Fläche des Keilbeins ein Loch (Foramen vomeris, von Tourtual gefunden), durch welches ein Ast der Arteria pharyngea zum Knorpel gelangt. Es ist somit der Nasenscheidewandknorpel des Erwachsenen nur der nicht verknöchernde Rest der embryonischen knorpeligen Nasenscheidewand.

Die paarigen dreieckigen oder Seitenwandknorpel der Nase, Cartilagines triangulares s. laterales, liegen in der Richtung der Seitensläche der Nasenbeine. Sie grenzen mit ihren vorderen (oberen) Rändern aneinander, und verschmelzen am Nasenrücken mit dem Nasenscheidewandknorpel so innig, dass Huschke sie als Theile desselben mit vollem Rechte beschrieb.

Die paarigen Nasenflügelknorpel, Cartilagines alares s. pinnales, liegen in der Substanz der Nasenflügel, deren elastische Grundlagesie bilden, gehen bis zur Nasenspitze vor, und beugen sich von hier nach einwärts um, worauf sie schmäler werden, und im Septum membranaceum verschwinden. Sie bilden die äussere, und den vorderen Theil der inneren Umrandung der Nasenlöcher, und hängen mit dem unteren Rande der dreieckigen Nasenknorpel durch Bandmasse zusammen, in welcher häufig mehrere kleinere, rundliche, oder eckige Knorpelinseln, die Cartilagines sesamoideae, eingesprengt liegen.

Die äussere Oberstäche der knorpeligen Nase ist mit der allgemeinen Decke überzogen, welche ziemlich sest durch settloses Zellgewebe an die Knorpeln anhängt, und nicht gesaltet werden kann, was doch auf der knöchernen Nase sehr leicht geschieht. Die Haut der Nase ist reich an Talgdrüsen, deren grösste Exemplare, von 1,200" Länge, in der Furche hinter dem Nasenstügel münden. Die in den Nasenössnungen sichtbaren Haare (Vibrissae) sind theils nach abwärts gegen die Oberlippe, theils direct gegen die Nasenscheidewand gerichtet, und werden im Alter und bei Männern überhaupt länger als bei Weibern.

Aeusserst selten steht die Nase vollkommen symmetrisch, eine Beobachtung, die von jedem Porträtmaler bestätigt werden kann. Am östersten weicht sie nach links ab. Auch das Septum narium osseum et cartilagineum biegt sich nach der einen oder anderen Seite. Sehr selten ist ein angeborenes Loch im Scheidewandknorpel, welches ich bisher nur dreimal, von der Grösse eines Pfennigs, beobachtete. Es wird leicht sein, eine angeborene Oeffnung von einem vernarbten, durchbohrenden, syphilitischen Geschwür zu unterscheiden. — Huschke entdeckte zwei neue Nasenknorpel, als ½ Zoll lange, paarige, knorpelige Streisen, welche den untersten Theil der knorpeligen Scheidewand ausmachen, und sich vom vorderen Ende des Vomer bis zur Spina nasalis anterior erstrecken. Er nannte sie Vomer cartilagineus dexter et sinister.

§. 198. Innere Nase.

Das eigentliche Geruchorgan ist die Schleimhaut der Nasenhöhle — Riechhaut, Membrana pituitaria narium s. Schneideri — welche aus Bindegewebfasern, ohne irgend eine Beimischung elastischer Fasern, besteht, die innere oder freie Oberstäche der die Nasenhöhle bildenden Knochen (§. 107) überzieht, an den vorderen Nasenlöchern mit der Cutis im Zusammenhange steht, durch die hinteren Nasenöffnungen in die Schleimhaut des Rachens übergeht, und in alle Nebenhöhlen eindringt, welche mit der Nasenhöhle in Verbindung stehen. Sie hängt mit dem Periost der Nasenhöhle innig zusammen, und lässt sich ohne dieses nicht abziehen.

Ihre Dicke (1"-2"), ihr Reichthum an Schleimdrusen, Gestssen (vorzüglich Venen) und Nerven, ist nur in der eigentlichen Nasenhöhle bedeutend; in den Nebenhöhlen verdunnt sie sich auffallend, und nimmt vergleichungsweise mehr das Ansehen einer serösen Haut an. Ihre freie Fläche ist mit feinen Flocken und niedrigen Fältchen besetzt, welche ihr stellenweise ein feinzelliges Ansehen verleihen. Zwischen den Fältchen münden zahlreiche Schleimdrüsen aus. Die Form der Drüschen ist verschieden. In der unteren Parthie der Nasenhöhle finden sich gewöhnliche, traubenförmige Schleimdrüschen; in der oberen Parthie, wo sich der Geruchnerv verzweigt, treten lange, gerade, oder an ihren Enden leicht gewundene, cylindrische oder birnförmige Drüsenschläuche auf, welche von Todd und Bowman genauer untersucht wurden. Die Dicke der Nasenschleimhaut verengt den Raum der knöchernen Nasenhöhle bedeutend, und es ist leicht möglich, dass bei krankhafter Lockerung und Aufschwellung derselben (beim Schnupfen) die Wegsamkeit der Nasenhöhle für die zu inspirirende Lust ganz und gar aufgehoben wird. Im Allgemeinen ist sie in den oberen Regionen der Nasenhöhle, im Siebbeinlabyrinth, und dem Meatus narium superior dicker, als in den unteren Räumen, im Meatus narium medius et inserior. Das Epithelium der Nasenschleimhaut ist in den oberen Regionen derselben ein mehrfach geschichtetes Cylinderepithelium, in den unteren ein Flimmerepithelium.

Die Venennetze der Nasenschleimhaut sind ausserordentlich stark entwickelt, besonders am hinteren Umfang der Muscheln. Die Stämmchen dieser Netze sind im gefüllten Zustande über anderthalb Linien dick (Kohlrausch). Die profusen Nasenblutungen, und die beim fliessenden Schnupfen so copiösen Absonderungsmengen, werden hiedurch verständlich. Auch lässt sich aus dem Anschwellen dieser Netze durch Blutanhäufung erklären, warum man häufig durch das Nasenloch jener Seite, auf welcher man im Bette liegt, keine Luft hat.

Die Communicationsöffnungen der Nasenhöhle für die Nebenhöhlen werden durch den gewulsteten Zustand der Schleimmembran viel kleiner, als man sie am macerirten Schädel findet. Besonders auffallend ist dieses bei dem Eingange in die Highmorshöhle, welche in der Leiche nur als eine 1" bis 1 1/2" weite Spalte, in der Mitte des Meatus narium medius erscheint, während er am skeletirten Kopfe eine weite, zackige Oeffnung bildet. - Die Nasenmundung des Thränen-Nasenganges liegt im Meatus narium inserior in einer Bucht, die dem Ansatze des vorderen Endes der unteren Nasenmuschel an die Crista des Nasenfortsatzes des Oberkiefers entspricht. Die Entfernung der Nasenmundung des Thränennasenganges vom äusseren Nasenloch beträgt 9 Linien. Sie bildet eine 1 1/2 " lange, schmale, fast senkrecht stehende Spalte, welche für Injectionsinstrumente, die durch die Nasenöffnung eingeleitet werden, zugänglich ist (Gensoul). - Hasner (Prager Vierteljahresschrift. II. Bd. pag. 135 sqq.) beschrieb eine kleine, halbmondformige Falte an der Mündung des Thränennasenganges. Diese Klappe ist so gestellt, dass sie sich durch die beim Ausathmen an die Wände obiger Bucht anprallende Lust, auf die Oessnung legt, und die Thränenwege lustdicht von der Nasenhöhle absperrt. Sie erklärt uns, warum man durch hestiges Ausathmen (bei geschlossenen Mund- und Nasenössnungen) keine Lust aus der Nasenhöhle dorch die Thränenwege ausweichen sieht.

Nil Stenson (de musculis et glandulis. Amstel., 1664. pag. 37) entdeckte eine Communication der Nasen - mit der Mundschleimhaut, in Form zweier häutiger Gänge, welche durch die Canales naso-palatini, vom Boden der Nasenhöhle zum Munde verlaufen. Jacobson (Annales du mus. d'hist. nat. Tom. 18) und Rosenthal (Tiedemann und Treviranus, Zeitschrift für Physiol. Tom. II.) entrissen diese Entdeckung der Vergessenheit, und führten sie in grösserem Massstabe aus. Nach meinen Beobachtungen verhalten sich die Stenson'schen Kanäle wie folgt: Einen Zoll hinter der Spina nasalis anterior liegt beiderseits von der Crista nasalis inferior eine längliche, mit einem Borstenhaare leicht zu sondirende, geschlitzte Oeffnung, welche in einen häutigen Schlauch geleitet, der stark schräge nach vorn läuft, sich trichterförmig verengt (durch knorpelartige Verdickung seiner Wand), durch den Canalis naso-palatinus zum harten Gaumen tritt, und sich bald mit dem der anderen Seite vereinigt, bald neben ihm auf einer Schleimhautpapille ausmündet, welche unmittelbar hinter den Schneidezähnen in der Medianlinie des harten Gaumens steht. Die Weite des Kanals ist sehr veränderlich, und nicht durch seine ganze Länge, welche ungefähr 5" misst, gleichbleibend. Zuweilen erweitert er sich vor seiner Ausmundung. Die Oeffnung am Gaumen fand ich an eilf Leichen, wo ich darnach suchte, jedesmal. Der Kanal hat keine besondere physiologische Bedeutung, und es ist ganz wahrscheinlich, dass er nach Huschke's Vorstellung blos die auf ein Minimum reducirte grosse Communicationsöffnung der embryonischen Nasen - und Mundhöhle sei. Der Kanal wird auch als Jacobson'sches Organ erwähnt, welche Benennung ihm durchaus nicht zukommt, da das von Jacobson bei mehreren Säugethierordnungen beschriebene, räthselhaste Organ, beim Menschen spurlos fehlt. Es besteht aus einem paarigen, am Boden der Nasenhöhle, neben der Scheidewand gelegenen, von einer knorpeligen Kapsel umschlossenen Schleimhautsack. der sich mit seiner Oeffnung in den Stenson'schen Gang seiner Seite öffnet. Beim Schafe mundet das Organ neben den Gaumenöffnungen dieser Gänge.

Wir kennen nur im Allgemeinen den Nervenreichthum der Nasenschleimhaut. Die peripherischen Nervenendigungen sind zur Zeit noch unbekannt. Eben so arm ist die Wissenschaft an Einsichten in die Art des Einwirkens der Riechstoffe auf die Nerven. So viel steht fest, dass die Nasenschleimhaut nicht blos für Gerüche, sondern auch für Tastempfindungen empfänglich ist - Kitzel. Die Riechstoffe, deren Natur übrigens auch im Dunkeln liegt, müssen durch die Schleimhaut durchdringen, um mit den Nervenenden in Wechselwirkung zu treten (Endosmosis), und da nur feuchte Häute permeabel sind, erklärt sich der Reichthum an Schleimdrüsen, und die Entwicklung der Nebenhöhlen der Nase, welche ihr schleimiges Secret gleichfalls in die Nase ergiessen. Bei trockener Nasenschleimhaut (im Stockschnupsen) ist der Geruch verloren, und viele Körper riechen nur, wenn sie beseuchtet oder angehaucht werden. Da die Riechstoffe nur durch das Einathmen in die Nasenhöhle gebracht werden, so ist das Geruchorgan eigentlich das Atrium respirationis, und giebt uns warnende Kunde über mephitische und irrespirable Gasarten. Es wäre insofern nicht unpassend, die Nasenhöhle die Athmungshöhle des Kopfes zu nennen. — Durch Versuche ist es hinlänglich constatirt, dass die Schleimhaut der Nebenhöhlen für Gerüche unempfindlich ist. Ich habe selbst bei einem Mädchen, welches an Hydrops antri Highmori litt, 4 Tage nach gemachter Punction der Höhle, durch 10 Tropfen Acet. arom., welche durch eine Canüle in die Höhle eingeträuselt wurden, keine Geruchsempfindung entstehen gesehen. Deschamps u. A. haben dieselbe Erfahrung an der Stirnhöhle gemacht. - Nur in der Luft suspendirte Riechstoffe werden gerochen. Wird die Nasenhöhle in liegender Stellung des Kopfes mit Wasser gefüllt, welches mit eau de Cologne versetzt ist, so entsteht keine Geruchsempfindung.

C. Sehorgan.

I. Schutz - und Hilfsapparate.

§. 199. Augenlider und Augenbrauen.

Das Wesentliche des Sehorgans — der Augapfel — wird zur Aufrechthaltung seiner so oftmal zufällig von aussen bedrohten Existenz, mit Schutzapparaten umgeben, welche seiner mechanischen und dynamischen, durch grelles Licht bewirkten Reizung, vorbauen: Augenlider und Brauen, oder seine der Aussenwelt zugewendete durchsichtige Wölbung abwaschen und reinigen: Thränenorgane, oder ihn in die, beim Fixiren der Gegenstände zweckmässige Stellung bringen: Augenmuskeln.

Die Augenlider, Palpebrae, sind zwei bewegliche, durch Faltung des Integuments gebildete, und durch Knorpel gestützte Deckel, welche sich vor dem Auge nähern und entsernen, das Auge gewissermassen abstreifen, und dadurch zufällige, mechanische Impedimenta visus wegfegen, aber auch die für den Glanz und die Durchsichtigkeit des Auges nothwendige Feuchtigkeit gleichmässig über dasselbe verbreiten. Die zwischen ihren freien. horizontalen, glatten Rändern offene Querspalte, Fissura s. Rima palpebrarum, bildet mit ihren beiden Enden die Augenwinkel, Canthi, von welchen der aussere spitzig zuläuft, der innere wie ausgeschweift erscheint. Der freie Rand des oberen Augenlids ist der Länge nach etwas convex, der des unteren entsprechend concav. Jeder Rand zeigt eine vordere scharfe Kante, wo die Wimperhaare austreten, und eine hintere stumpsere, mehr abgerundete, an welcher die Oessnungen der Meibom'schen Drüsen liegen. Die Wimperhaare (Cilia) sind kurze, steife, im oberen Augenlide nach oben, im unteren nach unten gekrümmte Haare, von 2" bis 4" Länge. Ihre Wurzeln liegen zwischen dem Augenlidknorpel und den tiesen Fasern des Sphincter palpebrarum, in 1/2" - 1" langen Bälgen, welche die Aussührungsgänge kleiner nebenan liegender Talgdrüsen aufnehmen.

Die Grundlage jedes Augenlids bildet ein Faserknorpel (Tarsus), welcher der vorderen Augapfelstäche entsprechend gewölbt ist, gegen den Rand des Augenlids bis 0,6" dick wird, und die Form und Festigkeit des Lids bestimmt. Der Knorpel des oberen Augenlids ist grösser und steiser, der des unteren eben so breit wie der obere, aber niedriger, dünner, weicher, von mehr sibröser Natur. Sie werden an den Margo orbitalis durch starke sibröse Membranen besestigt (Ligamentum tarsi superioris et inferioris), und am inneren Augenwinkel durch das 2" lange, von oben nach unten

platte Ligamentum canthi internum an den Stirnfortsatz des Oberkiefers. am äusseren Augenwinkel durch das viel schwächere, aber breitere Ligamentum canthi externum an die Augenhöhlensläche des Stirnsortsatzes des Jochbeins besestigt. Auf der vorderen convexen Fläche des Knorpels lieut. durch eine dünne Zellgewebsschichte von ihr getrennt, der Musculus ciliaris (§. 148), als eigentlicher Schliesser der Augenlider, auf welchen eine fettlose Schichte Unterhautzellgewebe, und das laxe, dünne, leicht in Falten hebbare Integument folgt. Auf der hinteren concaven Fläche finden sich in Grübchen des Knorpels eingesenkt, wohl auch ganz von ihm umschlossen (Zeis), die Meibom'schen Drüsen, als eine besondere Art von Talgdrusen. Man sieht an der hinteren Kante des freien Lidrandes (am oberen 30-40, am unteren 25-35) feine Oeffnungen, welche in dünne, durch die Bindehaut gelblich durchscheinende Drüsenschläuche von verschiedener Länge führen, auf welchen rundliche Bläschen (Acini) in ziemlicher Anzahl aufsitzen. Drückt man ein abgelöstes oberes Augenlid, wo die Drüsen grösser sind, am Rande mit den Fingernägeln, so presst man den Inhalt der Drüsen als einen feinen Talgfaden hervor (Sebum palnebrale s. Lema), welches im lebenden Auge den Lidrand beölt, um das Uebersliessen der Thränen zu verhindern, und am inneren Augenwinkel sich zuweilen in grösserer Menge ansammelt, und daselbst des Nachts mit dem Schleim der Augenlider zu einem bröcklichen Klümpchen erhärtet. Die allgemeine Decke schlägt sich, einer gewöhnlich üblichen Ausdrucksweise zufolge, mit Umwandlung ihrer histologischen Eigenschasten, von der vorderen Fläche der Augenlider zur hinteren, läuft an ihr, den Tarsusknorpel überziehend, bis in die Nähe des Margo orbitalis, und biegt sich von hier zur vorderen Fläche des Augapfels um, welcher sie innig anhängt. Dieser durch die Lidspalte eingedrungene, nirgends unterbrochene Fortsatz der Haut, ist die Bindehaut (Conjunctiva), welche, dem Gesagten zusolge, in die Conjunctiva palpebrarum und Conjunctiva bulbi unterschieden wird. Letztere zerfällt wieder in die Conjunctiva scleroticae und Conjunctiva corneae. Die Umschlagsstelle der Conjunctiva palpebrae zur Conjunctiva bulbi nennt man Fornix conjunctivae. Die Conjunctiva palpebrarum ist gesässreich; - sie erscheint, wenn das Augenlid umgestülpt wird, roth gesärbt, - ist an der Umbeugungsstelle in die Conjunctiva bulbi mit gehäusten, einfachen, und traubig verbundenen Schleimdrüschen versehen (von C. Krause zuerst beschrieben), besitzt ein mehrfach geschichtetes Epithelium, und hat somit alle Charaktere einer Schleimhaut angenommen. Unter dem Epithelium erstreckt sich, vom freien Rande des Lids bis zur Umbeugung der Conjunctiva hin, der sogenannte Textus papillaris, eine Folge von niedrigen fadensormigen Papillen (Tastwärzchen), welche bei katarrhalischen Zuständen der Bindehaut schon mit freiem Auge bemerkbar sind, und theils einzeln, theils in Reihen geordnet stehen. Die Conjunctiva bulbi verliert ihren Gesässreichthum bis auf wenige, von den Augenwinkeln gegen die Hornhaut strebende Gesässbüschel, die Schleimdrüsen und Papillen schwinden, und auf der Cornea liess man nur das Epithelium der Conjunctiva übrig bleiben. Man kann sich jedoch leicht überzeugen, dass die Fasern der Conjunctiva in die oberstächliche Schichte der Cornea übergehen, wenn man an einem in Kalilauge gehärteten Augapsel oberstächlich ein Scheibchen abträgt, welches den Rand der Cornea enthält, und bei dessen mikroskopischer Untersuchung man die Fasern der höchsten Conjunctivaschichte, in die oberstächliche Schichte der Cornea fortlausen sieht. — Bevor die Conjunctiva scleroticae in die Conjunctiva corneae übergeht, schwillt sie zu einem ½"—1" breiten Wulste auf (Annulus conjunctivae), welcher sich über den oberen und unteren Rand der Cornea etwas vorschiebt, so dass letztere Membran etwas queroval erscheint.

Am inneren Augenwinkel bildet die Conjunctiva eine senkrecht gestellte, mit der Concavität nach aussen gerichtete Duplicatur, die Plica semilunaris s. Palpebra tertia, eine Erinnerung an die Nick- oder Blinzhaut, Membrana nictitans, der Thiere. Auf ihrer vorderen Fläche liegt, in die Bucht des inneren Augenwinkels hineinragend, die Caruncula lacrymalis, ein Häuschen von Talgdrüsen, welche in einem zellgewebigen, blutgesässreichen Lager eingesenkt sind.

Die Augenbrauen, Supercilia, sind mehr oder weniger buschigbehaarte, nach oben convexe Bogen, welche die Grenze zwischen Stirn- und Augengegend bilden, mit dem Margo orbitalis superior, nicht mit dem Arcus superciliaris des Stirnbeins parallel laufen, und aus dicken, kurzen, schräg nach aussen gerichteten Haaren, welche am letzten ergrauen, zusammengesetzt sind. Sie beschatten das Auge (?), und dämmen den Stirnschweiss ab.

Die äussere Haut der Augenlider ist, ihrer Laxität und der Armuth an Unterhautzellstoff wegen, sehr zu krankhaften Ausdehnungen geneigt, welche beim Rothlauf und bei Wassersuchten so bedeutend werden können, dass die Augenlidspalte dadurch verschlossen wird. Selbst bei gesunden Individuen bildet die Haut des unteren Lides zuweilen einen mit seröser Flüssigkeit infiltrirten, bläulich gefärbten Beutel, der durch eine tiefe Furche von der Wange abgegrenzt wird. Die Hauterschlaffung am oberen Lide, welche Einwärtskehrung des behaarten Lidrandes zur Folge hat, muss sogar durch Exstirpation eines muldenförmigen Stückes aus dem Integument beseitigt werden.

Das Epithelium der Conjunctiva palpebralis ist ein geschichtetes, und besteht in der Tiefe aus länglichen (cylindrischen) Zellen, auf welchen eine Schichte oberflächlicher, mehr polygonaler Zellen ausliegt. An der Conjunctiva scleroticae werden die Zellen eckiger, und setzen auf der Cornea ein facettirtes Pflasterepithelium zusammen, welches aus mehreren über einander geschichteten Lagen besteht, von welchen die tiefen aus länglichen, auf der Cornea senkrechten, die oberflächlichen aus runden und slachen Zellen zusammengesetzt sind. Nach dem Tode fallen die Epithelialzellen der Hornhaut ab (vielleicht schon im Sterben beim Brechen der Augen), die Hornhaut verliert ihren Glanz, und wird matt. Auch bei gewissen Augenkrankheiten, wo die Cornea wie bestaubt erscheint, fallen einzelne Zellen aus. Ueber die traubensormigen Drüsen der Conjunctiva, welche sich im Fornix conjunctivae

. 3-

zu 8—20 vorfinden, siehe: W. Krause (Sohn) in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift, 1854. pag. 337.

Die Tastwärzchen der Conjunctiva, deren Höhe Krause von 1/32"—1/10" bestimmt, werden an Triefaugen und beim Trachoma 0,5"—1" lang. An der Conjunctiva scleroticae finde ich sie nicht bei gesunden Augen. Sie vermitteln offenbar das Tastgefühl der Lider, welches durch die kleinsten Staubtheilchen, die zwischen Auge und Augenlid gerathen, so schmerzvoll aufgeregt wird. Die laxen Umschlagsstellen der Conjunctiva palpebrae und Conjunctiva bulbi schliessen in der Regel zwischen den Vorragungen ihrer Warzen die fremden Körper ein, die zufällig (z. B. bei Schmieden und Steinmetzen während ihrer Arbeit) ins Auge springen. Lässt man das Auge nach auf oder abwärts richten, und hebt man mittelst der Cilien das Lid auf, um es umzustürzen, und seine innere Fläche nach aussen zu kehren, so kann die Umschlagsstelle der Conjunctiva leicht am oberen und unteren Augenlide gesehen werden.

§. 200. Thränenorgane.

Es finden sich in jeder Augenhöhle zwei Thränendrüsen, Glan-Die obere grössere liegt in der Fossa des Processus dulae lacrymales. zygomaticus des Stirnbeins, die untere kleinere dicht an ihr, aber etwas tiefer. Beide bestehen aus rundlichen Drüsenkörnern, welche durch kurzen Zellstoff ziemlich fest zusammengehalten, und durch eine gemeinschaftliche Zellgewebshülle oberslächlich überzogen werden. Die dem Augapfel zugewendete Fläche ist an der oberen Thränendrüse concav, die äussere Sie liegt in der Fossa lacrymalis so tief, dass sie nach Abtragung des Augenlids nur ihren vorderen Rand sehen lässt. Die einzelnen Drüsenkörper schliessen die bläschenformigen Anfänge der kleinsten Ausführungsgänge ein, welche sich zu grösseren Stämmchen vereinigen, und 6-10 an der Zahl, schräge nach innen und abwärts laufend, die Umbeugungsstelle der Conjunctiva desoberen Lids (Fornix conjunctivae superior) über dem äusseren Augenwinkel durchbohren, und ihren Inhalt bei den Bewegungen des Lids an der vorderen Fläche des Bulbus verbreiten. Der äusserste (unterste) von den Ausführungsgängen der Thränendrüse mündet in den Fornix conjunctivae inferior unterhalb des äusseren Augenwinkels, wodurch auch die vom unteren Augenlide bedeckte Fläche des Augapfels mit Thränenslüssigkeit befeuchtet wird.

Die über die vordere Fläche des Augapfels durch die Bewegungen der Augenlider ergossene Thränenslüssigkeit, wird bei jedem Schliessen der Lidspalte durch die hintere Kante des Lidrandes vom Bulbus wieder weggewischt, und in einen kleinen dreieckigen Raum gesammelt, welcher nur im Momente des Contactes beider Augenlidränder existirt, und durch die hintere, etwas abgerundete Kante der beiden Lidränder, so wie durch einen kleinen Streisen der vorderen Fläche des Bulbus gebildet wird. Er hat eine horizontale Richtung, und heisst, weil die Thränen in ihm zum inneren Augenwinkel strömen, der Thränenbach, Rivus lacrymarum. Der Thrä-

nenbach wird während des Schliessens der Lider nicht in seiner ganzen Lange auf einmal gebildet, sondern schliesst sich successiv, obwohl sehr schnell, von aussen nach innen, weil auch die Lidrander im Moment des Schliessens sich nicht augenblicklich an allen Punkten berühren, sondern der Contact von aussen nach innen erfolgt. Da aber dieser Thränenbach ein viel zu kleines Bett hat, um alle Thränenslüssigkeit aufzunehmen, und weiter zu sühren, so müssen auch der Fornix conjunctivae superior et inferior einen Theil der Ableitung, und zwar den beträchtlichsten, übernehmen. - Der im inneren Augenwinkel, zwischen der Bucht des Winkels, der Plica semilunaris und Caruncula lacrymalis, befindliche Raum ist der Thranensee, Lacus lacrymarum. In ihm sammeln sich die durch die Thränenbäche hieher geleiteten Thränen, und er lässt sie, wenn sie im Ueberschusse zuströmen, über die Wange ablaufen. Bei gewöhnlichen Absonderungsmengen werden sie durch die am inneren Ende der hinteren Kante des Lidrandes liegenden, kleinen, mit wulstigen Rändern umgebenen Oeffnungen - Thränenpunkte, Puncta lacrymalia - aufgesaugt. Jedes Augenlid hat ein Punctum lacrymale, das untere ist meistens grösser als das obere. Beide tauchen sich während des Schliessens der Augenlider in den Thränensee ein, und absorbiren durch einen noch nicht genau erforschten Mechanismus die Thränenseuchtigkeit. Die Thränenpunkte geleiten in die Thränenröhrchen (Canaliculi lacrymales, Cornua limacum). Diese sind häutige, durch eine in die Thränenpunkte eindringende Fortsetzung der Conjunctiva gebildete Kanälchen, welche anfangs die Feinheit der Thränenpunkte haben, dann sich aber erweitern, und in Kreisbogen (deren Mittelpunkt in der Caruncula liegt) gegen den inneren Augenwinkel ziehen, wo sie sich in die äussere Wand des Thränensacks entweder isolirt, oder zu einem kurzen gemeinschaftlichen Röhrchen vereinigt, einsenken.

Der Thränensack, Saccus lacrymalis s. Dacryocystis, liegt in der Fossa lacrymalis, wird vom Ligamentum palpebrale internum gekreuzt, und an seiner äusseren, dem Bulbus zugekehrten Fläche, von einer fibrösen Haut (Fortsetzung der Periorbita) überzogen. 1½ Linien unter seinem oberen blindsackförmigen Ende münden die Canaliculi lacrymales ein. Nach abwärts geht er in den häutigen Thränennasengang über, welcher kaum merklich enger als der Thränensack ist, und, wie beim Geruchorgan bemerkt wurde, im unteren Nasengange ausmündet.

Der untere Thränenpunkt wird seiner Weite wegen zu Einspritzungen dem oberen vorgezogen. — Dass bei alten Leuten der obere Thränenpunkt verwachse, und dadurch Thränenträuseln entstehe, ist eine ganz willkürliche Annahme. — Die in älteren Kupserwerken geradlinig convergent abgebildeten Thränenröhrchen, veranlassten den sonderbaren Namen der Schneckenhörner, Cornua limacum. — Die das ganze System der Thränenwege auskleidende Schleimhaut, vermittelt eine im gesunden und kranken Zustande häusig zu beobachtende Sympathie zwischen der Nasenschleimhaut und der Conjunctiva. Ihr Epithelialüberzug ist sur den Thränensack und Thränennasengang Flimmerepithelium, sur die übrigen Thränenwege ein geschichtetes Psasterepithelium.

— An der Einmundungsstelle der Thränenröhrchen in den Thränensack, findet sich nach Huschke ein halbmondförmiges Schleimhautfälltchen, welches das Ostium der Röhrchen nicht vollkommen deckt. — Janin und Pappenheim haben an den Thränenpunkten Kreismuskeln, und im Verlause der Thränenröhrchen longitudinale Muskelfasern gefunden. Ich halte diese Fasern für gewöhnliche Bindegewebsibrillen und elastische Fasern, wie sie auch in der Wand des Thränensackes und Thränennasenganges vorkommen.

Der Thränensack besitzt einen eigenen Muskel, den Musculus Horners (Philadelphia Journal, 1824. Nov. p. 98), welcher an der Crista des Thränenbeins entspringt, quer über den Thränensack nach vorn geht, und sich in zwei Bündel theilt, welche die Thränenkanäle einhüllen, und in die am Augenlidrande verlausenden Fasern des Sphincter palpebrarum übergehen. Rosenmüller hat ihn schon 1819 gekannt, und Trasmondi 1824 seine Nerven beschrieben. Abbildung des Muskels in Arnold's Icones. T. IV. Fig. 3. 2.

§. 201. Augenmuskeln.

Es finden sich in der Augenhöhle sieben Muskeln, wovon sechs für die Bewegungen des Bulbus, einer für das obere Augenlid bestimmt ist. Hat man an einem Kopfe, an welchem bereits die Schädelhöhle geöffnet und entleert wurde, die obere Wand der Augenhöhle durch zwei, gegen das Sehloch convergirende Schnitte abgetragen, so findet sich unter der Periorbita zunächst:

Der Ausheber des oberen Augenlids, Levator palpebrae superioris, welcher von der oberen Peripherie der Scheide des Sehnerven, dicht vor dem Foramen opticum, entspringt, und gerade nach vorn laufend, unter dem Margo orbitalis superior, und hinter dem Ligamentum tarsi superioris aus der Augenhöhle tritt, um mit einer platten, sich sächersormig ausbreitenden Sehne, sich an den oberen Rand des oberen Lidknorpels zu inseriren. Nach Trennung des Aufhebers, und sorgfältiger Entfernung des die Augenhöhle reichlich ausfüllenden Fettes, sieht man noch fünf Muskeln, rings um die Eintrittsstelle des Nervus opticus in die Orbita, von der Scheide des Sehnerven entspringen. Vier davon verlaufen geradlinig, aber divergent zur oberen, unteren, äusseren, und inneren Peripherie des Augapfels, und besestigen sich mit dunnen, aber breiten Sehnen, an die ausserste sehnige Haut (Sclerotica) desselben. Sie werden ihrer Richtung wegen Recti genannt, und wir zählen einen Rectus externus, internus, superior und inferior. Der äusserste ist der stärkste, und entspringt mit zwei Portionen, zwischen welchen das 3. und 6. Nervenpaar, und der Ramus naso-ciliaris des ersten Astes des fanften Paares hindurchziehen. funfte, vom Foramen opticum herkommende Muskel, gelangt nur auf Umwegen zum Augapfel. Er verläust im oberen inneren Winkel der Orbita nach vorn, und lässt seine dünne Sehne über eine knorpelige Rinne (Rolle, Trochlea) laufen, welche durch zwei von ihren Rändern entspringende Bandchen, an die Fovea oder den Hamulus trochlearis des Stirnbeins aufgehängt ist, ändert dann plötzlich seine Richtung, und geht breiter werdend nach aus- und rückwärts, unter der Insertion des oberen Rectus, zur Sklerotica. Die schiefe Richtung seiner Sehne giebt ihm den Namen des oberen schiefen Augenmuskels, Musculus obliquus superior, sein Verhältniss zur Rolle den des Rollmuskels, Musculus trochlearis, und seine supponirte Wirkung bei Affecten jenen des Musculus patheticus. Der letzte Muskel des Augapfels, der untere schiefe, Musculus obliquus inferior, entspringt nicht an der Sehnervenscheide, sondern vom inneren Ende des unteren Augenhöhlenrandes, geht unter der Endsehne des Rectus inferior nach oben und hinten zur äusseren Peripherie des Bulbus, und inserirt sich an die Sklerotica, zwischen dem Sehnerv und der Sehne des Rectus externus.

Da die zwei Obliqui schief von vorn her, und die 4 Recti gerade von hinten her zum Bulbus treten, so werden beide Muskelgruppen in einem antagonistischen Verhältniss zu einander stehen. Die schiefe Richtung jedes Obliquus lässt sich in eine quere und gerade auflösen. Nur die quere Richtung macht die Obliqui zu Drehern des Bulbus; — die gerade Richtung wirkt jener der Recti direct entgegen und man kann somit sagen: der Bulbus wird durch die Recti und Obliqui äquilibrirt.

Es ist nicht zulässlich, der gemeinschastlichen Wirkung der vier geraden Augenmuskeln eine Retractionsbewegung des Bulbus zuzuschreiben. Das Fett der Augenhöhle hindert mechanisch diese Bewegung, welche durch die Erfahrung nicht sestgestellt ist. Auch musste der Sehnerv dahei eine Biegung oder Knickung erleiden. — Die vier geraden und die beiden schiefen Augenmuskeln drehen den Bulbus um drei auf einander senkrechte Axen. Drehungen werden ohne eine Ortsveränderung des Bulbus ausgeführt. Drehungsaxe für die Bewegung, die der Bulbus durch den oberen und unteren Rectus erleidet, liegt horizontal von aussen nach innen, - für den äusseren und inneren Rectus senkrecht, - für die beiden schiesen horizontal von vorn nach hinten. Alle drei Axen schneiden sich in einem Punkte, der innerhalb des Bulbus liegt, und der das unverrückbare Centrum aller Bewegungen vorstellt. Er liegt nach Volkmann's genauen Messungen 5,064" bis 6,264" hinter dem convexesten Punkte der Hornhaut. Von Aufheben. Niederziehen, Aus- oder Einwärtsbewegungen kann nichts vorkommen, da die Recti in der Richtung der Tangenten der Augenkugel verlaufen. - Durch Lospräpariren der Conjunctiva scleroticae können die Sehnen aller Augenmuskeln blosgelegt, ihre fleischigen Bäuche durch Haken hervorgezogen, und zerschnitten werden, worauf das in der neuesten Zeit in Schwung gebrachte Operationsverfahren zur Heilung des auf Verkürzung eines Augenmuskels beruhenden Schielens gegrundet ist.

Ueber die Bewegungen des Augapsels siehe: A. Fick, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Neue Folge, 4. Bd. 1. Hest.

Die Fascia Tenoni oder Tunica vaginalis bulbi ist eine den Bulbus umhüllende fibröse Membran, welche nur lose mit der Sklerotica zusammenhängt, und deshalb eine Art Kapsel bildet, in welcher sich der Bulbus nach jeder Richtung drehen kann. Sie entspringt an der Umrandung der Orbita, geht hinter der Conjunctiva bis zum Hornhautrand, und schlägt sich von hierals Kapsel um den ganzen Bulbus herum bis zum Sehnerveneintritt. Sie wird von den Sehnen der Augenmuskeln durchbohrt. Ferral (Froriep's Notizen-1841. 19. Band. p. 249) hat sie als eine neue Entdeckung beschrieben.

Siehe Tenon, sur une nouvelle tunique de l'oeil, in dessen Mémoires et observations sur l'anatomie, pag. 200. — Unvollkommen war die Membran schon lange vor Tenon bekannt, und von Reald. Columbus (de re anatomica. Venet., 1559. lib. X.) als Tunica innominata erwähnt. Selbst Galen hatte sie nicht übersehen: "Sexta quaedam tunica extrinsecus prope accedit, in duram tunicam inserta." De usu part. cap. 2.

II. Augapfel.

§. 202. Allgemeines über den Augapfel.

Der Augapfel (Bulbus oculi) ist ein nach den optischen Gesetzen einer Camera obscura gebautes Sehwerkzeug, von höchster Vollkommenheit. Er hat die Gestalt eines Ellipsoids (nach Herschel und Krause), an dessen vorderer Seite ein kleines Kugelsegment angesetzt ist, und besteht aus concentrisch in einander geschachtelten Häuten (Sclerotica, Choroidea, Retina, mit ihren Unterabtheilungen), welche einen, mit den durchsichtigen Medien des Auges gefüllten Raum umschliessen, und von aussen nach innen an Dicke abnehmen. Diese Häute lassen sich wie die Schalen einer Zwiebel ablösen, — daher der lateinische Name Bulbus. Die Häute, die die vordere, der Aussenwelt zugekehrte, kugelig-convexe Seite des Bulbus einnehmen, sind entweder durchsichtig (Cornea), oder durchbrochen (Iris), um dem Lichte Zutritt zu gestatten. - Der Augapsel nimmt nicht die Mitte der Orbitalöffnung ein, sondern steht der inneren Augenhöhlenwand etwas näher als der äusseren, welches wahrscheinlich durch die Tendenz beider Augäpfel zu convergiren bedingt wird. Sein vorderer Abschnitt ragt mehr oder weniger über die Ebene der Orbitalöffnung hervor, ein Umstand, der auf die leichtere oder schwierigere Aussührbarkeit gewisser Augenoperationen Einfluss hat. Bei Verminderung des Fettes der Augenhöhle tritt der Bulbus in die Orbita etwas zurück, und das sogenannte hohle Auge ist ein nie fehlender Begleiter aller auszehrenden Krankheiten. Volumen und Gewicht unterliegen vielen Schwankungen, und sind überhaupt grösser bei Bewohnern südlicher Zonen.

Alle organischen Gewebe haben im Auge ihre Repräsentanten, und die den Naturphilosophen geläufigen Ausdrücke: Organismus im Organismus, Microcosmus in macrocosmo, haben insofern einigen Sinn. Die Durchsichtigkeit der Augenmedien lässt die Blicke des Arztes in das Innere dieses herrlichen Baues dringen, und macht die verborgensten Krankheiten desselben, insbesondere unter Anwendung des Augenspiegels, der Beobachtung zugänglich.

Nach Krause beträgt der von vorn nach hinten gezogene gerade Durchmesser des Auges 10⁴/2'''—11'''. Der Querdurchmesser ist dem geraden gleich, der senkrechte um ¹/10'''—¹/a''' kürzer, — der von aussen und oben nach innen und unten gezogene Diagonaldurchmesser um ¹/10'''—³/10''' grösser als der gerade, — der in entgegengesetzter Richtung gezogene aber überhaupt der grösste und — 11'''—11¹/a'''.

§. 203. Sklerotica und Cornea.

Die weisse oder harte Augenhaut, Sclerotica (besser Sclera, von σκληρός, hart), und die durchsichtige Hornhaut, Cornea, bilden zusammen die äussere Hautschichte des Bulbus.

Die Sklerotica (auch Albuginea und vor Alters Cornea opaca genannt) ist eine sibröse Membran, die die Grösse und Form des Augapsels bestimmt, eine hintere kleine, zum Eintritte des Sehnerven in den Bulbus, und eine vordere grössere Oeffnung besitzt, in welche die durchsichtige Hornhaut eingepflanzt ist. Die Gestalt dieser Oeffnungen bietet bemerkenswerthe Eigenschaften dar. Es muss vorerst festgehalten werden, dass die Dicke der Sklerotica an ihrer grössten Peripherie am geringsten, vorn und rückwärts dagegen bedeutender ist. Beide Oeffnungen sind also, da sie die dicksten Theile der Sklerotica durchbohren, eigentlich kurze Kanäle, welche aber nicht cylindrisch sind, sondern etwas konisch oder trichter-Die Oeffnung für den Sehnerven ist an der äusseren formig zulaufen. Oberstäche der Sklerotica um eine halbe Linie weiter, als an der inneren; die Cornealöffnung dagegen an der ausseren Oberfläche enger, als an der Die Sehnervenöffnung liegt nicht im Mittelpunkt des hinteren Augapfelsegments, sondern 1,3" einwärts von ihm. Der Sehnerv giebt, bevor er in den Bulbus eintritt, eine fibrose Scheide, die er von der harten Hirnhaut entlehnte, an die Sklerotica ab. Schneidet man den Sehnerv im Niveau der Sklerotica quer durch, so sieht man sein Mark durch ein feines Fasersieb in die Höhle des Bulbus vordringen. Zerstört man das Mark durch Maceration, so bleibt das feine Sieb zurück, und gab Veranlassung, in der Sehnervenöffnung der Sklerotica eine besondere Lamine eribrosa anzunehmen, welche jedoch, dem Gesagten zufolge, nur die Ansicht des Querschnittes der die einzelnen Fäden des Sehnerven umhüllenden Scheiden sein kann. — Die Cornealöffnung der Sklerotica umfasst die Cornea, wie der Rand eines Uhrgehäuses das Glas, d. h. der Rand der Sklerotica schiebt sich etwas über den Rand der Cornea hinauf. — Die innere Oberstäche der Sklerotica ist mit der ausseren der zweiten Augenschichte, durch zarte Bindegewebbündel (welche besonders rückwärts zahlreiche, aber vereinzelt stehende braune Pigmentzellen enthalten) locker verbunden. Dieses Bindegewebe ist die Membrana s. Lamina fusca. Bochdalek hat im Auge des Menschen, des Rindes, und des Kaninchens nachgewiesen, dass die Nervi ciliares, welche den hinteren Abschnitt der Sklerotica durchbohren, um zu den Häuten der zweiten Augenschichte zu gelangen, während des Durchgangs durch die Sklerotica, der letzteren feine Zweigehen abgeben, und nach dem Durchgange, in der Lamina fusca, mittelst Abgabe sehr feiner Seitenästchen, schöne, zarte Netze bilden, welche zum Theil in Furchen an der inneren Fläche der Sklerotica eingesenkt liegen.

Die durchsichtige Hornhaut, Cornea, bildet den vordersten

durchsichtigen, kugelig (nach Senff elliptisch) convexen Aufsatz des Bulbus, mit 5" Querdurchmesser an der Basis. Ihr grösster Umfang ist keine Kreislinie, sondern ein quergestelltes Oval, indem die ausserste Lamelle der Sklerotica sich oben und unten weiter über die Cornea vorschiebt, als aussen und innen. - Es giebt keine Periode im Embryoleben, wo Sklerotica und Cornea von einander getrennt wären, - es kann somit auch nicht von einer Verbindung derselben unter einander gesprochen werden. Die Sklerotica setzt sich vielmehr unmittelbar in die Cornea fort, und ist mit ihr Eins, weil sie gleichzeitig mit ihr entsteht. Der sogenannte Rand der Sklerotica, der die Cornea umfasst, ist nur die Marke, von wo aus die Sklerotica ihre histologischen und chemischen Eigenschaften aufgiebt, um andere anzunehmen, und zur Cornea zu werden. An der Stelle, wo die Cornea in die Sklerotica übergeht, findet sich ein kreisförmiger venöser Sinus (Canalis Schlemmii), der namentlich bei Erhenkten von Blut strotzt. und hinreichend weit ist, um eine Borste in ihn einsuhren zu können. — Die vordere Fläche der Cornea ist mit der Conjunctiva corneae, die hintere, parabolische, mit einer feinen, glashellen und structurlosen Membran (Membrana Descemetii s. Demoursii) überzogen, in welcher sich, ausser einer geringen Spur von Streifung an der Bruchfläche, keine faserige Structur erkennen lässt.

Das Mikroskop zeigt im Gewebe der Sklerotica feine, zu Bündeln vereinigte, kantige, nicht geschlängelte Bindegewebfasern, von 0,001" Dicke. Die Bundel laufen theils nach der Richtung der Meridiane der Kugel, theils, obwohl minder genau, nach den Parallelkreisen derselben, kreuzen und verweben sich, und nehmen in ihren Zwischenräumen die von Huschke entdeckten, kreideweissen, mit strahligen Aestchen versehenen Körperchen auf, welche an den dicken Stellen der Sklerotica zahlreicher, als an dunnen vorkommen. Ich halte diese Körperchen für Spalten und Räume zwischen den Faserbündeln der Sklerotica, welche, weil sie an getrockneten Präparaten der Sklerotica Lust enthalten, unter dem Mikroskope bei Beleuchtung von oben weiss erscheinen. - Die Fasern der Sklerotica gelangen nicht alle bis zum Hornhautrande. Sie beugen sich haufenweise in verschiedener Entfernung von diesem nach hinten um, wodurch die Dicke der hinteren Partie erklärlich wird. Die Dicke der Sklerotica misst am Sehnerveneintritt 0.560", etwas vor der grössten Peripherie 0,260", am Cornealrande 0,400". Die vordere Verstärkung hängt von der Verwebung der Augenmuskelsehnen mit der Sklerotica ab. - Die Sklerotica ist sehr gestssarm, und deshalb weiss. Selbst bei Entzundungen steigt ihre Färbung nicht über das Rosenroth, und bei venösen Stasen in der zweiten Augenschichte, erscheint sie bläulichweiss.

Die Hornhaut, die, ihrer Glätte und Klarheit wegen, dem Auge seinen spiegelnden Glanz giebt, besteht, wie die Sklerotica, aus Fasern, die sich zu platten Strängen vereinigen, deren Flächen den Flächen der Cornea entsprechen. Die Stränge kreuzen sich wohl mannigfaltig, scheinen sich aber mehr in der Breite, als in der Tiefe zu verflechten, indem es leicht gelingt, mehrere Blätter von der Cornea abzuziehen. Pathologische Verhältnisse der Cound ein eigener unangenehmer Zufall bei der Staaroperation (das leighliche Vorschieben des Messers zwischen den Blättern der Homdie Augenkammer zu gelangen), sprechen zu Gunsten der

Nebst den Fasern enthält sie eine grosse Anzahl spindel- und stern Zellen, deren Aeste untereinander anastomosiren. Sie giebt durch keinen Leim, sondern Chondrin. Bowman spricht der Erste (und bis zige) von einer vollkommen structurlosen Schichte der Cornea, wel mittelbar unter dem äusseren Epithelium derselben gelegen sein soll.

Die Membrana Descemetit (An sola lens crystallina cataracta Paris, 1758) führt ihren Namen mit Unrecht, da sie schon 1729 von del (Treatise on the Diseases of the Horny Coat of the Eye. Lond.) hen wurde. An mehrere Tage lang macerirten Hornhäuten lässt sie continuirliche Membran abziehen. Sie besteht aus einer unmittelbar Cornea anliegenden, farb- und structurlosen Grundsubstanz, und einer folgenden Epithelialüberzuge, der aus eckigen, 0,005" grossen Zell deutlichem Kern, besteht. Nur das Epithelium setzt sich auf die vord fläche fort. Den Entwicklungsgesetzen des Auges zufolge, wäre sie ei autzung der Arachnoidea cerebri.

Der Streit, ob die Cornea Blutgesässe habe oder nicht, ist no entschieden. Die meisten Anatomen verwerfen sie. Ich spreche mich stimmtheit für ihre Existenz aus, und Kölliker scheint sich auf mei zu neigen. Die Blutgestsse unter dem Bindehautblättehen der Cornea Schröder van der Kolk in Utrecht an einem entzündeten Auge, Römer in Wien an einem ganz gesunden Auge durch Injection nachs worden. Das Römer'sche Präparat, an welchem ein reiches Netz von convergirenden Gestassstämmchen die Cornea deckt, habe ich selbst unt und erst vor Kurzem gelang mir eine Injection einer Kindesleiche dass die Blutgesässe der Cornea sich 2 Linien weit über den Rand d erstreckten. — Bei beginnender Geschwürsbildung der Hornhaut laufei horizontale Gesassbundel zur ulcerirenden Stelle, und die Veränderun Cornea im Pannus sind ohne Gestssbildung nicht möglich. An seinen skopischen Injectionen der Augen fand ich regelmässig strahlige Verlä gen der Conjunctivagesasse in den Hornhautrand eindringen (§. 45). Auge eines Füllens zählte ich deren dreizehn, wovon sieben, ohne 1 abzugeben, 1 1/2" weit vordringen. Nie aber sah ich diese Randge Venen übergehen, wenn auch die Injectionsmasse in den übrigen The Auges durch die Venen zurückkam. (Gerlach und Brücke dages sichern, schlingenähnliche Umbeugungen der in den Rand der Cornea tenden Arterienzweigehen gesehen zu haben.) Es ist somit anzunehmsie sich in sogenannte Vasa serosa fortsetzen, deren weiterer Verlauf wärtig noch unbekannt ist. Ihr Durchmesser beträgt am mens Auge im Mittel 0,0009", und da dieses Mass der injicirten Gest den lebenden Zustand noch viel zu gross ist, so können sie nur Bl führen, und bleiben deshalb unbemerkt. Am Fötusauge wurden d gesässe der Cornea zuerst von J. Müller entdeckt, und von Henle ner lnauguralis beschrieben und abgebildet. (De membr. pupillari. 1832.) Römer's Praparat ist in Ammon's Zeitschrift V. 21. Tab. I. Fig. 11 abgebildet.

Die von Schlemm an Thieraugen aufgefundenen Nerven der wurden von Bochdalek (Bericht über die Versammlung der Natur in Prag. 1837. pag. 182) auch im menschlichen Auge entdeckt, und Messer als Zweige der Cilialnerven unzweiselhaft nachgewiesen. Va und Purkinje bestätigten sie durch das Mikroskop, was Engel unnicht gelingen wollte. Rahn (Mittheilungen der naturf. Gesellsch. in 1848) fand sie ebenfalls am Kaninchenauge.

§. 204. Choroidea und Iris.

Die zweite Augenschichte bilden zwei gestässreiche Membranen, — die Aderhaut (Choroidea) und die Regenbogenhaut (Iris). Erstere stellt, wie die Sklerotica, eine hohle Kugel dar, deren vordere Oessnung durch die Iris ausgestüllt wird, welche nicht mehr mit der Cornea parallel ist, sondern als ebene Membran sich von ihr entsernt, wodurch ein Raum zwischen beiden Häuten srei bleibt, der als vordere Augenkammer später beschrieben wird.

Die Choroidea (richtiger Chorioidea, von xoglov und eldog, hautartig, obwohl sie bei den griechischen Autoren durchwegs als xogoeidig γιτών erscheint), ist eine mit der Sklerotica concentrisch verlaufende, nicht über 0,06" dicke, aus einem faserigen Grundgewebe und ungemein zahlreichen Blutgestässen gebildete Membran (daher sie auch Vasculosa oculi heisst), von schwärzlich brauner Farbe. Ihre Farbung ist das Resultat ihres Reichthums an Blutgesassen, und der Anlage eines schwarzen Färbestoffes (Pigmentum nigrum), welcher an ihrer inneren Fläche eine zusammenhängende Schichte - das sogenannte Tapetum nigrum - bildet. Durch Auswaschen und Abpinseln wird sie blassroth. Sie besitzt an ihrer hinteren Peripherie eine Oeffnung für den Eintritt des Sehnervenmarks, und verwandelt sich, bevor sie den vorderen Rand der Sklerotica erreicht, in das Corpus ciliare (Strahlenkörper), welches aus zwei einander deckenden Lagen besteht. Die oberstächliche Lage bildet einen graulichweissen, 1.3" breiten Ring - das Strahlenband der älteren Anatomen (Orbiculus ciliaris s. Ligamentum ciliare). Man weiss gegenwärtig als gewiss, dass dieses sogenannte Strahlenband ein Muskel ist: der Tensor choroideae. Er besteht aus organischen, von der Choroidea zur inneren Wand des Canalis Schlemmii laufenden Muskelfasern, welche die Choroidea gegen die Cornea ziehen, und sie dadurch um den Glaskörper herum stärker anspannen. (Durch diese verhürgte Thatsachen fällt die bis auf die neueste Zeit gangbar gewesene Eintheilung des sogenannten Strahlenbandes in einen Orbiculus ligamentosus und gangliosus weg). Die tiefe Lage des Corpus ciliare besteht aus einem Kranze von 70-75 Falten (Corona ciliaris), welche ihre freien Ränder gegen die Axe des Auges kehren. An ihrem Beginne sind die Falten niedrig, und werden gegen ihr vorderes Ende 0,4" hoch. Der Saum, durch welchen dieser gefaltete Theil der Choroidea vom schlichten getrennt wird, ist die Ora serrata. - Die Blutgestsse der Choroidea sind so vertheilt, dass die grösseren Venen an ihrer ausseren Flache liegen, wo sie sich in 4-6 quirlformig convergirenden Bündeln (Vasa vorticosa Stenonis) vereinigen, die feinsten Capillargesässe dagegen ihre concave Fläche einnehmen, wo sie ein ausserst sein gewirktes Netz von Blutgesassen zusammensetzen, welches, wenn die Gefässe mit rother Injectionsmasse glücklich gefüllt wurden, mit freiem Auge wie eine gleichsörmig roth thertünchte Fläche erscheint — Lamina Ruyschiana.

Die Regenbogenhaut oder Blendung (Iris) ist eine ringformige, in ihrer Mitte durch das Sehloch (Pupilla) durchbrochene, gestssreiche Membran, deren Fläche senkrecht auf der Augenaxe steht. Sie hat vor sich die Cornea, hinter sich die Krystalllinse, berührt aber weder die eine noch die andere, sondern flottirt frei in der Flüssigkeit (Humor aqueus), welche den Raum zwischen Hornhaut und Linse einnimmt. Ihr ausserer Rand, Margo ciliaris, ist mit dem vorderen Rande des Orbiculus ciliaris verbunden; ihr innerer Rand, Margo pupillaris, umgiebt die Pupille, welche nicht genau der Mitte der Iris entspricht, sondern etwas nach innen und unten (gegen die Nase) abweicht, wodurch der nach aussen von der Pupille liegende Theil der Iris etwas breiter als der innere wird. Die vordere Fläche ist mit dem Epithelium der Membrana Descemetii bedeckt, und ihre verschiedene Färbung bedingt die Farbenverschiedenheit menschlicher Augen. Die hintere Fläche ist rauher, mit seinen Fältchen besetzt, und mit einem dicken Stratum schwarzen Pigmentes überzogen, welches ihr das sammtartig glänzende Ansehen der inneren Fläche einer schwarzblauen Weinbeere verleiht - wodurch der Name Traubenhaut, Uvea (δαγοειδής), entstand, unter welchem somit nicht eine besondere Platte der Iris, sondern blos ihre hintere pigmentirte Fläche zu verstehen ist. (Die griechischen Autoren nannten die Iris und Choroidea zusammen δαγοειδής γιτών.)

Die glatten Muskelfasern der Iris bilden den Sphincter 'und den Dilatator pupillae. Die Zusammenziehung beider Muskeln erfolgt viel rascher, als es sonst bei glatten Muskelfasern zu geschehen pflegt. Der Sphincter umgiebt in Form eines Ringes den Pupillarrand der Iris. Er hat vor sich die Gesasse, hinter sich die Pigmentschichte der Iris. Der Dilatator entspringt am Rande der Cornea (nach Kölliker am Ciliarrande der Iris). und besteht aus isolirten, geraden, oder hie und da unter spitzen Winkeln anastomosirenden Bündeln, welche zwischen den Gefässen und Nerven der Iris zur hinteren Wand derselben, und zwar bis zum Pupillarrand ziehen, wo sie mit dem Sphincter innigst verschmelzen. Die Wirkung der Kreisfasern verengert, die der geraden Fasern erweitert die Pupille nach Verschiedenheit der Lichtstärke. Ich hielt den Dilatator nicht für musculös. sondern für ein System elastischer Fasern, indem es mir aus physiologischen Grunden nicht möglich schien, dass der Sphincter sich durch Lichtreiz, der Dilatator durch Dunkelheit, also Mangel an Reiz, zusammenziehe. Ist aber der sogenannte Dilatator aus elastischen Fasern zusammengesetzt. so braucht nur der Sphincter durch Lichtmangel zu erlahmen, um den elastischen Fasern die Erweiterung der Pupille zu überlassen. Dieser Ansicht trat A. Kölliker (Zeitschrift für wiss. Zoologie, Bd. 1. 6. Heft) durch ein, wenigstens am Kaninchenauge sehr schlagendes Experiment entgegen. Es wurde, nach vorläufiger Abtragung der Cornea, der Pupillarrand der Iris, welcher den Sphincter enthält, ausgeschnitten, und der Rest der Iris hierauf durch einen schwachen Strom des Dubois'schen Apparates gereizt. Bei wiederholten Versuchen ergab sich jedesmal eine Dilatation der Irisöffnung. Reizung des Sympathicus am Halse hatte denselben Erfolg. — Die Iris vertritt die Stelle des in allen dioptrischen Instrumenten zur Abhaltung der Randstrahlen angebrachten Diaphragma, und lässt durch die unwillkürlich erfolgende Erweiterung und Verengerung der Pupille, gerade nur die nöthige Lichtmenge in die hinteren Räume des Auges fallen.

An der Choroidea können drei Schichten unterschieden werden. Die äusserste, von B. A. Stier (de tunica quadam novissime detecta. Hall., 1759. 4.) zuerst unterschiedene, ist eine, nur am vorderen Theile der Choroidea deutliche Zellgewebsschichte. Sie wurde von Arnold: Arachnoidea choroideae, von Montain: Suprachoroidea genannt. - Die zweite Schichte ist die eigentliche gefässreiche Choroidea, deren Venen an der äusseren, deren capillare Arteriennetze an ihrer inneren Fläche liegen. — (Bei Raubthieren und Wiederkäuern verwandeln sich die Fasern ihres Grundgewebes um den Sehnerveneintritt herum in tendinöse, mehr parallel geordnete Fäden, welche in gehogenen, kantig vorspringenden Linien verlaufen, und durch die sofort gebildete guilloschirte Fläche, wahrscheinlich jenes schöne blau und grun schimmernde Farbenspiel erzeugen, welches die Choroidea dieser Thiere an der genannten Stelle auszeichnet, und beim Eintrocknen in eine bleibende matte blauweisse Färbung übergeht. Dieses ist die nur bei Thieren vorkommende Membrana versicolor Fieldingii, auf welcher das Pigment sehlt. Hassenstein (de luce ex quorundam animalium oculis prodeunte, Jenae, 1836) hat bei reissenden Thieren, deren Augen im Finstern leuchten, noch eine besondere Schichte mikroskopischer Kalksalze hinter der Faserschicht gefunden. Auf der concaven Seite der schimmernden Fläche findet sich ein äusserst zartes, aus den feinsten Capillargesässen bestehendes Stratum, welches von Hovius (de circulari humorum in oculo motu. Lugd. Bat., 1716) zuerst durch Injection dargestellt wurde, und im Menschenauge gleichfalls fehlt). - Die dritte Schichte ist das Pigmentum nigrum, welches die Choroidea, die Corona ciliaris, und die hintere Irissläche überzieht, zur Absorption des falschen Lichtes dient, und aus eckigen (dodekaedrischen, Huschke), in einer membrandsen, aber structurlosen Grundlage eingetragenen, und dadurch zu einer Haut verbundenen Pigmentzellen zusammengesetzt ist. Die einzelnen Zellen zeigen, wenn sie möglichst frisch untersucht werden, einen Durchmesser von 0,006"-0,008". Sie sind, wie die Stücke eines Mosaikbodens, neben einander gelagert, und durch weisse, helle Begrenzungslinien (Zwischenschicht der structurlosen Grundlage) von einander getrennt. Sie enthalten die kleinen Pigmentmolekülen, und einen hellen Kern, sammt Kernkörperchen. Selbst an den pigmentlosen Augen der Albinos (Kakerlaken) finden sich die Pigmentzellen, aber ohne moleculösen farbenden Inhalt (Wharton Jones).

Bei aufmerksamer Betrachtung des eigenen Auges im Spiegel sieht man, dass die vordere Fläche der Iris nicht vollkommen eben ist, sondern wie in Staffeln von aussen nach innen abfällt. Es bilden sich dadurch zwei kreisförmige Contouren (Annulus iridis externus et internus), welche nie gleichgefärbt sind, und deshalb auch dem Ungeübten bald auffällen. Dass die Färbung der Iris nicht vom Durchscheinen des Pigments der Uvea allein abhänge, wird durch ihr nicht gleichmässig tingirtes, sondern gesprenkeltes Ansehen bewiesen. Dass aber das Pigment auf die Färbung dennoch Einfluss hat, zeigt der Umstand, dass bei sehlendem Pigment die Iris ihres Blutreichthums wegen roth erscheint. Sie ändert auch ihre Farbe bei ihren verschiedenen Entzündungen sehr auffallend, und ist bei jüngeren Individuen gewöhnlich lichter,

als bei älteren. Die metallisch glänzende Iris findet man nur an älteren, nicht an ganz jungen Katzen, wo sie grau ist.

Da das auf der hinteren Fläche der Iris abgelagerte Pigment, bei den Bewegungen der Iris leicht lose werden und abfallen könnte, wird es von einem durchsichtigen, wasserhellen Häutchen bedeckt (Membrana limitans, Pacini), welches die hinterste Irisschichte bildet, am Pupillarrande mit dem Epithelium der Iris zusammenhängt, aber keine Fortsetzung desselben sein kann, weil es nicht aus Zellen besteht, vielmehr von der glashellen Membran der Netzhaut abstammt. Huschke sah strahlenformige Blutgefässe in ihm zu jenen der Iris laufen, welche ich nicht wiederfinden konnte.

Fontana hat schon bemerkt, dass die Bewegungen der Iris nicht auf einer besonderen Empfindlichkeit derselben gegen das Licht beruhen, und E. H. Weber blieb es vorbehalten, durch ungemein sinnreiche Versuche uns über die Art dieser Bewegungen, und ihre Entstehung durch vorausgehende Reizung der Retina, die befriedigendsten Aufschlüsse zu geben (E. H. Weber, de motu iridis. Lips., 1821. 4.).

§. 205. Gefässe und Nerven der Choroidea und Iris.

a. Arterien der Choroidea.

Die Choroidea erhält ihr Blut aus den Arteriae ciliares posticae breves. Diese sind feine Aeste der Arteria ophthalmica, welche die Sklerotica in der Nähe des Sehnerveneintrittes durchbohren, und in der Choroidea von hinten nach vorn (gegen das Corpus ciliare) verlaufen. Ihre Zweige lassen sich in drei Abtheilungen bringen; die äusseren, inneren, und vorderen.

- a. Die äusseren gehen, nach österer Theilung, jedoch ohne capillär zu werden, in die weiter unten zu schildernden Venae vorticosae über.
- β. Die inneren bilden das feine Capillargesässnetz an der inneren Fläche der Choroidea (Lamina Ruyschii).
- γ. Die vorderen dringen in die einzelnen Ciliarfortsätze ein, und bilden in ihnen engmaschige Netze. (Einige von ihnen gehen auch in den Furchen zwischen den Ciliarfortsätzen weiter bis zur Iris.)
 - b. Venen der Choroidea.

Die grösseren Stämmchen werden seit ihrem Entdecker, N. Stenson, (1669), Vasa vorticosa genannt, und liegen auf der äusseren Fläche der Choroidea (4—6 an Zahl) auf. Sie führen ihren Namen von der Art und Weise, wie die aus der Choroidea zurückkehrenden Venen sich in sie einmünden. Die äusseren Zweige der Arteriae ciliares posticae breves nämlich gehen, nachdem sie sich nur wenige Male getheilt haben, bogenförmig in Venen über. Die benachbarten Bogen verbinden sich, so dass immer weniger und immer grössere venöse Gefässstämmchen gebildet werden, und zuletzt nur Eine grössere Vene entsteht, welche die zusammengefassten Enden aller ihrem Wirbel (Vortex) angehörigen Bogen repräsentirt. Auf diese Weise entstehen auf der Aussenstäche der Choroidea 4—6 zierliche Gesässsiguren, welche, um einen passenden Vergleich zu machen, das Bild eben so vieler Springbrunnen darstellen, die ihr Wasser in Bogen nach allen

Seiten auswerfen. — Diese Vasa vorticosa nehmen auch das Blut auf, welches ihnen direct aus der Lamina Ruyschii und aus der Iris zuströmt, wohin es durch die Arterien β und γ gebracht wurde. Die Endstämme der Vasa vorticosa durchbohren die hintere und mittlere Peripherie der Sklelerotica, und entleeren sich in die Vena ophthalmica cerebralis.

c. Arterien der Iris.

Die Iris erhält ihr Blut aus den Arteriae ciliares posticae longae, und aus den Arteriae ciliares anticae.

Die zwei Arteriae ciliares posticae longae sind gleichfalls Aeste der Arteria ophthalmica, welche, nachdem sie die Sklerotica durchbohrten, zwischen Sklerotica und Choroidea nach vorn laufen. Während dieses Laufes liegt die eine an der Schläsenseite, die andere an der Nasenseite, beide somit in der horizontalen Ebene des Augapsels. Am Tensor choroideae spaltet sich jede in zwei Aeste, welche in entgegengesetzten Richtungen (auf- und absteigend) mit einander zu einem Kranze von arteriellen Gesässen zusammensliessen, Circulus iridis arteriosus major, aus welchem kleine Aestchen sur den Tensor choroideae, und 15—20 zur Iris lausende, etwas geschlängelte Zweigchen entstehen, welche, bevor sie den Pupillarrand der Iris erreichen, durch Anastomosen zu einem Kranze zusammentreten (Circulus iridis arteriosus minor). Aus diesem Kranze treten nun die seinsten Zweigchen in mehr geradliniger Richtung zum Pupillarrand der Iris hin, wo sie in Venen umbeugen.

Die Arteriae ciliares anticae sind an Zahl und Grösse variirende Aestchen der Arteria lacrymalis, supraorbitalis, und der Arteriae musculares.
Sie durchbohren die Sklerotica im Umkreise der Cornea und treten in den
Spannmuskel ein, dem sie Zweige geben, worauf sie theils in den Circulus iridis arteriosus major einmünden, theils mit den Aesten des Circulus
gegen den Pupillarrand der Iris ziehen, um gleichfalls schlingenförmig in
Venen einzulenken.

d. Venen der Iris.

Die Venen der Iris gehen theils direct zu den Vasis vorticosis, theils sammeln sie sich zu zwei grösseren Stämmchen, welche an den Arterias ciliares posticae longae zurücklausen, theils entleeren sie sich in den Canalis Schlemmii, aus welchem die die Sklerotica vorn durchbohrenden Venae ciliares anticae hervorgehen, welche sich in benachbarte Augenmuskelvenen entleeren.

e. Nerven der Iris.

Sie stammen alle aus den Nervis ciliaribus, welche die Sklerotica an ihrem hinteren Umfange durchbohren, zwischen ihr und Choroidea nach vorn zum Tensor choroideae ziehen, in welchen sie eindringen, und sich in ihm in Aeste theilen, welche theils im Muskel bleiben, theils in die Iris übertreten, wo sie Netze bilden, aus denen Fasern für den Dilatator und Sphincter pupillae entstehen. — Die eigentliche Endigung der Irisnerven ist unbekannt. Schlingen existiren nicht.

Die Choroidea erhält nach Bochdalek's sorgfaltigen Untersigleichfalls aus den Nervis ciliaribus feine Zweigehen. Nach demsell tomen bilden die Nervi ciliares, nachdem sie an die Zussere Peripl Orbiculus ciliaris gekommen sind, durch Theilung und Anastomoser welche kleine (mikroskopische) Ganglien, und einzelne Ganglienzel schliessen soflen (Prager Vierteljahrsschrift. 1850. 1. Bd.).

§. 206. Retina.

Die Netzhaut (Retine s. Tunica nervea) folgt auf die Cl wie diese auf die Sklerotica. Sie umhüllt zunächst den durch Kern des Auges, und erstreckt sich mit der Mehrzahl ihrer gleicl wähnenden Schichten von der Eintrittsstelle des Sehnerven bis zu der Linsenkapsel. Am todten Auge ist sie milchweiss. Im leben stande ist sie heller. — Der Sehnerv ragt, nachdem er die Sklero Choroidea durchbohrte, als ein 0,3" hoher Markhügel, Collicul optici, über letztere vor, und entfaltet sich hierauf zur bechersorm tina. Neben dem Markhügel nach aussen bildet die Retina zwei fende, lippenähnliche Fältchen, Plicae centrales, von 0,5" Höhe u Länge, zwischen welchen eine durchsichtige rundliche Stelle einges wird, welche das schwarze Pigment der Choroidea durchscheinen lä deshalb für ein Loch gehalten wurde, Foramen centrale Soemm Die Ränder der Plicae und die nächste Stelle der Retina sind gell - Macula lutea. Der Colliculus und die Plicae centrales sind 1 Leichenerscheinung; — am lebenden, vollen Auge, existiren sie nie man sieht mit dem Augenspiegel nichts von ihnen. - Während di nach vorn läust, wird sie etwas dünner, und ihre milchig weiss klärt sich. Von der Ora serrata angesangen, wird sie ganz durc indem von allen ihren Schichten nur die wasserhelle Membrana übrig bleibt, welche sich unter der Corona ciliaris bis auf die Fläche der Iris fortsetzt.

Die Retina hat einen sehr complicirten Bau, und besteht aus ren Schichten, von denen nur eine (die Faserschicht) aus densellt menten wie der Sehnerv besteht. Diese Schichten sind, von auss innen gezählt: 1. die Stabschichte, 2. die Körnerschichte Zellenschichte, 4. die Faserschichte, 5. eine Schichte he geln (Epithelium?), und 6. die glashelle Membrana limitans.

1. Die Stabschichte, gewöhnlicher Jacob'sche Haut (von W. Essay on the Morbid Anatomy of the Eye. London, 1818, und Jacob, Philosoph. Transact. 1819. pag. 300, als äussere Retina zuerst dargestellt), wurde erst durch H. Müller (Zeitschrift für schaftliche Zoologie, 1851) und Kölliker (Gewebslehre, pag. 598 mikroskopischen Elementen nach, genauer bekannt. Sie ist 0,00,03" dick, und wird leicht gesellen, wenn man ein frisch prauge, nach Wegnahme der Sklerotica und Choroidea, in reines

legt, und ein wenig schüttelt. Sie löst sich hiebei in grösseren oder kleineren Lappen von der ausseren Fläche der Retina los, und schwebt in der Flüssigkeit. Unter dem Mikroskope erscheint sie aus doppelten Elementen: Stäbchen und Zapfen, zusammengesetzt. Die Stäbchen sind schmale, längliche, cylindrische Körper, welche auf der Retina senkrecht stehen, und an ihrem inneren Ende in einen langen, zarten Faden sich verlängern. Die Zapfen sind ebenfalls Stäbchen, aber ohne Verlängerungsfaden, dessen Stelle durch einen birnsormigen, bauchigen Körper eingenommen wird, der an seinem inneren Ende einen dunklen Kern zeigt, und sich erst hierauf zu einem, nach innen gegen die Körnerschicht gerichteten Faden verlängert. In der Nähe der Macula lutea prävaliren die Zapfen. in den entfernteren Zonen der Retina dagegen die Stäbchen. Zwischen diesen Stäbchen stehen regelmässig vertheilt, und ohne sich zu berühren. Hannover's Zwillingszapfen, welche nicht so lang, wie die Stäbchen sind, und aus zwei cylindrischen, an der Berührungsstäche abgeplatteten Körpern zusammengesetzt sind. Die von der Retina abgewendeten Enden der Stäbchen sind zugespitzt, die der Zwillingszapfen zweizipfelig, und häufig (nur an der Leiche) hakenformig gekrümmt. Es ist sehr annehmbar. dass die Spitzen sämmtlicher Stäbchen in die Vertiefungen hineinragen, welche durch die eckige Form der Pigmentzellen der Choroidea nothwendig entstehen müssen. Bei den Thieren, und namentlich schön am Vogelauge, finden sich auf den Enden der etwas kürzeren Zwillingszapfen runde Kügelchen, welche sehr deutlich blau, gelb und grün gesärbt sind. physiologische Bedeutung dieser sonderbaren Bildung ist bei dem gegenwärtigen Zustande der Optik noch ein Räthsel.

- 2. Die Körnerschichte (Nuclearformation nach Bowman), besteht aus dunklen, granulirten, rundlichen Körpern von 0,002"—0,004" Durchmesser, in denen man meistens einen dunklen Kern wahrnimmt. In dem hinteren Abschnitt der Retina bilden diese Körner zwei, durch eine helle, senkrecht gestreiste Lage von einander getrennte Schichten, und gehen erst gegen die Ora serrata zu, in eine einfache Schichte von 0,015" Dicke über. Kölliker fand von den Körnern, nach Art bipolarer Ganglienzellen, zwei Fortsätze abgehen, den einen nach innen, den anderen nach aussen.
- 3. Die Zellenschichte bildet eine 0,008"—0,02" dicke Lage runder, birnsvrmiger oder eckiger Bläschen, welche im ganz srischen Zustande durchscheinend sind wie Oeltropsen, bald aber einen Kern mit Kernkörperchen erkennen lassen. Sie sind wahre Nervenzellen, wie sie im Gehirne gesunden werden. Bowman, Corti, und Kölliker entdeckten an ihnen 1—6 blasse Ausläuser oder Fortsätze, welche sich wiederholt theilen, und dadurch bis zu einer Dünnheit von 0,0004" verjüngen. Die Fortsätze mehrerer Zellen anastomosiren theils unter einander, theils verbinden sie sich mit den nach innen gerichteten Fortsätzen der Körner der 2. Schichte, theils gehen sie in die Elemente der Faserschicht ununterbrochen über.

Dieses wurde wenigstens am thierischen Auge von Remak zuerst gesehen, von Corti am Elephantenauge, von Kölliker und kürzlich von Vintschgau auch am Menschenauge beobachtet.

- 4. Die Faserschichte ist die Entwicklung der Sehnervensasern in der Fläche. Diese Fasern haben die Feinheit der zartesten Gehirnsasern, und lausen in slachen Bündeln gegen die *Ora serrata* zu, in deren Nähe die Faserschicht dünner, als in der Nähe des Selmerveneintritts, erscheint.
- 5. Die einsache, helle Kugelschichte wird von Bowman für eine Schichte von Zellen erklärt, in welcher jedoch Kölliker die Kerne vermisste. Sehr wahrscheinlich ist sie epithelialer Natur.
- 6. Auf die Faserschichte folgt die glashelle, structurlose Membrana limitans, in welcher bisher keine geformten Elemente entdeckt wurden. Sie setzt sich über die Ora serrata hinaus fort, überzieht die Ciliarfortsätze, und die hintere Fläche der Iris.

Ueber den Zusammenhang der verschiedenen Schichten der Retina unter einander lässt sich nach H. Müller und Kölliker Folgendes mit Bestimmtheit aussprechen. Die nach innen gehenden Fäden der Stäbchen und Zapfen verbinden sich mit den nach aussen gerichteten Fortsätzen der Körner, so zwar, dass die Fäden der Stäbchen mit den Körnern der äusseren Körnerschichte, die Fäden der Zapfen mit jenen der inneren Körnerschichte zusammenhängen. Die nach innen gerichteten Fortsätze der Körner verbinden sich mit den nach aussen gerichteten Fortsätzen der Zellen, während die nach innen sehenden Fortsätze der Zellen ganz sicher mit den Nervenfasern der Faserschicht eine Verbindung eingehen. Dieser Anschauung zufolge existirt ein ununterbrochener Zusammenhang zwischen den einzelnen Retinaschichten, und die stabförmigen Körper sind das letzte Ende der Retinafasern. — Zur mikroskopischen Untersuchung der Retina wähle man blos Thieraugen, welche immer frisch zu haben sind.

Der Sehnerv hat, meinen Beobachtungen zufolge (Med. Jahrb. Oest., 28. Bd. p. 14), dreierlei Arterien: 1. Die Vaginalarterie versorgt sein Neurilemm, 2. die Interstitialarterie liegt zwischen dem leicht abziehbaren Neurilemm und dem Marke des Nerven, 3. die eigentliche Centralarterie, welche mit der Vene im Porus opticus (Axenkanal des Sehnerven, schon von Galen gekannt) in das Auge eindringt, und beim geborenen Menschen die Retina, nicht aber, wie Krause angiebt, auch den Glaskörper und die Linsenkapsel versieht. Sie löst sich nämlich zwischen der Faserschichte und der Membrana limitans der Netzhaut in ein feines und nur sehr schwer durch Injection darstellbares Gestssnetz auf, welches niemals Verlängerungen in den Glaskörper abgiebt, sondern am Beginne der Zonula Zinnii in ein kreissörmiges, aber nicht ganz zu einem Ringe abgeschlossenes Gestss übergeht (Sinus circularis venosus retinae), aus welchem die rücksührenden Venen austauchen. Am Ochsenauge ist dieser Sinus ohne Injection als nicht geschlossenes Zirkelgestss sichtbar, und mit einem Borstenhaar leicht zu sondiren.

§. 207. Kern des Auges. Glaskörper.

Der Kern des Auges, um welchen sich die im Vorigen abgehandelten Haute, wie die Schalen einer Zwiebel, herumlegen, besteht aus dem Glaskörper, Corpus vitreum, und der Krystalllinse, Lens crystallina. Der Glaskörper fullt die bechersvrmige Höhlung der Retina aus. und ist eine Kugel wasserklarer, sulziger Masse, welche in einer vollkommen durchsichtigen, zarten Hüllungsmembran - Glashaut, Hyaloidea - eingeschlossen ist. Die Kugel hat vorn eine tellerformige Vertiesung (Fossa patellaris s. lenticularis), welche von der Krystalllinse occupirt wird. Von der Ora serrata angesangen, theilt sich die Hyaloidea in zwei Blätter, von denen das vordere (Zonula Zinnii) zum Rande der Linsenkapsel geht, während das hintere zur tellersormigen Grube einsinkt. Da die Processus ciliares sich in die Zonula hineinsenken, und jeder einzelne Processus ciliaris die Zonula faltig einstülpt, so geschieht es in der Regel, dass, wenn man die Corona ciliaris vom Kerne des Auges abzieht, das Pigment derselben in den Falten der Zonula hasten bleibt, wodurch ein Kranz schwarzer Strahlen, um die Linse herum, zum Vorschein kommt, der wohl zuerst Corona ciliaris genannt wurde, - ein Begriff, den man später erst auf die Summe aller Falten des Corpus ciliare übertrug.

Durch die Divergenz beider Blätter entsteht rings um den Rand der Linsenkapsel ein ringformiger Kanal (Canalis Petiti), der ein Minimum seröser Flüssigkeit enthält, und durch Anstich der Zonula (seiner vorderen Wand) aufgeblasen werden kann. Bläst man den Kanal wirklich auf die genannte Weise auf, so werden sich die Falten seiner vorderen Wand, die durch die Einsenkung der Processus ciliares entstanden, hervorwölben. und dadurch ein Kranz von Buckeln entstehen, welcher den von Petit ansangs gewählten Namen des Kanals: canal godronné erklärt. - Da im Embryo eine Arterie von der Eintrittsstelle des Nervus opticus gerade nach vorn zur Linsenkapsel läuft, so muss die Hyaloidea dieses Gefäss scheidenartig umgeben, und einen Kanal bilden, der von Cloquet: Canalis hyaloideus genannt wurde, und an die Einstülpung erinnert, welche die Hyaloidea beim Vogelauge durch das Marsupium s. Pecten (eine gefaltete. in den Glaskörper eindringende Fortsetzung der Choroidea) erleidet. Der trichtersormige Ansang dieses Kanals ist die Area Martegiani. Im Erwachsenen ist vom Kanal und vom Martegianischen Trichter keine Spur zu sehen.

Die Glashaut ist eine structurlose Membran. Was den Bau des Glaskörpers anbelangt, so liess man ihn bis auf die neuere Zeit aus grossen häutigen Zellen besteben. Dieser Glaube war durch die Wahrnehmung entstanden, dass ein angestochener Glaskörper nicht gänzlich ausläuft. Brücke (Müller's Archiv. 1843. pag. 345) glaubt, dass sich im Glaskörper von Schafen und Rindern concentrische, geschichtete Membranen vorfinden, von welchen die aussersten der Retina, die innersten der hinteren Linsenfläche näherungswarallel verlaufen, wodurch die Schnittsläche eines mit essigsaurer Bleit

lösung behandelten Glaskörpers das Ansehen eines fein gestreisten Bandachates erhält. Das essigsaure Blei soll sich nämlich beim Tränken des Glaskörpers mit der Auflösung, auf den Membranen desselben niederschlagen. A. Hannover beschrieb hierauf (Müller's Archiv. 1845. p. 467) im Menschenauge eine grosse Menge häutiger Septa, welche durch die Axe des Glaskörpers gehen, und seinen Raum, wie die Meridianebenen einer Kugel, in eine grosse Anzahl von Sectoren theilen (ungesähr wie die häutigen Fächer einer Orange). Diese Septa sind so dunn, und so schwach lichtbrechend, dass sie durch chemische Mittel (Chromsäure) sichtbar gemacht werden müssen. Brücke's concentrische Membranen konnte Hannover im Menschenauge nicht wiederfinden, und Brücke giebt selbst zu, dass er bei wiederholter Untersuchung von Menschenaugen, nicht deutliche concentrische Membranen, wohl aber in der Oberfläche des Glaskörpers parallele Streisen gefunden habe, welche sich mit Hannover's Septa kreuzten. Brücke's Angaben wurden durch Bowman widerlegt (Lectures on the Parts concerned in the Operations on the Eye. London, 1849. pag. 97). Nach diesem Autor soll der Glaskörper des Neugeborenen eine faserige Textur besitzen, wie unvollkommen entwickeltes Bindegewebe, was von Virchow an thierischen Augen (von Embryonen) bestätigt wurde. Die Maschen der Fasern sollen von einem gallertartigen Schleime erfüllt sein, der an homogenes Bindegewebe erinnert. Jedenfalls ist die Controverse über den Bau des Glaskörpers noch nicht zu Ende geführt. Ich schliesse mich der Ansicht von Bowman und Virchow an.

§. 208. Linse.

Die Krystalllinse liegt, von einer vollkommen durchsichtigen, structurlosen, 0,01" dicken, häutigen Kapsel eingeschlossen, in der tellerformigen Grube des Glaskörpers. Die vordere Wand der Kapsel ist frei, und der Uvea zugewendet, die hintere ist mit der Glashaut verwachsen, damit die Linse mit ihrer Kapsel nicht vom Posten weichen könne, wozu noch die Zonula Zinnii (Fortsetzung der Hyaloidea), welche sich an die grösste Peripherie der Kapsel ansetzt, beiträgt. Die Linsenkapsel hat durchaus keine Verbindung irgend einer Art mit der Linse, welche, wie der Kern in der Schale, frei liegt. Die innere Oberstäche der Linsenkapsel ist mit einer Lage heller, polygonaler, kernhaltiger Zellen (Epithelium) belegt. — Die Linse fullt ihre Kapsel nicht genau aus; - was an Raum (besonders am Rande) übrig bleibt, wird durch seröse Flüssigkeit (Humor Moryagni) eingenommen, welche leicht beim Anstich der Linsenkapsel aufzufangen ist, und meistens losgerissene Zellen des Kapselepitheliums enthält. Die Linse selbst, das stärkste Brechungsmedium des Auges, hat eine vordere. elliptische, und eine hintere, viel stärker gekrümmte, parabolische Fläche. Als man die Flächen noch für sphärisch gekrümmt hielt, liess man den Halbmesser der vorderen zu dem der hinteren sich wie 6:1 verhalten, was beiläufig genügt, um über die Verschiedenheit der Krümmungen eine Vorstellung zu bekommen. Man unterscheidet an frischen Linsen eine oberslächliche, weiche, leicht abzustreisende Schichte, und einen inneren (der hinteren Fläche etwas näher liegenden) Kern. An gehärteten Linsen grosserer Thiere kann man Schale für Schale abziehen, bis man zuletzt

auf einen runden, harten, unter dem Fingerdruck zerbröckelnden Kern stösst. Bei alten Leuten findet man die Linse, ohne Beeinträchtigung des Sehvermögens, fast regelmässig bernsteingelb.

Die Linse besteht aus Fasern, welche von Leeuwenhoek und Camper zuerst mikroskopisch untersucht, und von Young und Reil für musculös gehalten wurden, eine Ansicht, die auch in neuester Zeit nicht ganz ausgegeben ist (Musculus crystallinus). Huschke (Ammon's Zeitschrift. III. 1833. p. 20) entdeckte ihren Verlauf, und Corda (Weitenweber's Beiträge. Prag, 1836) ihre sechsseitig prismatische Gestalt. Sie sind nicht solid, sondern hohl, also eigentlich Röhren - keine Fasern - mit zähem eiweissartigen Inhalt (Kölliker). Die Fasern legen sich durch Flächenberuhrung oder durch zackige Ränder (nach Brewster, besonders schön bei Fischen) an einander, und bilden dadurch Blätter. Die Zahl der Blätter ist sehr gross. Sie lassen sich bei grösserer oder geringerer Geschicklichkeit, in Form mehrerer oder weniger Schalen abziehen. Die aussersten Schalen haben die Form der Linse. Je näher dem Centrum der Linse, desto mehr geht die Form der Schalen in die kugelige über. Diese kugeligen Schalen liegen auch viel dichter an einander, als die ausseren, und bilden dadurch den harten Kern der Linse, der besonders an Linsen, welche in Weingeist gelegen haben, auffällt.

Die Richtung der Linsensasern geht vom Rande gegen die Pole der Linse. Nicht an frischen, wohl aber an bereits undurchsichtig gewordenen, oder gehärteten Linsen, sieht man an der vorderen und hinteren Fläche vom Mittelpunkt aus drei Linien gegen die Peripherie der Linse laufen, durch welche drei Winkel, jeder von 120 Grad, gebildet werden. Die drei Linien der hinteren Fläche correspondiren nicht mit jenen der vorderen; - sie entsprechen vielmehr der Mitte ihrer Abstände. Gegen die Peripherie der Linse zu theilen sich diese Linien ein- oder mehrfach gabelförmig, wodurch die Figur eines verzweigten Sternes entsteht. Die Strahlen dieses Sternes denke man sich als Spalten in der Linsensubstanz, welche den Verlauf der Linsenfasern unterbrechen, so dass letztere nicht von einem Pole der Linse bis zum anderen, wie Meridiane herumgehen, sondern in kleinere Curvensysteme getrennt werden, welche die sogenannten Linsenwirbel (Vortices lentis) bilden. Es ist zu vermuthen, dass diese Spaltungen der Linsensubstanz in keilförmige Stücke, durch eine schon in der lebenden Linse gegebene Verschiedenheit ihres Materials bedingt wird. - Der Druck, den der Kern des Auges durch seine Hülle erleidet, erklärt, warum am lebenden Auge ein Stich in die vordere Linsenkapsel hinreicht, um die Kapsel ihrer ganzen Länge nach zu zerreissen, worauf die Linse aus ihrer Nische fällt, und (wie bei der Extraction des Staares) aus der Hornhautschnittwunde zuweilen hervorspringt.

Die Lage der Linse im Auge kann keine constante, sondern muss eine veränderliche sein. Die Linse erzeugt ein verkehrtes Bild, welches auf die Retina fallen muss, um gesehen zu werden. Da nun das Bild von nahen und fernen Objecten nicht in derselben Entfernung hinter der Linse liegt, sondern bei nahen Gegenständen weiter, bei fernen näher an der Linse, so müssen im Auge Veränderungen geschehen, welche die Linse der Retina nähern oder von ihr entfernen. Die Fähigkeit, den Stand der Linse durch unbewusste Vorgänge zu ändern, heisst Accommodationsvermögen. Die — der Musculus ciliares (welche bei den Raubvögeln deutlich musculös sind), Brücke's tensor choroideae, und die Elasticität der Zonula scheinen die leiter dieser Bewegungen zu sein. — Hat das Auge sein Accom

munia gebildet wird. Mit der Leiste parallel, und durch die schiffformige Grube von ihr getrennt, verläust die Gegenleiste (Antihelix), welche über der Spina helicis mit zwei convergirenden Schenkeln (Crura furcata) beginnt. Vor dem Eingange in den ausseren Gehörgang, verdickt sich der Ohrknorpel zu der 11/2" dicken Ecke (Tragus), welche, wie eine offene Klappe, nach hinten gerichtet ist, und von der ihr gegenüber stehenden Gegenecke (Antitragus), durch die Incisura intertragica getrennt wird. Die vertiesteste Stelle der Ohrmuschel ist die eigentliche Concha, welche sich, schraubenstrmig gewunden, in den äusseren Gehörgang hineinzieht. Der Ohrknorpel hat eine feste, fibrose Hulle, - das Perichondrium welches ihm sehr innig anhängt. Elastisch-fibröse Bänder, die vom Jochfortsatz und Warzenfortsatz entspringen, befestigen ihn in seiner Lage, und erlauben eine gewisse Entfernung desselben durch Ziehen. Die Haut hängt an der concaven Fläche des Knorpels fester, als an der convexen an, und bildet unter der Incisura intertragica einen, mit saserigem, settlosen, blutund nervenarmen Gewebe gefüllten Beutel — das Ohrläppchen, Lebulus auriculae - der, wie die Ohrzierrathen der Wilden beweisen, eine ungeheure Ausdehnbarkeit besitzt, und beim Ohrenstechen weder erheblich schmerzt, noch blutet. — Kein Ohr eines Thieres besitzt ein Ohrläppchen.

Der Ohrknorpel hat einige ihm eigenthümliche Muskeln, welche, da sie an ihm entspringen und endigen, bei den Gesichtsmuskeln nicht berücksichtigt wurden. Der Musculus helicis major entspringt in der Concavität des Ohrknorpels an der Spina helicis, geht nach vor- und aufwärts, und inserirt sich an der Umbeugungsstelle des Helix nach hinten. — Der Musculus helicis minor liegt auf dem Anfange der Spina helicis, — der Musculus tragicus auf der vorderen Fläche des Tragus, — der Musculus antitragicus geht vom unteren Ende des Antihelix zum Antitragus, — der Musculus transversus auriculae besteht aus mehreren blassröthlichen Bündeln, welche an der convexen Seite des Ohrknorpels die beiden Erhabenheiten verbinden, welche der Concha und der schiffförmigen Grube entsprechen.

Zuweilen findet sich ein wandelbarer Muskel am Tragus, welcher von Santorini: Musculus incisurae majoris auriculae, von Theile: Dilatator conchae genannt wird. Ich sah ihn, wenn er vorhanden war, vom vorderen Umfange des äusseren Gehörgangs entspringen, von wo er nach ab- und auswärts zum unteren Rande des Tragus verlief, welchen er nach vorn zieht, und den Raum der Concha dadurch vergrössert. Ich kenne kein Beispiel von sichergestellter willkürlicher Gestaltveränderung der Ohrmuschel durch das Spiel dieser kleinen Muskelchen. Willkürliches Bewegen der Ohrmuschel als Ganzes ist dagegen keine so seltene Erscheinung. Haller führt (Elem. phys. Tom. V. pag. 190) viele hieher gehörige Fälle auf, und B. S. Albin, der grösste Anatom des vorigen Jahrhunderts, nahm jedesmal seine Perücke ab, um seinen Schülern zu zeigen, wie sehr er die Bewegungen der Ohrmuschel in seiner Macht hatte.

§. 212. Acusserer Gehörgang.

Der äussere Gehörgang besteht aus einer knorpeligen Röhre einer Fortsetzung des Ohrknorpels - und einer an sie angestückelten knöchernen Röhre, und wird somit in den Meatus auditorius cartilagineus und osseus unterschieden. Der knorpelige Gehörgang ist besonders an seiner unteren Wand durch Einschnitte (Incisurae Santorinianae) getheilt, so dass es scheint, als wenn er aus mehreren, gewöhnlich drei, Stücken bestände, die durch elastische Fasermasse zusammenhängen. Der knöcherne Gehörgang ist ein integrirender Theil des Schläsebeins, und ist an seinem inneren Ende mit einem Falze für die Aufnahme der Trommelhaut versehen (Sulcus tympani). Die Länge des ganzen Ganges (Axe desselben) variirt von 9"-1". An der oberen Wand ist die Länge geringer, an der unteren etwas beträchtlicher, weil das Trommelfell nicht vertical steht, sondern mit seinem unteren Rande nach innen sieht, also schief gerichtet Auch seine Weite ist nicht an jedem Querschnitte dieselbe. Wo der knorpelige Theil an den knöchernen stösst, und unmittelbar am Trommelfelle, ist die Weite um 1/2"-2/3" grösser, als an den Zwischenstellen. Seine Richtung ist nicht geradlinig. Wird er mit Wachs ausgegossen, so erhält man einen Abdruck, der etwas spiral nach vorn, innen, und unten gedreht erscheint. Eine Fortsetzung des Integuments überzieht seine innere Fläche. Diese Fortsetzung wird um so feiner, je mehr sie sich dem Trommelfelle nähert, und bedeckt auch als dünnes Häutchen die äussere Oberfläche desselben. Sie besitzt, so weit sie den knorpeligen Gehörgang auskleidet, zahlreiche Drüschen, welche als einfache, in einen Knäuel zusammengewundene Röhrchen, bis in den Knorpel hineinragen, und bei einer Weite von 0,02", eine Länge von 1,5" haben. Sie secerniren kein gewöhnliches Sebum cutaneum, sondern den als Ohrenschmalz bekannten gelblichen, schmierigen, an der Lust zu Brocken erhärtenden, bitter schmeckenden Stoff (Cerumen), und heissen deshalb Glandulae ceruminales. Auch an Haaren fehlt es nicht, welche besonders am Eingange dicht stehen, und zuweilen die aus dem Ohre büschelförmig herausragenden sogenannten Bockshaare (Hirci) darstellen.

Nach Buchanan finden sich in Einem Ohre 1000—2000 Glandulae ceruminales. — Durch Ziehen am Ohre kann der Wundarzt, wenn er den Gehörgang untersuchen will, wenigstens den knorpeligen Theil desselben gerade machen, indem die Incisurae Santorini nachgeben. Durch dieselben Incisurae kann auch ein Abscess, der in der Ohrendrüsengegend entstand, sich Bahn in den Meatus auditorius brechen, was häufig geschieht. (Sehr interessant ist der lange, äussere Gehörgang der Echidna, welcher wie die menschliche Luströhre aus einer Folge ringförmiger Knorpel, die durch elastische Bänder zu einer Röhre verbunden werden, besteht.) — Da der Querschnitt des Gehörgangs eine Ellipse und kein Kreis ist, so wird, wenn ein runder Körper, z. B. eine Erbse, hineingefallen ist, und, seines Anschwellens wegen, nicht mehr von selbst herausfällt, noch Raum genug vorhanden um ein Instrument hinter ihn zu schieben, und ihn dazuit herausz

Höchst merkwurdig sind die sympathischen Zusälle (Kratzen im Halse, Husten, Erbrechen), welche bei derlei chirurgischen Hilseleistungen, selbst wenn sie mit nöthiger Delicatesse gemacht werden, nicht selten vorkommen, und ich erwähne dieses Umstandes, weil die Neurologie — wie später solgt — ihn ganz befriedigend auszuklären vermag.

§. 213. Trommelfell.

Das Trommelfell gehört weder der äusseren noch inneren Sphäre an, sondern liegt zwischen beiden als vollkommene Scheidewand. Da man jedoch wenigstens einen Theil seiner oberen Contour, bei geschickter Behandlung des Ohres und richtiger Stellung des Kopfes gegen das Licht, übersehen kann, so schliesse ich es dem äusseren Gehörgange an.

Das Trommelfell, Trommelhaut (Membrana tympani), ist im Sulcus tympani am inneren Ende des knöchernen Meatus auditorius befestigt, aber nicht plan gespannt, sondern nach innen convex, nach aussen concav. Der Befestigungsrand des Trommelfells ist der dickste Theil des Trommelfells, und besitzt fast knorpelige Härte, daher sein Name Annulus cartilagineus. Die tiefste Stelle der ausseren Concavität ist der sogenannte Umbo. Nahe am oberen Rande wird die Trommelhaut durch den Processus minor des Hammers, der sich an sie von innen her anstemmt, etwas hervorgetrieben. Ihre Form ist länglich oval, ihre Länge verhält sich zur Breite wie 4,3": 4,0". Trotz ihrer Dünnheit, besteht sie aus drei darstellbaren Häuten, von denen die äussere der Epidermis des Meatus auditorius, die innere der Schleimhaut der Trommelhöhle angehört, die mittlere aber eine selbstständige, aus Sehnenfasern gebildete, trockene, weder elastische noch contractile Membran ist (Stratum proprium). Die Ehene des Trommelfells steht nicht senkrecht auf der Achse des Gehörgangs, sondern ist schief nach innen und unten gerichtet, so dass, wenn man beide Trommelfelle in dieser Richtung nach einwärts und unten verlängern würde, sie sich unter einem Winkel von 130° schneiden (Huschke). Das Trommelfell ist so dünn, dass der an seine innere Wand angewachsene Hammer nach aussen durchscheint. Eine Oeffnung (Foramen Rivini) existirt in ihm keineswegs als Norm, und ist das Vorkommen einer solchen unter die seltenen Ausnahmen zu rechnen.

Das Foramen Rivini (A. Q. Rivinus, de auditus vitiis. Lips., 1717. pag. 32) soll am hinteren oberen Theile des Trommelsells vorkommen, mit einem Schliessmuskel und einer Deckklappe versehen sein. Ich habe es weder bei Erwachsenen, noch an Kindesleichen jemals gesehen. Sollte es je vorkommen (was bei jenen Menschen nicht zu bezweiseln ist, welche Tabakrauch aus den Ohren blasen können), so ist es sur eine zusällig entstandene Anomalie, oder sur eine Hemmungsbildung zu nehmen, welches letztere durch Huschke's Beobachtungen (Beiträge zur Physiol. 1824. pag. 51), nach welchen das Trommelsell im srühesten Embryoleben oben nicht geschlossen ist, bekrästigt wird. Aussührliche Erörterungen dieses Gegenstandes enthält §. 16 meiner vergl. anat. Untersuchungen über das innere Gehörorgan. Prag, 1845.

Ueber das Aeltere siehe *Portal*, hist. de l'anatomie. Tom. III. pag. 570 und Tom. VI. pag. 1 und 469.

II. Mittlere Sphäre.

§. 214. Paukenhöhle und Ohrtrompete.

Die Pauken- oder Trommelhöhle (Cavum tympani) ist eine zwischen dem Meatus auditorius externus und dem Felsentheile des Schläsebeins befindliche Höhle, welche durch die Eustachi'sche Ohrtrompete mit der Rachenhöhle zusammenhängt, von dieser aus mit Lust gefüllt wird, und die Gehörknöchelchen enthält. Die äussere Wand der Trommelhöhle bildet die Membrana tympani, - die hintere Wand führt in die Zellen der Pars mastoidea, — die obere ist ein dünnes, mässig concaves Knochenblatt, welches als vordere obere Wand der Schläsebeinpyramide beschrieben wurde, - die untere Wand entspricht der unteren Fläche der Pyramide, - die vordere ist die kleinste, und zeigt die Paukenmundung der Eustachi'schen Trompete, und über dieser den Anfang des Halbkanals für den Paukenfellspanner (Semicanalis tensoris tympani); — die innere besitzt die zahlreichsten Merkwürdigkeiten, welche sind: 1. das ovale Fenster (besser das bohnenförmige, Fenestra ovalis s. vestibuli), zum Vorhof des Labyrinthes führend, 2. unter dem ovalen das runde Fenster (besser das dreieckige, Fenestra rotunda s. triquetra, s. cochleae), zur Schnecke leitend, 3. zwischen beiden eine unebene Knochenwulst — das Vorgebirge, Promontorium - mit einer senkrecht über sie weglaufenden Rinne (Sulcus Jacobsonii), welche eine Verlängerung des beim Schläsebein erwähnten Canaliculus tympanicus ist, 4. hinter der Fenestra ovalis eine hoble Knochenpapille mit einer Oeffnung an der Spitze (Eminentia pyramidalis), 5. über der Fenestra ovalis die in die Paukenhöhle vorspringende, dunne, untere Wand des Canalis Fallopiae, welcher anfangs nach hinten, und dann nach unten läuft, und mit der Höhle der Eminentia pyramidalis communicirt, 6. über dem Promontorium ein knöcherner Halbkanal, Semicanalis tensoris tympani, der wagrecht bis über das Foramen ovale streicht, und hier mit einem dünnen löffelförmig aufgekrümmten Knochenblättchen (Rostrum cochleare) endigt.

Nebst diesen grossen und sonder Mühe bemerkbaren Einzelnheiten finden sich noch kleinere, für die subtilere Anatomie der Kopfnerven wichtige Oeffnungen, an den Wänden der Trommelhöhle: 1. Die Jacobson'sche Furche führt, nach oben verfolgt, in eine Oeffnung, welche unter dem Semicanalis tensoris tympani zum Hiatus canalis Fallopiae geht, 2. nach unten verfolgt, zeigt diese Furche den Weg zur Paukenmündung des in der Fossula petrosa beginnenden Canaliculus tympanicus, 3. an der vorderen Wand der Trommelhöhle die Paukenmündungen der zwei, aus dem Canalis caroticus kommenden Canaliculi carotico-tympanici, 4. an der äusseren Wand und am hinteren Umfange des für die Einrahmung des Trommelfelles bestimmten Falzes

cus tympani), die Paukenöffnung des aus dem unteren Stücke des Canalis Fallopias (kurz über dem Foramen stylo-mastoideum) entspringenden Kanal-chens für die Chorda tympani (Canaliculus pro chorda tympani).

Die Eustachi'sche Ohrtrompete (Tuba Eustachii) ist ein in der Paukenhöhle unter dem Semicanalis tensoris tympani mit einer engen Oeffnung, Ostium tympanicum, beginnender, und, trichterförmig sich erweiternd, gegen die Rachenhöhle nach innen und unten gerichteter Kanal, welcher im oberen und seitlichen Raume des Rachens mit einer länglich ovalen, wulstig gerandeten Oeffnung, Ostium pharyngeum, mündet. Der knöcherne Theil der Trompete gehört dem Schläsebeine an, und liegt am vorderen Winkel der Pyramide. Der knorpelige Theil ist ein rinnensörmig gehöhlter elastischer Knorpel, welcher die untere Wand der Tuba bildet, und durch eine sibröse seste Membran, welche an den vorderen Winkel der Pyramide innig anhängt, zu einem Kanale geschlossen wird. Die Länge der Tuba beträgt 1", die Oessnung im Rachen misst in der Länge 3", in der Quere 1½".

Die Eustachi'sche Trompete besitzt Flimmerepithelium; die Paukenhöhle 1—2schichtiges Pflasterepithelium.

§. 215. Gehörknöchelchen.

Die drei Gehörknöchelchen (Ossicula auditus) bilden eine gegliederte Kette, durch welche die äussere Wand der Trommelhöhle mit der inneren in Verbindung gebracht, und die Schwingungen der Trommelhaut auf das Labyrinth fortgepflanzt werden. - Der erste und grösste derselben ist der Hammer, Malleus. Er hat eher die Gestalt eines Schlegels, als die eines Hammers, und wird in den Kopf, Hals, Handhabe, und in zwei Fortsätze eingetheilt. Der Kopf ist sein oberes, dickes, kolbig aufgetriebenes Ende, an dessen hinterer Fläche eine, zur Articulation mit dem nächstanliegenden Ambos bestimmte Gelenksläche vorkommt. Er kann durch die Trommelhaut hindurch nicht gesehen werden, da er sammt dem Halse, auf welchem er aufsitzt, in die Concavität der oberen Wand der Paukenhöhle hinaufragt. Der Griff oder die Handhabe ist ein seitlich zusammengedrücktes, an der Spitze etwas abgeflachtes Knochenstielchen, welches mit der Trommelhaut sest zusammenhängt, indem es zwischen die innere und mittlere Lamelle derselben bineingeschoben ist (oder vielmehr einen Spalt der mittleren Lamelle ausfullt, während die innere und äussere darüber weglaufen). Er reicht bis über die Mitte der Trommelhaut herab, und zieht diese so nach innen, dass er ihre ebene Spannung in eine nach aussen concave (Umbo) verändert. Die Fortsätze sind der kurze und der lange. Der kurze Fortsatz geht vom Halse gegen die Trommelhaut zu, stemmt sich an sie, und drängt sie dadurch an ihrem oberen Umfange konisch hervor; der lange Fortsatz (Processus Folii s. Ravii) geht vom Halse nach vorn, ist dunn und flach, und liegt bei Kindern lose in der

Fissura Glaseri, verwächst aber bei Erwachsenen mit der unteren Wand derselben, so dass er abbricht, wenn er mit Gewalt herausgezogen wird, und nur ein kurzes Stück desselben am Hammer bleibt, welches man früher kannte (Folius), als die flache, spatelformige, mit der Glaserspalte verwachsene Fortsetzung desselben (Ravius).

Der Ambos (Incus) ist kleiner als der Hammer, und ist an Gestalt einem zweiwurzeligen Backenzahn (dessen Wurzeln rechtwinklig divergiren) nicht unähnlich. Sein Körper (Krone des Zahns) hat eine nach vorn gekehrte Gelenkstäche (Mahlstäche des Zahns) für die entgegensehende Gelenksläche des Hammerkopses. Seine beiden Fortsätze zerfallen in den langen, welcher mit dem Griff des Hammers parallel nach unten und innen gerichtet ist, und in den kurzen, welcher direct nach hinten sieht. und an die hintere Wand der Trommelhöhle durch ein kurzes Bändchen befestigt ist, oder (häufiger) in einem Grübchen dieser Wand steckt. Der lange Fortsatz trägt an seinem, gegen das ovale Fenster etwas gekrümmten Ende, das linsenförmige Beinchen, Ossiculum lenticulare Sylvii, welches kein selbstständiges Gehörknöchelchen, sondern eine Apophyse dieses Fortsatzes ist. Das Linsenbeinchen articulirt mittelst einer schwach convexen Gelenksläche mit dem Kopfe des Steigbügels (Stapes), der seinen Namen von seiner Gestalt führt, und mit seiner Fussplatte das ovale Fenster verschliesst, in welchem er nicht feststeckt, sondern durch ein fibröses Häutchen, welches den ungemein kleinen Zwischenraum zwischen dem Rande der Fussplatte und dem Rande des Fensters ausfullt. beweglich eingepflanzt ist. Die beiden Schenkel (der vordere mehr, der hintere weniger gekrummt) vereinigen sich am Köpschen, und lassen zwischen sich einen schwibbogenartigen Raum frei, der durch die fibrose Membrana propria stapedis verschlossen wird. Der Steigbügel und der lange Fortsatz des Amboses bilden einen rechten Winkel. Das Köpschen des Steigbügels ist somit gegen die Trommelhaut gerichtet, und empfängt jene Stösse, welche durch die Schwingungen des Trommelfelles dem Hammer, von diesem dem Ambos, und von diesem dem Steigbügel mitgetheilt werden, von dessen Fussplatte sie in das Labyrinthwasser übergehen. -Die Kette der Gehörknöchelchen kann durch zwei Muskeln — die kleinsten im menschlichen Körper - bewegt werden. Der Spanner des Trommelfells (Musculus tensor tympani s. Musculus mallei internus) entspringt ausserhalb der Trommelhöhle von der Tuba Eustachii und dem vorderen Winkel der Felsenpyramide, läust im Semicanalis tensoris tympani nach innen, schickt seine feine platte Endsehne um das Rostrum cochleare herum (wie der Musculus trochlearis oculi um den Rollenknorpel) zum Halse des Hammers. Er vermehrt die Concavität des Trommelfells, und spannt es dadurch. - Der Erschlaffer des Trommelfells (Musculus laxator tympani s. Musculus mallei externus), der von des Spina angularis des Keilbeins entspringt, und durch die Glaserspalte zum langen Fortsatz des Hammers geht, ist ein wahrer Muskel - h

Band, wosür man ihn neuerer Zeit ausgiebt. — Den von Casserius aufgestellten, und von Sömmerring neuerdings zur Sprache gebrachten Musculus laxator tympani minor, habe ich nie gesehen. Er soll vom oberen und hinteren Rande des Sulcus tympanicus entstehen, und zwischen den Blättern des Trommelsells (was ich für unmöglich halte) zum kleinen Fortsatz des Hammers ziehen. — Der Steigbügelmuskel, Musculus stapedius, nimmt die Höhle der Eminentia pyramidalis ein, und schickt eine sadensörmige Sehne, durch das Löchelchen an der Spitze der Pyramide, zum Köpschen des Steigbügels. Seine Wirkung ist unbekannt. Alle Muskeln der Gehörknöchelchen haben quergestreiste Primitivsasern.

Aussührliches über die Gehörknöchelchen enthält Huschke's Eingeweidelehre, p. 837, und §. 17—26 meiner Untersuchungen über das innere Gehörorgan. Prag, 1845.

Die Schleimhaut des Rachens setzt sich durch die Tuba Eustachis in die Trommelhöhle, und die damit zusammenhäugenden Cellulae mastoideae fort, überzieht alle Wände, die Gehörknöchelchen und ihre Muskeln, bildet an den Uebergangsstellen von den Wänden zu den Knöchelchen Duplicaturen, welche als Haltbänder der Ossicula beschrieben werden, geht über den Stapes weg, und senkt sich etwas in die Fenestra rotunda ein, um die äussere Fläche des sehnigen Häutchens zu überziehen, welches in einem Falz dieses Loches, wie die Membrana tympani im Sulcus tympani, ausgespannt ist, und von Scarpa als Membrana tympani secundaria zuerst beschrieben wurde.

III. Innere Sphäre oder Labyrinth.

§. 216. Vorhof.

Das Labyrinth besteht, wie sein Name vermuthen lässt, aus mehreren Räumen, die unter einander in Verbindung stehen, und deren einige sich zu Kanälen von halbmondsormiger oder schneckenähnlicher Windung entwickeln, und in der Felsenmasse der Schläsebeinpyramide eingeschlossen, so schwer darstellbar sind, dass die an Hilssmitteln und Untersuchungsmethoden armen Anatomen der Vorzeit, sie mit dem Worte "Labyrinth" absertigten. Seine Hauptabtheilungen sind: der Vorhos, die drei Bogengänge, und die Schnecke.

Der Vorhof oder Vorsaal (Vestibulum) ist die mittlere Höhle des Labyrinths, welche mit den übrigen Gängen desselben communicirt, und der Vereinigungs- oder Ausgangspunkt derselben ist. Er grenzt nach aussen an das Cavum tympani, und würde mit ihm in offener Communication stehen, wenn die Fussplatte des Steigbügels nicht das ovale Fenster verschliessen würde; nach innen grenzt er an den Grund des Meatus auditorius internus, nach vorn an die Schnecke, nach hinten an die drei Bogengänge, nach oben an den Anfang des vom inneren Gehörgang entspringenden Canalis Fallopiae, nach unten hat er keinen Nachbar von Wichtigkeit. Er besteht aus zwei Abtheilungen von ungleichen Dimensionen.

Die vordere, mehr sphärische, ist der Recessus hemisphaericus; die hintere, länglich ovale, der Recessus hemiellipticus. Beide werden durch eine niedrige Knochenleiste der inneren Wand (Crista vestibuli) von einander abgemarkt. Die Crista endet nach oben an einer konischen Hervorragung (Pyramis vestibuli, Scarpa), die man am macerirten Felsenbein durch die Fenestra ovalis (hinter ihrem oberen Rande) sieht. Im Recessus hemiellipticus münden die drei Bogengänge mit fünf Oeffnungen aus. Eine dieser Oeffnungen entsteht durch die Verschmelzung zweier, liegt an der inneren Wand, ist etwas grösser als die übrigen vier, und hat vor sich die sehr feine Vorhoföffnung des Aquaeductus vestibuli, zu welcher eine ritzförmige Furche der inneren Wand den Weg zeigt. Im Recessus hemisphaericus liegt (an der vorderen Wand des Vorhofs) der Eingang zur Vorhofstreppe der Schnecke — so gross wie eine Bogengangsmündung.

Ausser diesen grösseren Oeffnungen finden sich im Vorhofe noch drei Inseln von vielen haarseinen Löcherchen — die sogenannten Siebslecke, Maculae cribrosae — welche in kurze Röhrchen führen, die im Meatus auditorius internus münden, und den in seine seinsten Fasern zersallenden Nervus vestibuli in den Vorsaal eintreten lassen. Man sindet regelmässig eine obere (an der Pyramis vestibuli), eine mittlere (etwas unter dem Centrum des Recessus hemisphaericus), und eine untere. Mit der Loupe betrachtet, ähneln sie dem Querschnitte eines spanischen Rohrs.

§. 217. Bogengänge.

Die drei Bogengänge (Canales semicirculares) werden in den oberen, unteren (oder hinteren), und ausseren eingetheilt. Sie sind so gestellt, dass ihre Ebenen senkrecht auf einander stehen. Jeder hat eine Anfangs- und eine Endmundung im Recessus hemiellipticus des Vorhofs. Die Anfangsmundung erweitert sich zu einer ovalen, einer Feldflasche im Kleinen ähnlichen Höhle, welche Ampulla genannt wird. Es finden sich drei solcher Ampullenmundungen, aber nur zwei schlichte Endmundungen, indem die Endschenkel des oberen und unteren Bogenganges, kurz vor ihrer Einmündung in den Vorsaal, in eine kurze gemeinschaftliche Endröhre übergehen, wodurch die Zahl sämmtlicher Oeffnungen der Bogengänge, welche sechs sein sollte, auf fünf vermindert wird. Die Richtung des oberen Bogenganges kreuzt sich mit der oberen Kante des Felsenbeins, die des unteren (hinteren) streicht mit der hinteren Fläche der Pyramide fast parallel, die des ausseren fallt schief nach aussen und unten ab, und bildet, indem sie die innere Wand der Trommelhöhle etwas hervortreibt, eine über dem Canalis Fallopiae befindliche Wulst. Der aussere Bogengang ist der kürzeste, der hintere der längste. Ihr Querschnitt ist ein Oval. Die Grösse ihrer Krümmungen beträgt, namentlich beim äusseren, mehr als 180°; auch bleibt die Richtung des Kanals nicht in einer und derselben Ebene, sondern weicht durch seitliche Divergenz seiner beiden Enden (oberer Bogengang), oder durch Ausschweifung seiner Krummung (äusserer Bogengang) von der Kreisebene ab.

Es ist vergebliche Mühe, sich von dem Baue des Labyrinths und den Verhältnissen seiner einzelnen Abtheilungen durch Lectüre anatomischer Schriften — seien sie die umständlichsten und genauesten — einen Begriff zu machen. Um diesen zu erhalten, muss man selbst Hand anlegen, und sich in der technischen Bearbeitung dieses so überraschend schönen Baues versuchen. An Schläfeknochen von Kindern wird man, da die hier gegebene praktische Beschreibung das Aufsuchen der Theile erleichtert, zuerst die Merkwürdigkeiten der Trommelhöhle ohne Schwierigkeiten aussinden, und kann dann zur Präparation des Labyrinthes schreiten, welche, wenn sie noch so roh ausställt, doch eine gewisse Sicherheit der Vorstellung erzeugt, die das blosse Memoriren gelesener Beschreibungen nie geben kann.

§. 218. Schnecke.

Die Schnecke (Cochlea) ist ein schraubenförmig 21/2mal aufgewundener Gang, ähnlich dem Gehäuse einer Gartenschnecke. Sie liegt vor dem Vorhof, und hinter dem Carotischen Kanal, bildet, indem sie die Knochenmasse des Felsenbeins gegen die Paukenhöhle vordrängt, das Promontorium, und stösst nach innen an das blinde Ende des Meatus auditorius internus. Die Windungen liegen nicht in einer Ebene, sondern erheben sich über einander, und werden zugleich kleiner. Die knöcherne Axe, um welche sie sich drehen, heisst für die erste Windung: Spindel, Modiolus, für die zweite: Säulchen, Columella, und für die letzte halbe Windung: Spindelblatt, Lamina modioli, welches letztere aber nicht freisteht, sondern sich in die Zwischenwand der zweiten und letzten halben Windung fortsetzt, und deshalb auch als der Endrand dieser Zwischenwand angesehen werden kann. Der Modiolus ist, weil die erste Windung der Schnecke die grösste ist, dicker als die Columella, und diese stärker als die Lamina modioli. Die Axe der Schnecke liegt horizontal, in der Richtung des Querdurchmessers des Felsenbeins. Die breite Basis misst 4", ihre Höhe, von der Mitte der Basis bis zum blinden Ende des Schneckenganges (Kuppel. Cupula) 2,4". Die die Gänge von einander trennende Zwischenwand, wird gegen die Kuppel dünner, verliert ihre horizontale Richtung, und stellt sich während der letzten Schraubentour so auf, dass sie durch ihre Einrollung einen konischen, einer nicht ganz geschlossenen Papierdute ähnlichen Raum umgreift, dessen nach unten gerichtete Spitze das Ende der Columella, und dessen gewölbte Basis die Kuppel der Schnecke ist. Dies ist der Trichter, Scyphus Vieussenii. Der Raum des Schneckenganges wird durch das an die Axe besestigte, dünne, ebenfalls spiral gewundene, aus zwei Lamellen bestehende Spiralblatt, Lamina spiralis ossea, in zwei Treppen getheilt, von denen die untere (der Basis nähere) durch das runde Fenster mit der Paukenhöhle, die obere (von der Basis entferntere) mit dem Recessus hemisphaericus des Vorhofs communicirt. Erstere heisst deshalb Scala tympani, letztere Scala vestibuli. In der Scala tympani liegt, gleich

10

hinter der das runde Fenster verschliessenden Membrana tympani secundaria, die Anfangsöffnung des Aquaeductus ad cochleam. Die Lamina spiralis ossea hört in der letzten halben Windung der Schnecke mit einem zugespitzten, hakenförmig gekrümmten Ende (Hamulus) auf, welches in den Scyphus Vieussenii hineinsieht. Da die Lamina spiralis ossea nur bis in die Mitte des Schneckenganges hineinreicht, so wird die vollkommene Trennung beider Scalae durch die Lamina spiralis membranacea, eine Fortsetzung der ossea, bewerkstelligt. Die Lamina spiralis membranacea setzt sich über den Hamulus hinaus fort, und umgreist mit diesem eine Oessnung (Helicotrema Brescheti, — Ελιξ, Schnecke, τρημα, Loch), durch welche Scala tympani und Scala vestibuli unter einander in Verbindung stehen.

Mein ehemaliger Prosector, Marchese Corti, hat das Verdienst, eine sehr sorgfältige und genaue mikroskopische Untersuchung über den Bau der Lamina spiralis ossea und membranacea, so wie der Nerven und Gefässe derselben vorgenommen zu haben, deren überraschend complicirte Ergebnisse in dem bei der Literatur des Gehörorgans (§. 220) angeführten Werke niedergelegt wurden. Auf dieses Werk verweise ich Jene, welche mehr über diesen Gegenstand zu erfahren wünschen, als in einem Lehrbuche von der compendiösen Form des vorliegenden, füglich angeführt werden kann.

Die Höhle des Labyrinthes darf nicht als ein im Felsenbeine befindlicher, und zunächst von dessen Kuochenmasse umschlossener Raum angesehen werden, da das Labyrinth früher als das Felsenbein entsteht, und Vestibulum, Canales semicirculares, und Cochlea, eine besondere, glasartig spröde, feine Knochenlamelle als nächste Hülse haben, welche ich als Lamina vitrea beschrieb, und auf welche sich erst die Knochenmasse des Felsenbeins von aussen ablagert. An allen Schnitten des Labyrinths sieht man diese gelblich graue Lamelle deutlich. Zwischen ihr und dem eigentlichen Felsenbeleg ist bei Kindern eine zellig spongiöse Knochensubstanz abgelagert, welche das Präpariren (Ausschälen des Labyrinths aus seiner Hülse) sehr erleichtert.

Der Modiolus ist, wie die Columella, ein System paralleler Knochenröhrchen, welche im inneren Gehörgange mit feinen, in einer Spirallinie gelegenen Oeffnungen beginnen (Tractus spiralis foraminulentus), und sich zur Schnecke so verhalten, wie die Laminae cribrosae zum Vorhof. Das durch die Axe des Modiolus und der Columella laufende centrale Röhrchen ist etwas grösser als die übrigen, und wird als Canalis centralis modioli besonders benannt. Es mundet an dem Ende der Columella, oder an der Spitze des Scyphus Vieussenii. Jedes Röhrchen geleitet in der Tour zur Anhestungsstelle der Lamina spiralis ossea, und mundet in dem Raume, der zwischen den beiden Blättern derselben übrig bleibt. Untersucht man die Anhestung der Lamine spiralis ossea an den Modiolus aufmerksam, so sindet man, dass die obere und untere Lamelle derselben am Modiolus nicht endigen, sondern durch Aufoder Umbiegen in das dünne Knochenblättchen übergehen, welches die Oberfläche des Modiolus in der Scala vestibuli und Scala tympani überzieht (Lamina modioli), und hierauf in die Lamina vitrea übergeht. Wo die untere Lamelle der Lamina spiralis in die Lamina modioli übergeht, findet sich eine in Spiraltouren aussteigende Reihe von Löcherchen, welche an der Lehrbuch der Anatomie. 5. Aufl.

Ausbeugungsstelle der oberen Lamelle sehlen, und zum Verlause venöser Gefässe dienen, welche vom Spiralblatt und der inneren häutigen Auskleidung
der Schnecke zu einem Sinus sühren, welcher ausserhalb des Raumes der
Schnecke, in einem Kanale liegt, der sich zwischen den äussersten Röhrchen
des Modiolus und der Lamina modioli ebenfalls spiral erhebt, und als Canatis Rosenthalianus (Meckel's Archiv. 1823. pag. 74) beschrieben wird.

Ilg hat das Verdienst, zuerst bewiesen zu haben, dass der häufig als ein selbstständiges Gebilde betrachtete Scyphus Vieussenii, das Gehäuse der letzten halben Schneckenmundung ist (Anat. Beob. über den Bau der Schnecke. Prag, 1821). Da der Scyphus Vieussenii den Hamulus spiralis enthält, und von dem convexen Rande dieses, die Lamina spiralis membranacea gegen die innere Oberstäche des Scyphus schräg sich erhebt, so muss ein kleinerer Scyphus in dem Vieussen'schen grösseren stecken, und dieser wurde von Krause als Scyphulus zuerst unterschieden. Seine Spitze ist das Helicotrema. Er ist eben so wenig geschlossen, wie der grössere Scyphus, und überhaupt nur das Ende der Scala vestibuli.

Die Lamina spiralis membranacea besteht aus zwei Zonen: der Zona denticulata und Zona pectinata, deren complicirter Bau bei Corti nachgesehen werden kann. Die Zona denticulata schliesst sich an die Lamina spiralis ossea an, die pectinata verbindet die letztere mit der gegenüberstehenden Wand des Gehäuses, oder (wie in der ersten Windung) mit einer bei gewissen Thieren sehr entwickelten Lamina spiralis secundaria, welche auch beim Menschen im Anfauge der ersten Schneckenwindung deutlich ist.

Todd und Bowman haben einen organischen Muskel in der Schnecke beschrieben (Physiological Anatomy. II. pag. 26.), der von der inneren Wand der Schnecke zur Lamina spiralis membranacea geht, um diese zu spannen. Sie nannten ihn Musculus cochlearis. Kölliker erklärt sich gegen die musculöse Natur dieses Fundes.

Die Membrana tympani secundaria besteht, wie die grosse Trommelhaut, aus einer mittleren fibrösen Schichte, an welche sich aussen und innen die häutigen Ueberzüge jener Höhlen anlegen, welche durch sie von einander geschieden werden. Der Aquaeductus cochleas ist, wie der Aquaeductus vestibuli, ein venöser Gestsskanal. Siehe meine Untersuchungen über das Gehörorgan §. 122.

§. 219. Häutiges Labyrinth.

Die innere Oberstäche des knöchernen Labyrinths ist mit einem zarten Häutchen, Periosteum internum, überzogen, welches an seiner sreien Fläche glatt und glänzend ist, wie eine seröse Haut, und mit einer Schichte eckiger Epithelialzellen bedeckt wird. Es sondert eine seröse Flüssigkeit ab, in welcher die häutigen Säckchen des Labyrinths und ihre Verlängerungen schwimmen (Perilympha s. Aquula Cotunni). Die häutigen Säckchen nehmen den Recessus hemisphaericus und hemiellipticus des Vorhoss ein, und sühren dieselben Namen — Sacculus sphaericus et ellipticus. Sie haben keine Verbindung untereinander, und berühren sich blos. Vom Sacculus ellipticus gehen als dessen Verlängerungen die häutigen Bogengänge aus, welche die knöchernen nicht ganz ausfüllen, und, so wie diese, an

einem Schenkel eine flaschensormige Erweiterung (Ampulla membranacea) bilden. Die Säckchen sind so wie die häutigen Bogenrohrchen hohl, und enthalten eine Flüssigkeit (Endolympha). An jenen Stellen der Säckchen, welche den drei Laminae cribrosae, somit den Eintrittsstellen der Fasern des Nervus acusticus in das Labyrinth entsprechen, bemerkt man ein kreideweisses, rundliches Scheibchen, das aus unzähligen mikroskopischen Krystallen von kohlensaurem Kalk besteht, die durch ein zähes Cement zu einem concav-convexen Scheibchen zusammengebacken sind. Das Scheibchen liegt an der inneren Fläche des Säckchens auf.

Der Gehörnerv theilt sich im Meatus auditorius internus in den Nervus vestibuli und Nervus cochleae. Der Nervus vestibuli, der sich durch die Löcherchen der drei Laminae cribrosae durchschiebt, und sich dadurch in so viele Filamente auslöst, als Löcherchen existiren, betritt die häutigen Säckchen, und verästelt sich in ihrer Wand und in jener der drei Ampullen, ohne in die Höhle einzudringen, und sich in die singirte Pulpa acustica aufzulösen. Die von Breschet und Krause beschriebenen schlingen-Ormigen Umbeugungen der letzten Theilungsfasern existiren ganz bestimmt Der Nervus cochleae geht durch die Löcherchen des Tractus spiralis foraminulentus in den Modiolus und die Columella, schickt seine Fäserchen an der Anhestungsstelle der Lamina spiralis in den aus netzförmig verstrickten feinen Knochenkanälchen bestehenden Raum, zwischen beiden Lamellen derselben, wo sie ein dichtes Geslecht erzeugen, welches nach Corti's Entdeckung nahe am Rande der Zona viele ovale, bipolare Ganglienzellen enthält, in welche die Primitivfasern des Nervus cochlege übergehen', um am anderen (äusseren) Pol derselben wieder auszutreten, sich parallel neben einander zu legen, marklos zu werden, und als äusserst feine, 0,001" dicke Fäden, auf der unteren Fläche der Zona denticulata wahrscheinlich frei zu endigen (?).

Das Periosteum internum des Labvrinths schickt Fortsetzungen durch die beiden Aquaeductus zur äusseren Beinhaut des Felsenbeins. Die durch den Aquaeductus ad cochleam austretende Fortsetzung, kann bei Embryonen grösserer Thiere als ein hohler, trichterförmiger Zapfen herausgezogen werden. Die Gestaltungsmembran der häutigen Vorhofssäckehen, kann für keine einfache seröse Haut genommen werden, da sie aus mehreren Schichten besteht, wovon die ausserste die Charaktere einer genetzten Faserhaut, die zweite jene einer structurlosen Membran besitzt, die dritte (innerste) eine kernhaltige Epithelialzellenschichte von 0,005" Durchmesser darstellt. - Die Nerven, welche zu den Vorhofssäckehen gelangen, zerfallen in ein Büschel divergirender Fasern, welche miteinander anastomosiren, sich wiederholt theilen und verjüngen, deren letzte Endigung jedoch noch nicht mit Bestimmtheit sestgestellt ist (Kölliker scheint für freie Endigungen zu stimmen). In den häutigen Bogenrühren sehlt jede Spur von Nerven, obwohl die Dicke der Röhrenmembran 0,018", also das Doppelte von der Haut der Säckchen beträgt. Nicht alle Fäden des Nervus vestibuli treten an die Sacculi; kleine Bundel derselben dringen direct in die häutigen Ampullen ein, deren äussere Wand sie vor sich hertreiben (einstülpen), und dadurch äusserlich eine Furche, und innerlich einen Vorsprung von 0,2" Höhe erzeugen - Sulcus et Septum ampullae, Steisensand (Müller's Archiv. 1835. 2. Hft.). Die Nervenendigungem in den Ampullen sind ebenso hypothetisch wie jene in den Vorhofssäckchen. — Die Kalkkrystalle wurden zuerst von Huschke (Froriep's Notizen. 1832. Nr. 707) als sechsseitige Prismen mit sechsseitigen Zuspitzungspyramiden beschrieben. Die durch ihre Verbindung entstandenen, lockeren und mehr pulverigen Scheibchen, wurden von Breschet als Otoconie (bei niederen Thieren, Sepien und Knochenfischen, wo sie harte steinartige Concremente bilden, als Otolithen) unterschieden (Recherches anat. sur l'organe de l'ouie. 1836. p. 129). Sie kommen übrigens auch frei in der Endolympha und in dem Serum, welches die Schneckenhöhle ausfüllt, vor.

Zwei Kanile des Felsenbeins, die mit dem Gehörorgane in näherer Beziehung stehen, müssen hier noch erwähnt werden: der innere Gehörgang, und der Fallopische Kanal. Der innere Gehörgang beginnt an der hinteren Fläche der Felsenpyramide, und dringt so weit in die Masse derselbem ein, dass er vom Vestibulum nur durch eine dünne Knochenlamelle getrennt, wird. Sein blindsackähnliches Ende wird durch eine quervorspringende Knochenleiste in eine obere und untere Grube getrennt. Erstere vertieft sich wieder zu zwei kleineren Grübchen, wovon das vordere sich zum Fallopischen Kanale verlängert, das hintere aber mehrere feine Oeffnungen besitzt, welche zur Lamina cribrosa superior führen. Die untere Grube enthält dem Tractus spiralis foraminulentus (Basis modioli), und hinter diesem, einige kleinere Oeffnungen, welche zur Macula cribrosa media, und eine grössere, welche zur inferior geleitet. Der innere Gehörgang enthält den Nervus acusticus, den Nervus facialis, und die Arteria auditiva interna, aber keine Vene.

Der Fallopische Kanal läuft, von seinem Ursprung im inneren Gehörgang, durch die Knochenmasse des Felsenbeins anfangs nach aussen, dann nach hinten, zuletzt nach unten zum Foramen stylo-mastoideum. Er besteht somit aus drei, unter Winkeln zusammengestückelten Röhren. Die Winkel heissen Genicula (knieförmige Beugungen). Am ersten Knie hat er die an der vorderen oberen Fläche der Pyramide bemerkte Seitenöffnung (Hiatus s. Apertura spuria canalis Fall.), zu welcher der Sulcus petrosus superficialis Im Hiatus mundet der in der Fossula petrosa entsprungene, in der Pauke über das Promontorium nur als Furche aufsteigende, und unter dem Semicanalis tensoris tympani zum Fallopischen Kanale führende Canaliculus tympanicus. Vom Hiatus angesangen, liegt der Canaliculus Fallopiae zwischen Fenestra ovalis und Canalis semicircularis externus, wo er in die Paukenhöhle bauchig vorspringt. Vom zweiten Knie an liegt er hinter der Eminentia pyramidalis, mit deren Höhle er durch eine Oeffnung zusammen-Auch mit dem Canaliculus mastoideus hat er eine Communication. Bevor er am Griffelwarzenloch endigt, schickt er den kurzen Canaliculus chordae zur Paukenhöhle.

§. 220. Literatur der gesammten Sinnenlehre.

I. Tastorgan.

- J. Purkinje, comment. de exam. physiol. organi visus et systematis cutanei... Vratisl., 1823. 8.
- G. Breschet et Roussel de Vauxème, nouvelles recherches sur la structure de la peau. Paris, 1835. 8.

G. Simon, Beschreibung der normalen Haut, in dessen: Hautkrankheiten, durch anat. Untersuchungen erläutert. Berlin, 1848.

Bärensprung, Beiträge zur Anatomie u. Pathologie der menschl. Haut. 1848.
Ueber Epidermis, Rete Malpighii, Haare, Nägel, findet man alles Wissenswerthe in den Geweblehren von Henle u. Kölliker, und kleinere Aufsätze in Müller's Archiv, von Bidder, G. Simon, Kohlrausch etc., so wie Hessling in Froriep's Notizen, 1848, Nr. 113. u. insbesondere Kölliker, über den Bau der Haarbälge u. Haare, in den Mittheilungen der Zürcher Gesellschaft. 1847, so wie E. Reissner, nonnulla de hominis mammaliumque pilis. Dorpat. 1853.

Eine umfassende Zusammenstellung eigener und fremder Beobachtungen über die Structur der Haut und ihrer Amnexa, enthält Krause's Artikel "Haut" in Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. — Die an interessanten Thatsachen reiche Entwicklungsgeschichte der Haut, gab Kölliker im 2. Bande der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. — Ueber die glatten Muskelfasern der Haut siehe: Eylandt, de musculis organicis in cute humana. Dorpat, 1850.

Vortreffliche Abbildungen sämmtlicher Sinnesorgane gab F. Arnold im Fasc. II. seiner Icones anat. Ebenso R. Wagner in dessen Icones physiolog.

II. Geruchorgan.

- A. Scarpa, disquisitiones anat. de auditu et olfactu, und dessen Annot. acad. lib. II. de organo olfactus. Ticini, 1785. 4.
- S. Th. Sömmerring, Abbildungen der menschl. Organe des Geruches. Frankfurt a. M., 1809. fol.
- J. Fr. Schröter, die menschliche Nase etc. Leipzig, 1812. fol.

Das Physiologische liefern die oft genannten Handbücher über Physiologie, so wie:

- H. Cloquet, Osphresiologie oder Lehre von den Gertichen. Aus dem Französischen. Weimar, 1824.
- Möller, de odorum effectibus. Berol., 1826. 4., und der Artikel "Geruch" in R. Wagner's Handwörterbuch.

Die feineren anatomischen Verhältnisse behandeln ausführlich die neuesten Gewebslehren von Todd, Bowman, und Kölliker.

III. Sehorgan.

Da die Entdeckungen über das Gewebe der Augenhäute und des Augenkerns ganz der neueren Anatomie angehören, so ist die ältere Literatur so ziemlich entbehrlich geworden, und hat grösstentheils nur historischen Werth. Da ferner das Auge, als eine aus concentrischen Schichten bestehende Kugel, mathematische Durchschnitte zulässt, so kann das Studium der Anatomie desselben durch Abbildungen solcher Schnitte sehr erleichtert und vereinfacht werden.

Ueber den ganzen Augapfel handeln:

J. G. Zinn, descriptio anat. oculi humani icon. illustr. Gottingae, 1755. 4., und 1780. 4.

- S. Th. Sömmerring, Abbildungen des menschlichen Auges. Frankfurt a. M., 1801. fol.
- D. W. Sömmerring, de oculorum hominis animaliumque sectione horizontali. Cum IV. tab. Gott., 1818. fol.
- F. Arnold, anat. und physiol. Untersuchungen über das Auge des Menschen. Heidelberg, 1832. 4., und dessen Tab. anat. Fasc. II.
- G. Valentin, feinere Anatomie der Sinnesorgane, in dessen Repertorium 1836, 1837, und als Anhang des Artikels "Gewebe" im Wagner'schen Handwörterbuche der Physiologie.
- Th. Ruete, Lehrbuch der Ophthalmologie. 1. Lieferung. Braunschweig, 1845. 8.
- S. Pappenheim, die specielle Gewebslehre des menschl. Auges, mit Rücksicht auf Entwicklungsgeschichte und Augenpraxis. Berlin, 1842. 8.
- B. Brücke, anat. Beschreibung des menschlichen Augapfels. Berlin, 1847. 4.
- W. Bouman, Lectures on the Parts concerned in the Operations of the Eye. London, 1849.
- A. Hannover, das Auge. Leipzig, 1852.

In iconographischer Hinsicht bieten Arnold's Organa sensuum das Beste für das Auge und die übrigen Sinnesorgane.

Viele kleinere Abhandlungen in Ammon's Zeitschrift für Ophthalmologie. Dresden. Bd. I-V.

Die physiologischen Verhältnisse sind nachzusehen in:

- G. R. Treviranus, Beiträge zur Anatomie u. Physiologie der Sinneswerkzeuge etc. 1. Heft. Bremen, 1828. fol.
- J. Müller, zur vergleichenden Anatomie des Gesichtssinnes. Leipzig, 1826.
- E. Purkinje, Beobachtungen und Versuche zur Physiologie der Sinne. 2 Bde. 1823 und 1825.
- C. F. Tourtual, die Sinne des Menschen. Münster, 1827, und Jahresbericht in Müller's Archiv. 1840.
- W. Volkmann, neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig, 1836.
- A. Hueck, die Axendrehung des Auges. Dorpat, 1838. 4.
- A. Burow, Beitrage zur Physiologie und Physik des menschlichen Auges. Berlin, 1842.

Augenlider und Bindehaut.

- H. Meibom, de vasis palpebrarum novis. Helmstadii. 1666. 4.
- B. Eble, über den Bau und die Krankheiten der Bindehaut des Auges. Wien, 1828. 8., und in den med. Jahrbüchern Oesterr. 1837. 25. Bd.
- G. Meyer, diss. de conjunctiva oculi hum. imprimis palpebrarum. Berol., 1839. 8.

Thränenwerkzeuge.

- J. Th. Rosenmüller, partium externarum oculi, inprimis organorum lacrymalium descriptio. Lips., 1797. 4.
- Gosselin, über die Ausführungsgänge der Thränendrüse, in Archiv. génér. de médecine. Paris, 1843. Octob.
- H. Reinhard, diss. de viarum lacrymalium in homine ceterisque animalibus anatomia et physiologia. Lips., 1840.
- T. Ross, über den Mechanismus der Thränenableitung. Oppenheim's Zeit-schrift. 35. Bd.

Hornhaut und Sklerotica.

- M. Erdl, disquisit. anat. de oculo. Pars I. de membrana sclerotica. Monach., 1839. 4.
- F. C. Donders, Untersuchungen über die Regeneration der Hornhaut, in den holländ. Beiträgen. Bd. I. pag. 387 seqq.
- Bochdalek, über die Nerven der Sklerotica, in der Prager Vierteljahrsschrift, 1849. Ueber Lamina fusca, Orbiculus ciliaris etc. in derselben Zeitschrift. 1850.
- Strube, der normale Bau der Cornea. Wurzb., 1851.
- Luschka, die Structur der serösen Häute. Tub., 1851.
- Aussätze über die Nerven der Cornea von Kölliker und Rahn, in den Mittheilungen der Zürcher Gesellschaft 1848 und 1850.
- Stellwag v. Carrion, zur Lehre von den Glashäuten, in der Zeitschrift der Wiener Aerzte, 1852. Nov.

Choroidea, Iris und Pigment.

- E. H. Weber, de motu iridis. Lips., 1821. 4.
- J. M. Gottsche, über das Pigment des Auges, in Pfaff's Mittheilungen aus dem Gebiete der Med. 1836.
- F. Schlemm, im Berliner encyklopad. Wörterbuche. Bd. VI.
- J. Lenhossek, diss. de iride. Budae, 1841.
- J. Cloquet, mém. sur la membrane pupillaire et sur la formation du petit cercle de l'iris. Paris, 1818. 8.
- C. Krause in Meckel's Archiv 1832, und in Müller's Archiv, 1837. Jahres-bericht.
- L. Kobelt, über den Sphincter der Pupille, in Froriep's Notizen. 1840.
 Rd. XIV.
- G. Bruch, Untersuchungen zur Kenntniss des körnigen Pigments etc. Zürich, 1844. 4.

Netzhaut.

- E. Schneider, das Ende der Nervenhaut im menschlichen Auge. München, 1827. 4.
- B. M. Lersch, diss. de retinae structura microsc. Berol., 1840. 8.
- J. Bidder, zur Anatomie der Retina, in Müller's Archiv. 1839 und 1841.
- A. Hannover, über die Netzhaut etc., in Müller's Archiv. 1840 und 1843.
- F. A. Ammon, de genesi et usu maculae luteae. Vimar., 1830. 4.
- A. Burow, über den Bau der Macula lutea, in Müller's Archiv, 1840.
- F. Pacini, sulla testura intima della retina. Nuovi annali di Bologna. Luglio e Agosto (enthält gewaltige mikroskopische Beobachtungsfehler, z. B. eine Schichte grauer Nervenfasern und schlingenförmige Umbeugungen).
- H. Müller, zur Histologie der Netzhaut. Zeitschrift für wissenschaftl. Zool. 1851., und im 3. und 4. Bande der Verhandlungen der phys.-med. Gesellschaft zu Würzburg.
- M. Corti, Beitrag zur Anatomie der Retina. Müller's Archiv. 1850.
- A. Hannover, zur Anat. und Phys. der Retina, in der Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie. 5. Bd. 1. Heft, und Kölliker, in den Verhandlungen der Würzburger phys.-med. Gesellschaft. 3. Bd. p. 216.
- R. v. Vintschgau, ricerche sulla struttura microscopica della retina, in den Sitzungsberichten der kais. Akademie. 1853.

Glaskörper und Linse.

E. Brücks, über den inneren Bau des Glaskörpers, in Müller's Archiv, 1843. Desselben nachträgliche Bemerkungen hierüber, in Müller's Archiv. 1845. pag. 130.

A. Hueck, die Bewegungen der Krystalllinse. Dorpat, 1839. 4.

Meyer Ahrens, Bemerkungen über die Structur der Linse, in Müller's Archiv. 1838.

A. Hannover, in Müller's Archiv. 1845. pag. 467 seqq.

W. Werneck, mikroskop. Untersuchungen über die Wasserhaut und das Linsensystem, in Ammon's Zeitschrift IV. und V. Bd.

W. Bowman, Observations on the Structure of the Vitreous Humour, in Dubl. Quart. Journ. Aug. pag. 102 (gegen Brücke's irrige Angaben concentrischer Membranen).

Virchow, Notiz über den Glaskörper. Archiv für pathol. Anat. IV., und Verhandlungen der Würzb. Gesellschaft. II.

Hyaloidea.

M. A. Unna, comment. de tunica humoris aquei. Heidelb., 1836.

Werneck, über die Wasserhaut etc., in Ammon's Zeitschrift Bd. IV. Heft 1 und 2.

F. Schlemm, im Berlin. encyklop. Wörterb. der med. Wissensch. Bd. IV.

Ueber die Zergliederung des Auges handelt:

A. K. Hesselbach, Bericht von der königl. anatomischen Anstalt zu Würzburg, mit einer Beschreibung des menschlichen Auges und Anleitung zur Zergliederung desselben. Würzburg, 1820. 8. Auch in Radius, scriptores ophthalmologici minores, Vol. I.

Eine vollständige Literatur des Auges, so wie aller Sinnesorgane und Bingeweide, findet sich bei Huschke (Neue Ausgabe von Sömmerring's Anatomie. V. Bd.).

IV. Gehörorgan.

Ueber das Gehörorgan sind auch die älteren Schristen von Valsalva (1704), Cassebohm (1754), Vieussens (1714) noch immer brauchbar. Die Beschreibungen der beiden ersteren gehen selbst in die Subtilitäten ein; nur sind die Abbildungen roh und mangelhast.

A. Scarpa's disquisitiones anat. de auditu et olfactu. Ticin., 1789, 1792, fol., und Sömmerring's Abbildungen des menschl. Gehörorgans. Frankfurt am M., 1806, fol., empfehlen sich noch immer durch die Schönheit und Correctheit der Tafeln.

Sehr reichhaltig an vergleichend anat. Beobachtungen ist:

Th. Buchanan, Physiological Illustrations of the Organ of Hearing. London, 1828. Auszüge davon in Meckel's Archiv. 1828.

Ueber mikroskopische Structur der Bestandtheile des Gehörorgans handelt:

Pappenheim, die specielle Geweblehre des Gehörorgans. Breslau, 1840., und Todd und Bowman, Physiological Anat. of Man. — Ausgezeichnet durch

Reichthum und Neuheit der Beobachtungen sind Corti's Recherches sur l'organe de l'ouie des Mammiseres, in der Zeitschrift für wiss. Zool. III.

Ueber Verrichtung des Gehörorgans siehe die physiologischen Lehrbücher, und den bündigen und klaren Artikel von Theile in Schmidt's Encyklopadie der Medicin. III. Bd. pag. 427, so wie den Aufsatz "Hören" in R. Wagner's Handwörterbuch.

Ueber die mittlere und innere Sphäre des Gehörorgans des Menschen und der Säugethiere handeln aussührlich:

- G. Breschet, recherches anat. et physiol. sur l'organe de l'ouie etc. Paris, 1836. 4.
- J. Hyrtl, vergleichende anat. Untersuchungen über das innere (und mittlere) Gehörorgan des Menschen und der Säugethiere. Prag, 1845. mit 9 Kupfertafeln. fol.

Einzelne Theile des Gehörorgans:

Aeusseres Ohr, Trommelfell und Gehörknöchelchen.

- A. Hannover, de cartilaginibus, musculis et nervis auris ext. etc. Hafn., 1839.
 4. (grösstentheils vergleichend).
- Jung, vom ausseren Ohre, und seinen Muskeln beim Menschen, in den Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 1849. pag. 54 segg.
- E. Home, On the Structure and Uses of the Membrana Tympani, in Philos. Transact. 1800. P. 1.
- H. J. Shrapnell, On the Structure of the Membrana Tympani, in Lond. Med. Gazette. April. 1832.
- A. P. Aepli, diss. de membrana tympani. Gynoped., 1837. 4.
- E. J. Volquarts, membranae tympani explicatio anat. phys. Kil., 1839.
- A. Carlisle, The Physiology of the Stapes. Philos. Transact. 1805.
- F. Tiedemann, Varietäten des Steigbügels, in Meckel's Archiv. 5. Bd.
- H. J. Shrapnell, On the Structure of the Incus. Lond. Med. Gaz. June. 1833. (Sylvisches Knöchelchen.)
- F. W. Chevallier, On the Ligaments of the Human Ossicula Auditus, in Med. Chir. Transact. 1825. Vol. XIII. P. I.
- E. Hagenbach, disquisitio circa musculos auris int. hom. Basil., 1833. 4.

Labyrinth.

- D. Contunni, de aquaeductibus auris hum. Nap., 1761.
- J. G. Zinn, observationes anat. de vasis subtilioribus oculi et cochleae auris int. Gött., 1753. 4.
- Brugnone, observations anat. et phys. sur le labyrinthe de l'oreille, in Mém. de Turin. 1805 und 1808.
- Ribes, sur quelques parties de l'oreille interne, in Magendie Journal de physiol. expérimentale. Vol. II.
- J. H. Ilg, anat. Beobachtungen über den Bau der Schnecke. Prag, 1821. 4. Ch. Fr. Meckel, de labyrinthi auris contentis. Argent., 1777. 4.
- A. Meckel, Bemerkungen über die Höhle des knöch. Labyrinths, in Meckel's Archiv. 1827.
- Reissner, de auris internae formatione. Dorpat., 1851.
- A. Corti's in §. 218 citirte Abhandlung.
- A. Kölliker, über die letzte Endigung des Nervus cochleae, und die Function der Schnecke. Würzb., 1854.

Praparation des Labyrinths.

J. Hyrtl, vorläufige Bemerkungen über das knöcherne Labyrinth. Oesterr. Med. Jahrb. 1843. Märzheft.

Die unter Seiler's Anleitung von Papaschy in Dresden verfertigten kolossalen Darstellungen des Gehörorgans in Gyps, und die Wachsarbeiten des leider zu früh verstorbenen Künstlers Heinemann in Braunschweig, so wie jene von Guy ainé in Paris, kommen dem theoretischen Studium trefflich zu Statten, obwohl sie nie jene Sicherheit der Vorstellung erzeugen werden, welche nur durch eigene Präparationsversuche zu erlangen ist.

FÜNFTES BUCH.

Eingeweidelehre und Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte.



A. Eingeweidelehre.

§. 221. Begriff und Eintheilung der Eingeweidelehre.

Die Eingeweidelehre, Splanchnologia (σπλάγχνον, Eingeweide), im engeren Sinne des Wortes, befasst sich mit dem Studium jener zusammengesetzten Organe, durch welche der materielle Verkehr des Organismus mit der Aussenwelt unterhalten, und jene Stoffe bereitet werden, welche entweder zur Erhaltung des Individuums, oder zur Fortpflanzung seiner Species nothwendig sind. Jedes Organ, welches an der Ausführung dieser Verrichtungen Antheil hat, ist ein Eingeweide (Viscus). Eine Gruppe oder Folge von Eingeweiden, welche zur Realisirung eines gemeinsamen physiologischen Zweckes sich verbinden, bildet einen Apparat oder ein System, dessen Name von der Wirkung genommen wird, die es hervorbringt. Da die Eingeweide von aussen her Stoffe aufnehmen oder dahin abgeben, so müssen sie mittel- oder unmittelbar mit den Leibesöffnungen in Verbindung stehen.

Da die Sinnesorgane in einer näheren Beziehung zum Geiste des Menschen stehen, und seine Entwicklung durch die Vorstellungen leiten, die von ihnen vermittelt werden, so können sie mit den eigentlichen Eingeweiden, die dem materiellen Leben angehören, nicht in eine Klasse zusammengeworfen werden, um so weniger, als der Sprachgebrauch unter Eingeweiden den Inhalt der grossen Körperhöhlen versteht, und die mehr weniger oberflächlich gelegenen Sinnesorgane wohl nie unter dem Collectivnamen von Eingeweiden begreift.

Es sollte allerdings, unserem Begriffe zusolge, auch das Herz und das Gehirn in der Eingeweidelehre Platz finden. Da jedoch das erstere der Vereinigungs- oder Ausgangspunkt eines besonderen Systems — des Gestassystems — ist, und das letztere dasselbe sur das Nervensystem vorstellt, so werden diese beiden Eingeweide nicht hier, sondern bei ihren betreffenden Systemen näher gewürdigt werden. — Nach Verschiedenheit des Zweckes, welchen die zu einem bestimmten Apparate zusammentretenden Eingeweide leisten, zerfallen diese in das Verdauungsorgan, Respirationsorgan, Harn- und Geschlechtsorgan. An den Rändern der Ausnahms- oder Ausleerungsöffnungen geht das Integument in die Sch

haut über, welche einen ununterbrochenen Ueberzug der inneren Oberfläche der meisten Eingeweide bildet.

I. Verdauungsorgan.

§. 222. Begriff und Eintheilung des Verdauungsorgans.

Das Verdauungsorgan, Organon digestionis, bildet einen, vom Munde bis zum Aster, durch alle Leibeshöhlen verlausenden Schlauch (Canalis s. Tubus alimentarius) mit veränderlicher Weite, der die Aussuhrungsgänge drüsiger Nebengebilde (Organa accessoria) aufnimmt. Seine lebendige Thätigkeit, die nur an seinem Anfange und Ende der Willkür unterworfen ist, zielt dahin, aus den genossenen Nahrungsmitteln jene Stoffe auszuziehen, welche im Stande sind, die Verluste zu ersetzen, die der Organismus durch Ausscheidung seiner verbrauchten und zum Leben untauglichen Materien fortwährend erleidet. Die Theilchen, aus welchen der thierische Leib besteht, sind während des Lebens nicht auf ein ruhiges Nebeneinandersein angewiesen, sie besinden sich vielmehr in einem sortdauernden Wechsel. durch welchen die älteren aus ihren Verbindungen treten, und jüngere an ihre Stelle kommen, um wieder anderen Platz zu machen. Dieser Umtausch von Stoff, der ein Hauptmerkmal des thierischen und psanzlichen Lebens ist, und, wie man sagte, die Pflanze im Thiere vorstellt, kann nur dann eine Zeit lang ohne Verzehrung und Aufreibung des Organismus dauern, wenn der Zuwachs dem Verluste gleichartig und proportionirt ist. Die Materien, aus welchen der thierische Leib besteht, finden sich, als solche, auch in der pflanzlichen und thierischen Nahrung. Es handelt sich nur darum, sie aus dieser auszuziehen, und rein von jeder anderen Zugabe darzustellen. Diesen Act hat die Natur den Verdauungsorganen anvertraut. Er wird auf chemische, leider oft nur der Form nach gekannte Weise geleistet. Wie der Chemiker, wenn er einen reinen Stoff aus einem zusammengesetzten Körper darzustellen hätte, diesen in kleine Stücke zerschneidet oder zu Pulver zermalmt, mit Flüssigkeiten digerirt, mit Säuren behandelt, von einem Gestasse in ein anderes giesst, um neue Reagentien anzuwenden, und den Rückstand, der ihn nicht mehr interessirt, wegschüttet, so ist der Verdauungsact der Form nach eine Reihe ähnlicher Verrichtungen, die als Kauen, Einspeicheln, Schlingen, Magen- und Darmverdauung, und endlich Kothentleerung auf einander folgen. Die ganze Folge von Verdauungswerkzeugen kann somit in folgende Abtheilungen gebracht werden: 1. Mundhöhle (mit Zähnen und Speicheldrusen), 2. Schlingorgane (Rachen- und Speiserühre), 3. eigentliche Verdauungsorgane (Magen, Dunn- und Dickdarm, sammt ihren drusigen Nebengebilden: Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz), 4. Ausleer ungsorgan (Mastdarm).

Die Wand des Verdauungskanals wird aus mehreren Schichten zusam-

mengesetzt, welche sich an jedem Abschnitte desselben mit wenig Abweichungen wiederholen. Die innerste Schichte ist ein der ausseren Oberhaut analoges, aus kernhaltigen Zellen zusammengesetztes Epithelium, welches, da die innere Oberstäche des Verdauungskanals fortwährend mit Schleim bedeckt ist, und durch Wasserdunst gebäht wird, nie die Härte und hornige Natur der Epidermis annimmt. Auf sie folgt die Schleimhaut (Membrana mucosa), eine mit Blutgesassen, Nerven, glatten Muskelfasern und verschiedenen Drüschen reichlich ausgestattete Membran, welche stellenweise mit besonderen Hervorragungen (Falten, Wärzchen, Zotten) besetzt erscheint. Sie wird durch die Zellhaut (Tunica cellularis s. Textus cellularis submucosus) an die nächstfolgende Muskelhaut (Tunica muscularis) gehestet, welche aus einer äusseren Längenfaserschichte und einer inneren Kreissaserschichte besteht. Die äusserste Schichte des Kanals (welche sich aber nur in der Bauchhöhle vorfindet) ist keine dem Darme eigenthümlich angehörende, sondern von dem gemeinschaftlichen serösen Ueberzuge aller Baucheingeweide (Bauchfell, Peritoneum) entlehnte seröse Membran — Involucrum peritoneale.

§. 223. Mundhöhle, weicher Gaumen, und Isthmus faucium.

Der Verdauungskanal beginnt mit einer, am unteren Theile des Kopfes zwischen den Kiefern liegenden Höhle — Mundhöhle, Cavum oris in welcher die Speisen für die Magenverdauung durch das Kauen, Masticatio, und Einspeicheln, Insalivatio, vorbereitet werden, und auf mechanische Weise jene Aenderung ihrer Cohäsion erleiden, welche sie zum Verschlungenwerden tauglich macht. Bei geschlossenen Kiefern zerfällt die Mundhöhle durch die Zähne in eine vordere kleinere (Vestibulum oris). und in eine hintere grössere Abtheilung oder die eigentliche Mundhöhle. Beide Abtheilungen stehen beiderseits durch eine zwischen dem letzten Backenzahn und dem vorderen Rande des Kronenfortsatzes des Unterkiefers offen bleibende Lücke in Verbindung. Bei gesenktem Unterkiefer fliessen beide Abtheilungen in ein grosses Cavum zusammen, welches seitwärts durch die Backen, oben durch den harten Gaumen, unten durch die vom Unterkieser zum Zungenbein gehende Musculatur begrenzt wird, vorn und hinten aber offen ist. Die vordere Oeffnung ist die, von zwei wagrechten, gewulsteten, mit Empfindlichkeit und Tastvermögen begabten häutigen Falten — Lippen, Labia — begrenzte Mundspalte (Rima oris), an deren Saume das aussere Integument mit der Schleimhaut des Verdauungsorgans in Verbindung tritt. Jede Lippe wird durch eine, von ihrer inneren Fläche senkrecht sich erhebende Schleimhautfalte (Frenulum labii superioris et inferioris) an das hinter ihr besindliche Zahnsleisch gehestet, und besitzt, wegen ihrer nothwendigen Mitwirkung beim Kauen, Sprechen, und den verschiedenen Athmungsformen (Saugen, Blasen, Pfeisen

einen so hohen Grad von Beweglichkeit, dass die Mundspalte die verschiedensten Formen annehmen kann.

Der Schleimhautüberzug der Lippen setzt sich in jenen der Backen fort, wo er, dem 1. oder 2. Mahlzahn gegenüber, in die Mündung des Ausführungsganges der Ohrspeicheldrüse eindringt. Von den Backen und Lippen schlägt er sich zur vorderen Fläche der Alveolarfortsätze der Kieser um, gelangt zwischen je zwei Zähnen aus der vorderen Mundhöhle in die hintere, und schliesst als Zahnfleisch (Gingiva) die Hälse der Zähne ein. In der hinteren Mundhöhle überzieht er den Boden, und das Dach derselben: den harten Gaumen. Vom Boden erhebt er sich faltenformig. um als Zungenbändchen (Frenulum linguae), welches vorzugsweise aus elastischen Fasern besteht, zur unteren Fläche der Zunge zu treten, und die ganze freie Oberstäche dieses Organs einzuhüllen. Rechts und links vom Zungenbändchen stülpt er sich in die Mündungen der Ausführungsgänge der Unterkiefer- und Unterzungen-Speicheldrüse ein. Am harten Gaumen verdickt er sich, hängt durch unnachgiebigen Zellstoff mit der Beinhaut des knöchernen Gaumens zusammen, und hildet, bevor er durch die hintere Oeffnung der Mundhöhle in die Rachenhöhle übergeht. eine vom hinteren Rande des harten Gaumens gegen die Zungenbasis herabhängende Falte - den weichen Gaumen, Palatum molle, mobile, pendulum.

Der weiche Gaumen, auch Gaumensegel, bildet eine Art beweglicher und querer Grenzwand zwischen der Mund- und Rachenhöhle, welche aber nicht vertical herabhängt, sondern schief nach hinten gerichtet ist, hat eine vordere und hintere Fläche, einen oberen (am hinteren Rande des harten Gaumens besetigten), und einen unteren sreien Rand, welcher nicht bis zur Zunge herabreicht, und in seiner Mitte einen stumps kegelförmigen Vorsprung besitzt, — das Zäpschen, Uvula, Staphyle, — durch welchen er in zwei seitliche Hälsten zersällt. Jede dieser Hälsten theilt sich in zwei divergirende Schenkel — Gaumenbögen, Arcus palatini — deren vorderer zum Seitenrande der Zunge geht — Gaumenzungenbogen, Arcus palato-glossus, — deren hinterer in die Schleimhaut der Rachenhöhle übergeht — Gaumenrachenbogen, Arcus palato-pharyngeus.

Jeder Schenkel kehrt seinen concaven oder freien Rand der Zunge zu. Zwischen beiden Schenkeln bleibt ein nach oben spitziger, dreieckiger Raum übrig, in welchem ein Aggregat von Balgdrüsen — die Mandel, Tonsilla s. Amygdala — liegt, welches über die inneren Ränder der Schenkel vorspringt, und deshalb von der Mundhöhle her gesehen werden kann. Der zwischen dem unteren Rande des weichen Gaumens, dem Zungengrunde, und den beiden Mandeln übrig bleibende Raum, ist die hintere Oeffnung der Mundhöhle, welche zur Rachenhöhle führt, und deshalb Racheneingang oder Rachenenge (Isthmus faucium) benannt wird.

Der weiche Gaumen wird durch Muskeln bewegt, welche entweder ganz oder nur mit ihren Enden zwischen seinen beiden Schleimhautblättern verlausen, ihn heben, senken, oder in der Quere spannen, und dadurch die Weite und Gestalt des *Isthmus faucium* verändern. Einer von ihnen ist unpaar, die übrigen paarig.

Der unpaare Azygos uvulae entspringt von der Spina palatina (hinterer Nasenstachel), und verliert sich kegelförmig zugespitzt im Zäpschen.

Der paarige Levator veli palatini s. Petro-salpingo-staphylinus (von $\pi \acute{e} \tau \varrho \alpha$, Felsen, $\sigma \acute{\alpha} \lambda \pi \iota \gamma \xi$, Trompete, und $\sigma \tau \alpha \varphi \upsilon \lambda \dot{\gamma}$, Zäpschen) entspringt vor dem Carotischen Kanal an der unteren Felsenbeinsläche, und von dem Knorpel der Eustachischen Ohrtrompete, und verwebt seine Fasern im weichen Gaumen theils mit den Fasern des Azygos, theils mit jenen des gleichnamigen Muskels der anderen Seite.

Der Tensor palati s. Circumflexus, s. Spheno-salpingo-staphylinus, liegt an der äusseren Seite des vorigen, zwischen ihm und dem Ursprunge des Pterygoideus internus. Er entsteht an der Spina angularis des Keilbeins, und an der knorpeligen Ohrtrompete, umschlingt mit seiner Endsehne den Haken der inneren Lamelle des Flügelfortsatzes, und lässt seine Fasern divergirend im weichen Gaumen ausstrahlen. Der Muskel ist somit nicht, wie die übrigen, geradlinig, sondern bildet einen Winkel, dessen Spitze an dem Haken des Flügelfortsatzes liegt (Schleimbeutel).

Der schwache Musculus palato-glossus und palato-pharyngeus liegt in dem gleichnamigen Schenkel des weichen Gaumens eingeschlossen. Der Palatoglossus führt, weil er den weichen Gaumen niederzieht, und den concaven Rand des Arcus palato-glossus geradlinig nach einwärts vorspringen macht (wodurch der Isthmus faucium von oben und von den Seiten verengert wird), auch den Namen Constrictor isthmi faucium. — Alle diese Muskeln des weichen Gaumens sind kürzer als ihre griechischen Namen.

Tourtual beschrieb (Müller's Archiv. 1844. pag. 452) einen neuen Gaumenmuskel, welcher am untersten Theile des äusseren Randes der hinteren Nasenöffnung liegt. Sein Ursprung erstreckt sich vom hinteren Ende der unteren Nasenmuschel bis zur knorpeligen Ohrtrompetenmundung hinauf. Er wird im Herabsteigen weiter, und verliert sich im vorderen äusseren Theile des Gaumensegels. Die Schleimhaut bildet, wo sie den hinteren Rand dieses Muskels bekleidet, eine kurze scharfe Falte, welche die Aussindung des Muskels erleichtert. Tourtual nannte ihn Levator palati minor.

Die Schleinhaut der Mundhöhle besitzt, ausser den sie vorzugsweise bildenden Bindegewebfasern, einen ziemlichen Reichthum an elastischen Fasern, und ist mit kleinen, traubigen Schleimdrüschen ausgestattet, welche aus einem kurzen, verästelten Ausführungsgange, und aus einer variablen Menge von Acini bestehen. Sie werden in die Glandulue tabiales, buccales, und palatinae eingetlieilt. Ihre Grösse und Zahl variirt an verschiedenen Stellen, und ist am weichen Gaumen am ansehnlichsten, wo sie eine continuirliche, 1½" dicke Drüsenschichte bilden, welche sich auch in den harten Gaumen, aber mit nach vorn abnehmender Dicke, fortsetzt. — Das Zäpschen Lehrbuch der Anatomie. 5. Auß.

ist nur ein, mit dichtgedrängten, traubenformig aggregirten Schleimdrüschen gefüllter Schleimhautanhang des weichen Gaumens. - Die Mandel ist ein Conglomerat grüsserer, balgähnlicher, dickwandiger Drüsen, welche durch Bindegewebe in einen 1/2" langen und 1/4" breiten Klumpen vereinigt werden. Jede dieser Drusen besteht aus einer ausseren, faserigen Membran, und einem inneren, von der Mundhöhlenschleimhaut abstammenden Ueberzuge. Zwischen beiden liegt eine grössere oder geringere Anzahl vollkommen geschlossener Kapseln, welche Kerne und Zellen in Fülle enthalten. (Denselben Bau besitzen auch die grösseren, auf der Zungenwurzel hinter den wallformigen Warzen gelagerten Balgdrüsen.) Die dem Isthmus saucium zugewendete, convex vorspringende Fläche der Mandeln ist mit 15 - 20 grösseren Oeffnungen versehen, durch welche die Drüsenbälge ihren Inhalt, während des Durchpassirens des Bissens durch den Isthmus, fahren lassen, und diese enge Passage schlüpfrig machen. Sie schwellen bei Entzundungen so bedeutend an, dass sie den Isthmus und selbst die Rachenhöhle ausfüllen, und Erstickungsgefahr bedingen (Angina tonsillaris). Eine bleibende Vergrösserung derselben verursacht beschwerliches Schlingen, genirt die Sprache, veranlasst selbst Schwerhörigkeit (wegen der Nähe der Rachenmundung der Ohrtrompete), und erfordert ihre Ausrottung mit dem Messer. Bei alten Individuen, die oftmals an Entzundungen der Mandeln mit partieller Vereiterung derselben gelitten haben, findet man sie geschrumpst, theilweise oder vollkommen geschwunden, und nur ihre Oeffnungen als seichte Grübchen ohne drusiges Parenchym noch sichtbar.

Um eine richtige Vorstellung vom Isthmus faucium zu erhalten, bereitet man sich zwei senkrechte Durchschnitte eines Schädels. Der eine gehe senkrecht durch beide Augenhöhlen bis in die Mundhöhle, und lasse Unterkiefer und Zunge unberührt. Man bekommt durch ihn eine freie Ansicht des weichen Gaumens von vorn her, seiner Schenkel, und der Mandeln. Der andere, ebenfalls senkrechte, aber mit der Nasenscheidewand parallele, theilt die Mundhöhle in zwei seitliche Hälften. Man erhält die Ansicht des weichen Gaumens und seiner Beziehungen zur Mund- und Rachenhöhle im Aufriss.

Die Muskeln des weichen Gaumens können nur von hinten her präparirt werden. Man hat somit die Wirbelsäule abzutragen, den Rachensack zu öffnen, und findet sie leicht nach Entfernung des hinteren Blattes der Schleimhaut des weichen Gaumens, bis zur Eustachi'schen Trompete hinauf.

Lässt man am Lebenden, dessen Hals untersucht werden soll, bei geöffnetem Munde eine tiefe Inspiration machen, so erhebt sich der weiche
Gaumen, der Isthmus wird grösser, und man kann durch ihn hindurch einen
grossen Theil der hinteren Rachenwand übersehen. Lässt man Schlingbewegungen machen (welche ohnedies häufig unwillkürlich eintreten, wenn man
mit der Mundspatel den Zungengrund nach abwärts drückt), so sieht man,
wie sich die concaven Ränder der Gaumenschenkel gerade strecken, und sich
(namentlich die der vorderen) so weit nähern, dass nur eine kleine Spalte
zwischen ihnen frei bleibt, die durch das herabhängende Zäpschen verschlossen wird. Auch beim Singen hoher Töne nimmt der Isthmus die Gestalt
einer senkrechten Spalte an. Dass die Schleimhaut des weichen Gaumens,
der Gaumenschenkel, und der Mandeln, sur Geschmacksempsindung empsänglich ist, beweisen Müller's und Valentin's Versuche.

§. 224. Zähne. Anatomie derselben.

Die Zähne, Dentes, sind passive Kauwerkzeuge. Grosse Zähne kommen deshalb mit weiten Mundspalten, starken Kiefern, und krästigen Beissmuskeln vor. Sie eignen sich durch ihre Härte sowohl, wie durch ihre Form, welche Meisseln, Keilen, oder Stampfen gleicht, zu mechanischen Zertrümmerungsmitteln der Nahrung. Jeder Zahn ragt mit einem unbedeckten nackten Theile seines Kurpers in die Mundhühle vor. Dieser ist die Krone (Corona). Auf ihn folgt der vom Zahnfleisch umschlossene Hals (Collum). Der in die Lücken des Alveolarfortsatzes, wie der Nagel in die Wand, eingetriebene spitzige Endzapsen heisst Wurzel (Radix dentis). Jeder Zahn enthält eine in seinem Halse und seiner Krone befindliche Höhle (Cavum dentis), welche durch einen feinen, in der Wurzel nach unten laufenden Kanal, an der Spitze der letzteren ausmündet (Canalis radicis). In dieser Hohle liegt der sogenannte Zahnkeim (Pulpa s. Blastema dentis), ein weicher, aus undeutlich faserigem Bindegewebe zusammengesetzter Körper, zu welchem reichliche, aber feine Gefässe und Nerven durch die Wurzelkanäle eindringen, und welcher mit einem zarten. structurlosen Häutchen überzogen ist. Der Zahnkeim liegt ganz frei in der Zahnhöhle, und sendet keine Spur von Fortsätzen in die Substanz des Zahns hinein. Man unterscheidet ferner an jedem Zahne drei Substanzen: 1. Der Schmelz oder das Email (Subst. vitrea s. adamantina) bildet die aussere Rinde der Krone, welche an der Kaussache des Zahnes am dicksten ist, und, gegen den Hals zu sich verdünnend, mit scharf gezeichnetem Rande plötzlich aufhört. Er deckt somit den freien Theil des Zahnes wie eine dicht aufsitzende Kappe. Der Schmelz besteht aus kantigen, sechseckigen, etwas geschläugelten, von der Oberfläche der Krone strahlenförmig gegen die Zahnaxe convergirenden, soliden Fasern, von 0,002" Dicke, welche der Bruchfläche der Krone ihren Seidenglanz geben. Eine vollkommen homogene, verkalkte, seine Schichte deckt die freie Obersläche des Schmelzes als sogenanntes Schmelzoberhäutchen. Es hängt mit dem Schmelz so innig zusammen, dass es nur durch Anwendung von Salzsäure sich von ihm in grösseren Stücken trennen lässt. 2. Das Zahnbein (Ebur s. Substantia propria dentis), oder die eigentliche Zahnsubstanz, bildet den Körper des Zahns, und schliesst zunächst die Zahnhöhle ein. Es wird aus feinen, 0,001"-0,002" weiten Kanälchen, und einer, diese unter einander verbindenden, structurlosen, harten Grundmasse zusammengesetzt. Die Kanälchen beginnen mit offenen Mündungen in der Zahnhöhle und im Wurzelkanal, sind schräg nach aussen und oben gerichtet, sanst wellenförmig gewunden, und, gegen die Oberstäche zu, mehrere Male gabelförmig getheilt. Den neuesten Beobachtungen zufolge endigen die zahlreichen Aeste dieser Kanälchen niemals blind, sondern anastomosiren entweder mit benachbarten, oder gehen in den Schmelz über, wo sie ebenfalls mit einander anastomosiren, oder endlich treten sie in die Wurzelrinde des

Zahnes (Cement) über, und verbinden sich mit den Aestchen der daselbst befindlichen Knochenkörperchen. Sie enthalten, wie Lessing gegen Valentin bewies, keine Knochenerde, sondern eine zur Ernährung des Zahnes dienende Flüssigkeit, den Zahnsaft, welcher aus den Blutgestässen der Zahnpulpa stammt. — Da dem Gesagten zufolge die Structur des Zahnbeins eine röhrige ist, so ist der Name Zahnbein nicht glücklich gewählt. Beine (Knochen) besitzen ja blätterige Structur. - Jener Theil des Zahnbeins, welcher die Höhle des Zahnes zunächst umschliesst, ist nicht eben, sondern mit rundlichen, tropssteinartigen Vorsprüngen besetzt, welche den von Czermak entdeckten Zahnbeinkugeln angehören (siehe Note zum nächsten §.). 3. Die Wurzelrinde (Crusta ostoides radicis), gewöhnlich Cement genannt, findet sich nur an der ausseren Oberstäche der Radix. als 0,2"-0,05" dicke Rinde, und besitzt, nebst dem concentrisch-blätterigen Bau, auch die mikroskopischen Elemente der Knochen: die Müller'schen Knochenkörperchen, jedoch nur mit spärlichen Aestchen. - Die Grenzlinie zwischen Zahnbein und Wurzelrinde erscheint an seinen Längenschnitten des Zahns als ein bei durchgehendem Lichte dunkler Streifen. in welchem sehr grosse Knochenkörperchen liegen, welche mit denen der Wurzelrinde durch ihre Strahlen sich verbinden, und ganz bestimmt mit den Röhrchen des Zahnbeins communiciren. An der Spitze der Zahnwurzel setzt sich die Rinde noch etwas (an den Eckzähnen 0,6"-1") über die Spitze des Zahnbeins fort, und bildet dadurch allein den Anfang des Zahnkanals. Die Zahl der Zähne beträgt 32. Jeder Kiefer trägt 16. Sie werden in die vier Schneide-, zwei Eck-, vier Backen- und sechs Mahlzähne eingetheilt.

Die vier Schneidezähne (Dentes incisivi) haben meisselartig zugespitzte Kronen, mit vorderer convexer, und hinterer concaver Fläche. Ihr Hals ist im Unterkiefer seitlich comprimirt, und von vorn nach hinten dicker, als von rechts nach links. Im Oberkiefer ist er mehr rundlich. Die Wurzel ist einfach kegelformig, von den Seiten etwas flachgedrückt. Die beiden inneren Schneidezähne sind, besonders im Oberkiefer, stärker, und haben breitere Kronen als die beiden äusseren.

Die zwei Eckzähne (Dentes angulares, canini, cuspidati), auf jeder Seite einer, haben konisch zugespitzte Kronen, und an der hinteren Seite dieser, zwei flache Facetten. Ihre starken, einfachen, zapfenformigen Wurzeln zeichnen sich an den Eckzähnen des Oberkiefers (Augenzähne) durch ihre Länge aus.

Die vier Backenzähne (Dentes buccales), gewöhnlich auch kleine oder vordere Stockzähne genannt, zwei auf jeder Seite, haben niedrigere Kronen als die Eckzähne, und entweder zwei Wurzeln, oder nur eine einfache, plattgedrückte, an welcher eine longitudinale Furche die Tendenz zum Zerfallen in zwei Wurzeln andeutet. Ihre Mahlstächen besitzen einen ausseren und inneren, kurzen, aber breiten und stumpfen Hücker (Cuspis). Sie führen deshalb auch den Namen Bicuspidati.

Die sechs Mahl- oder Stockzähne (Dentes molares), drei auf jeder Seite, zeichnen sich durch ihre Grösse, und durch die vier oder fünf Höcker ihrer Kauslächen aus. Die Stockzähne des Oberkiesers haben in der Regel drei divergirende konische Wurzeln, die des Unterkiesers nur zwei, deren jeder man es ansieht, dass sie durch die Verwachsung zweier konischer kleinerer Wurzeln entstand. Die Kronenhöcker der ersteren sind viersach, die der letzteren sunssieht — drei am äusseren, zwei am inneren Kronenrande. Der letzte Stockzahn beider Kieser, der seines späten Ausbruches (im 20.—25. Lebensjahre) wegen, Dens serotinus s. dens sapientiae heisst, ist kürzer als die übrigen, und seine Wurzeln sind nicht selten zu einem einzigen, konischen Zapsen verschmolzen, der gerade oder gekrümmt, und im Unterkieser gegen die Basis des Kronensortsatzes gerichtet ist.

Obwohl die Natur schon in den frühen Perioden der Entwicklung des Embryo (im dritten Monate) die Bildung der Zähne beginnt, so wird sie doch so spät damit fertig, dass erst im sechsten oder siebenten Monate nach der Geburt, die inneren Schneidezähne des Unterkiefers durchbrechen können. In Zwischenräumen von 4-6 Wochen folgen die übrigen nach, und zwar in der Ordnung, dass auf die unteren inneren Schneidezähne die oberen inneren, hierauf die unteren äusseren, und dann die oberen äusseren Schneidezähne folgen. Nun sollten der Tour nach die Eckzähne kommen. Es brechen aber früher die unteren und oberen ersten Backenzähne aus. und erst, wenn diese ihren Platz eingenommen haben, rückt der Eckzahn hervor, worauf die ausseren Backenzähne erscheinen. Am Ende des zweiten Lebensjahres zählt das Kind zwanzig Zähne. Es folgen nun keine anderen nach, da der kindliche Kiefer keinen Raum für sie hätte. Diese zwanzig Zähne heissen Milchzähne, Dentes lactei s. caduci. Die Schneideund Eck-Milchzähne sind kleiner als die bleibenden, die Backen-Milchzähne dagegen grösser. Letztere ähneln durch ihre breite, viereckige, mit fünf Erhabenheiten besetzte Krone den bleibenden Stockzähnen, mit welchen sie auch durch die Zahl ihrer Wurzeln übereinstimmen. — Die Milchzähne bleiben bis zum siebenten Lebensjahre stehen, wo sie in derselben Ordnung, als sie geboren wurden, ausfallen, und den bleibenden Zähnen, die zum Ausbruche bereit im Kiefer vorliegen, Platz machen. Sind alle zwanzig Milchzähne durch bleibende ersetzt, so solgen noch auf jeder Seite drei Stockzähne nach, wodurch die Zahl der bleibenden Zähne auf 32 gebracht wird. Den Ausbruch der Milchzähne begreist man als Dentitio prima, den Wechsel derselben als Dentitio secunda.

§. 225. Lebenseigenschaften der Zähne.

Der Zahn ist, seinen äusseren Eigenschaften nach, dem Knochensystem, seiner Entwicklung nach, den Horngebilden verwandt. Es ist durch Goodsir und Arnold bewiesen, dass der Zahn in einem mit der Mundschleimhaut zusammenhängenden und aus ihr durch Ausstülpen hervorgegangenen Bläschen gebildet wird, welches sich allmälig in den Kiefer einsenkt, und erst später von der Mundhöhle abschliesst. Im Grunde dieses Bläschens erwächst eine Papille — die zukünstige Pulpa des Zahns — um welche herum die Zahnsubstanz, wie beim Modelliren einer Form, abgelagert wird. — Dieses Säckchen und dessen Papille sind also für den Zahn, was die Haartasche und der Haarkeim für das Haar waren — Ausnahms- und Absonderungsgebilde des zum Zahnbau verwendeten Materials. Nach den Ansichten von Schwann (Mikroskop. Untersuch. pag. 124) und Leveille (Blandin, Système dentaire. page 94) soll die Pulpa nicht das Zahnmateriale blos absondern und an ihrer Oberstäche deponiren, sondern sich wie ein ossisicirender Knorpel in das Zahnbein umwandeln.

Die Bestimmung des Zahns bedingt seine physischen Eigenschaften, seine Härte und seinen geringen Antheil an animalischen Substanzen, welcher im Email, nach Berzelius, nicht einmal ganz zwei Procent beträgt; das Uebrige ist phosphorsaurer Kalk und Fluorcalcium 88,50, kohlensaurer Kalk 8,00, und phosphorsaure Talkerde 1,50. Darum wird der Zahn von Säuren so leicht angegriffen. Selbst die Form des Zahnes ist von seiner mechanischen Verwendung abhängig. — Die animalische Substanz scheint vorzugsweise die Bindung der mineralischen zu vermitteln, weil nach Verlust der ersteren, durch Calciniren, oder im Leben durch Anwendung alkalischer Zahnpulver (Tabakasche), der Zahn auffallend brüchig wird, und leicht zerbröckelt. Die Erschütterung der kleinsten Zahntheilchen, die sich beim Beissen auf ein Sandkorn bis zur Pulpa dentis fortpflanzt, lässt dem Zahne (oder vielmehr den Nerven seiner Pulpa) auch Tastempfindungen zukommen.

Es ist nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschast nicht mehr zulässlich, den Zahn sür ein lebloses Gebilde zu halten, welches mit den ernährenden Flüssigkeiten des Körpers in keiner Beziehung stände. Es ist allerdings wahr, dass ein vollkommen ausgebildeter Zahn nicht mehr zunimmt, und die Natur deshalb gezwungen ist, die Milchzähne, welche nur sür den kindlichen Kieser berechnet sind, und sür den entwickelten Beissapparat zu klein wären, wegzuschassen, und durch grössere zu ersetzen. Allein das Stationärbleiben der Grösse eines Zahns schliesst einen inneren Wechsel seines Stosse nicht aus. Der Zahn kann ja erkranken, und muss deshalb leben. Gewiss dringen von der Zahnböhle aus Nahrungssäste in die Kanälchen des Zahnbeins ein, und dienen dem Leben des Zahnes. Dass dieses Leben im Zahne, wie im Knochen, sortwährend wirkt und schasst, beweisen die Fälle von geheilten Zahnsracturen (sehr lehrreich jener im Breslauer Museum). Ich besitze selbst einen durch Callus geheilten Bruch des Halses eines Schneidezahns.

Die Veränderung der Zähne in gewissen Krankheiten, z. B. das Aendern ihrer Farbe und ihr Halbdurchsichtigwerden bei Lungensüchtigen. (Henle), ihr Brüchigwerden bei Typhus (Malgaigne), so wie das.

Schwinden der Wurzeln der Milchzähne vor ihrem Ausfallen, spricht ebenso überzeugend für das Dasein einer inneren Metamorphose. Diese Metamorphose beschränkt sich aber nur auf das Erhalten des Bestehenden. Verlorengegangenes (Abnützung der Zähne, Feilen derselben, abgesprengte Kanten) wird nicht regenerirt. — Im vorgerückten Alter fallen die Zähne in der Regel aus. Verknöcherung der Zahnpulpa, und Obliteration der Zahnarterien sind die Ursachen davon. Im Greisenalter neu zum Vorschein kommende Zähne sind entweder wirkliche Neubildungen, oder erklären sich auch einfach durch den Umstand, dass, wenn beim Wechseln der Zähne ein Zahn, der sich zwischen zwei andere hineinschieben soll (z. B. ein Eckzahn), keinen Platz findet, und auch nicht als Ueberzahn an der vorderen oder hinteren Wand des Alveolus vorbricht, er im Kiefer stecken geblieben ist, und erst nach dem Ausfallen eines seiner Nebenzähne zum Vorschein kommt. — Das vorschnelle Zugrundegehen der Zähne, welches oft selbst durch die ängstlichste Sorgfalt beim Reinigen der Zähne nicht hintangehalten werden kann, scheint am meisten durch den plötzlichen Temperaturwechsel bedingt zu werden, welchem die Zähne bei unserer Lebensweise unterliegen. Man denke an die heissen Suppen bei Winterkälte, an das Wassertrinken auf heissen Kaffee, u. s. w. In Obersteyer, wo das heisse Schmalzkoch eine Lieblingsnahrung der Landleute ist. findet man kaum eine Bauerndirne ohne eingebundenes Gesicht.

Nebst den älteren Berichten über eine Dentitio tertia senilis von Birch, Diemerbroeck, Foubert, Blancard, Palfyn, bestätigen auch neuere Beobachtungen (gesammelt von E. H. Weber, in dessen Ausgabe der Hildebrandt'schen Anat. 4. Bd. pag. 123) ihr Vorkommen.

Als interessante Varietäten der Gestalt und Stellung der Zähne finden sich 1. Versetzungen der Zähne (ich besitze einen schönen Fall, wo beide Eckzähne, statt der Schneidezähne, die Mitte des Kiefers einnehmen). 2. Abnorme Ausbruchsstelle (am Gaumen, — vor oder hinter einem norma-len Zahne als sogenannter Ueberzahn). — Ich sah einen Zahn aus der Nasenhöhle eines Cretins ausziehen. 3. Inversion (wo die Krone eines Backenzahns in die Highmorshöhle sieht. Prag. Mus.). 4. Verwachsung (an den Schneidezähnen im Oberkiefer mehrmals gesehen. Schr schöne Fälle im Prager Museum). 5. Nebenzähne (kleine Zähnchen neben einem normalen — bei gewissen Thieren regelmässig vorkommend). 6. Emailsprossenzähne (wo eine Druse oder Halbkugel von Schmelz, wie ein Auge auf dem Halse eines Zahnes aussitzt, oder sich zwischen den Wurzeln des Zahnes seitwarts hervordrangt). 7. Haken - und Knopfzahne (wo die Wurzel umgebogen, oder zu einem mehr weniger grossen hückerigen Knopf aufgetrieben erscheint). Sie sind schwer auszuziehen, und geht bei ersteren leicht ein Stück der Alveolarscheidewand mit. 8. Verkittung der Zähne durch Zahnstein, vulgo Weinstein. Hieher sind die von den Alten (Plinius, Pollux, Plutarch) erwähnten Fälle zu zählen, wo alle Zähne in einen einzigen huseisensormigen Zahn verwachsen gesehen wurden, wie bei Pyrrhus, Euryptolemus, Marc. Cur. Dentatus etc.). 9. Obliteration der Zahnhöhle (durch Verknöcherung der Pulpa, oder durch Deposition harnsaurer Salze, wie ich einen ausgesuchten Fall dieser Art vor mir habe). - Zahlreiche Beobachtungen über Zahnvarietäten enthalten Gruber's Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. Petersburg, 1852. pag. 91.

Das Zahnfleisch, Gingiva, ist eine Partie der Mundschleimhaut, welche, durch ein dichtes und festes submuköses Zellgewebe gestützt, die Hälse der Zähne umgiebt, und sie zuweilen so knapp umschliesst, dass es abgelöst werden muss, bevor der Zahn ausgezogen wird. Bei Entfernung von Zähnen, welche ihre Kronen fast ganz durch Caries verloren haben, muss, weil die Zange nur am Halse sicher fassen kann, das Zahnfleisch jedesmal abgelöst, und gegen die Wurzel zurückgedrängt werden. Das Zahnfleisch ist wenig empfindlich, aber äusserst gefässreich, blutet deshalb leicht beim Bürsten der Zähne und bei stärkerem Saugen. Man unterscheidet an ihm eine vordere und eine hintere Wand oder Platte, welche zwischen je zwei Zähnen durch Zwischenspangen mit einander zusammenhängen, und nach Verlust der Zähne, in ihrer ganzen Länge mit einander verschmelzen.

Am hinteren Zahnsleische erwähnt Serres (Mém. sur l'anat. et la physiol. des dents, in Mém. de la Société d'émulation. Tom. VIII. pag. 128) kleine, hirsekorngrosse Drüschen, welche eine schmierige Flüssigkeit absondern, die, seiner Vorstellung zusolge, den Zahn (wie das Hautsebum die Epidermis) einölt, um ihn dauerhafter zu machen. Er nannte sie glandes dentaires. Krankhaste Veränderung dieses Secrets soll den Zahnstein bilden, welcher nach Serres nicht als Niederschlag des Speichels angesehen werden kann, da eine chemische Analyse mit jener der sixen Bestandtheile des Speichels nicht übereinkommt. Meckel hat diese Drüschen, da er sie nur beim Ausbruche der Milchzähne deutlich sah, für kleine Abscesse gehalten. Serres will sie auch bei Erwachsenen gesehen haben, wo Raschkow. Rousseau, und ich sie nicht wieder finden konnten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Serres gewöhnliche solitäre Follikel, wie sie in der Schleimhaut des gesammten Verdauungsapparates vorkommen, für etwas Besonderes gehalten hat. - Im Schleime, den man mit dem Zahnstocher zwischen den Zähnen herausholt, leben, nehst ästigen Fadenpilzen, unzählige, parasitische, sich zitternd bewegende Wesen, thierischer Natur (Vibrio denticola). Henle vermuthet, dass die Caries der Zähne mit der Wucherung dieser Parasiten in Verbindung stehe, welche Annahme durch das Vorkommen ähnlicher Parasiten (Pilze), bei anderen geschwürigen Processen (Aphthen, Kopfgrind, Sycosis). sehr wahrscheinlich wird. Mandl ist zu weit gegangen, wenn er den Zahnstein sur die petrificirten Leiber abgestorbener Insusorien des Zahnschleims hält. Die chemische Zusammensetzung des Zahnsteins erklärt es. warum Obstliebhaber und Branntweintrinker gewöhnlich sehr weisse Zähne haben. - Bei alten Leuten wird der Zahnstein zuweilen in so grosser Menge abgelagert, dass er Zähne, die sonst schon lange ausgefallen wären, noch an ihre Nachbarn festhält.

Die merkwürdigsten und reichhaltigsten Sammlungen von Zahnanomalien, die ich kenne, besitzt Prof. Heider in Wien, und der Zahnarzt Desirabode in Paris.

Ueber den Bau der Zähne handeln:

Raschkow, meletemata circa mammalium dentium evolutionem. Vratisl., 1835. — L. Fränkel, de penitiori dentium hum. structura. Vratisl., 1835. — Retsius in Müller's Archiv. 1837. — J. Linderer, Handbuch der Zahn-

heilkunde. Berlin, 1837. - Nasmyth, Researches of the Teeth. Lond., 1839. - Lessing, Verhandlung der naturw. Gesellschaft in Hamburg. 1845. -Kruckenberg, Beitrag zur Lehre vom Röhrensystem der Zähne und Knochen. in Müller's Archiv. 1849. — J. Czermak, Zeitschr. für wissensch. Zoologie. 1850. — Das Wesentliche von Czermak's interessanten Beobachtungen ist Fol-Das ganze Zahnbein scheint ein Aggregat von kugeligen Massen zu sein (Zahnbeinkugeln), welche durch unregelmässige Lücken (Interglobularräume) von einander getrennt werden. Die der Höhle des Zahns zunächst liegenden Kugeln, ragen in dieselbe als rundliche Erhabenheiten hinein. Die Zahnbeinkugeln stehen mit der Ablagerung von Kalksalzen in der anfänglich weichen Substanz des Zahnes in Verbindung. Diese Ablagerung erfolgt namlich in Form rundlicher Massen, die zwar immer mehr und mehr miteinander zusammensliessen, aber dennoch nicht so vollständig, dass nicht unverkalkte Theile der ursprünglich weichen Zahnmasse zwischen ihnen zurückblieben, welche dann beim Trocknen des Zahnes durch Einschrumpfen vergehen, und an deren Stelle Lücken erscheinen, welche die oben erwähnten Interglobularräume sind.

Hauptwerk für vergleichende Anatomie der Zähne ist die prachtvolle Odontography von R. Owen. 2 Bde. London, 1840—1845.

§. 226. Speicheldrüsen.

Die drüsigen Nebenorgane der Mundhöhle bereiten den wasserreichen Speichel, Saliva, der die gekauten Nahrungsmittel, mit welchen er innig gemischt wird, in einen weichen formbaren Teig umwandelt, welcher als Bissen, Bolus, leicht durch die Schlingwerkzeuge in die Magenhöhle befördert wird. Er löst zugleich die löslichen Bestandtheile der Nahrung auf, und erregt durch die Befeuchtung und Tränkung der Geschmackswärzchen die Geschmacksempfindungen.

Es finden sich drei Paar Speicheldrüsen, Glandulae salivales, welche ihrer Lage nach in die Ohr-, Unterkiefer- und Unterzungen-Speicheldrüsen eingetheilt werden.

Die Ohrspeicheldrüse, Glandula parotis (παρὰ τοῦ ἀτὸς, neben dem Ohre), die grösste von allen, liegt vor und unter dem Ohre, in dem Winkel, welcher zwischen dem Gelenkaste des Unterkiesers, dem Warzenfortsatze, und dem äusseren Gehörgange übrig gelassen wird, und schiebt sich von hier über die äussere Fläche des Masseters, bis zum unteren Rande des Jochbogens vor. Nach innen dringt sie bis zum Processus styloideus ein, und mit einzelnen ihrer Läppchen zwischen den Musculus stylo-glossus und stylo-hyoideus. Sie hat ein gelapptes, körniges Ansehen, und besteht — wie jede andere Speicheldrüse — aus rundlichen Körnern, Acini, die durch Hüllungszellgewebe in einen gemeinschaftlichen Körnern, acini, die durch Hüllungszellgewebe in einen gemeinschaftlichen Körper zusammengesast werden. Ihre äussere Fläche wird von der Fascia parotideo-masseterica bedeckt. Ihr Aussührungsgang, Ductus Stenonianus, der sich durch die Dicke seiner Wand, und durch die Enge seines Lumens charakterisirt, entwickelt sich am oberen Drittel des vorderen Randes der Drüse, durch successive Vereinigung der kleinen Aussührungsgänge

aller Acini, läust mit dem Jochbogen parallel, und ½" unter ihm, an der Aussensläche des Masseters nach vorn, senkt sich am vorderen Rande desselben, durch das Fettlager der Backe zum Musculus buccinator herab, welchen er in seinem Mittelpunkte durchbohrt, um an der inneren Obersäche der Backe, dem ersten oberen Mahlzahne gegenüber, auszumünden. Ostmals liegt vor der Parotis, und auf dem Ductus Stenonianus, noch eine kleinere Nebendrüse (Parotis accessoria), welche ihren Aussührungsgang in den Ductus Stenonianus münden lässt.

Die Unterkiefer-Speicheldrüse (Glandula submaxillaris s. angularis), um die Hälfte kleiner als die Parotis, und minder stark gelappt, liegt unter dem Musculus mylo-hyoideus, zwischen beiden Blättern der Fascia cervicalis, in dem dreieckigen Raume, der vom unteren Rande des Unterkiefers und den beiden Bäuchen des Musculus biventer maxillae begrenzt wird (ohne ihn ganz auszufüllen). Der Ausführungsgang derselben, Ductus Whartonianus, geht über die obere Fläche des Musculus mylohyoideus, zwischen ihr und der Mundschleimhaut, nach innen und vorn, und mündet an der stumpfen Spitze einer zu beiden Seiten des Zungenbändchens befindlichen Papille (Caruncula sublingualis). Der Ductus Whartonianus besitzt glatte Muskelfasern, — der Ductus Stenonianus aber nicht (Kölliker).

Die Unterzungen-Speicheldrüse, Glandula sublingualis, ist die kleinste, und liegt auf der oberen Fläche des Musculus mylo-hyoideus, nur von der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle bedeckt. Ihr hinteres Ende sliesst häusig mit den vordersten Lappen der Glandula submaxillaris zusammen. Ihre seinen Aussührungsgänge, 8—12 an der Zahl, Ductus Rivini, münden entweder hinter der Caruncula sublingualis in die Mundhöhle, oder vereinigen sich, nach Art der übrigen Speicheldrüsen, zu einem gemeinschastlichen grösseren Gange, Ductus Bartholini, welcher ebensohäusig eine besondere Endmündung an der Caruncula besitzt, als er mit dem Ductus Whartonianus zusammensliesst. — Die Unterzungenspeicheldrüsen scheinen mehr Schleimdrüsen als Speicheldrüsen zu sein.

Alle Speicheldrüsen sind nach demselben Typus gebaut. Der Hauptausführungsgang theilt sich wiederholt in kleinere Zweige, deren letzte Enden mit traubig zusammengehäuften Bläschen (Acini) in Verbindung stehen, welche mit capillaren Blutgefässen netzartig umsponnen werden, und in welchen die Bereitung des Speichels aus den Elementen des Blutes vor sich geht. Ein Acinus ist nur die Summe mehrerer solcher Endbläschen. In der Parotis beträgt der Durchmesser der Endbläschen im injicirten Zustande 0,04", und in der Glandula submaxillaris nur 0,02". Die innere Oberfläche der grösseren Speichelgänge besitzt Cylinderepithelium; jene der kleineren und ihrer Endacini Pflasterepithelium.

Jede der drei Speicheldrüsen steht mit einer benachbarten Arterie und Vene in inniger Beziehung. Die Parotis schliesst den Stamm der Carotis externa und der Vena facialis posterior ein, so dass eine Exstirpation der Parotis am Lebenden, ohne vorläusige Unterbindung der Carotis, nicht zu machen ist. Die Glandula submaxillaris enthält, in einer Furche ihrer oberen Fläche, die Arteria maxillaris externa und die Vena facialis anterior. Die Glandula sublingualis liegt auf der Arterie und Vene gleichen Namens.

Die Parotis erleidet bei jedem Oessnen des Mundes einen Druck, indem der Raum zwischen Unterkieserrand und Warzensortsatz sich dabei verkleinert. Die Glandula submaxillaris und sublingualis erleidet ihn ebenfalls, erstere durch das Spiel des Musculus mylo-hyoideus, und letztere durch den Widerstand des gekauten Bissens. Dieser Druck besördert die Entleerung ihres Secrets während des Kauens, wo seine Gegenwart am nöthigsten ist.

Die specifischen Verschiedenheiten der Secrete der drei Speicheldrüsen sind noch nicht genau bekannt. Der Parotidenspeichel enthält keinen Schleim, welcher dagegen im Secret der Unterzungendrüse prävalirt. Bernard (Comptes rendus, 1852. Tom. I.) glaubt, dass der Parotidenspeichel zum Kauen, jener der Glandula sublingualis zum Schlingen, jener der Glandula submazillaris zum Schmecken besonders beitrage.

Der Speichel besteht, nach Berzelius, aus 99% Wasser, und 1% fester Stoffe (Speichelstoff oder Ptyalin, Schleim, Chlornatrium, Casein). Er enthält immer abgestossene Epithelialplatten der Mundschleimhaut, und die schon von Leeuwenhoek gekannten, rundlichen Speichelkörperchen, von 0,02-0,03" Durchmesser. - Seine Verwendung ist eine doppelte. Erstens eine, die er schon in der Mundhöhle leistet. Sie besteht in dem Einweichen der gekauten Nahrungsmittel, als nothwendige Vorbereitung zum Schlingen, und in der Auflösung leicht löslicher Bestandtheile derselben zu Gunsten der Geschmacksempfindung. Zweitens bewirkt der mit den Speisen verschlungene Speichel im Magen die Umwandlung des Amylum in Traubenzucker. — Die Nachtheile, die durch häufiges Spucken dem Organismus erwachsen sollen, hat man wohl zu hoch angeschlagen. - In der Thierwelt sind die Speicheldrusen weiter verbreitet, und erhalten sich länger, als die übrigen drusigen Nebenorgane des Verdauungssystems. Den Fischen und Cetaceen fehlen sie. - Da das Wasser des Speichels, durch die, beim Athmen durch die Mundhöhle ein- und ausstreichende Luft, fortwährend als Dampf weggeführt wird. so erklärt sich hieraus die Bildung jenes festen Beschlages, der als Zahnstein, besonders die hintere Fläche der unteren Schneidezähne (wo der Speichel sich aus den Carunculis sublingualibus ergiesst), und die Hälse aller Zähne im Unterkiefer incrustirt, sich zwischen Zahn und Zahnsleisch drängt, und die Zähne zwar entstellt, aber gewiss für ihre Dauerhastigkeit eher nützlich als schädlich ist, obwohl dieses die Zahnärzte nicht zugeben mögen. — Die giftigen Wirkungen, welche der in den Magen oder in die Venen eines lebenden Thieres injicirte Speichel hervorbringt, sind nicht Wirkungen des Speichels, sondern des narkotischen Princips des Tabaks, welcher geraucht wurde, um die zum Versuche nothwendige Quantität Speichel zu erhalten. Ebenso ist die ansteckende Krast des Geisers bei wuthkranken Thieren eine gänzlich grundlose Chimare. Bruce, Harris und Hertwig konnten durch Uebertragung des Geifers von wuthkranken Thieren auf gesunde, ja selbst durch Einimpfung des Geifers, niemals die Wuthkrankheit erzeugen.

§. 227. Zunge.

Die Zunge (Lingua) ist ein von der Mundschleimhaut umkleideter, weichlicher und sehr beweglicher Fleischlappen, der in der Höhlung des Unterkiefers liegt, und sie ausfüllt. Man unterscheidet an ihm eine obere und untere Fläche, zwei Seitenränder, die Spitze, den Körper, und den Grund, welcher letzterer bis zum Zungenbeine herabgeht. Die obere convexe Fläche der Zunge, welche bei geschlossenem Munde an dem harten Gaumen anliegt, ist frei, und bis zum Isthmus faucium hin, mit den Tastund Geschmackswärzchen so dicht besäet, dass sie ein sammtartiges, kurzzottiges Ansehen erhält. Vom Isthmus faucium bis zum Zungenbeine hinab, ist sie mit grossen Balgdrüsen ausgestattet, welche die Schleimhaut hugelig wölben, und durch den Finger als eben so viele Erhabenheiten gefühlt werden. Die untere Fläche ist viel kleiner, steht mit dem Zungenbändchen in Verbindung, welches die allzu grosse Rückwärtsbewegung der Zunge, und das Umschlagen ihrer Spitze nach hinten, verhindert. Sie besitzt keine Geschmackswärzchen. Die Seitenränder stehen hinten mit den beiden Arcus palato-glossi des weichen Gaumens in Verbindung. Spitze und Körper gehen ohne Grenze in einander über. Der Grund oder die Basis grenzt nach hinten an den Kehldeckel, und hängt mit ihm durch den ununterbrochenen Verlauf der Schleimhaut zusammen. - Von der Spitze bis zum Isthmus faucium nimmt die Zunge an Dicke zu, vom Isthmus bis zum Zungenbein an Dicke bedeutend ab. Der zunächst an das Zungenbein grenzende dünne Theil der Basis, heisst die Zungenwurzel. Er enthält einen von der Mitte des Zungenbeins entspringenden, blattsormigen, dünnen Faserstreisen, welcher unrichtig Cartilago linguae (Cartilage médian, Blandin) genannt wird, da er keine knorpeligen Elemente besitzt. Er setzt sich fast durch die ganze Dicke der Zunge als senkrechte Scheidewand fort, und könnte deshalb Septum linguae genannt werden. Am Rücken der Zunge, welcher durch eine nicht immer deutliche Längenfissur in zwei gleiche Hälsten getheilt wird, finden sich drei Arten Wärzchen (Papillae gustatoriae). 1. Die fadenförmigen Wärzchen (Pavillae filisormes), die der Zunge ihr rauhes, pelziges Ansehen geben, sind in unzähliger Menge am Rücken und den Seitenrändern vertheilt, und stehen in parallelen Reihen, welche von der Mitte gegen die Ränder und zugleich schief nach vorn gerichtet sind. Sie sind die seinsten und längsten, und nehmen gegen den Isthmus an Zahl und Länge ab. - 2. Die schwammförmigen Wärzchen (Papillae fungiformes s. clavatae) sind zwischen die fadenformigen als rothe, knopfformige Höckerchen hie und da eingestreut. - 3. Die 8-12 wallförmigen Wärzchen (Papillae vallatae s. maximae) liegen nur an jenem Theile des Zungenrückens, der den Isthmus faucium bilden bilft, und sind in zwei Reihen gestellt, welche nach hinten convergiren, und sich zu einem V vereinigen, an dessen Spitze gewöhnlich die grösste Papilla vallata steht. Jede Wallwarze besteht aus

einer umgekehrt kegelförmigen, mit der Basis nach oben gerichteten, dicken Warze, welche von einem kreisförmigen Schleimhautwall, über welchen sie etwas hervorragt, umzäunt wird. An oder hinter der Spitze des V, liegt das blinde Loch (Foramen coecum), ein zuweilen 5" langer Blindgang, in welchen sich mehrere der benachbarten Schleimdrüsen des Zungenrückens einmünden.

Das musculöse Parenchym der Zunge besteht, nebst den unter einander sich verwebenden Fasern des Musculus genio-glossus, hyo-glossus, und styloalossus, noch aus drei besonderen Muskelschichten, welche in der Zunge entspringen, und auch in ihr endigen. Die obere Längenschichte liegt gleich unter der Schleimhaut des Zungenrückens, und schiebt ihre Bündel zwischen die zur Zungenoberstäche emporstrebenden strahligen Bundel des Genioglossus ein. Die untere (viel stärker als die obere, und bisher als Musculus lingualis beschrieben), liegt zwischen dem Musculus genio-glossus und hyo-glossus an der unteren Fläche der Zunge. Die quere Muskelschichte (Musculus lingualis transversus, Theile) entspringt von den Seitenslächen des Septum linguae. Ihre Fasern laufen nach aus- und auswärts; die inneren gehen zum Rücken der Zunge, die ausseren zum Zungenrande, und schieben sich, um diese Richtung einschlagen zu können, zwischen den Längenfasern des Genio-glossus und Hyo-glossus hindurch. — In der Zungenspitze kommen auch senkrechte, von der oberen zur unteren Fläche ziehende Muskelbundel vor. - Eine sehr genaue Untersuchung der Zungenmuskeln lieserte mein zu früh verstorbener Freund, J. Zaglas, in den Annals of Anat. and Physiol., edit. by J. Goodsir. Edinb., 1850. I.

Die Arterien der Zunge sind zahlreich, und für das Volumen der Zunge sehr gross. Die Arteria dorsalis linguae ist unbedeutend, die Arteria profunda dagegen so gross, dass die tollkühnen Versuche, die abnorme Länge der Zunge durch Herausschneiden eines keilförinigen Stückes aus ihrem Dorsum zu verkürzen, keine Nachahmung finden können, und die Amputation einer krebsigen Zunge, ohne vorläufige Unterbindung der Arteria linqualis, Gefahr droht. Die Arteria sublingualis s. ranina läust nicht weit vom Zungenbändchen, und es erfordert deshalb die Lösung desselben einige Vorsicht. Der grosse Gesässreichthum der Zunge erklärt die enorme Anschwellung derselben bei gewissen Entzundungen, die selbst Erstickungstod herbeisührt, und die augenblickliche Linderung aller Zusälle durch Einschnitte in das Zungenparenchym (Scarificationen). Wie leicht eine aufgeschwollene Zunge Athmungsbeschwerden hervorrufen kann, mag man an sich selbst erproben, wenn man mit dem Daumen, unmittelbar vor dem Zungenbeine, den Boden der Mundhöhle, und somit die Zunge, nach oben drückt. Die Zunge verstopst hiebei den Isthmus faucium, und drängt den weichen Gaumen gegen die Wirbelsäule (wodurch der Lustzutritt von der Mund- und Nasenhöhle her ausgehoben wird). Beim Selbsterhängen, wo die Schnur nicht zusammengeschnürt wird, sondern der Hals in einer Schlinge hängt, die hinter beiden Winkeln des Unterkiefers in die Höhe steigt, erfolgt der Erstickungstod auf diese Weise.

Die von Fleischmann (De novis sub lingua bursis. Norimb., 1841) beschriebenen Bläschen halte ich nicht für Schleimbeutel, sondern für accidentelle Cystenbildung. — Die von A. Nuhn beschriebene neue Zungendrüse (Ueber eine bis jetzt noch nicht näher beschriebene Zungendrüse. Mannheim, 1845) ist schon in Blandin's traité d'anatomie topographique. Paris, 1834. pag. 175 erwähnt, aber nicht näher gewürdigt worden. Auch Prof. Mayer in Bonn macht auf das Prioritätsrecht ihrer Entdeckung Anspruch. Sie liegt

in der Spitze der Zunge, der unteren Fläche näher als der oberen, ist 7—10" lang, 3—4 1/2" weit, und 1—2" dick, und mündet durch 5 in einer Reihe liegende Ostia an der unteren Fläche der Zungenspitze aus. Unter den Thieren findet sie sich nur beim Orang-Utang.

Der Bau der Geschmackswärzchen ist von jenem der Tastwärzchen §. 62 und 190 nicht wesentlich verschieden. In den schwammförmigen Zungenwärzchen hat man bereits, obwohl selten, auch Tastkörperchen aufgefunden. - Das geschichtete Psiasterepithelium der Zunge ist auf dem Rücken viel stärker, als anderswo. Es ist, wie jenes der Mundhöhle überhaupt, aus sehr breiten und flachen Zellen zusammengesetzt, welche sich mit dem sogenannten Zungenbeleg abstossen, und wieder erzeugen. Bei Verbrühungen und gewissen Ausschlagskrankheiten fällt das Epithelium in grösseren Stücken ab. Das Epithelium der fadenformigen Wärzchen ist besonders dick, und zeigt das eigenthümliche Verhalten, dass es von der Spitze der Warze aus sich in feine, haarformige Fortsätze spaltet, welche der Warze ein pinselformiges Ansehen verleihen. Dieses Zerfasern des Epithels, welches besonders bei weiss belegter Zunge beobachtet wird, ist nicht zu verwechseln, mit den bei vielen krankhasten Zuständen der Zungenschleimhaut, auf dieser wuchernden Fadenpilzen. - Die durch den Speichel gelösten schmeckbaren Substanzen der Nahrungsmittel müssen sich durch das Epithelium der Zunge durchsaugen, um auf die Nerven der Papillen wirken zu können. Daher erklärt es sich, warum schwer lüsliche Substanzen erst geschmeckt werden, nachdem sie längere Zeit in der Mundhöhle verweilten, ja erst nachdem sie verschluckt wurden Trockene Nahrung in trockener Mundhöhle erregt keinen (Nachgeschmack). Geschmack. Alles Unlösliche ist nicht schmeckbar. — Da man nirgends eine grössere Schleimhautpartie auf einmal übersehen kann, als in der Mundhöhle. so pflegt man die Zunge der Kranken zu untersuchen, um aus ihrem Ansehen, auf den Zustand anderer, dem Gesichte nicht zugänglicher Schleimhaute zu schliessen. - Die Mitwirkung der Zunge beim Kauen, Sprechen, Schlingen beweisen die Störungen dieser Functionen bei der Zungenlähmung. Thiere, denen der Bewegungsnerv der Zunge durchschnitten wurde, zerfleischen sich die Zunge beim Kauen, und schreien deshalb mitten im Fressen laut auf. - Dass ein zu kurzes Zungenbändchen bei Kindern das Saugen beeinträchtige, scheint mir eine ungegründete Annahme zu sein, indem das Kind nicht mit der Zunge, sondern durch Senken des ganzen Mundhöhlenbodens saugt. - Von den drei zur Zunge gehenden Nerven: Lingualis, Glossopharyngeus, Hypoglossus, besitzen die beiden ersten an ihren Aesten zahlreiche kleine Ganglien.

§. 228. Rachenhöhle.

Die Rachenhöhle, Pharynx, liegt hinter der Mundhöhle, mit welcher sie durch den Isthmus faucium in Verkehr steht. Sie grenzt nach oben an die Schädelbasis, nach hinten an die Halswirbelsäule, seitwärts an die grossen Blutgesasse und Nerven des Halses, vorn an die Choanae, den Isthmus, und den Larynx. Nach unten geht sie in den Kanal der Speiseröhre über. Wird der weiche Gaumen so weit nach hinten gedrängt, dass seine hintere Fläche sich an die hintere Wand der Rachenhöhle anlegt, so wird letztere dadurch in zwei über einander gelegene Räume getheilt, deren oberer die Choanae enthält, und Cavum pharyngo-nasale, —

deren unterer grösserer, weil er den Isthmus und den Eingang zur Kehlkopfshöhle enthält, Cavum pharyngo-laryngeum genannt werden könnte. Diese Scheidung der Rachenhöhle in zwei Räume geschicht bei jedem Schlingacte, und beim Sprechen und Singen mit Brusttönen. (Angeborene Spaltung des weichen Gaumens, oder Substanzverlust durch Geschwür, bedingen näselnde Sprache, weil ein Theil der beim Sprechen ausgeathmeten Lust durch die Nasenhöhle streicht.) Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass nur das Cavum pharyngo-nasale Flimmerepithelium besitzt, das Cavum pharyngo-laryngeum dagegen das gewöhnliche dicke Pflasterepithelium der Mundhöhle.

Die Wand der Rachenhühle bildet einen, aus drei Schichten bestehenden, konischen Sack, dessen Basis an die Schädelbasis stüsst, dessen Spitze in die Speiseröhre (Schlund) fortläuft, und gewöhnlich Schlundkopf (Anfang des Schlundes) genannt wird. Die äussere Schichte existirt nur an der oberen Abtheilung des Pharynx. Sie ist fibröser Natur, und wurde in der Muskellehre als Fascia bucco-pharyngea beschrieben. Die zweite Schichte ist aus Muskelfasern zusammengewebt, welche longitudinale oder mehr quere Richtungen einschlagen, und dadurch den Rachen entweder verkürzen (heben) oder verengern (schnüren) können.

Die Muskeln mit Längenrichtung ihrer Fasern (Levatores pharyngis) sind: der Stylo-pharyngeus (paarig), und der Azygos pharyngis (unpaarig und oft fehlend). Der Stylo-pharyngeus entspringt am Griffelfortsatz, oberhalb dem Stylo-glossus, und verliert sich, an der Seite des Pharynx herablaufend, und mit seinem Gespan etwas convergirend, zwischen den Schnürmuskeln in der hinteren Rachenwand. Der Azygos pharyngis entspringt, wenn er vorkommt, von der Basis des Hinterhauptbeins, und mischt seine strahlig-divergirenden Fasern mit denen der beiden Stylo-pharyngei.

Die Schnürmuskeln (Constrictores pharyngis) bilden die Seitenwände und die hintere Wand des Rachens, in deren Medianlinie (Raphe) sie sich von beiden Seiten vereinigen. Man zählt drei Paare, die sich von unten her theilweise decken, und ihrer Lage nach in den Constrictor pharyngis superior, medius, und inferior eingetheilt werden. Alle knöchernen, fibrösen und knorpeligen Gebilde, die zwischen Schädelbasis und Anfang der Luftröhre gelegen sind, dienen den Faserbündeln der Rachenschnürer zum Ursprunge, und es muss deshalb, wenn man jedem Bündel einen eigenen Namen giebt, eine sehr complicirte Musculatur herauskommen.

Der Constrictor superior entspringt von der Fibrocartilago basilaris (als Cephalo-pharyngeus), vom Hamulus pterygoideus (als Pterygo-pharyngeus), von dem hinteren Ende der Linea mylo-hyoidea (als Mylo-pharyngeus), vom Seitenrande der Zunge (als Glosso-pharyngeus), und von dem, zwischen Ober- und Unterkieler ausgespannten hinteren Stücke der Fascia bucco-pharyngea (als Bucco-pharyngeus), und endigt, mit dem der anderen Seite zusammensliessend, in der Raphe pharyngis. — Die Wirkung dieses Muskels ist nichts weniger, als bekannt, da der zu verschlin-

gende Bissen nie in sein Bereich kommt, indem er des weichen Gaumens wegen, nicht nach aufwärts gegen die Choanen getrieben werden kann.

Der Constrictor medius entspringt mit zwei Bündeln vom grossen und kleinen Horne des Zungenbeins (Cerato- und Chondro-pharyngeus). Seine oberen Fasern steigen nach aufwärts, und vereinigen sich mit denen der anderen Seite zu einer Spitze, welche sich über den Constrictor superior hinaufschiebt, und ihn bedeckt.

Der Constrictor inferior entspringt vom Bande, welches das grosse Horn des Zungenbeins mit dem oberen Horne des Schildknorpels verbindet (Syndesmo-pharyngeus), von dem hinteren Theile der äusseren Fläche des Schildknorpels (Thyreo-pharyngeus), und von der Aussensläche des Ringknorpels (Crico-pharyngeus). Seine Bündel vereinigen sich mit den entgegengesetzten in der Raphe, und schieben sich (die oberen) mit einer nach oben gerichteten Spitze über den Constrictor medius hinaus.

Auf die Muskelschicht folgt die Schleimhaut mit ihrem submukösen Bindegewebe. Sie ist besonders an ihrer hinteren Wand sehr drüsenreich, und hängt mit der Schleimhaut aller jener Höhlen zusammen, welche mit der Rachenhöhle communiciren (Nasenhöhle, Eustachi'sche Trompete, Mundhöhle, Kehlkopfshöhle).

Die Communicationsöffnungen für die Nasen-, Mund- und Kehlkopfshöhle liegen an der vorderen Rachenwand, die Rachenöffnung der Eustachi'schen Trompete aber am obersten Theile der Seitenwand, hinter dem äusseren Rande der Choanae. Die Oeffnung ist fast oval, 4" lang, und etwas schräg von innen und oben nach aussen und unten gerichtet. Ihre Umrandung ist an der hinteren Peripherie wulstiger, als an der vorderen. Sie kann durch eine, an der Spitze gekrümmte Sonde, welche durch den unteren Nasengang in die Rachenhöhle geleitet wird, leicht erreicht werden.

Die anatomische Darstellung des Pharynx muss von rückwärts und nach folgenden Regeln vorgenommen werden: Man löst an einem Kopfe die Wirbelsäule aus ihrer Verbindung mit dem Hinterhaupte, und entfernt sie. Dadurch wird die hintere Rachenwand, die an die vordere Fläche der Wirbelsäule durch nachgiebiges Zellgewebe besestigt war, frei. Man entsernt nun vorsichtig die Reste der Fascia bucco-pharyngea, und verfolgt die unter ihr liegenden Faserbundel der Levatores und Constrictores bis zu ihren Ursprüngen, wodurch auch die Seitengegenden des Pharynx zur Ansicht kommen. Führt man von unten her durch die Speiseröhre einen Scalpellgriff oder eine starke Sonde in die Rachenhöhle ein, so kann man damit die hintere Rachenwand ausheben, und man bekommt eine Idee von der Ausdehnung und Form dieses häutig-musculösen Sackes. Nun trennt man durch einen Längenschnitt die eben präparirte hintere Wand, und durch einen Querschnitt ihre obere Anhestung an der Schädelbasis, legt die beiden dadurch gehildeten Lappen wie Flügelthuren aus einander, und befestigt sie durch Haken, damit sie nicht wieder zufallen. Man übersieht nun die vordere Rachenwand von hinten her, und lernt die Lage der Oeffnungen kennen, welche in die Nasen-, Mundund Kehlkopsshöhle führen. Die Choanen sind vom Isthmus faucium durch das Palatum molle, - der Isthmus vom Kehlkopfseingang durch die elastische Knorpelplatte des Kehldeckels getrennt. Seitwärts und oben findet man neben den Choanen die Rachenmündungen der Eustachi'schen Trompeten.

Die Rachenböhle ist der Kreuzungspunkt der Respirations- und Verdauungshöhle des Kopses (communis aëris et nutrimentorum via, Haller). Die durch die Nase eingeathmete Lust, und der zu verschlingende Bissen, müssen durch sie zum Kehlkopf und zur Speiseröhre gelangen. Da die Speiseröhrenöffnung hinter dem Kehlkopse liegt, so mussen sich die Wege des Luststroms und des Bissens in der Rachenhöhle kreuzen. Ist der Bissen in den Rachen gekommen, und wird dieser durch die Constrictores verengert, so könnte der dadurch gedrückte Bissen eben so gut gegen die Choanen sich erheben, oder in den Kehlkopf hinabgetrieben werden, als in die Speiseröhre gelangen. Den Weg zu den Choanen schliesst der weiche Gaumen ab, indem er sich gegen die Wirbelsäule stellt, und seine hinteren Schenkel (Arcus palato-pharungei) sich bis zur Berührung nähern. Der Eintritt in den Kehlkopf wird durch den Kehldeckel versperrt, welcher sich, wie eine Fallthüre, über das Ostium luryngis legt. Es ist nicht richtig, wenn gewöhnlich gesagt wird, dass der niedergedrückte Kehldeckel dem Bissen als Brücke dient, über welche hinüber er in den Schlundkopf und so fort in die Speiseröhre gedruckt wird. Denn der Kehldeckel kommt eigentlich mit dem Bissen in gar keine Berührung, da er nicht durch den Bissen, sondern durch den Zungengrund, gegen welchen er beim Heben des Kehlkopses während des Schlingens angepresst ist, niedergedrückt wird. - Nur beim Erbrechen kann Festes oder Flüssiges aus der Rachenhöhle in die Nasenhöhle hinauf geschleudert werden, oder wie bei gewissen Formen des Einathmens aus der Mundhöhle in den Kehlkopf gerathen.

Der Weg des Bissens von den Lippen bis zum Pharynx steht unter der Aussicht und Obhut des freien Willens. Ist der Bissen durch den Racheneingang passirt, so hält ihn nichts mehr auf, und er wird ohne Zuthun des Willens in den Magen geschafft. Kitzeln des Rachens mit dem Finger oder einer Feder (oder durch ein verlängertes Zäpschen) erregt kein Erbrechen, sondern Schlingbewegung, — Kitzeln des Zungengrundes und des weichen Gaumens dagegen keine Schlingbewegung, sondern Erbrechen. Beide Formen von Bewegungen sind somit Reslexbewegungen.

§. 229. Speiseröhre.

Die Speiseröhre, Oesophagus s. Gula (wortlich Essenträger. von οἴω, tragen, φάγω, essen), ist die untere Verlängerung des Rachens, und besteht aus denselben Schichten, wie dieser. Sie verbindet den Rachen mit der Magenhöhle, und hat, ausser der mechanischen Fortbewegung des Bissens, keine andere Nebenbestimmung. Sie liegt am Halse auf der Wirbelsäule, hinter der Luströhre, und etwas nach links, geht durch die obere Brustapertur in den hinteren Mittelfellraum, kreuzt sich mit der hinteren Fläche des linken Luströhrenastes, und legt sich, von der Theilungsstelle der Luströhre an, an die rechte Seite der Aorta, verlässt hierauf die Wirbelsäule, kreuzt sich mit der vorderen Fläche der Aorta, um zum links gelegenen Foramen oesophageum des Zwerchsells zu gelangen, und geht durch dieses in die Cardia des Magens über. Sie beschreibt, kurz gesagt, eine langgedehnte Spirale um die Aorta. Sie ist an ihrem Lehrbuch der Anatomie. 5. Aufl.

Ursprunge am engsten, erweitert sich hierauf etwas, und nimmt, vom sechsten Brustwirbel angefangen, an Weite wieder ab, ohne jedoch im Foramen oesophageum so enge zu werden, als sie an ihrem Beginne war. Sie ist äusserlich von lockerem Zellstoff umgeben. Ihre Muskelhaut besteht aus einer äusseren longitudinalen, und inneren spiralen oder Zirkelfaserschicht. Die Schleimhaut ist in Längenfalten gelegt, welche sich beim Durchgange des Bissens glätten, um das Lumen des Rohrs zu erweitern. Ihre Schleimdrüsen sind solitär stehende oder gruppirte Follikel, welche bis in den submukösen Zellstoff ragen, und (die grösseren derselben) sich selbst zwischen die Maschen der Längen- und Querfasern der Muskelhaut einschieben. Das Epithelium ist pflasterförmig und geschichtet.

Die Muskelfasern der Speiseröhre sind am Halstheile derselben quergestreift, am Brusttheile glatt, und bilden hier eine sehr ansehnliche, mit dem Messer darstellbare Schichte. - Die von mir entdeckten Musculi bronchound pleuro-oesophagei (Zeitschrift der Wiener Aerzte. 1844), haben sich seit ihrer Bekanntmachung so häufig wieder gefunden, dass ich um so mehr geneigt bin, sie nicht für zustllig, sondern mit dem Mechanismus der Deglutition in nothwendigem Bezuge stehend, zu halten. Der Broncho-oesophageus, von der hinteren membranösen Wand des Bronchus zur Speiseröhre herabgehend, kann letztere heben, und zugleich die durch das Hinabgleiten des Bissens eingedrückte Bronchuswand wieder herausziehen. Der Pleuro-oesophageus, der von der linken Wand des Mediastinums zum Oesophagus geht, kann letzteren fixiren, und dadurch dem Broncho-oesophageus seine Wirkung auf Erweiterung des Bronchus leichter erreichbar machen. Die Existenz beider Muskeln wurde durch J. Paget bestätigt. (Bericht über die Fortschritte der menschlichen Anatomie etc. Aus dem Englischen von R. Melzer. Augsburg, 1846. pag. 59.) - Der Pleuro-oesophageus kommt öfter vor, als der Broncho-oesophageus.

§. 230. Uebersicht der Lage und Zusammensetzung des Verdauungskanals in der Bauchhöhle.

Der bei weitem grössere Theil des Verdauungskanals und seiner drusigen Nebenorgane liegt in der Bauchhöhle, und wird von dem Bauchfelle. Peritoneum, eingeschlossen, welches einerseits die innere Oberfläche der Bauchwandungen, als vollkommen geschlossener Sack auskleidet (Peritoneum parietale), theils viele faltensormige Einstülpungen erzeugt, um die einzelnen Abtheilungen der Verdauungsorgane mit einem mehr weniger completen Ueberzuge (Peritoneum intestinale s. viscerale) zu versehen. Bauchtheil des Verdauungskanals besteht aus drei, durch Lage, Gestalt und Der erste ist der Magen - der vo-Structur verschiedenen Abschnitten. luminöseste Abschnitt des Kanals. Der zweite ist das dünne (besser enge) Gedärm, und der dritte: das dicke (weite) Gedärm. Jeder Abschnitt ist von dem nächstsolgenden durch eine Klappe getrennt. Der Magen liegt in der oberen Bauchgegend, und reicht in beide Rippenweichen (Hypochondria) — weniger in die rechte, als in die linke. Er setzt sich durch seinen Ausgang, den sogenannten Pförtner (Pylorus), in das dünne Gedarm, Intestinum tenue, fort, an welchem drei Stücke unterschieden werden: der Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krummdarm.

Der Zwölffingerdarm, Intestinum duodenum, bildet eine, mit der Convexität nach rechts gerichtete Krümmung, welche durch den, nur an ihrer vorderen Fläche befindlichen Bauchfellüberzug in der Nähe der Wirbelsäule besestigt wird. Der darauf folgende Leerdarm, Intestinum jejunum, geht ohne bestimmte Grenze in den Krummdarm, Intestinum ileum, über. Beide sind in zahlreiche Krümmungen gelegt, welche Darmschlingen (Ansae s. Gyri intestinales) heissen, und die Regio umbilicalis, hypogastrica, beide Regiones iliacae, und den oberen Theil der kleinen Beckenhöhle einnehmen. Das Ende des Krummdarms erhebt sich aus der Beckenhöhle zur rechten Darmbeingegend, und mündet in den, auf der Fascia des Musculus iliacus dexter gelegenen Ansang des dicken Gedärmes, Intestinum crassum, ein. Das dicke Gedärm zerfällt, wie das dünne, in drei Stücke. Das erste - der Anfang des dicken Gedärms - ist der Blinddarm, Intestinum coecum, in der rechten Darmbeingegend. Von hier erhebt sich das zweite Stück, der Grimmdarm (Intestinum colon) in das rechte Hypochondrium, geht dann über dem Nabel quer in das linke Hypochondrium, und von dort abwärts in die Beckenhöhle, wo es in das dritte Stück des dicken Gedärms, in den Mastdarm (Intestinum rectum) übergeht. Das dicke Gedärm umkreist somit das dünne.

Das rechte Hypochondrium wird von der voluminösen Leber mehr als ausgefüllt, indem sie fast zwei Querfinger breit über den Rand der Rippen vorragt. Das linke Hypochondrium enthält die Milz. Die Bauchspeicheldrüse liegt dicht hinter dem Magen, quer vor der Wirbelsäule, von der concaven Seite der Zwölffingerdarmkrümmung bis zur Milz sich erstreckend.

Die Bauchsellsalten, welche diese Organe ausnehmen, und ihnen als Befestigungsmittel dienen, heissen, für die einzelnen Abtheilungen des Darmkanals: Gekröse, Mesenteria, für die drüsigen Nebenorgane: Ausnangebänder, Ligamenta suspensoria.

Der bei weitem grösste Theil des Verdauungskanals besteht aus denselben Schichten, welche, von aussen nach innen gerechnet, sind: 1. der Peritonealüberzug (seröse Haut des Gedärms), 2. die Muskelhaut, 3. das submuköse Bindegewehe (Zellhaut), 4. die Schleimhaut. Der Peritonealuberzug fehlt nur am untersten Stücke des Mastdarms (welches unterhalb der Fascia hypogastrica liegt) vollkommen, und ist für den Zwölflingerdarm, Blinddarm, und aufsteigenden Grimmdarm, kein vollständiger, indem ein grösserer oder kleinerer Theil der hinteren Fläche dieser Darmstücke unüberzogen bleibt. Die Muskelhaut besteht durchwegs aus einer äusseren longitudinalen, und inneren Kreisfaserschicht. Ihre mikroskopischen Elemente sind glatte (organische) Muskelfasern, welche in den verschiedenen Abtheilungen des Darmkanals mit denselben Eigenschaften als sehr lange und schmale, einen verlängerten Kern einschliessende Faserzellen erze

nen, und häusig nicht parallel gerandet, sondern wellensormig erscheinen. Sie ist an ihrer äusseren Seite mit einer dünnen Lage Zellstoff bedeckt, welche sie mit dem Bauchsellüberzug verbindet (subperitoneales oder suhseröses Bindegewebe), an ihrer inneren Seite liegt die Zellhaut des Darmes an, welche, ihres Verhältnisses zur Schleimhaut wegen, auch submuköses Bindegewebe genannt wird. Am meisten variirt die Schleimhaut, deren Attribute im Magen, Dünn- und Dickdarm andere werden, wie an den betreffenden Orten gezeigt werden soll.

Diese kurze Uebersicht der Lage und Zusammensetzung des Verdauungskanals musste, um häufige Wiederholungen zu umgehen, der speciellen Beschreibung aller Einzelnheiten vorausgeschickt werden. Der detaillirte Verlauf des Bauchfelles, welches das gemeinschaftliche Vereinigungsmittel aller einzelnen Verdauungsorgane abgiebt, kann, mit der allgemeinen Uebersicht des Situs viscerum, erst am Ende dieses Systems verständlich dargestellt werden (§. 239).

§. 231. Magen.

Der Magen (Ventriculus, Stomachus, Gaster) ist die grösste, gleich unter dem Zwerchfelle liegende, sack- oder retortensörmige Erweiterung des Verdauungskanals, in welcher die Nahrungsmittel am längsten verbleiben, ihre im geschluckten Bissen noch erkennbaren primitiven Eigenschasten verlieren, und in einen homogenen, dickslüssigen Brei umgewandelt werden, welcher Speisebrei, Chymus, genannt wird.

Der Magen nimmt die Regio epigastrica ein, und erstreckt sich in beide Hypochondria. Er grenzt nach oben an das Zwerchfell, nach unten an das Querstück des Grimmdarms, nach vorn an die Bauchwand, nach hinten an das Pankreas, nach rechts an die Leber, die ihn zum Theil bedeckt, und nach links an die Milz. Man unterscheidet an ihm den Eingang, Cardia s. Ostium oesophageum, und den Ausgang oder Pförtner. Pylorus s. Ostium duodenale (πύλη-οὖρος, Thorwachter). Unter der Cardia liegt der weiteste Theil des Magens (Fundus ventriculi), der sich blindsackformig gegen die Milz ausbuchtet. Vom Fundus gegen den Pylorus verengert sich der Magen mässig, krümmt sich aber zwei Zoll vor dem Pylorus als sogenanntes Antrum pyloricum etwas nach auswärts. Der Pylorus selbst ist äusserlich als eine seichte Strictur kennbar, welche den Magen vom Anfange des Zwölstingerdarms trennt. Die vordere und hintere Fläche des Magens stossen am oberen (kleineren und concaven) und unteren (grösseren und convexen) Bogen zusammen (Curvatura superior Die Flächen werden im vollen Zustande des Magens zur et inferior). oberen und unteren, somit die Bogen zum vorderen und hinteren. Flächenraum beträgt beiläufig einen Quadratfuss. Seine Capacität variirt nach individuellen Verhältnissen zu sehr, um allgemein ausgedrückt werden zu können.

Die Besestigungsmittel des Magens sind die Falten, welche das Bauch-

fell bildet, während es sich zu seinem Peritonealüberzuge einstülpt. unterscheidet ein Ligamentum phrenico-gastricum, zwischen Zwerchsell und Cardia, und ein Ligamentum gastro-lienale, zwischen Magen und Milz. Von der Pforte der Leber geht das kleine Netz, Omentum minus s. hepato-gastricum, schief zum kleinen Magenbogen herab. Vom grossen Magenbogen zieht das grosse Netz, Omentum majus s. gastro-colicum, gegen die Beckenhöhle herab, deckt, wie eine Schürze, die Schlingenconvolute des dünnen Gedärms, schlägt sich dann nach rück- und aufwärts um, als wollte es zum Magen zurückkehren, befestigt sich jedoch schon früher am querliegenden Grimmdarme, wo es mit dem Bauchfellüberzug dieses Darmstücks verschmilzt. Es ist von selbst klar, dass dieser Anordnung des grossen Netzes zufolge, jener Theil desselben, welcher zwischen Magen und Quergrimmdarm liegt, nur zweiblättrig ist, während der vom Quergrimmdarm bis zum unteren freien Rand des grossen Netzes sich erstreckende grössere Theil desselben, vierblätterig sein muss. - Nur das Ligamentum phrenico-gastricum verdient den Namen eines Haltbandes, die ubrigen sind so schwach, und sind selbst an so bewegliche Eingeweide gehestet, dass sie den Magen unmöglich fixiren können, und er somit seine Richtung im vollen Zustande ohne Anstand andern kann.

Die drei Häute des Magens bieten folgende Verhältnisse dar:

1. Der Bauchfellüberzug stammt von den beiden Blättern des kleinen Netzes, welche am oberen Bogen auseinander treten, um sich am unteren wieder als grosses Netz zu vereinigen. An beiden Bogen bleibt so viel Raum, als die hier verlaufenden Blutgefässe und Nerven erfordern, zwischen 2) Die Längenfasern der Muskelhaut sind den Blättern der Netze übrig. Fortsetzungen der Längenfasern des Oesophagus. Sie sind besonders am kleinen Magenbogen dicht zusammengedrängt. Die auf sie folgenden, bedeutend stärkeren Zirkelfasern, kreuzen sich mit ihnen unter rechten Winkeln. Die der Cardia nächsten Kreisfasern werden in horizontalen Ebenen liegen, während die übrigen senkrecht vom kleinen zum grossen Magenbogen lausen. Die Fibrae obliquae der Autoren sind eigentlich nur die vom kleinen Magenbogen zum Fundus ventriculi schief ziehenden Fibrae cir-Ein Bündel Zirkelfasern erzeugt im Pylorus durch plötzliches Engerwerden eine faltenartige Erhebung der Schleimhaut - die Pförtnerklappe, Valvula pylori. Das in der Pfortnerklappe eingeschlossene Muskelbündel wirkt als Sphincter pylori, und verschliesst während der Verdauung den Magenausgang vollkommen. An der Cardia findet sich kein 3) Die Schleimhaut besitzt ein einfaches Cylinderbesonderer Sphincter. epithelium, und ist mit unzähligen feinen Oeffnungen durchbohrt, welche die Ausmündungsstellen kleiner, einfacher, cylindrischer, meistens gerader, höchstens an ihrem blinden Ende etwas gewundener Dritsenschläuche sind, die durch das submuköse Bindegewebe bis auf das Stratum musculare hineinragen, die Secretionsorgane des Magensastes sind, und Labdrüsen oder Pepsindrusen (πέπτω, verdauen) genannt werden. Jede Pepsindrüse besteht aus einer structuriosen Grundmembran. Das Cylinderepithelium der Magenschleimhaut setzt sich nicht in die Höhle dieser Drüsen fort. Die Zahl der Drüsen ist so bedeutend, dass die Magenschleimhaut fast ganz von ihnen allein gebildet wird. Nur gegen das blinde Ende der Drüsen zu, tritt ein aus Bindegewebe und glatten Muskelfasern bestehendes Zwischengebilde auf.

Die grössten Pepsindrusen finden sich, gegen den Pylorus zu, am grossen Magenbogen. Häufig stehen sie zu 4-8 an einander gedrängt, und münden in kleinen Grübchen der Magenschleimhaut aus. Dieses ist besonders am Magengrunde der Fall. Ihre Länge misst 0,40"-0,80", ihre Ausmündungsoffnung 0.06". Der Inhalt der Pepsindrusen besteht: 1. aus einem nur in der Nähe ihrer Mündungen deutlichen Cylinderepithelium, 2. aus Zellenkernen. rund oder oval (0,002"), 3. aus vollkommenen Zellen (Enchymzellen) den sogenannten Labzellen. Diese sind rundlich oder eckig, 0,07" im Mittel gross, enthalten 1-2 Kerne, welche oft durch einen seinkörnigen Beleg undeutlich werden. 4. Aus einer klaren Flüssigkeit (Labsast), welche während der Verdauung in reichlichem Masse von den Wänden der Pensindrüsen abgesondert wird, den geformten Inhalt der Drüsen mechanisch herausschwemmt, sich mit ihm mischt, und nun Magensaft (Succus gastricus) genannt wird. Die Labzellen und der Labsast sind die physiologisch wirksamsten Bestandtheile des Magensastes. Die Pepsindrusen entleeren ihren Inhalt nur während der Verdauung. Dass die Anhäusung ihres Inhaltes, während des Nüchternseins, das Gefühl des Hungers veranlasse, ist eine willkurliche, unbegrundete Annahme. Wäre dieses der Fall, so musste man in der Früh, wo der Magen am längsten leer war, den grössten Hunger haben. -Streist man die innere Fläche eines Magens mit der Messerschärse ab, um das Secret der Magendrüschen zu erhalten, und verdünnt man dieses mit angesäuertem Wasser, so hat man sich kunstlichen Magensast bereitet, der zu Verdauungsversuchen extra ventriculum verwendet werden kann. Fleisch und Eiweiss werden in dem kunstlichen Magensaste ganz so wie im naturlichen Magen verdaut, wenn man die Temperatur auf jener des Magens erhält. -Am Pylorus und an der Cardia kommen auch grössere Schleimdrüsen (schon von Santorini gekannt, in neuester Zeit durch Frerichs bezweiselt), so wie 0,05"-0,08" hohe Zöttchen (welche auch für Gesühlswärzchen ausgegeben wurden) vor. Am Pylorus sitzen diese Zöttchen auf dem stark vorspringenden Rande der Scheidewände je zweier Magendrüschen, werden breiter, verschmelzen auch, und bilden dadurch die sogenannten Zottenfalten von Krause (Plicae villosae). - Die Valvula pylori hat bei verschiedenen Individuen eine sehr verschiedene Gestalt. Ihre Oeffnung ist rund oder oval. liegt selten in der Mitte, sondern nähert sich der Darmwand, und stösst an sie an, wodurch der Klappenring halbmondförmig wird. Leveling (Pylorus anatomico - physiologice consideratus. Argent., 1764) hat schon auf diese Spielarten hingewiesen, und Meckel die kurzere und längere Verdauungszeit von ihnen abhängig gehalten. Die Längensasern nehmen an der Bildung der Pylorusklappe keinen Antheil, und gehen gerade in jene des Zwölffingerdarms über.

Die Bewegung des Magens, Motus peristalticus, welche durch die abwechselnde Zusammenziehung seiner Längen- und Kreisfasern bewerkstelligt wird, und von der Cardia gegen den Pylorus wurmförmig fortschreitet, ist aur darauf berechnet, nach und nach jedes Theilchen des Mageninhaltes mit der Schleimhaut in Berührung zu bringen, und was bereits chymificirt wurde. in das Duodenum abzustreisen. Stärkerer Krastäusserungen ist der menschliche Magen nicht stähig. Ganze Weinbeeren und weichgekochte Hülsensrüchte werden deshalb durch den Magen nicht zerdrückt. Die Krast, mit welcher beim Erbrechen die Magencontenta ausgeworsen werden, hängt hauptsächlich vom Drucke der Bauchpresse ab.

§. 232. Dünndarm.

Der Zwölffingerdarm (Intestinum duodenum) besteht aus drei, mittelst abgerundeter Winkel in einander übergehenden Stücken, welche zusammen eine mehr als halbkreissörmige Krümmung um den Kopf des Pankreas bilden. Das obere Querstück geht vom Pylorus über den rechten Lumbaltheil des Zwerchfells quer nach aussen, beugt in das vor dem inneren Rande der rechten Niere liegende absteigende Stück um, welches in das untere Querstück übergeht, dessen Richtung vor der Aorta und Vena cava ascendens, schräg nach links und oben geht. Das obere Querstück und das absteigende Stück haben nur an ihrer vorderen Fläche einen Bauchfellüberzug; das untere Querstück liegt zwischen beiden Blättern des queren Grimmdarmgekröses eingeschlossen, und hebt an seinem Ende das untere Blatt desselben als Ansang des Dünndarmgekröses saltenörmig aus. Die Länge des Zwölstüngerdarms misst zwölf Daumenbreiten, woher sein Name stammt.

Mein ehemaliger Schüler, Prof. Treitz, entdeckte einen constanten, eigenen Muskel am Zwölffingerdarm, welchen er Musculus suspensorius duodeni nannte. Er geht aus dem dichten Bindegewebe hervor, welches die Ursprünge der Arteria coeliaca und mesenterica superior umgiebt, und verliert sich in dem longitudinalen Muskelstratum des Zwölffingerdarms in der Gegend der unteren Krümmung. (Siehe die betreffende Abhandlung in der Prager Vierteljahrsschrift, 1853, 1. Bd. pag. 113.) Der Muskel wurde aller Orten bestätigt.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, dass ich bereits zweimal schmale Muskelbündel zwischen den Blättern des zum obersten Theile des Jejunum gehörigen Mesenterium antraf. Sie gingen beide Male von der Fascia longitudinatis anterior aus. Auch am Uebergange der Speiseröhre in die Brust sah ich (nur einmal) ein Muskelbündelchen vom 6. Zwischenwirbelknörpel zum Oesophagus treten. Diese Beobachtungen, zusammengehalten mit den von mir schon früher beschriebenen Musculus broncho- und pleurooesophageus (§. 229), scheinen ein allgemeines Gesetz auszudrücken, nach welchem die Muskelschicht des Verdauungskanals, verstärkende Zuzüge von benachbarten Knochen oder anderen Hartgebilden entlehnt.

Der Leer- und Krummdarm (Intestinum jejunum et ileum) bilden ein 15—20 Fuss langes, gleichweites Rohr, welches, um in der Bauch- und Beckenhöhle Platz zu finden, sich in viele Schlingen krümmen muss. Es nimmt die unteren und seitlichen Theile der Bauchhöhle ein, und lässt seine untersten Schlingen in die kleine Beckenhöhle herabhängen.

Beide Darmstücke werden durch eine grosse Bauchsellsalte, das Dünndarmgekröse (Mesenterium) an der Wirbelsäule ausgehangen. Der Be-

ginn dieser Falte (Radix mesenterii) ist an der hinteren Bauchwand vor der Wirbelsäule zu suchen, wo er schief vom zweiten Lendenwirbel zur rechten Symphysis sacro-iliaca herabsteigt. Im Laufe gegen den Dunndarm wird die Falte immer breiter, so dass sie einem Dreiecke gleicht, dessen abgeschnittene Spitze an der Wirbelsäule, dessen breite Basis am Dünndarm liegt. Da der Dünndarm viele Krümmungen macht, so muss sich das Mesenterium ebenfalls wie ein Jabot (Halskrause) in Falten legen, und erhielt deshalb den Namen des Gekröses. Je weiter sich der Dünndarm von der Wirbelsäule entfernt, desto länger muss das Mesenterium werden, und desto grösser wird die Beweglichkeit des Darms. Wenn man das ganze Dünndarmconvolut mit den Händen zusammenfasst, kann man das Mesenterium wie einen Fächer oder Wedel hin und her bewegen, und man versteht es leicht, dass der Dünndarm mit jeder Aenderung der Körperlage auch seine eigene Lage ändern muss. Die grösste Entfernung von der Wirbelsäule, und somit die grösste Volubilität, hat die letzte Beckenschlinge des Dünndarms, in einer Entsernung von sechs Zoll vom Blinddarm. Diese Darmschlinge wird deshalb auch am häusigsten sich in Schenkel- und Leistenbrüche vordrängen.

Die Peritoneal- und Muskelhaut des dünnen Darms gleichen jener des Magens. Letztere wird aus einer äusseren, longitudinalen, und einer inneren Kreisfaserschicht zusammengesetzt.

Die Schleimhaut besteht aus einer zunächst unter dem Cylinderepithelium gelegenen, structurlosen Membran (Basement Membrane der englischen
Histologen), an welche sich ein Stratum von gefässreichem Bindegewebe
anschliesst, worauf die zuerst von Middeldorpf (Diss. de glandulis Brunnianis. Vratisl. 1846. pag. 9.), im Duodenum beobachtete, von Brücke
und Kölliker weiter untersuchte Schichte glatter, der Länge und Quere
nach verlaufender Muskelfasern folgt. Unter der Schleimhaut liegt das
meistens unbedeutende submuköse Bindegewebe, welches sich nur an gewissen Stellen, wo Drüsen vorkommen, zu einer bedeutenderen Dicke entwickelt. — Die Schleimhaut ist durch das Vorkommen von Falten, Zotten,
und Drüsen ausgezeichnet.

1. Falten. Sie finden sich 1. als Querfalten, Valvulae conniventes Kerkringii, vom absteigenden Stücke des Zwölsingerdarms angesangen, bis zum Blinddarme hin, stehen im Zwölsingerdarme enger an einander, so dass sie sich in hängender Lage dachziegelartig decken, und nehmen successive an Höhe ab. Sie umkreisen nie ringsormig die ganze Peripherie des Darmrohrs, sondern höchstens drei Viertheile derselben. 2. Eine Längenfalte (eigentlich eine kurze Längenwulst) sindet sich an der hinteren Wand des absteigenden Stücks des Zwölsingerdarms. Sie wird dadurch zu Stande gebracht, dass der gemeinschastliche Gallengang, bevor er sich in dieses Darmstück einmündet, eine Strecke weit zwischen Muskel- und Schleimhaut nach abwärts läust, und dadurch die letztere zu einer fast 2" hohen und 6" langen Wölbung vordrängt. An ihrem unteren Ende

mündet der gemeinschaftliche Gallengang, und dicht unter ihm der Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse. 3. Am Eintritte des Krummdarms in den Blinddarm bildet die Schleimhaut eine doppellippige Falte oder Klappe, die Blinddarmklappe, von 5" Höhe (Valvula coli, s. Fallopias, s. Tulpii, s. Bauhini), welche, wie das Kotherbrechen beweist, den Rücktritt der Fäcalmassen aus dem Dickdarm in den Dünndarm nicht zu hindern vermag. Sie enthält Muskelfasern. Beide Lippen der Klappe convergiren schräge nach oben, bilden einen trichterförmigen Raum, dessen Basis dem Krummdarme, und dessen lanzettförmig offene Spitze dem Grimmdarme zugewendet ist. Die Klappe wird am zweckmässigsten als Einschiebung (Invagination) der Schleim-, Zell- und Muskelhaut des Dünndarms in die Höhle des Dickdarms betrachtet. Der Bauchfellüberzug geht schlicht über die Faltung der drei Häute weg. Wird er ringsum eingeschnitten, so kann man durch Zug am Krummdarme die Klappe fast ganz verschwinden machen.

2. Zotten. Von der Valvula pylori bis zur Valvula coli ist die Schleimhaut des Dünndarms mit kleinen, im nüchternen Zustande zungenoder blattformigen, im gefüllten Zustande fingerformigen Flocken besetzt, welche, wenn man ein Stück Schleimhaut unter Wasser bringt, slottiren, und ihr ein feinzottiges Ansehen verleihen. Sie sind die thätigsten Organe der Absorption des aus dem Chymus ausgeschiedenen nahrhasten Speisenextracts (Chylus), und werden Darmzotten, Villi intestinales, genannt. Jede Zotte ist eine wahre Verlängerung oder Erhebung der Dünndarmschleimhaut, und besteht demgemäss aus allen Elementen der letzteren: Cylinderepithelium, structurlose Haut, Bindegeweb- und glatte Muskelfaserschicht mit prävalirender Längenrichtung ihrer Fasern. Ihre Zahl und Grösse nimmt gegen das Ende des Dünndarms ab; sie sind aber selbst an der dem Krummdarme zugekehrten Fläche der Valvula coli noch nicht ganz verschwunden. Nach Krause's Schätzung kann ihre Menge vier Millionen betragen. Nimmt man annäherungsweise die Obersläche einer Zotte zu 1/4 Quadratlinie an, so giebt dies für alle, eine Flächenausdehnung von 25 Quadratfuss, während die äussere Leibesobersläche nur 15 Quadratfuss misst. Die längsten Zotten im Duodenum haben 0,7" Höhe und 0,3" Breite. Das Vorkommen contractiler Elemente in den Zotten war schon Gruby und Delafond bekannt.

Die Zotten entstehen im Embryo aus Schleimhautsalten, welche vom freien Rande aus immer tieser und tieser eingekerbt werden.

3. Drüsen. Der Dünndarm ist reich an Drüsen, und es findet sich eine vierfache Formation derselben. 1. Die Lieberkühn'schen Crypten (0,2" lang, 0,03" breit) liegen zwischen den Zotten. Sie sind an Form und Bau den Magendrüsen analog, und werden für die Secretionsorgane des Darmsasts, Succus entericus, gehalten. Sie kommen grösser und zahlreicher auch im Dickdarme vor. 2. Die Peyer'schen Drüseninseln (Agmina Peyeri, Placques der französischen Anatomen) gehören in der Re-

gel nur dem Ileum an, an dessen freiem Rande sie sich vorsinden. Ihre Zahl variirt sehr, so wie ihre Dimensionen. Sie bestehen, nach Verschiedenheit ihres Umfanges, aus 20-80 (ausnahmsweise noch mehr) hirsekorn-, selbst hanskorngrossen Bläschen, welche auf einen Fleck (Insel) zusammengedrängt liegen, der öster schon bei äusserer Besichtigung des Darms, einer leichten Wölbung oder anderer Färbung wegen, erkannt wird. Der Längendurchmesser einer Insel ist immer nach der Länge des Darms gerichtet. Jedes einzelne Element einer Peyer'schen Drüsengruppe ist ein vollkommen geschlossenes Bläschen, welches nur unter pathologischen Bedingungen sich in die Darmhöhle öffnet. Die Säckchen ragen tief in das hier verdickte submuköse Bindegewebe hinein, bestehen aus einer ziemlich sesten, nicht ganz deutlich faserigen Hülle, und enthalten, in einer klaren Flüssigkeit, eine grosse Menge Zellenkerne und vollständiger Zellen. Oft sieht man. nach glücklichen Injectionen, ein oder mehrere Capillargesasse durch die Höhle des Säckchens quer von einer Wand zur anderen ziehen. 3. Die solitären, geschlossenen Follikel (0,2"-1" gross) finden sich, ebwohl meistens nur spärlich, durch das ganze Gedärm. Ihre Menge variirt bedeutend bei verschiedenen Individuen. Sie sind nur vereinzelt stehende Peyer'sche Drüsenfollikel von grösserem Durchmesser. Im Magen führten sie lange den Namen Glandulae lenticulares. 4. Die Brunner'schen oder Brunn'schen Drüsen (0,5"-1,5" gross) sind blos dem Duodenum eigen. Jede einzelne Drüse ist aus traubig vereinigten Acinis zusammengesetzt. Ihre Aussührungsgänge sind etwas gewunden, und münden mit Oeffnungen, welche kaum grösser als die einer Lieberkühn'sches Druse sind. Ihr Secret gleicht jenem des Pankreas.

Der Bau der Darmzotten ist, was die Ursprünge der Lymphgesasse in ihnen betrifft, gegenwärtig noch immer Gegenstand einer Controverse. Lieberkuhn nahm in jeder Zotte eine Höhle an, die an der Spitze der Zotte geöffnet sei, und an der Basis derselben mit einem Lymphgesasse in Verbindung stehe. Dies ist die Ampulla Lieberkuehniana. "Ramusculus vasis lactei extenditur in ampullulam s. vesiculam, ovo haud absimilem, in cujus apice foraminulum quoddam exiguum microscopio delegitur." (De fabr. et act. villorum. London, 1782. pag. 3.) Es wurde somit jedes Lymphgefass mit offenen Mündungen — wie die Puncta lacrymalia der Thränenröhrchen - beginnen. Die offenen Mündungen wurden von Hewson bestritten, und von Rudolphi und Fohmann bleibend widerlegt. Wahrscheinlich hat Lieberkuhn die Kerne der Epithelialzellen für die offenen Mündungen seiner Ampullae angesehen. Die Existenz der centralen Höhle aber blieb problematisch. Müller (Handbuch der Phys. 1. Bd. 3. Abschnitt) sand die Höhle beim Kalb, Schaf, Kaninchen; vermisste sie bei Hunden, Schweinen, und Katzen. Die menschlichen Darmzotten sollen sie besitzen (Gerlach, Frerichs), und Schwann will sie sogar mit Quecksilber injicirt haben. Henle (Symbolae ad anat. villorum. Fig. 12. A) und Vogel (Schmidt's Jahrb. XXVI. pag. 265) erklären sich für blinde Anfänge der Chylusgestässe. welche in den schmalen Zotten keulenförmig, in den breiten spitzig und rankensormig sein sollen. Valentin (Repert. 1838. pag. 100) spricht sich entschieden für den netzformigen Ursprung aus. - Nach einer, von Prof.

Brücke, der kaiserlichen Akademie gemachten Mittheilung (Sitzungsberichte, Dec. 1852, Jänner 1853) bilden die Lymphgefässe des Darmkanals ein dendritisch verzweigtes Röhrensystem, dessen Aeste die Muskelschicht der Schleimhaut durchdringen, ihre Wandungen verlieren, und mit den interstitiellen Gewebräumen, welche sich theils in den Zotten, theils in der Bindegewebschicht der Schleimhaut zwischen den Lieberkühn'schen Crypten befinden, in offener Communication stehen. Da, ferneren Gedanken Brücke's zusolge, die Zellen des Cylinderepitheliums der Zotten an ihrem freien und an ihrem aussitzenden Ende offen sind (sie haben ihre Wandungen im Wiener physiologischen Institute verloren), und einen weichen, gelatinösen Inhalt besitzen, der sich bei leeren Zotten über das Niveau der Zelle mit convexer Oberstäche herausdrängen soll, und selbst den Kern der Zelle mit sich nimmt, so steht dem zu absorbirenden Chylus kein Hinderniss entgegen, durch die offenen Zellen des Epithels in das Fasergewebe der Zotte, und von diesem in jenes der Darmschleimhaut einzudringen, und zuletzt in die mit nachweisbaren Wänden versehenen Lymphgestasse überzugehen. Bruch, Kölliker, und besonders Henle, haben diese Angaben entschieden verworsen, und ich stige hinzu, dass, wenn man die der Absorption im Wege stehenden Wände der Epithelialzellen auf den Zotten wegläugnet, man auch in der unter dem Epithel besindlichen structurlosen Haut eine ähnliche Durchlöcherung erfinden muss, um es der Absorption ganz bequem zu machen. - Eine eben so wichtige Rolle, wie die Saugadern, spielen die Venen der Zotten bei der Absorption. Der Antheil, den sie hiebei haben, ist durch Versuche constatirt (Müller's Physiol. I. Bd., V. Cap., vom Verhalten der Blutgestasse bei der Resorption). Die Zottenvene entsteht nicht durch Umbeugen der Spitzen der Capillararterien in ein centrales Stämmchen, sondern bildet sich aus einem oberflächlichen Venennetze, aus welchem mehrere Venenstämmchen, worunter eines durch Dicke sich auszeichnet, an der Basis der Zotte in die Bindegewebschicht der Schleimhaut eintreten. Injicirt man ein Darmstück durch einen Ast der Vena mesenterica, und die Masse erfüllt nicht das ganze Capillarsystem, so erhält man nur die Basis der Zotte injicirt, während eine ähnliche Injection von der Arterie aus, zuerst in das Capillarnetz der Spitzen der Zotte eindringt, und von hier gegen die Basis vorrückt. -

Man beobachtete schon östers, dass gesärbte Flüssigkeiten, welche in ein unterbundenes Darmstück mit einiger Gewalt injicirt werden, regelmässig in die Lymphgestsse des Darmes übergehen. Selbst wenn ein Darmstück zu stark aufgeblasen wird, um es zu trocknen, entweicht die Lust sehr oft. durch die Saugadern und selbst durch die Venen. Brücke glaubt nun, dass die injicirte Flüssigkeit zuerst in die geschlossenen Follikel der Peyerschen Drüsen, von diesen in das umgebende Bindegewebe, und aus den Maschen des letzteren in die Saugaderansange trete. Dabei muss es natürlich wohl Risse absetzen. Kommen diese auch im Leben vor? Da ferner der Inhalt der Peyer'schen Drüsen jenem der übrigen Lymphdrüsen ganz gleich ist (Kerne und Zellen, welche letzteren den Lymphkörperchen auf ein Haar gleichen), so hält Brücke die Peyer'schen Drüsen auf diesen (auch für manche andere Organe: z. B. Malpighische Milzbläschen, Thymus, Balgdrüsen geltenden) Umstand hin, für in die Darmwand eingeschlossene Lymphdritsen (Denkschriften der kais. Akademie der Wissensch. II. Bd.). Gegen dieses Belieben hat naturlich Niemand etwas einzuwenden, die Wissenschaft rechtet nicht mit Redensarten. Sie überlässt es dem, der davon Gebrauch macht, sich in dem trüben Lichte solcher Entdeckungen zu sonnen, und zu ferneren ähnlichen Leistungen Kräste zu sammeln. Vielleicht besteht hierin die Aufgabe der "höheren" Anatomie, und diese scheint sie wacker zu erfüllen.

§. 233. Dickdarm.

Das letzte Stück des Ileum, welches aus der kleinen Beckenhöhle zur Fossa iliaca dextra aufsteigt, inserirt sich nicht in den Anfang des dicken Gedärms, sondern nebenan. Das über die Insertionsstelle des Ileum nach unten hinausragende Stück des Dickdarms ist der Blinddarm (Intestinum coecum), welches sich zum lleum so verhält, wie der Fundus ventriculi zum Oesophagus. Der Blinddarm liegt auf der Fascia iliaca dextra. und ist durch den, von seiner inneren Gegend entspringenden, 2-3 Zoll langen, wurmförmigen Anhang (Processus vermicularis) kennbar. Auf den Blinddarm folgt der Grimmdarm (Colon), welcher vor der rechten Niere bis zur concaven Fläche der Leber aufsteigt (Colon ascendens), dann unter der Curvatura major ventriculi quer nach links geht (Colon transversum), um am unteren Ende der Milz, vor der linken Niere wieder nach abwärts zu laufen (Colon descendens), und mittelst der Flexura sigmoidea s. S romanum in den Mastdarm (Intestinum rectum) überzugehen. Dieser letztere steigt von der linken Symphysis sacro-iliaca an, in der Concavität des Kreuzbeins, ohne Krummungen zu bilden (daher der Name rectum), herab, und mundet am Mittelsleische vor der Steissbeinspitze in der Afteröffnung, Anus. Der deutsche Name Mastdarm verdankt seinen Ursprung der reichlichen Fettablagerung unter dem Bauchsellüberzuge dieses Darmstücks.

Der Dickdarm zeichnet sich durch seine Weite, seine Ausdehnbarkeit, und seine zellig ausgebuchtete Oberstäche (Haustra) vor dem Dünndarme aus. Seine Länge misst zwischen 4 — 5 Fuss. Seine Häute besitzen folgende Eigenthümlichkeiten.

Der Peritonealüberzug ist in der Regel nur am Colon transversum, am Wurmfortsatze, und am S romanum vollständig. An den übrigen Stücken des Dickdarms bleibt ein grösserer oder geringerer Theil ihrer hinteren Fläche ohne Bauchfellüberzug, und wird nur durch Zellgewebe an die benachbarten Stellen der Bauch- oder Beckenwand besestigt. Der Mastdarm hat, vom dritten Kreuzwirbel an, wo er die Fascia hypogastrics durchbohrt, gar keinen Bauchfellüberzug. Die Darmstücke mit unvollkommenen Bauchfellüberzügen haben deshalb keine wahren Mesenterien (doppelblätterige Aufhängebänder), und das nur einen Theil ihrer Oberstäche deckende Peritoneum gestattet ihnen nur einen geringen Grad von Beweglichkeit. Nur wenn sich diese Darmstücke bei Relaxation des Zellgewebes. welches sie an die Bauchwand hestet, von letzterer entsernen (was jedesmal geschehen muss, wenn sie den Inhalt eines Leisten- oder Schenkelbruches bilden), ziehen sie das Peritoneum als Falte nach sich, jedoch ohne dass sich die beiden Blätter derselben vollständig, wie bei einem Mesenterium an einander legten. Man kann insofern nur unrichtig von einem Mesocoecum, Mesocolon ascendens et descendens, und Mesorectum sprechen; dagegen ein Mesocolon transversum, ein Mesenterium curvaturae sigmoideae, und ein Mesenterium processus vermicularis, unter denselben Verhältnissen existirt, wie das Mesenterium am Dünndarm. Am Colon und Rectum finden sich noch kleine, beutelförmige, mit Fett gefüllte Verlängerungen des Bauchfellüberzuges, welche Appendices epiploicae s. Omentula genannt werden.

Die Muskelhaut des Dickdarms schiebt ihre Längenfasern auf drei Stränge zusammen, welche Fasciae (auch Taeniae Valsalvae, s. Ligamenta coli) heissen. Sie sind besonders am Colon deutlich. Die erste Fascia liegt längs der Anhestungsstelle des Omentum colicum, die zweite am Mesenterialrande, und die dritte ist frei. Sie werden deshalb als Fascia omentalis, mesenterica, und libera unterschieden. Die Zirkelfasern bedingen, durch ihr stellenweise stärkeres Einschnüren des Darms, die oben erwähnten Haustra s. Cellulae, in welchen der Koth, durch fortwährende Aufsaugung seiner slüssigen Bestandtheile, härter wird, und sich zu ballen ansängt. Am Ende des Mastdarms mehren sie sich, und bilden einen 3'''—4''' breiten Muskelring (Sphincter ani internus), welcher den Asterhermetisch schliesst, und durch den Sphincter ani externus (der ein selbstständiger, der Willkür bis zu einem gewissen Grade gehorchender Muskel ist) unterstützt wird.

Die Schleimhaut bildet viele, in Abständen von 1/2"—3/4" auf einander folgende Falten (Plicae sigmoideae), welche nie mehr als die halbe Peripherie des Darmes einnehmen, 1/4"—1/2" in die Darmhöhle vorragen, und im Intestinum rectum, nur im obersten Theile desselben, obwohl viel weniger erhaben, vorkommen. Sie besitzt keine Zotten, und von den Drüsen des Darmes erhalten sich nur die Lieberkühn'schen und die solitären Follikel, welche letztere jene des Dünndarms an Grösse übertreffen. Am After muss sie sich, der Schnürmuskeln wegen, in longitudinale Falten legen, zwischen welchen zuweilen Querfältchen eingeschaltet werden, wodurch Gruben entstehen, welche von Morgagni für Schleimdrüsen gehalten wurden (Sinus Morgagni). Fremde Körper (z. B. Nadeln, Fischgräten, Knochensplitter), welche mit den Nahrungsmitteln zufällig verschluckt wurden, können, nachdem sie den langen Weg durch den ganzen Verdauungsschlauch zurückgelegt haben, in diesen Gruben des Afters angehalten werden, und das Einschreiten der Kunsthilse nothwendig machen.

Die von Kohlrausch zwischen Sphincter internus und Schleimhaut als Sustentator membranae mucosae beschriebene musculöse Längenschichte, ist wohl nur eine stärkere Entwicklung der Muskelschicht der Schleimhaut (wie am Oesophagus).

§. 234. Muskeln des Afters.

Die der Willkur unterworfenen Muskeln des Asters sind der äussere Schliessmuskel, und der paarige Hebemuskel des Asters.

Der aussere Schliessmuskel, Musculus sphincter ani externus,

entspringt von der Steissbeinspitze, umgreist mit zwei Schenkeln die Asteröffnung, und verliert sich vor dem Aster in den Musculus bulbo-cavernosus
beim Manne, und den Constrictor cunni beim Weibe.

Theile beschreibt an ihm noch eine tiesliegende Schichte, welche als ein 4"'-6" tieser Trichter, das untere Mastdarmende sammt dem Sphincter internus umgreist. Diese Schichte gehört jedoch, wie ich ganz bestimmt weiss, dem Levator ani an. — Der äussere Schliessmuskel enthält dieselben quergestreisten Muskelsasern, welche in allen willkürlich wirkenden Muskeln vorkommen. — Die Fasern des inneren Schliessers stimmen mit den Kreismuskelsasern der Gedärme überein.

Der Aufheber des Afters, Musculus levator ani, liegt zwischen der Fascia perinei und Fascia pelvis, entspringt vom Arcus tendineus der letzteren, so wie von der hinteren Fläche des Schambeins, über dem Obturator internus, dem absteigenden Aste desselben, und der Spina ossis ischii. Beide Levatores convergiren nach unten, sliessen mit dem Sphincter ani externus zusammen, und hängen auch an die Prostata, den Harnblasengrund, und bei Weibern an die Scheide an. Zieht den Aster einwärts, und hist auch dem Sphinter ihn zusammen zu schnüren, indem sich beide beiläusig so zur Asterössnung verhalten, wie der doppelte Zug an einem Tabaksbeutel.

Man hatte allgemein die irrige Ansicht, dass der Darmkoth sich im unteren Ende des Mastdarms ansammle, und durch Druck auf die Sphincteren. das Bedürfniss der Entleerung veranlasse. Dass die Kothsäule nicht bis zu den beiden Schliessmuskeln herabreiche, sondern höher oben durch einen dritten Sphincter am Herabsteigen gehindert werde, ist eine Thatsache, von welcher die praktische Chirurgie viel früher, als die Anatomie Notiz genommen hat. Wären die beiden Schliessmuskeln die einzigen Kräste, die die Faces zurückhielten, so müsste bei jeder Operation, durch welche die Sphincteren zerschnitten werden (Operation der Mastdarmfistel, Exstirpation des Anus, Mastdarm-Blasenschnitt), Unvermögen den Stuhlgang zurückzuhalten eintreten. was, laut Zeugniss der Erfahrung, nicht der Fall ist. Untersucht man den Mastdarm mit der Sonde oder dem Finger, so findet man seinen Raum über den Sphincteren leer, selbst wenn mehrere Tage kein Stuhl entleert wurde. Drei bis vier Zoll über dem Anus stösst die Sonde auf ein Hinderniss, und kann von hier aus nur mit einiger Krast weiter geschoben werden. Das Hinderniss rührt von einer permanenten Zusammenziehung des Mastdarms her, welche bis zum Ansange des Rectums (Ende des S romanum) sich erstreckt. Diese kann nur durch die stärkere Wirkung der Kreisfasern erfolgen, und letztere verdienen hier somit den Namen eines Sphincter tertius. Die anatomische Untersuchung lehrt zugleich, dass in vielen Fällen die Kreissasern des Mastdarms 4 Zoll über dem Aster sich dichter an einander legen. und einen stärkeren Ring bilden, als über oder unter dieser Stelle. Ich habe nur einmal einen Zusammenhang dieser Kreisfasern mit dem Periost des Kreuzbeins deutlich erkannt und öffentlich demonstrirt. Velpeau hat ihn öfters gesehen (Malgaigne, anat. chir. pag. 379). Wenn auch in einzelnen Fällen das Dasein dieses dritten Schnürmuskels nicht als stärkere Entwicklung der Kreisfaserschichte anatomisch nachzuweisen ist, so ist doch die Existenz desselben eine physiologische Nothwendigkeit, die von Lisfranc. O'Beirn, Houston, richtig gewürdigt wurde. Nelaton (Velpeau, anat. chir. 3. éd. introd.) hat ihn als Sphincter ani superior beschrieben. Der Darmkoth wird sich also nicht im unteren Mastdarmende, sondern in der Curvatura sigmoidea ansammeln, welche im leeren Zustande an der Seite des Mastdarms in die Beckenhöhle herabhängt, sich durch ihre successive Anfüllung erhebt und dreht (wie der volle Magen), und die Fäces auf den oberen Schliessmuskel drücken lässt, welcher nachgiebt. Nun rücken die Fäces bis zum Anus herab, und können nur mit grosser Anstrengung der beiden Sphincteren eine Zeitlang zurückgehalten werden, wozu selbst die Hinterbacken mitwirken müssen, um den Entleerungsdrang zu überwinden. Man hütet sich deshalb in dieser kritischen Lage grosse Schritte zu machen. — Alles, was Kohlrausch gegen diese meine Ansicht vorbrachte, gebe ich zu, weil ich nicht einsehe, wieso es gegen dieselbe spricht.

§. 235. Leber. Aeussere Verhältnisse derselben.

Die Leber, Hepar s. Jecur, das grösste und schwerste Eingeweide, von rothbrauner Farbe und derbem Gestige, liegt im rechten Hypochondrium, und erstreckt sich durch die Regio epigastrica bis zum linken Hy-Sie hat eine länglich viereckige Gestalt mit abgepochondrium herüber. rundeten Winkeln. Ihr vorderer, unter den Rippen und dem Schwertknorpel hervorragender Rand, ist schneidend, und mit einem, das vordere Ende des Ligamenti suspensorii aufnehmenden Einschnitte versehen. Der hintere stumpfe Rand liegt an der Uebergangsstelle der Pars lumbalis diaphragmatis in die Pars costalis. Er steht zugleich höher als der vordere, wodurch die Lage der Leber nach vorn abschüssig wird. Der rechte Rand ist eine Fortsetzung des hinteren, und der linke Rand, gegen welchen sich die Masse der Leber allmälig verdunnt, ist in einen spitzigen Zipf ausgezogen, welcher vor der Cardia des Magens liegt. convexe, zugleich etwas nach vorn geneigte Fläche schmiegt sich an die Concavität des Zwerchfells an. Das an sie befestigte Ligamentum suspensorium hepatis bezeichnet die Grenze zwischen dem rechten, grösseren, dickeren, und dem linken, kleineren, und dünneren Leberlappen - Lobus hepatis dexter et sinister. Die untere, zugleich nach hinten gerichtete Fläche berührt das obere Ende der rechten Niere, und erhält von ihr einen seichten Eindruck. Sie deckt das Ende des aufsteigenden, und den Anfang des queren Grimmdarms, den Pylorus, und einen grossen Theil der vorderen Magensläche, und zerfällt durch drei, sich wie die Linien eines H kreuzende Furchen, in vier Abtheilungen oder Lappen. Die Furchen werden als Fossa longitudinalis dextra et sinistra, und Fossa transversa (Pforte, Porta hepatis) bezeichnet. Rechts von der Fossa longitudinalis dextra liegt der rechte Leberlappen, links von der Fossa longitudinalis sinistra der linke. Vor der Fossa transversa liegt zwischen den beiden Fossis longitudinalibus der viereckige, hinter ihr der Spigel'sche Leberlappen, welcher letztere mit einem stumpskegelsormigen Höcker (Tuberculum papillare), und mit einem, gegen den rechten Leberlappen hinziehenden Fortsatz (Tuberculum caudatum) ausgestattet ist. Jede Fossa lonaitudinalis wird durch die Fossa transversa, welche sie schneidet, in eine vordere und hintere Abtheilung gebracht. Die rechte Längenfurche enthält in ihrer vorderen Abtheilung die Gallenblase, in ihrer hinteren die Vena cava ascendens; die linke Längenfurche vorn das Nabelband der Leber, hinten den Ductus venosus Arantii. Die Pforte ist die Aus- und Eintrittsstelle der Gesässe und Nerven der Leber, mit Ausnahme der Venae hepaticae. - Die Oberstäche der Leber ist vom Peritoneum überzogen, welches sich, vom Zwerchfell aus, gegen die Leber einstülpt, und dadurch zwei Falten bildet, die als Bänder der Leber beschrieben werden. Aufhängeband der Leber, Ligamentum suspensorium s. triangulare, entspringt an der concaven Zwerchfellssläche, so wie an der vorderen Bauchwand bis zum Nabel herab, und inserirt sich an der convexen Leberfläche. vom Einschnitte des vorderen Randes bis zum hinteren, wo es mit dem Kranzbande, Ligamentum coronarium, zusammensliesst, welches, ebenfalls vom Zwerchfelle kommend, am hinteren stumpfen Leberrande sich befestigt. Die beiden Blätter dieser Falten weichen an der Leber auseinander, um sie zu umhüllen, streifen aber über die Furchen der Leber und ihren Inhalt oberstächlich weg. Nur der vordere Abschnitt der linken Längenfurche wird vom Peritonealüberzuge der Leber ausgekleidet, welcher zugleich das aus Bindegewebfasern bestehende Nabelband der Leber einhüllt. teres ist ein rundlicher Strang (daher auch Ligamentum teres genannt), der vom Nabel zur genannten Furche läuft, und in den unteren freien Rand des Aufhängebandes eingeschlossen ist.

Der Peritonealüberzug der Leber setzt sich zu anderen Baucheingeweiden fort, und zwar: 1. zum kleinen Bogen des Magens, als Omentum minus s. hepato-gastricum, 2. zum Zwölffingerdarme, als Ligamentum hepato-duodenale, 3. zum oberen Theile der rechten Niere, als Ligamentum hepato-renale, und 4. zur rechten Krümmung des Colon, als Ligamentum hepato-colicum. Zwischen dem Ligamentum hepato-duodenale und einer ähnlichen Bauchfellfalte, welche von der vorderen Wand des Duodenum zur Niere herübergeht, besindet sich eine schlitzsürmige Oessnung (Foramen Winslovii), welche zu einem, hinter dem Magen und dem Omentum minus liegenden Raume der Peritonealhöhle sührt (Saccus peritonei retroventricularis s. Bursa omentalis).

Bevor man die Leber herausnimmt, um ihre untere Fläche mit deren Lappen und Gruben zu studiren, müssen die Gefässverbindungen derselben in der Leiche präparirt werden. Man eröffnet nun auch die Brusthöhle, und trägt von den Rippen so viel ab, als nöthig ist, um die Leber gegen die Lungen hinaufschlagen zu können, wodurch ihre untere Fläche zur oberen wird. Das Ligamentum hepato-duodenale spannt sich dabei strangartig an, und muss, da es die grossen Gefässe enthält, welche der Gallenbereitung vorstehen, zuerst untersucht werden. Man präparirt seinen Bauchfellüberzug los, und findet in ihm eingeschlossen ein Gefässbündel, in welchem sich folgende Stämme isoliren lassen: 1. Die Arteria hepatica.

Sie liegt links und oben im Gesassbundel, und kann leicht bis zu ihrem Ursprunge aus der Arteria coeliaca verfolgt werden. 2. Der gemeinschaftliche Gallengang, Ductus choledochus (χολή, Galle, δέχομαι, leiten), rechts und unten im Bündel gelegen. Man verfolgt ihn gegen die Leber zu, und sieht ihn sich in zwei Aeste theilen, deren einer zur Pforte geht - Lebergallengang, Ductus hepaticus, - der andere mit dem Halse der Gallenblase sich verbindet, - Gallenblasen-Gallengang, Ductus cysticus. Der Ductus choledochus hat den Umsang eines dunnen Federkiels, der Ductus cysticus und hepaticus sind noch etwas Nun trennt man das Colon transversum von seinen Verbindungen mit dem Magen und der Leber, und schlägt es nach unten. Dadurch wird die Krümmung des Zwölflingerdarms und der von ihr umschlossene Kopf des Pankreas zugänglich. Man präparirt ihren Bauchfellüberzug los. lustet den rechten Rand des absteigenden Stücks des Zwölflingerdarms. verfolgt den Ductus choledochus nach abwärts, und findet, wie er die hintere Wand des Duodenum schief nach unten durchbohrt, und durch Aufheben der Schleimhaut, die beim Dunndarm erwähnte, einzige Längenfalte desselben bildet. Schneidet man den Ductus choledochus irgendwo an. und führt durch ihn eine Sonde gegen den Darm, so findet man die Ausmündungsstelle des Ganges am unteren Ende jener Falte. 3. Die Pfortader, Vena portae. Sie liegt hinter der Arteria hepatica und dem Gallengange, und hat beiläusig die Stärke des kleinen Fingers. Gegen die Fossa transversa (Porta hepatis) aufsteigend, theilt sie sich in zwei Aeste (wie die Arteria hepatica), für den rechten und linken Leberlappen. Präparirt man den Kopf des Pankreas mit der Curvatur des Duodenum von der Wirbelsäule los, so findet man den Zusammenfluss der Vena splenica, Vena mesenterica, und einiger Venae pancreaticae, als Anfang des Pfortaderstamms. Die Pfortader sammelt somit das venöse Blut aus den Venen der Milz und des Verdauungskanals, und führt es zur Leber, um es dort in ihren seinsten Ramisicationen zu vertheilen. Sie gleicht somit, wenn man sie aus den Eingeweiden herausgerissen denken möchte, einem Baume, dessen Wurzeln im Darmkanale, Milz und Pankreas stecken, dessen Zweige in das Leberparenchym hineinwachsen, und dessen Stamm im Ligamentum Die Nerven begleiten als Plexus hepaticus vorhepato - duodenale liegt. zugsweise die Arteria hepatica, und die tiesen Saugadern solgen der Vena portae. Das Bindegewebe, welches diese Theile zu Einem Bündel vereinigt. und welches sich vom gewöhnlichen Bindegewebe durchaus nicht unterscheidet, begleitet die Ramificationen der Gefässe durch das Leberparenchym, und wurde von Glisson für musculös gehalten (Capsula Glissonii).

Hat man den Inhalt des Ligamentum hepato-duodenale auf die geschilderte Weise untersucht, so schneidet man das ganze Gefässbündel entzwei, und sieht hinter ihm den Stamm der Vena cava ascendens zum hinteren Leberrande aufsteigen, wo er sich in die hintere Abtheilung

rechten Längenfurche legt, und daselbst die Venas hepaticae aufnimmt, welche somit nicht in der Pforte zu suchen sind.

Nun wird das Ligamentum suspensorium und coronarium getrennt, und die Leber, sammt dem sie berührenden Stücke der Vena cava ascendens herausgenommen, um ihre Furchen, und was in ihnen liegt, darzustellen.

Die Fossa longitudinalis dextra enthält Organe, die im Erwachsenen dieselbe Rolle spielen, wie im Embryo: vorn die Gallenblase, und hinten die untere Hohlvene; — die Fossa longitudinalis sinistra dagegen im Embryo Venen, welche nach der Geburt obliteriren, und in Bindegewebsstränge einschrumpsen; vorn die Vena umbilicalis, und hinten den Ductus venosus Arantii.

Die Gallenblase, Vesicula s. Cystis fellea s. Cholecystis, liegt im vorderen Segmente der Fossa longitudinalis dextra. Sie ist birnformig, ragt mit ihrem Grunde über den vorderen Leberrand etwas hervor, und verschmächtigt sich nach hinten zum engen, etwas gewundenen Halse, welcher in den Ductus cysticus übergeht. Sie ist nur an ihrer unteren Fläche und am Grunde vom Peritoneum überzogen; ihre obere Fläche hängt durch leicht zerreissliches Zellgewebe an die Lebersubstanz an. Sie besteht aus einer äusseren Bindegewebhaut, einer mittleren Muskelhaut mit Längenund Querfasern, und einer inneren Schleimhaut. Letztere ist mit kleinen, niedrigen Schleimhautstältchen, welche sich zu eckigen Zellen (wie eine Honigwabe) gruppiren, besetzt, und zeigt im Halse eine 0,4" hohe, spiral an der Wand hinziehende Falte (Valvula spiralis Heisteri).

Die im hinteren Segmente der Fossa longitudinalis dextra liegende untere Hohlvene ist bereits erwähnt. Man schlitzt sie an der von der Leber abgewendeten Seite auf, um die an Zahl und Grösse sehr verschiedenen Insertionen der Lebervenen zu sehen.

Der vordere Abschnitt der Fossa longitudinalis sinistra ist durch Zusammenneigen und Schliessen seiner Ränder sehr häufig in einen Kanal umgewandelt. Das Nabelband der Leber (Rest der obsolescirten Vena umbilicalis) kann leicht durch die ganze Länge der Furche bis zum linken Pfortaderaste verfolgt werden, mit dessen äusserer Haut es verwächst, und den Weg andeutet, welchen die Nabelvene zur Pfortader einschlug.

Der hintere Abschnitt der linken Längenfurche enthält die viel schwächeren Reste des Ductus venosus Arantii, welcher im Embryo vom linken Pfortaderaste nach rückwärts lief, den Lobus Spigelii umkreiste, um sich in die Cava ascendens (oder in die grösste Lebervene) zu entleeren.

§. 236. Bau der Leber.

Er ist noch immer nicht so genau bekannt, dass man über das Verhältniss der Anfänge der Gallengefässe zu den Leberzellen keinen Zweiselbegen könnte. Die Wissenschaft weiss viel über die mikroskopischen Ele-

mente der Leber, aber noch lange nicht Alles. Das Wichtigste von dem Vielen ist in folgenden Punkten enthalten.

a. Leberacini, - Vasa inter- und intralobularia.

Nach Kiernan's Untersuchungen (Philos. Transact. 1833. P. II.) wird die schon von Wepfer und Malpighi ausgestellte Ansicht, dass die Leber ein Aggregat gleichartiger Läppchen (Acini s. Lobuli) sei, auf dem Wege mikroskopischer Untersuchung weiter ausgesührt. Jeder Lobulus sei in eine Bindegewebshülle eingeschlossen, welche eine Fortsetzung der mit den Blutgesässen bis zum Lobulus gelangten Capsula Glissonii ist, und enthalte ein dichtes Netzwerk der feinsten Gallengesässchen. Aeste der Arteria hepatica und der Vena portae verlaufen zwischen den Lobuli, und werden deshalb Vasa interlobularia genannt. Die ersten Würzelchen der Lebervenen dagegen stecken in der Axe der Lobuli, und heissen Vasa intralobularia, besser Vena centralis. Die Vasa inter- und intralobularia stehen mittelst eines Capillargefässnetzes in Verbindung, welches durch die Maschen der Gallengesässnetze im Lobulus dringt, und den Gallengestsschen Gelegenheit giebt, durch Wechselwirkung auf das Blut, die Elemente der Galle aus diesem zu entnehmen. Die aus dem Netzwerk der Gallengefässchen in den Lobulis entspringenden Ductus biliarii, gesellen sich den Vasis interlobularibus bei, und verlaufen mit ihnen in derselben Scheide. Das Verhältniss von Blut- und Gallengefässen wäre somit für jeden Lobulus dasselbe, wie für die ganze Leber in der Pforte.

Kiernan's Ansicht des Gestssbaues der Leber (welche übrigens, bezüglich der Gallengestssursprünge, wie er selbst pag. 769 gesteht, nicht durchaus auf objective Anschauung gegründet ist) wurde allgemein angenommen, und zählt die grössten Männer der Wissenschaft unter ihre Anhänger. Jahre 1843 trat E. H. Weber mit einer neuen Ansicht über den Bau der Leber auf (Müller's Archiv. pag. 303), welche auf Untersuchungen des frischen und injicirten Leberparenchyms gegrundet ist, und welcher mit einigen Modificationen zu folgen, meine eigenen Ersahrungen mich bestimmen. Acini oder Lobuli existiren nicht als von einander abgegrenzte Massentheilchen des Leberparenchyms, die in eine besondere isolirende Bindegewebhülle Die ganze Leber ist vielmehr ein einziger grosser eingeschlossen wären. Acinus, in welchem die Blut- und die Gallengestsse capillare Netze von sast gleichen Durchmessern bilden. Diese Masse genetzter Blut- und Gallengefasse wird allerdings durch zahlreiche Fortsetzungen der Capsula Glissonii durchkreuzt, welche Fortsetzungen jedoch niemals die ganze Lebermasse in aliquote, und wie die Acini anderer Drusen von einander unabhängige Läpp-Die Stämmchen des Gallengesässnetzes liegen in den Lücken chen theilen. Ein Netz ist durch das andere durchgestochten, und des Blutgefässnetzes. sie stehen beide in so inniger Berührung, dass nur kleine Zwischenraume frei bleiben. Weber ging, meiner Ansicht nach, insofern zu weit, dass er die Fortsetzungen der Glisson'schen Kapsel, durch welche das Leberparenchym in kleinere Parzellen getheilt wird, läugnete; was um so leichter möglich war, als man an injicirten Lebern diese Fortsetzungen wirklich nicht sieht. - Nach Müller (Archiv. 1843. pag. 336), in welchem Weber's Ansicht den krästigsten Gegner fand, soll der acinose Bau in der Leber des Schweins und des Eisbären eine unbestreitbare Thatsache sein. Es werden von ihm

auch die Methoden angegeben, die Fortsetzungen der Capsula Glissonii am dünnen Spalten der Hundeleber zu sehen. Ich habe an der Leber des Octodon Cumingii, nach vorausgegangener Maceration, die Kapseln gesehen. Sie existiren ganz gewiss — aber, wie ich überzeugt bin, nicht als Isolatoren der Acini, da die Capillargestsse und die seinsten Gallengestsse Eines sogenannten Acinus mit denselben Gestssen aller umliegenden Acini zusammenhängen. Die Fortsetzungen der Capsula Glissonii scheinen mir nur deshalb das Leberparenchym zu durchziehen, um es mit dehnbaren Balken zu stützen, und seine Brüchigkeit zu vermindern, nicht um Begrenzungen besonderer und selbstständiger Acini zu bilden. Gerlach, dem wir eine äusserst sorgsaltige Bearbeitung dieses Gegenstandes verdanken, spricht sich über die Existenz bindegewebiger Begrenzungsmembranen der einzelnen Lobuli beim Menschen sehr zurückhaltend aus (Gewebelehre pag. 323, seq.).

b. Leberzellen.

Die Grundlage eines Acinus der Leber besteht aus Zellen (Leberzellen). Sie sind die eigentlichen Absonderungsstätten der Galle. Die Zellen sind polygonal, enthalten einen Kern mit 1-2 Kernkörperchen. Zwischen Kern und Hülle der Zelle besindet sich eine zuweilen mit Fetttröpschen (Gallenfett) gemischte, und, besonders in den Lebern von Gelbsüchtigen, dunkel grungelbe Flüssigkeit, welche zahlreiche Körnchen führt. - Die Zellen besitzen ungleiche Grösse. Die der Axe eines Lobulus näher liegenden sind grösser, als die davon entsernteren. Ihr mittlerer Durchmesser beträgt 0,007", jener der Kerne 0,003". Sie sind so um die Axe des Lobulus (Vena centralis) gruppirt, dass die grösseren von ihnen bei der Ansicht eines Querschnittes eines Lobulus, durch liniensormige Aneinanderreihung die Radien desselben bilden, zwischen welchen die kleineren eingeschaltet Zwischen den Zellen finden sich allenthalben Lücken. durch welche die Blut- und Gallengesasse der Lobuli verlausen. Man kann also auch die Gruppirung der Zellen als ein Netz ausfassen.

c. Anfänge der Gallengefässe.

Die von Müller und Krause beschriebenen blinden Ansänge der kleinsten Gallengesasschen habe ich bisher nur an der Obersläche der Leber vom Helix und Arion gesehen, und mit Injectionsstoff gefüllt. Sie sind ausnehmend gross (einige bis 1/2" im Durchmesser stark). Jeder Lobulus enthält nur Ein solches bläschenförmiges Ende. Es ist dieser Fall um so merkwürdiger, als es mir bei Wirbelthieren nie gelingen wollte, blasige Enden der Gallengestässe durch Einspritzung darzustellen, und die Praparate. welche ich besitze, nur netzsormige Verbindungen der Gallengesässe nach-Die Netze haben jedoch das Eigenthümliche, dass sie sich nie durch die ganze Dicke des Acinus hindurch erstrecken, sondern sich mehr an seine Oberstäche halten. Ob sie hier auch als Netze enden, oder sich mit den Zellen (Kölliker), oder mit deren Intercellulargängen in Verbindung setzen (Gerlach), ist noch immer unentschieden. Ich habe netzformige Verbindungen der kleinsten Gallengesasse im Menschen schon im Jahre 1836 durch Injectionen dargestellt. Sie wurden in Berres mikroskopischer Anatomie abgebildet. An der daselbst gegebenen Interpretation, dass die Gallengesasse mit dem Capillargesassystem anastomosirten. habe ich keinen Antheil. Weber's und Kruckenberg's Darstellungen dieser Netze (Müller's Archiv. 1843. Tab. XV. und XVI.) waren für mich somit nicht neu. Meine Ansicht über den Ursprung der Gallengefässe, die aus der Untersuchung injicirter Präparate von 31 Thiergeschlechtern hervorgegangen ist, besteht darin, dass die Ausange der Gallengesasse Netze bilden, die zwischen den Zellen der Acini liegen. Ob diese Netze eigene Wandungen besitzen, oder blos durch die um- und anliegenden Gruppen von Leberzellen begrenzt werden, glaube ich eher im letzteren als ersteren Sinne annehmen zu müssen. Ich habe besondere Wandungen der letzten Gallengesässnetze nie unterscheiden können. — Die Gallengesässnetze eines Acinus sind nicht durch die Glisson'sche Hülle von den Netzen benachbarter Acini isolirt, sondern hängen mit ihnen durch zahlreiche Verbindungskanälchen zusammen. Dasselbe gilt von den Blutgefässen. isolirenden Bindegewebskapseln der Acini, habe ich weder an der Menschenleber, noch an der Amphibien- und Fischleber auslinden können. -Gerlach's Arbeit über die Leber sührte zu einer neuen Ansicht über den Anfang der Gallengestasse im Lobulus. Es sollen nämlich die einen Acinus umstrickenden Gallengesässe, Aeste in den Acinus hineinsenden, welche sich durch Anastomosen vereinigen, und Inseln bilden, in welchen Gruppen mehrerer Leberzellen eingeschlossen sind. Diese Aeste haben deutliche Wandungen, verlieren dieselben aber, je mehr sie gegen die Axe des Acinus vordringen, und gehen zuletzt in die verhältnissmässig weiten Interstitia der Leberzellen über, welche Gerlach Intercellulargänge der Leberacini nennt. Diese Intercellulargange besitzen sonach keine ihnen eigene Wand (wie die ebenso genannten Gänge der Pslanzen), und ihre Grösse und Richtung hängt nur von den Lagerungsverhältnissen der sie unmittelbar begrenzenden Leberzellen ab. Die Ansänge der Gallengestasse wären also die Intercellulargänge der Leberacini.

Eigentlich hat schon Henle (Allgemeine Anatomie. pag. 906) diese Ansicht gehegt, sie jedoch nur als Vermuthung hingestellt. Gerlach (dessen Angaben sich vorzugsweise auf die Schweinsleber beziehen) will die Existenz der Intercellulargänge im Acinus, und den Mangel einer besonderen Begrenzungsmembran derselben, dadurch constatiren, dass, wenn er einen durch die Gallengestsse injicirten Acinus in kleine Scheibchen schnitt, und die Scheibchen unter dem Mikroskope mit dem Compressorium behandelte, die in den fraglichen Gängen enthaltene Injectionsmasse durch den Druck nach allen Seiten aus ein an der wich, was, bei der Existenz membranöser Wandungen, nicht geschehen könnte. Ich frage aber, ob, wenn die fraglichen Gänge wirklich eigene Begrenzungsmembranen haben, nicht dasselbe Ausweichen des Injectionsstosses nach allen Seiten unter dem Compressorium stattsinden muss, da es doch kaum möglich ist, bei der Führung eines Querschnittes die Gallengänge unverletzt an der Schnittsäche zu erhalten.

Weber's Ansicht, nach welcher die feinsten Gallenkanälchen aus linearer Aneinanderreihung der Leberzellen mit Dehiscenz der Zwischenwände entstehen, wird durch die Beobachtung widerlegt, dass unter dem Mikm eine Reihe von Leberzellen durch Behandlung mit verdünnter Kalilösung in vollkommen geschlossene Zellen zerfällt. Kruckenberg und Theile versetzten die Leberzellen an die innere Oberfläche der feinsten Gallenkanälchen, welche aus einer so ungemein feinen Membran bestehen sollen, dass Kruckenberg sie selbst nicht sehen konnte, sondern blos supponirte. Backer will auch diese Membran gesehen haben, deren Existenz auch von Retzius behauptet wird. Dass die Leberzellen nicht an der inneren Oberfläche der Gallengefässanfänge aufsitzen können, beweist der Umstand, dass der Durchmesser der Leberzellen doppelt so gross ist, als jener der kleinsten Gallengefässe.

Der Gedding'sche Fall, wo bei einer Frau, deren Ductus choledochus durch eine Geschwulst unwegsam gemacht wurde, die letzten Enden der Gallengefässchen zu weiten Blinddärmchen ausgedehnt gefunden wurden, würde allerdings, wenn es sichergestellt wäre, dass keine Täuschung stattgefunden, für das Dasein blinder Enden der seinsten Gallengefässe, wenigstens an der Leberoberstäche, sprechen. Allein man hat schon vieles gesehen und beschrieben, was nicht existirt, und ich konnte es nicht dahin bringen, durch Unterbindung des Ductus choledochus bei Fröschen (nach welcher sie mehrere Tage sortleben), mit Galle gesüllte Blindsäckehen an der Oberstäche der Leber ansichtig zu werden. —

Sämmtliche Gallenwege besitzen, so weit sie mit dem Messer verfolgt werden können, Cylinderepithelium. — Im Ductus hepaticus und seinen Verzweigungen konnte Kölliker keine Spur organischer Muskelfasern aussinden. Dagegen existiren diese unzweiselhast im Ductus choledochus und cysticus, obwohl sehr spärlich. In der Gallenblase dagegen bilden sie eine wahre, aus Längen- und Querfasern bestehende Muskelschichte. — In den Wänden aller Gallengänge grösseren Kalibers (bis ½2") finden sich kleine Drüschen eingelagert, welche mit gewöhnlichen traubenförmigen Schleimhautdrüschen vollkommen übereinstimmen.

Da die Absonderung der Galle ununterbrochen von Statten geht, die Gegenwart der Galle im Darmkanale aber nur zur Zeit der Dünndarmverdauung benöthigt wird, so muss am Ausführungsgange der Leber ein Nebenbehälter (Gallenblase) angehängt sein, in welchem die Galle bis zur Zeit der Verdauung außbewahrt wird.

Die Galle (Bilis) ist eine Ausstein von Kali- und Natronsalzen, deren eigenthümliche Säuren (Cholein- und Choleiure) einige Achnlichkeit mit den Pettsäuren haben. Die Galle enthält ausserdem noch zwei Färbstosse, einen grünen und braunen, welche im Darmkanale verharzt werden, und die Farbe der Excremente bedingen. — Durch die Mischung der Galle mit dem Chymus wird die Ausscheidung der nahrhasten Bestandtheile des letzteren auf noch unerforschte Weise befördert, die Aussaugung der Fette des Chylus ermöglicht, die faule Gährung des Chymus verhindert, und die peristaltische Bewegung der Gedärme bethätigt. Ein Theil der Galle wird resorbirt, ein Theil aber mit dem Darmkoth ausgeleert. Sie ist somit kein bloser Auswurfstoss.

Eine aussthrliche, aber dennoch nicht erschöpfende Schilderung des Baues der Leber gab Theile in Rudolph Wagner's Handwürterbuch der Physiologie, Artikel: Leber. Die von Theile beschriebenen Drüsen der Gallengänge in der Leberpforte (pag. 305) sind, ihrer Theilung und ihrer netzsürmigen Verbindungen wegen, wohl nur Plexus der Gallengesasse selbst, welche an der Schlangenleber sehr entwickelt zu sein psiegen. E. H. Webe'r hat an einzelnen Ausläusern dieses in der Pforte der Leber gelegenen Plexus, bläschenartige Endaustreibungen beobachtet. Das Neueste über den Bau der

Leber bieten: Gerlack in seinem Handbuch der Gewebelehre, 2. Aufl. pag. 323 seq. — A. Retsius in Müller's Archiv. 1849. — N. Weja und E. H. Weber in Müller's Archiv. 1851. — Kölliker in seiner Gewebslehre. p. 415, und A. Lereboullet, Mém. sur la structure du foie, etc. Paris. 1853. — Zahlreiche Nerven in den Wandungen der Blutgestsse der Leber wurden von C. H. Jones nachgewiesen. Lond. Med. Gaz. 1848. Juli. pag. 55. — Ueber die Drüschen der Gallengestsse handelt C. Wedl, in den Sitzungsberichten der kais. Acad. 1850. Dec.

§. 237. Bauchspeicheldrüse.

Die Bauchspeicheldrüse, Pancreas (von πας, κρέας, ganz aus Fleisch bestehend, eine nach gegenwärtigen Begriffen ganz unverständliche Benennung), ist eine nach dem Typus der Mundspeicheldrüsen gebaute acinose Druse. Sie spielt bei dem Verdauungsgeschäfte eine grosse Rolle, da die Umwandlung des Amylum der Nahrungsmittel in Traubenzucker, dem Succus pancreaticus (und dem Mundspeichel) obliegt. Sie liegt hinter dem Magen, vor der Pars lumbalis diaphragmatis und der Aorta abdominalis, hat eine Länge von 6" bis 7", und grenzt mit ihrem linken spitzigen Ende (Cauda) an die Milz, mit dem rechten dickeren (Caput) an die concave Seite der Zwölflingerdarmkrümmung. Ihr 0,6"-1" dicker Aussuhrungegang, Ductus pencreaticus s. Wirsungianus, liegt in ihrer Langenaxe, und wird von den Acinis ringsum eingeschlossen. Seine Ausmundungsstelle im Duodenum, liegt dicht unter der Oeffnung des Ductus choledochus, und wird von ihr durch ein kleines Querfaltchen getrennt. Bei grosser Entwicklung des Pankreas, findet sich noch ein zweiter, blos mehreren Acinis des Caput pancreatis angehöriger Aussuhrungsgang, der 1"-11/2" unter dem normalen im Duodenum mündet (Ductus Santorini).

Wenn man das kleine Netz vom oberen Magenbogen abtrennt, und den Magen etwas herabzieht, bekommt man den mittleren Theil des Pankreas zu Gesichte. Um es ganz zu übersehen, muss auch das grosse Netz und das Ligamentum gastro-lineale vom grossen Magenbogen abgelöst, und der Magen (ohne Milz) gegen den Thorax hinaufgeschlagen werden. Man sieht das Pankreas, bedeckt vom hinteren Blatte des Netzbeutels, quer vor der Wirbelsäule liegen, und sich von der Milz bis in die Curvatur des Duodenum erstrecken. Präparirt man nun den Hiatus aortious des Zwerchfells, vor welchem das Pankreas vorüberläuft, so sieht man aus ihm eine kurze, aber starke unpaarige Arterie hervorkommen — Arteria coeliaca, welche sich, sobald sie zwischen den Schenkeln des Hiatus herausgetreten, in drei Aeste theilt: Arteria hepatica, Arteria coronaria ventriculi superior sinistra (für den kleinen Magenbogen), und Arteria lienalis. Letztere zieht am oberen Rande des Pankreas mit der Vena splenica (welche unter ihr liegt) zur Milz. Am unteren Rande des Pankreas tritt der zweite unpaarige Aortenast — Arteria mesenterica superior — in das Mesenterium des Dünndarms ein. Werden nun einige von den oberstächlich gelegenen Acinis des Pankreas behutsam weggenommen, so braucht man damit nicht tief zu gehen, um den in der Axe der Drüse verlaufenden, weissen, dünnhäutigen Ductus pancreaticus zu finden, welchen man öffnet, eine Sonde gegen das Duodenum einleitet, und die Mündung des Ganges, unmittelbar unter jener des Ductus choledochus, auffindet. In seltenen Fällen haben der Ductus pancreaticus und der Ductus choledochus eine gemeinschaftliche Einmündungsöffnung. — Der Ductus Wirsungianus besitzt keine Spur von organischen Muskelfasern.

§. 238. Milz.

Die Milz (Lien, Splen), ein drusiges, ungemein gestassreiches Gebilde ohne Aussührungsgang und von räthselhaster Bedeutung, liegt neben dem Fundus ventriculi, im linken Hypochondrium. Sie ist von braun- oder violetrother Farbe, hat die Grösse einer Faust, die Gestalt einer Kaffeebohne, ein Gewicht von 14-18 Loth, und eine teigige Consistenz. Ihre aussere, zugleich obere, convexe Fläche, liegt an der Concavität des Rippentheils des Zwerchsells; ihre innere, dem Magen zugewendete Fläche, wird durch einen auf einem erhabenen Rücken angebrachten Längenschnitt (Hilus ·lienis) in zwei schwach concave Facetten getrennt, von denen nur die vordere, grössere, an den Fundus ventriculi ansteht, die hintere, kleinere, mit dem linken Lumbaltheil des Zwerchfells in Contact ist. Ihr vorderer Rand ist etwas schärfer als der hintere, und gegen das untere Ende mit unconstanten Kerben eingeschnitten, deren eine so tief werden kann, dass ein Theil der Milz dadurch vollkommen, als sogenannte Nebenmilz, Lien succenturiatus, abgeschnitten wird. Ihr Peritonealüberzug stammt als Ligamentum gastro-lienale vom Magengrunde her, und hängt oben durch eine Duplicatur (Ligamentum phrenico-lienale) mit jenem des Zwerchfells zusammen. Unter der Peritonealhaut, und sest mit ihr verbunden, folgt die sibrüse Tunica propria lienis, welche am Hilus in das Milzparenchym eindringt, und Scheiden für die daselbst wechselnden Blutgefässe bildet. Sucht man sie von der Oberfläche der Milz abzuziehen, so gelingt dieses nur schwer und unvollkommen, indem eine Unzahl kleiner fibröser Fortsatze derselben, welche viele elastische Fasern, und nach Kölliker's Entdeckung bei Thieren glatte Muskelfasern enthalten, wie Balken (Trabeculae lienis) in das weiche Milzparenchym eindringen. Aehnliche Balken gehen auch von der die Blutgestasse begleitenden Scheide ab, und verbinden sie mit ersteren. Macerirt man die Milz, schneidet sie an, und knetet sie unter Wasser, so entfernt man ihre weiche Pulpa, und es bleibt dann nur ein fibröses Gebälke, als Skelet des Organs, zurück, dessen leere Räume und Lücken mit einem Badschwamme Aehnlichkeit haben. - R. Wagner hat die Contractilität des Balkengewebes der Milz durch Anwendung des magneto-elektrischen Rotationsapparates festgestellt.

Oeffnet man eine möglichst frische Milz, so findet man die Zwischen-

räume ihres Balkengewebes mit einer dickstüssigen, braunrothen Masse gefullt (Pulpa lienis), in welcher man mit Hilfe des Mikroskops folgende Bestandtheile unterscheidet: a. Elementarkörner, wie sie in allen Blastemen vorkommen; B. Zellenkerne, in grosser Anzahl, und mit oder ohne Kernkörperchen; v. Zellen, in sehr geringer Menge, mit 1-2 Kernen, und 0.004"-0.005" Durchmesser; d. Blutkörperchen in grosser Menge, und in den mannigfaltigsten Umwandlungen begriffen, indem man sie kleiner und dunkler, als gewöhnlich, auch in Häuschen zusammengeballt, ja selbst, obwohl selten, von einer Zellenmembran umschlossen findet, in welcher sie zu Pigmentkörnern zerfallen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Blutkörperchen nur zufällig durch Zerreissung von Blutgefässen hieher gelangten. e. Eigenthümlich gestaltete, spindelförmige Fasern, mit wellenförmig gebogenen Enden, und einer bauchigen Austreibung in der Mitte. welche einen rundlichen Kern einschliesst. Diese Fasern finden sich theils frei, theils zusammengerollt, und von einer Zellenwand umhüllt. Ihre Bedeutung ist noch räthselhaft. Kölliker hat sie anfangs für glatte Muskelfasern gehalten, bis er ihre Einkapselung in Zellen beobachtete, was bei glatten Muskelfasern niemals vorkommt.

Vergleicht man die Bestandtheile der Lymphe (§. 56) und den Inhalt der geschlossenen Peyer'schen Follikel (§. 232) mit α , β und γ , so findet sich zwischen beiden die grösste Uebereinstimmung. Da nun Gerlach nachgewiesen haben will, dass an einem ausgewachsenen Stückchen Milzparenchym, nebst den Trabeculis und den Blutgesässen, zahlreiche Lymphgesässe vorkommen, welche den grössten Theil des Präparates ausmachen, so ist es ihm höchst wahrscheinlich, dass α , β und γ , nicht, wie man bisher glaubte, frei in den Maschen des Balkengewebes der Milz liegen, sondern den Inhalt obiger Lymphgesässe bilden. Allein die Lymphgesässe in der Pulpa der Milz hat ausser Gerlach noch Niemand gesehen, und keinem Anatomen ist es bis jetzt gelungen, andere als subperitoneale Lymphgesässe der Milz darzustellen.

Ein ferneres, und, wie es scheint, für die Function der Milz höchst wichtiges Vorkommniss bilden die Malpighischen Körperchen. Man findet diese weissen, 0,2" grossen Bläschen nur in der Milz gesunder, plötzlich verstorbener Menschen. (Bei den Thieren sind sie constante Erscheinungen, und bei Wiederkäuern, insonderheit beim Schafe, sehr gross.) oft sind sie zu drei bis acht gehäuft, sitzen auf den fibrösen Scheiden der feineren Blutgefässe auf, oder hängen an ihnen mittelst eines besonderen Stieles, welcher immer eine kleine Arterie enthält. Die Wand des Bläschens besteht aus denselben faserigen Elementen, aus denen die Scheide, auf welcher sie aufsitzen, zusammengesetzt ist. Mehrere Autoren betrachten deshalb die Bläschen als Ausbuchtungen dieser Gefässscheide. Der Inhalt der Bläschen ist eine albuminöse Flüssigkeit mit denselben Elementarkörnchen, Zellenkernen, und Zellen, welche in der Pulpa lienis gefunden wurden. Die Zellen, welche Blutkörperchen umschliessen, überwiegen an Menge. Ein feines Capillargefässnetz durchzieht nach Gerlach die Höhle

der Bläschen. Ob die Blutkörperchen in diesen Zellen entstehen, oder ob das Umschlossenwerden derselben durch eine Zellenwand als erster Schritt ihrer rückschreitenden Metamorphose, ihres Zerfallens zu deuten sei, ist noch nicht ausgemacht. Letztere Ansicht hat durch die Beobachtung, dass auch in anderen Organen unter pathologischen Bedingungen Blutkürperchen von Zellen umschlossen und in körniges Pigment umgebildet werden, ein gewisses Uebergewicht über erstere.

Wie sich die Malpighischen Bläschen zu den Lymphgesassen verhalten, ist unbekannt. Dass sie mit ihnen irgend welchen Zusammenhang besitzen, wird nur vermuthet, - gesehen hat ihn Niemand. Gerlach erklärt sie mit Entschiedenheit für kleine Lymphdrusen. — Die Arterie der Milz ist durch ihr, im Verhältniss zur geringen Grösse der Milz, grosses Caliber, ausgezeichnet. Ihre seineren Verästlungen treten mit den Malpighischen Bläschen in die früher erwähnte Beziehung, streisen an den Bläschen vorbei, und zerfallen in zierliche Büschel seinster Reiser, welche in die Pulpa eingehen, und deren unmittelbarer Uebergang in die Venen angenommen wird, aber das Wie noch nicht bekannt ist. - Die Milzvene übertrifft die Arterie bedeutend an Volumen. Sie zerfällt nicht allmälig in kleinere Zweige, sondern bleibt ein starker Stamm, und nimmt unter rechten Winkeln seine Nebenäste von allen Seiten her auf, so dass ihre innere Oberfläche siebförmig durchlöchert erscheint (Stigmeta Malpighii). Erweiterungen, oder gar Ausbuchtungen, von welchen ältere und neuere Anatomen als von einer ausgemachten Sache sprechen, kommen weder am Stamme, noch an den feinen Nebenästen der Milzvene vor.

Trotz unserer ziemlich genauen Kenntniss der Milzstructur, ist das Organ dennoch für uns, was es zu Galen's Zeiten war: ein Mysterii plenum organon. Es bleibt den Fortschritten der Wissenschaft überlassen, zu erklären, warum bei den oben berührten Vorgängen in den Malpighischen Milzbläschen und in der Pulpa (seien sie auf Bildung neuer, oder Auflösung alter Blutsphären hinzielend), die Exstirpation der Milz kein absolut tödtlicher Eingriff ist.

Ueber die Verwandlung der Blutsphären in den Zellen der Pulpa und in den Malpighischen Bläschen sind folgende Schristen nachzusehen.

Für die Rückbildung: Kölliker, über Bau und Verrichtung der Milz, in den Mittheilungen der Zürcher naturforsch. Gesellschaft, 1847, und dessen Sendschreiben: über blutkörperchenhaltige Zellen, in der Zeitschrift für wissenschaft. Zoologie. 1. Bd. pag. 260. — Landis, Beiträge zur Lehre über die Verrichtungen der Milz. Zürich, 1847. — Ecker, in Henle's und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. VI. Bd. p. 261. und in dem Artikel Blutdrüsen, in R. Wagner's Handwörterbuch. — Remak, in Müller's Archiv. 1851. pag. 480.

Gegen die Rückbildung: Gerlach, in Henle's und Pseuffer's Zeitschrift. VII. Bd. pag. 78.

Ueber die glatten Muskelfasern der Milz siehe: Mazon, in Müller's Archiv. 1854. pag. 25.

§. 239. Bauchfell.

Das Bauchfell, Peritoneum (nach wörtlicher Uebersetzung seiner griechischen Wurzel: περιτείνω, die Umspannungshaut der Unterleihe-

eingeweide), kann als ein zusammenhängendes Ganzes erst dann mit Vortheil studirt werden, wenn alle Einzelheiten der Lage und Verbindung der Abdominalorgane bekannt geworden sind.

In die Klasse der serösen Häute gehörend (deren umfangreichste und complicirteste sie ist), bildet sie einen vollkommen geschlossenen Sack, der die innere Oberfläche der Bauch- und Beckenwandungen überzieht (Peritoneum parietale), und durch die Eingeweide, welche sich in den Sack hineindrängen, saltenartig eingestülpt wird (Peritoneum viscerale). Nur im weiblichen Geschlechte hat das Peritoneum zwei Oeffnungen: die Bauchmündungen der Tubae Ballopianae. Die einander zugekehrte innere Oberfläche des Peritoneum parietale, und die aussere des Peritoneum viscerale. sind glatt, seucht und schlüpsrig, und mit einem Plattenepithelium bedeckt. dessen kernhaltige flache Zellen 0,01"-0,02" Durchmesser haben. Beide Oberflächen sind durch den Druck, den die Bauchpresse auf die Unterleibeorgane ausübt, in inniger Berührung; es bleibt nirgends ein Zwischenraum. der sich erst bildet, wenn bei Bauchwassersuchten oder Verwundungen. Wasser oder Blut in die Höhle des Peritoneums ergossen wird. Die Glätte der freien Flächen erleichtert das Hin- und Hergleiten der beweglichen Eingeweide, welches durch ihre Füllung und Entleerung, ihren peristakischen Motus, und ihre Verschiebung bei den Athmungsbewegungen bewirkt wird. Die aussere Flache des Peritoneum parietale, und die innere des Peritoneum viscerale, sind durch Bindegewebe (Textus cellulosus subperitonealis, auch subserosus), an die Bauchwand und an die Eingeweide gehestet, oder, wie bei den Mesenteriis und Omentis, unter einander verklebt. Dieses Bindegewebe des Peritoneum parietale ist in der unteren Abtheilung der Bauchhöhle immer fettreicher, als in der oberen. Einzelne Fettklumpen desselben können, wenn sie in der Nähe des Leisten- oder Schenkelkanals, oder des Nabelringes, liegen, durch diese nach aussen dringen, und Bruchgeschwülste vorspiegeln (Herniae adiposae s. Littrianae), welche. wenn sie grösser werden, das Peritoneum beutelartig nach sich ziehen, und secundar eine wahre Hernie veranlassen.

Der Verlauf des Peritoneum parietale ist in der Beckenhöhle beider Geschlechter ein verschiedener. Im Manne steigt es vom Nabel herab, um den Scheitel und die hintere Wand der Harnblase zu überziehen, macht dann einen Sprung zur vorderen Fläche des Mastdarms, an welcher es wieder zur hinteren Wand der Bauchhöhle heraufläuft. Zwischen Harnblase und Mastdarm bildet das Peritoneum somit einen Blindsack (Excevatio vesico-rectalis), welcher einige Schlingen des Intestinum ileum enthält, und dessen Grund sich in eine quere halbmondförmige Falte erhebt, welche stärker vorspringt, wenn man die Blase nach vorn, und den Mastdarm nach hinten drückt, und Plica semilunaris Douglasii genannt wird. Beim Weibe schiebt sich der Uterus mit seinen Annexis (Tubae, Ovaria, Ligamenta rotunda) zwischen Harnblase und Mastdarm von unten herein, hebt den peritonealen Beckenüberzug faltig auf, und theilt die Excavatio

vesico-rectalis in zwei kleinere, deren vordere: Excavatio vesico-uterina, deren hintere (viel tiefere): Excapatio utero-rectalis genannt wird. -Die vertrockneten Nabelarterien (Chordas umbilicales), und der zwischen ihnen liegende, vom Blasenscheitel zum Nabel ziehende Rest des Urachus, werden in Falten der vorderen Peritonealwand eingehüllt, und die vom Poupart'schen Bande zur hinteren Fläche des geraden Bauchmuskels schräg aussteigende Arteria epigastrica inferior, liegt in einer ähnlichen, aber nicht immer deutlich ausgeprägten Bauchsellsalte - Plica epigastrica. An der äusseren Seite der Plica epigastrica geht bei Embryonen männlichen Geschlechts ein sackförmiger Fortsatz des Bauchfells durch den Leistenkanal aus der Bauchböhle bis in den Grund des Hodensacks hinab, wo er durch den Hoden eingestülpt erscheint, wie der grosse Bauchfellsack durch die einzelnen Eingeweide. Nach der Geburt verwächst dieser sackformige Fortsatz, vom Leistenkanale an, gegen den Hoden hinab. Die Verwachsung hört aber etwas oberhalb des Hoden auf, und schreitet nicht weiter. Der Hode muss somit beim Erwachsenen in einem doppelten serüsen Beutel liegen, dessen ausserer Theil ihn nur einhüllt, ohne mit ihm zu verwachsen, dessen innerer dagegen an seine Oberstäche angewachsen ist, - wie das Peritoneum viscerale überhaupt an die Eingeweide, die es überzieht. Dieses ist die Tunica vaginalis propria testis. Diejenige Stelle des Bauchsells, welche die Bauchöffnung des Leistenkanals verdeckt, und von welcher aus sich beim Embryo die Tunica vaginalis propria in den Hodensack vordrängte, führt im Erwachsenen den Namen Fovea inquinalis externa, während die an der inneren Seite der Plica epigastrica besindliche (der ausseren Oeffnung des Leistenkanals vis-a-vis gelegene) Vertiefung, Foves inquinalis interna heisst. §. 161 und 162. Oft findet man das Anfangsstück der Tunica vaginalis propria auch beim Erwachsenen noch ein wenig offen, wodurch, wie ich glaube, die Disposition zur Entstehung eines äusseren Leistenbruchs gegeben ist.

Auch bei weiblichen Embryonen sieht man einen kegelförmigen, aber viel engeren und kürzeren Fortsatz des Peritoneum, in den Leistenkanal eindringen, und daselbst blind endigen. Dieses ist das sogenannte Diverticulum Nuckii.

Von der vorderen Bauchwand bildet sich nur Eine Peritonealeinstülpung, welche das Ligamentum umbilicale hepatis aufnimmt, und längs des Diaphragma weiter ziehend, als Ligamentum suspensorium hepatis beschrieben wurde. Dieses wird zum serösen Ueberzuge der Leber, dieser zum kleinen Netz und Ligamentum hepato-duodenale, diese beiden zum serösen Ueberzuge des Magens und des Duodenum, und zuletzt zum grossen Netz, welches an seinem unteren Rande sich umschlägt, gegen den Quergrimmdarm heraufläuft, und ihn umfassend als Mesocolon zur Wirbelsäule zieht, wo seine beiden Blätter neuerdings auseinander weichen, um das Pankreas aufzunehmen. Das vordere Blatt wird dann zur hinteren Wand der hinter dem Magen liegenden Bursa omentalis, zu welcher das Winslow'sche Loch

(zwischen Ligamentum hepato-duodenale und duodeno-renale) der Zugang war, das hintere Blatt beugt sich aber, vom unteren Rande des Pankreas, gleich wieder nach abwärts, um mit dem Peritoneum parietale der hinteren Bauchwand zu verschmelzen.

Die Anatomie der Gekröse ist aus dem, was bei den betreffenden Darmstücken gesagt wurde, klar. Sie sind nicht blos die Faltungen des Peritoneums, die durch das Vorrücken der Gedärme nachgezogen werden, und die somit dieselbe Richtung, wie die Darmstücke haben, zu welchen sie gehen, sondern zugleich die Heerstrassen, auf welchen Blutgefässe und Nerven zum Darmkanale gelangen. Spannt man das Mesenterium des Dünndarms an, und schneidet man, z. B. sein linkes Blatt an der Wirbelsäule durch, und reisst es, gegen den Darm hin, von dem rechten Blatte los, so sieht man, wie die Wurzel des Mesenteriums, die Aorta zwischen ihre beiden Blätter fasst, und wie die Arteria mesenterica superior et inferior, so wie die Zweige, welche die Vena mesenterica zusammensetzen, ferner die Nerven und Lymphgefässe des Darms mit ihren Drüsen (Glandulae mesentericae) zwischen den Blättern des Mesenteriums verlaufen.

Ich weiss aus Erfahrung, wie schwer es dem Ansanger wird, sich von einer so complicirten Membran, wie das Bauchsell ist, eine befriedigende Vorstellung zu bilden. Sehr häusig ist die ursprüngliche Reinheit seines Verlauses durch abnorme Adhäsionen entstellt, welche sich in Folge von Bauchsellentzundungen bildeten, und leicht für normale Duplicaturen gehalten werden, wo dann der Besund in der Leiche mit der Darstellung des Handbuches nicht übereinstimmt. Am zweckmässigsten ist es, das Peritoneum an Kindesleichen zu untersuchen, und selbst dann wird die Bildung der Netze, der gleich zu erwähnenden Bursa omentalis, und die Verbindung des Magens mit dem Colon transversum noch immer ein Räthsel bleiben, zu welchem nur die Entwicklungsgeschichte des Darmkanals den Schlüssel giebt.

Wenn man das Bauchfell blos an Leichen untersucht, deren Darmkanal bereits in jenen Verhältnissen sich befindet, die durchs ganze Leben bleibend verharren, ist es unmöglich, sich eine Vorstellung davon zu machen. warum das grosse Netz auf Umwegen an das Colon transversum tritt, und wie so es zur Bildung einer Höhle (Bursa omentalis) hinter dem Magen komme, welche durch das Foramen Winslovii mit der übrigen Bauchhöhle communicirt. Durch die Untersuchungen Müller's (Ueber den Ursprung der Netze beim Menschen, in Meckel's Archiv für Anat. und Phys. 1830. pag. 395) sind diese Punkte auf die befriedigendste Weise erörtert. Im vier- und fünswöchentlichen Embryo nämlich liegt der Magen, der eine einfache, halbmondförmige Erweiterung des Oesophagus darstellt, noch nicht quer, sondern senkrecht vor der Wirbelsäule. Der Darm tritt vollkommen geradlinig vom Magen in den Nabelstrang, wo er umbeugt, um ebenso gerade zum Aster herabzusteigen. Die grosse Curvatur des Magens sieht nach links, die kleine nach rechts. An die kleine Curvatur setzt sich das von der Leber herabkommende Omentum minus fest. Ein Omentum majus fehlt noch. Dagegen inserirt sich an die linke grosse Magencurvatur ein

Mesenterium — wie an den übrigen Darmkanal. Dieses Magen-Mesenterium (Mesogastrium Mülleri) geht von der Wirbelsäule aus, und wendet sich sleich nach seinem Ursprunge nach links, um die linke Curvatura ventriculi zu erreichen. Es bleibt also zwischen dem Mesogastrium, und der hinteren Magenwand ein dreieckiger Raum frei, dessen Kante nach links, dessen Basis nach rechts sieht. Diese Basis ist ihrer ganzen Länge nach offen, und stellt somit den Eingang jenes dreieckigen Raumes dar (zukunftiges Foramen Winslovii). Nach und nach stellt sich der Magen aus der senkrechten Richtung in die quere. Sein Pylorus, der früher die tiefste Stelle des Magens war, steigt auf; das Omentum minus wird kürzer, und die grosse Eingangsöffnung des hinter dem Magen befindlichen leeren Raumes, wird auf die gewöhnlichen Dimensionen eines Foramen Winslovii reducirt. Das Mesogastrium folgt dieser Lagenanderung des Magens, und stellt sich ebenfalls quer, buchtet sich aber zugleich nach unten aus, und hangt als laxe Falte vor dem übrigen Darmkanale herab. - Gleichzeitig macht das vom Nabelstrang zum After laufende Darmstück und sein Mesenterium, eine Krummung nach oben, welche die Elemente zum Colon ascendens, transversum und descendens enthält. Die laxe Falte des Mesogastrium besteht aus einem vorderen, absteigenden (vom grossen Magenbogen kommenden), und einem hinteren, aufsteigenden (zur ursprünglichen Entstehungsstelle des Mesogastriums zurücklaufenden), doppelblätterigen Stücke. Letzteres läuft über das Colon transversum zurück zur Wirbelsäule, und ist mit dem Mesocolon transversum, auf welchem es liegt, parallel. In diesem Zustande bleibt die Sache bei den Säugethieren, wo das Omentum majus mit dem Colon transversum keine Verbindung hat, durch das ganze Leben hindurch. Beim Menschen dagegen verwächst der zurticklausende Theil des Omenti majoris mit der oberen Platte des Mesocolon transversum, oder, als österer Fall, beide Blätter des Omentum umsassen das Colon transversum, und gehen somit in die beiden Blätter des Mesocolon transversum über.

Eine genaue Zusammenstellung aller hieher gehörigen Data enthält Hennecke: Comment. de functionibus omentorum in corp. hum. Cum. tab. VI. Gottingae, 1836. 4. — W. Gruber, Beiträge zur Kenntniss des Bauchfells, in der Zeitschrist der Wiener Aerzte. 1847/48. II. pag. 432 (beschreibt ein Ligamentum mesenterio-mesocolicum, welches an der Entstehung gewisser innerer Darmeinschnütrungen Antheil hat).

II. Respirationsorgan.

§. 240. Begriff und Eintheilung des Respirationsorgans.

Die atmosphärische Lust ist für die Erhaltung des Lebens eben so unerlässlich nothwendig, wie für die Erhaltung eines Verbrennungsprocesses. In beiden Fällen wirkt sie durch ihren Oxygengehalt, das Azot hat dabei keinen Antheil. Die Organe, welche die atmosphärische Lust in den Körper leiten, und die Wechselwirkung des Oxygens mit dem Blute vermitteln, sind die Respirationsorgane. Sie nehmen die obere Kürperhälste (Kopf, Hals, Brust) ein, und erstrecken sich nicht über das Zwerchfell hinaus. Soll Luft in den Körper einströmen, so muss ein leerer Raum in ihm gebildet werden. Dieser wird erhalten durch Vergrösserung eines schon bestehenden --- der Brusthöhle. Hat die Lust ihr Oxygen abgegeben, und sich dafür mit anderen Stoffen geschwängert, welche aus dem Leibe entfernt werden sollen, so muss sie wieder herausgetrieben werden, durch Verengerung der Brusthöhle. Bewegung spielt somit eine Hauptrolle bei dem Respirationsgeschäfte, und das Aus- oder Einströmen der Lust ist nur die nothwendige physikalische Folge der durch Muskelbewegung bedingten Verengerung oder Erweiterung des Brustkastens. Die Muskeln sind also der active Theil der Respirationsorgane. Die Lust strömt nicht in die Höhle des Brustkastens ein, sondern verbreitet sich in einem schwammigen, expansiblen Organe, dessen Oberfläche der inneren Oberfläche des Thorax genau anliegt, sich mit ihm vergrössert und verkleinert, und zugleich vom Herzen jene Masse Blutes erhält, welche die belebende Einwirkung der Atmosphäre erfahren soll. Dieses Organ ist die Lunge. Bevor die Lust in die Lunge gelangt, muss sie beim Einathmen durch die Nasenhöhle, den Rachen, den Kehlkopf, und die Luftröhre passiren, und denselben Weg wieder zurücknehmen beim Ausathmen. - Charakteristisch für die Lustwege ist es, dass sich in ihrer ganzen Ausdehnung eine Schichte elastischen Gewebes unter ihrem Schleimhautüberzuge findet, welche im Kehlkopfe am ansehnlichsten ist, in der Luströhre abnimmt, aber selbst an den kleinsten Verästlungen derselben nicht gänzlich schwindet.

§. 241. Kehlkopf.

Der Kehlkopf, Larynx (λαρύνω, schreien), ist ein aus beweglichen Knorpeln zusammengesetztes, hohles Gerüste, welches mit einer Fortsetzung der Rachenschleimhaut ausgekleidet wird. Er stellt die Einund Ausgangspforte der Luftröhre dar, und bildet durch Schwingungen der an seiner inneren Oberstäche besestigten Bänder die Stimme.

Er liegt an der vorderen Seite des Halses, zwischen dem Zungenbein und der Luströhre, grenzt nach hinten an den Schlundkopf, nach vorn an die Integumente des Halses, welche er beim männlichen Geschlechte stark wölbt, und jenen Vorsprung erzeugt, der den Namen des Adamsapfels (besser Prominentia laryngea s. Nodus gutturis) führt, nach oben an die Zungenwurzel, nach unten an die Luströhre, seitwärts an die grossen Gefässe des Halses.

1. Knorpeln des Kehlkopfs.

a) Der Schildknorpel, Cartilago thyreoidea (θυρεός-είδος, schildformig), besteht aus zwei, unter einem mehr weniger rechten Winkel nach vorn zusammenstossenden, viereckigen Platten, deren äussere Fläche eine schiese rauhe Linie zur Anhestung des Musculus sterno-thyreoideus, thyreo-hyoideus und thyreo-pharyngeus besitzt, deren innere Fläche durchaus glatt und von der Schleimhaut des Kehlkops bedeckt ist. Der obere Rand jeder Platte ist nach oben convex, und bildet mit dem der anderen Seite die Incisura thyreoidea superior. Der untere Rand ist der kürzeste, und S-sormig geschweißt, und bildet mit demselben Rande der anderen Schildknorpelplatte die Incisura thyreoidea inserior. Der hintere, sast senkrecht stehende, verlängert sich nach oben und unten in die Hörner des Schildknorpels (Cornu superius s. longum, et inserius s. breve). Am oberen Rande sindet sich ausnahmsweise eine Oessnung, durch welche die Arteria laryngea in den Kehlkops tritt.

- b) Der Ringknorpel, Cartilago cricoidea (xqlxog, Ring, woraus, durch Versetzung des q, circus und circulus gebildet wird), liegt unter dem Schildknorpel, dessen untere Hörner ihn zwischen sich fassen. Er hat die Gestalt eines horizontal liegenden Siegelringes, dessen schmaler Reif nach vorn, dessen Platte nach hinten gerichtet ist. Seine äussere Fläche besitzt zu beiden Seiten eine kleine Gelenksläche, zur Articulation mit den unteren Hörnern des Schildknorpels, die innere ist mit der Kehlkopfschleimhaut überzogen. Sein unterer Rand verbindet sich durch das Ligamentum crico-tracheale mit dem ersten Luströhrenknorpel, sein oberer Rand hat am hinteren Halbring zwei ovale, convexe Gelenkslächen, auf welchen die Bases der Giessbeckenknorpel articuliren.
- c) Der rechte und linke Giessbeckenknorpel, Cartilago arytaenoidea (ἀρύταινα, Giessbecken), sind dreikantige Pyramiden, deren Basis auf den Gelenkslächen des oberen Randes des Ringknorpels aufsitzt. deren Spitze etwas nach hinten gekrummt ist. Die drei Flächen stehen so. dass die innere, eben und gerade, der der anderen Seite zugewendet ist, die äussere, wellenformig gebogene, nach vorn und aussen, die hintere, concave, gegen die Wirbelsäule sieht; alle drei Flächen sind mit Schleimhaut bekleidet. Der Ueberzug der inneren Fläche stammt von der Kehlkopshöhle her, jener der hinteren und ausseren gehört dem Pharynx an. Die Ränder werden somit ein vorderer, ein hinterer äusserer, und hinterer innerer sein. Die vordere Ecke der Basis verlängert sich zum stumpsen Stimmbandfortsatz, Processus vocalis, die aussere zum stärkeren und etwas nach hinten gerichteten Muskelfortsatz, Processus muscularis. Auf der Spitze jeder Cartilago arytaenoidea findet sich, durch Bandsasern mit ihr vereinigt, die dreiseitige Cartilago Santoriniana s. Corniculum, und an der vorderen Kante sitzt öfters ein stabförmiger, nach vorn gerichteter Knorpel auf — die Cartilago Wrisbergiana.
- d) Der Kehldeckel, Epiglottis, hat die Gestalt einer Hundszunge, liegt zwischen Zungenwurzel und Schildknorpel, und stellt eine bewegliche, in hohem Grade elastische Klappe vor, deren freier abgerundeter Rand nach oben und hinten, deren dicke Spitze nach unten und vorn, gegen

die Incisura des oberen Schildknorpelrandes gerichtet ist, wo sie durch das Ligamentum thyreo-epiglotticum besestigt wird.

2. Bander der Kehlkopfknorpel.

Man zählt wahre und salsche Kehlkopsbänder. Erstere bestehen aus Sehnensasern, letztere sind Schleimhautduplicaturen, welche nur die Form, aber nicht den Bau von Bändern besitzen.

A. Wahre Kehlkopfbänder.

Sie dienen entweder zur Verbindung des Kehlkopfs mit den darüber und darunter liegenden Gebilden, oder zur Vereinigung einzelner Knorpel. Zu ersteren gehören:

- a) Die Ligamenta thyreo-hyoidea, deren drei vorkommen, ein medium und zwei lateralia. Das medium ist breit, füllt den Raum zwischen oberem Schildknorpelrande und Zungenbein aus, und führt, seiner Breite wegen, auch den Namen Membrana obturatoria laryngis. Die beiden lateralia verbinden die oberen Hörner des Schildknorpels mit den grossen Zungenbeinhörnern, sind rundlich, strangförmig, und enthalten häufig Faserknorpelkerne (Corpuscula triticea).
- b) Das Ligamentum crico-tracheale, zwischen unterem Ringknorpelrande und oberem Rande des ersten Luströhrenknorpels.

Zu letzteren werden gerechnet:

- α) Der Ringknorpel wird mit den unteren Schildknorpelhörnern durch fibröse Kapselhäute und deren Verstärkungsfasern verbunden, Ligamente crico-thyreoidea lateralia.
- β) Der obere Ringknorpelrand mit dem unteren Schildknorpelrande durch das Ligamentum crico-thyreoideum medium s. conicum, welches vorzugsweise aus elastischen Fasern besteht, und deshalb die charakteristische gelbe Farbe der Ligamenta flava besitzt.
- γ) Der obere Rand des hinteren Halbringes der Cartilago cricoidea mit den Bases der Giessbeckenknorpel durch fibröse Kapseln und Verstärkungsbänder: Ligamenta crico-arytaenoidea.
- d) Die vordere Fläche der Epiglottis mit der hinteren Seite des Zungenbeinkörpers durch das starke Ligamentum hyo-epiglotticum, und
- e) Die untere schmale Spitze der Epiglottis mit der Incisura cartileginis thyreoideae durch das ebenso starke Ligamentum thyreo-epiglotticum. Alle diese Bänder enthalten elastische Fasern.
 - B. Falsche Kehlkopfbänder (Schleimhautbänder).

Sie sind Schleimhautfalten, welche elastische Fasern oder dünne Muskelbundel einschliessen.

- 1. Verfolgt man die Schleimhaut der Zungenwurzel nach rück- und abwärts, so sieht man sie zur vorderen Fläche der Epiglottis sich in drei Fältchen erheben, welche Ligamenta glosso-epiglottica genannt werden.
 - 2. Der Schleimhautüberzug des Kehldeckels wendet sich von den Lehrbuch der Anstomie. 5. Aufl.

Seitenrändern der Epiglottis zur Spitze der Giessbeckenknorpel hin, und erzeugt dadurch die Ligamenta epiglottideo-arytaenoidea, welche den Aditus laryngis zwischen sich frei lassen.

- 3. Von der Seite des Kehldeckels zum Arcus palato-pharyngeus des weichen Gaumens zieht sich sehr oft eine Schleimhautfalte hinauf, welche unter spitzigem Winkel mit dem Arcus palato-pharyngeus verschmilzt.
 - F. Betz hat diese Schleimhautfalte als Ligamentum epiglottico-palatinum beschrieben (Archiv für physiolog. Heilkunde. 1849. p. 44). Er nennt sie auch, da ihr oberes Ende zwischen dem vorderen und hinteren Gaumenbogen liegt, Arcus palatinus medius. Das Band ist insofern nicht ohne Interesse, als zwischen ihm und dem Arcus palato-pharyngeus eine Längengrube liegt (Fovea navicularis), in welcher fremde Körper beim Verschlingen stecken bleiben können.
- 4. Die wichtigsten falschen Bänder finden sich im Inneren des Kehlkopfs. Hier bildet der Schleimhautüberzug beiderseits zwei über einander liegende Falten, welche vom Winkel des Schildknorpels horizontal nach rückwärts zur Cartilago arytaenoidea ziehen, und Ligamenta thyreo-arytaenoidea heissen. Das obere ist dicker, wulstiger, aber weniger vorspringend als das untere, welches breiter und schärfer gerandet erscheint. Das obere besestigt sich an den vorderen Winkel, das untere an den Processus Zwischen beiden Bändern buchtet vocalis der Cartilago arytaenoidea sich die Schleimhaut zu einer drüsenreichen Grube (Ventriculus Morgagni) aus. Die Ligamenta thyreo-arytaenoidea der rechten und linken Kehlkopfhälfte berühren sich mit ihren inneren Rändern nicht. Es bleibt eine Oeffnung zwischen ihnen frei, welche für die wenig vorspringenden Ligamenta thyreo-arytaenoidea superiora grösser, für die breiteren Ligamenta thyreo-arytaenoidea inferiora enger, und schlitz- oder spaltförmig ausfallen muss. Diese Oeffnung heisst für die oberen Bänder Glottis spuria, für die unteren Glottis vera - falsche und wahre Stimmritze. Die Bänder selbst können, statt der langen, aus ihrem Ursprung und Ende zusammengesetzten Namen: Ligamenta thyreo-arytaenoidea superiora et inferiora, einfach Ligamenta glottidis verae et spuriae (Stimmritzenbänder) heissen. Es ist durch Experimente bewiesen, dass die unteren Stimmritzenbänder (welche die Glottis vera zwischen sich nehmen) zur Erzeugung der Stimme genügen; - sie heissen deshalb auch Chordae vocales. Ihre Länge misst beim Manne 6"-7", beim Weibe 4"-5", ihre grösste Breite 1". Liegen die Cartilagines arytaenoideae mit ihren inneren Flächen an einander, so ist die Stimmritze (Glottis vera) so lang, wie die Ligamenta glottidis verae, weichen sie aus einander, so wird die Stimmritze um die Breite dieser Knorpel bis auf 10½" verlängert.

Die oberen und unteren Stimmritzenbänder enthalten elastische Fasern, welche vom Winkel des Schildknorpels und vom Ligamentum cricothyreoideum an den Seiten der Kehlkopfhöhle nach rückwärts laufen, und sich an den vorderen Winkel der Giessbeckenknorpel befestigen.

3. Muskeln des Kehlkopfs.

Die Muskeln, welche den Kehlkopf als Ganzes bewegen — heben und senken — sind bereits bei den Halsmuskeln geschildert. Die Muskeln, welche seine einzelnen Knorpel verschieben, haben die Bestimmung, die Stimmritzenbänder an- oder abzuspannen. Da nun diese Bänder an der Cartilago thyreoidea entspringen, und an der Cartilago arytaenoidea endigen, so werden die fraglichen Muskeln, welche sämmtlich paarig sind, ihre Insertionen nur an diesen Knorpeln finden können.

An der äusseren Peripherie des Kehlkopfs liegen:

- a) der Musculus crico-thyreoideus; er entspringt am vorderen Halbring der Cartilago cricoidea, und geht schief nach oben und aussen zum unteren Rande der Cartilago thyreoidea. Zieht den Schildknorpel nach vorn herab, entfernt seinen Winkel von den Giessbeckenknorpeln, und spannt somit die Ligamenta glottidis.
- b) der Musculus crico-arytaenoideus posticus entspringt von der hinteren Fläche des hinteren Halbringes der Cartilago cricoidea, ist breit und viereckig, und befestigt sich, mit nach aussen und oben convergirenden Fasern, am Processus muscularis der Basis der Cartilago arytaenoidea. Dreht den Giessbeckenknorpel so, dass sein vorderer Winkel nach aussen gerichtet wird, wodurch die Stimmritze breiter wird, und sich zugleich, wegen Auseinanderweichen der inneren Flächen der Cartilagines arytaenoideae (welche ihren Schleimhautüberzug von der Kehlkopshöhle herleiten), nach hinten verlängert.
- c) Der Musculus crico-arytaenoideus lateralis entsteht am oberen Rande der Seitentheile der Cartilago cricoidea, wird von der seitlichen Platte des Schildknorpels (welche abgetragen werden muss, um ihn zu sehen) bedeckt, läuft schräg nach hinten und oben zum Processus muscularis der Cartilago arytaenoidea, und besestigt sich vor der Insertion des Arytaenoideus posticus, dessen Antagonisten er vorstellt.
- d) Die Musculi arytaenoidei transversi und obliqui gehen in querer und in schräger Richtung von einer Cartilago arytaenoidea zur anderen, deren hintere concave Flächen sie einnehmen, so dass die obliqui auf den transversi liegen. Sie nähern die beiden Giessbeckenknorpel.

An der inneren Oberstäche des Kehlkopss liegen:

a) Der Musculus thyreo-arytaenoideus inferior. Er entspringt an der inneren Obersläche der Cartilago thyreoidea, nicht weit vom Winkel derselben, läust in dem Ligamentum thyreo-arytaenoideum inferius nach hinten, und besestigt sich am Processus vocalis der Cartilago arytaenoidea.

Ich glaube nicht, dass er das Band, in welchem er liegt, erschlaffe. Es scheint vielmehr seine Wirkung dahin gerichtet zu sein, das Band vorspringender zu machen, und dadurch die Stimmritze zu verengern. Er kann jedoch diese Wirkung nur dann äussern, wenn der Schildknorpel und der Giessbeckenknorpel (sein Anfang und Ende) durch andere Muskeln fixirt werden. — Santorini beschrieb noch einen Musculus thyreo-arytaenoideus

superior im gleichnamigen Ligament. Er ist nicht immer deutlich ausgeprägt-Von beiden Musculis thyreo-arytaenoideis setzen sich unbestreitbare Verlängerungen an die hintere Fläche der Cartilagines arytaenoideae fort, und fliessen mit den Arytaenoideis obliquis zusammen (bilden sie aber micht ganz allein).

b) Zwischen beiden Blättern des Ligamentum epiglottideo-arytaenoideum liegt eine dünne, aber breite Muskelschichte desselben Namens(Santorini nannte sie Ary-epiglottidaeus, Theile Arytaenepiglotticus.)
Sie wird durch schwache blasse Bündelchen verstärkt, welche von der
Innenfläche der Cartilago thyreoidea stammen, und von Santorini als
Musculus thyreo-epiglottidaeus beschrieben wurden.

W. Gruber beschrieb einen bisher nicht bekannten anomalen Kehlkopfmuskel, welchen er Musculus thyreoideus transversus anomalus nennt. Er liegt auf dem Ligamentum crico-thyreoideum, und füllt mit queren Fasern die Incisura thyreoidea inferior aus. Er muss höchst selten vorkommen, da ihm Gruber unter 100 Leichen nur einmal beobachtete. (Oesterr. med. Jahrh. 1845. Maiheft. pag. 148. Fig. 8.)

Der innere Schleimhautüberzug des Kehlkopss stammt aus der Rachenhöhle, und dringt durch den Aditus laryngis in die Kehlkopshöhle ein. Die
Schleimhaut ist nicht so gestssreich wie anderswo, wenigstens sind ihre capillaren Gestsse viel seiner, und bilden weitere Maschenräume als im Pharynx.
Ihre Farbe wird deshalb niemals so intensiv roth, wie die Schleimhaut der
Mundhöhle. Sie ist allenthalben sest an die unter ihr liegenden musculösen
und elastischen Gebilde des Kehlkopss gehestet. Ein Flimmerepithelium deckt
sie, und kleine einsache Schleimdrüschen, welche besonders im Ventriculus
Morgagni, am vorderen und hinteren Ende der Stimmritze, und an der hinteren Fläche der Epiglottis (wo sie in kleinen Grübchen des Knorpels liegen)
zahlreich sind, geben ihr unter dem Mikroskope ein siebartig durchlöchertes
Ansehen. Die Ventriculi Morgagni sollten besser Ventriculi Galeni heissen,
da Morgagni selbst sagt: Galenus has envitates princeps invenit, et Ventriculos appellarit. Advers. anat. pag. 17.

Nicht die Lust, sondern die unteren Stimmritzenbänder erzeugen primär im Kehlkopfe den Schall, dessen Höhe und Tiefe als Ton von der Länge und Spannung der Stimmritzenbänder, wohl auch von der Stärke des Anblasens durch die ausgeathmete Luft, abhängt. Der weibliche Kehlkopf, dessen Durchmesser beiläufig um 1/4 kleiner sind, als die des männlichen, wird ein höheres Tonregister haben. Ebenso Knaben vor dem sogenannten Mutiren, welches einige Zeit vor der Geschlechtsreise stattfindet. Um zur Ehre Gottes weiblichen Sopran mit männlicher Stärke zu singen, hat man zu Ende des verflossenen Jahrhunderts noch - castrirt. Die knorpeligen Wände des Kehlkops, verstärken den Ton durch Mitschwingen, und die Ventriculi Galeni durch Resonanz ihrer Luft. Da die ausgeathmete Luft die Schwingungen der Stimmbänder durch Rachen-, Mund- und Nasenhöhle sortpflanzt, so werden diese Höhlen den Timbre des Schalles wesentlich modificiren. Elasticität, Feuchtigkeit, und ein zureichender Spannungsgrad der Stimmbänder, sind unerlässliche Erfordernisse für die Tonbildung; Abwesenheit dieser Bedingungen bewirkt Heiserkeit, selbst Stimmlosigkeit - Aphonie. Durch den verschiedenen Tensionsgrad der Stummbänder lässt sich gewöhnlich eine Tenfolge von 2 Octaven (Brusttone) erzielen. Nie erreichte der Stimmumfang einer Sängerin 4 Octaven. Bei Falsettönen schwingen nur die inneren Ränder der Stimmbänder. - Die männliche Stimme ist unbeholfener als die weihliche. wegen der Grösse der Knorpel und der Dicke der Bänder. Der Bass hält darum volle Noten, während der Sopran eine Roulade in Vierundsechzigsteln ausstihrt. — Die Stimmritze erweitert sich auch bei jedem Einathmen, und verengert sich beim Ausathmen. Beim Anhalten des Athems mit gleichzeitigem Drängen schliesst sie sich vollkommen, so wie beim Schlingen, wo der Kehldeckel zugleich wie eine Fallthüre auf den Aditus Isryngis durch die Zunge niedergedrückt, und durch die Musculi ary-epiglettiei niedergezogen wird. — Die Articulation der Stimme beim Sprechen erfolgt in der Mundhöhle. — Der Kehldeckel verknöchert nie, der Ring-, Schild- und Giessbeckenknorpel aber häusig im vorgerückten Alter. — Verknöcherte Schildknorpel haben schon oft den tödtlichen Schnitt ausgehalten, den die Hand der Selbstmörder auf den Kehlkopf suhrte.

§. 242. Luftröhre.

Die Luftrohre, Trachea s. Aspera arteria (τραχεία ἀρτηρία, rauhes Luftrohr), ist die Fortsetzung des Kehlkopss, wie die Speiserühre jene des Rachens. Sie liegt vor dem Oesophagus (der hinter ihr etwas nach links abweicht), beginnt, wie der Oesophagus, am fünften Halswirbel, wird von der Fascia cervicalis, der Glandula thyreoidea (unter dieser von einigen starken Venen) und den Musculis sterno-thyreoideis bedeckt, geht hinter der Incisura semilunaris sterni bis zum dritten Brustwirbel herab. und theilt sich hier in zwei divergente Aeste (Bronchi), deren jeder zu einer Lunge geht. Der Bronchus dexter ist kürzer, weiter und mehr quer gerichtet, als der linke. Jeder Bronchus theilt sich wieder in so viele Zweige, als die Lunge, zu welcher er geht, Lappen hat, der rechte in drei, der linke in zwei, welche in das Lungenparenchym eindringen, und durch ihre ferneren Verästlungen die Grundlage desselben bilden. Die Luftrühre besteht aus 16-26 horizontal über einander liegenden, C-förmigen Knorpelstreisen (unvollkommenen Knorpelringen), deren Oeffnung nach hinten sieht. Sie geben der Luströhre ein unebenes, geringeltes Ansehen, woher der Name Aspera arteria stammt. Der Bronchus dexter enthält 6-8. der linke 9-12 solche unvollständige Knorpelringe. - Die Knorpel bestimmen die Gestalt und Weite der Luströhre, stossen aber nicht mit ihren oberen und unteren Rändern an einander, sondern werden durch elastische Faserbänder, welche ebenfalls die Gestalt unvollkommener Ringe haben, an einander gekettet. Dieser Umstand macht die Verkurzung und Verlängerung der Luströhre möglich. Die hintere, platte, knorpellose Wand der Luströhre und ihrer Aeste wird von einer dichten Zellhaut, und von queren, blassen Bündeln glatter Muskelfasern eingenommen, welche die Stelle des fehlenden Knorpelsegments ergänzen. Die innere Oberfläche ist mit dunner Schleimhaut ausgefüttert. Ihr cylindrisches Epithelium flimmert. An der hinteren Wand der Schleimhaut finden sich gehäuste Glandulas muciparae, und an der ausseren Umgebung der Bronchien zahlreiche, schwarz pigmentirte Lymphdrüsen, Glandulae bronchiales.

Die Luströhre ist kein cylindrischer Kanal, sondern ein Rohr, an wel-

chem hinten ein Stück seiner Peripherie durch eine ebene Membran ersetzt ist. Die Nähe des Oesophagus, und dessen Ausdehnung durch den verschlungenen Bissen, erfordert, dass die vor ihm liegende hintere Wand der Trachea nachgiebig sei. Die Länge der Luströhre misst $3^{1}/2-4^{1}/2$ Zoll. An ihrem oberen und unteren Ende ist sie etwas enger, als in der Mitte. Die grössere Weite des rechten Bronchus bedingt einen stärkeren Luststrom zur rechten Lunge, und sremde Körper, welche in die Luströhre gelangen, werden in der Regel in den rechten Bronchus hineingerissen. Man weiss auch durch Leichenbesunde von Neugeborenen, welche nach den ersten Athemzügen starben, dass die rechte Lunge srüher athmet als die linke.

§. 243. Lungen.

Die Lungen, Pulmones, sind zwei stumpse, kegestormige, die beiden Seitenhälsten des Thorax einnehmende, und das Herz zwischen sich sasende, schwammige und elastische Eingeweide, in welchen der chemische Act der Respiration, die Umwandlung des venösen Blutes in arterielles, stattsindet.

Ihre Farbe ist nach Verschiedenheit des Alters, des Blutreichthums, und der gesunden oder kranken Verfassung ihres Parenchyms, sehr different, und bietet alle Nuancen zwischen Rosenroth und Blauschwarz dar. Ihr Gewebe ist weich, knistert beim Druck, und lässt beim Durchschnitt schaumiges (mit Lustbläschen gemengtes) Blut aussliessen. Ihr absolutes Gewicht beträgt bei mässiger Füllung mit Blut beiläufig 2½ Pfund (beim Weibe etwas über 2 Pfund), ihr specifisches Gewicht ist, der im Parenchym vertheilten Lust wegen, geringer als jenes des Wassers. Lungen, welche geathmet haben, schwimmen deshalb (als Ganzes oder in Theile zerschnitten) auf dem Wasser-Frische Lungen von Embryonen oder todtgeborenen Kindern, haben eine derbere Consistenz, sind specifisch schwerer und sinken im Wasser zu Boden. In einem gewissen Stadium der Lungenentzündung wird ihr Gewebe impermeabel für die Lust, nimmt das Ansehen und die Dichtigkeit der Leber an, und heisst in diesem Zustande hepatisirt.

Jede Lunge (Pulmo dexter et sinister) stellt eine Hälfte eines senkrecht durchschnittenen Kegels dar, dessen concave Basis auf dem convexen Zwerchfell aufruht, dessen abgerundete Spitze in der Apertura thoracis superior liegt, dessen äussere convexe Fläche an die Concavität der Seitenwand des Thorax anliegt, und dessen innere ausgehöhlte Fläche mit der gleichen der gegenüber stehenden Lunge eine Nische für das Herz bildet. — Die Ränder zerfallen in den unteren halbkreisförmigen (scheidet die äussere Fläche von der unteren), in den vorderen schneidenden, und hinteren stumpfen (beide trennen die äussere Fläche von der inneren). An der inneren Fläche findet sich, nahe am hinteren Rande, eine längliche, flache Vertiefung, durch welche die Gefässe der Lunge aus- und eintreten (Hilus s. Porta pulmonis). Vom hinteren stumpfen Rande schräg nach abwärts zum vorderen schneidenden Rande verläuft, über die äussere Fläche beider Lungen weg, ein 2" tiefer Einschnitt, der an der rechten Lunge sich gabelförmig in zwei Schenkel theilt, an der

linken aber ungetheilt bleibt. Die linke Lunge wird dadurch in zwei, die rechte in drei Lappen geschnitten (Lobi pulmonum), von welchen der mittlere der kleinste ist.

Die Oberstäche jedes Lappens ist an frischen und gesunden Lungen in kleinere eckige Felder (Lobuli s. Insulae pulmonales) getheilt, welche durch schwarz tingirte Streisen sich wechselseitig abgrenzen, und der Ausdruck der Zusammensetzung eines Lappens aus gleichartigen Formtheilen sind. Die Obersläche der Lunge ist mit der Pleura pulmonalis überzogen, welche sich in die Einschnitte hineinsenkt, ohne jedoch ganz bis auf ihren Grund zu gelangen. Sie hängt fest an die Lunge an, und kann nicht abgezogen werden. Die rechte Lunge ist, wegen des hohen rechtseitigen Standpunktes des Zwerchfells, niedriger, aber breiter als die linke, und zugleich um ein Zehntel des Volumens grösser. Die Gesässe jeder Lunge treten nur am Hilus aus und ein. Sie sind: 1. der Bronchus, 2. die Arteria pulmonalis, 3. die Vena pulmonalis. Sie werden mit den ernährenden Gefässen (Arteriae bronchiales) und den Saugadern durch Bindegewebe zu einem von der Pleura pulmonalis überzogenen Bündel vereinigt (Radix pulmonis), an welchem die Lunge, wie die Frucht am Stiele, hängt, und welcher deshalb auch Pedunculus pulmonis heisst.

Der Bronchus theilt sich in so viel Aeste, als Lobi an der betreffenden Lunge vorkommen. Jeder Ast theilt sich wiederholt gabelformig in kleinere Zweige (Syringes s. Canales aëriferi), welche, wenn sie auf 0.05"-0.01" Durchmesser gekommen sind, sich nicht mehr spalten, sondern, wie die Ausführungsgänge einer Speicheldrüse, mit 18-40 Bläschen besetzt werden (Cellulae s. Vesiculae aëreae), welche sich beim Inspiriren ausdehnen, beim Exspiriren verengern, und der Lungenoberstäche ihr vesiculäres Ansehen verleihen. Die in der verlängerten Richtung des kleinsten Bronchus liegende Cellula aërea kann nach Moleschott: Cellula terminalis, die seitlich aussitzenden, oder wandständigen, Cellulae parietales (nach Rossignol: Alvéoles pulmonaires) genannt werden. Die Grösse dieser Bläschen variirt von 0,2"—0,06". Bei krankhaster Ausdehnung kann ihr Durchmesser bis 2" betragen (Emphysema vesiculare). Scheidewände, welche die Ausbuchtungen der Cellulae aereae von einander trennen, sind hie und da durchbrochen, und auf feine Bälkchen reducirt. Hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen dem Bau der Lunge und einer acinösen Drüse. Bei letzteren werden die traubig aggregirten Endbläschen immer durch vollständige Septa von einander getrennt, und sind deshalb mehr selbstständig. — Die Lungenbläschen bestehen aus einer structurlosen, mit elastischen und Bindegeweb-Fasern umgebenen Grundmembran, auf deren innerer (freier) Fläche eine Schichte Pflasterepithelium Gerlach stellt auch das Vorkommen glatter Muskelfasern als unbestreitbar auf (gegen Kölliker, welcher sie in den Lungenbläschen aller höheren Wirbelthiere läugnet). Das respiratorische Capillargesassnetz der Lungenbläschen liegt unmittelbar unter dem Epithelium. - Die Arteria

pulmonalis, welche aus der rechten Herzkammer entspringt, und venüses Blut führt, folgt den Verästlungen des Bronchus, und löst sich an den Cellulae aëreae in ein capillares Netz auf, aus welchem die ersten Anfänge der Venae pulmonales entspringen. Während das venöse Blut durch dieses Capillargefässnetz strömt, tauscht es seinen Kohlen- und Wasserstoff gegen das Oxygen der in jeder Cellula aërea vorhandenen Luft aus, wird arteriell, und kehrt durch die Lungenvenen, deren jede Lunge zwei hat, zur linken Herzvorkammer zurück.

Die Aeste und Zweige der Bronchi in den Lungen verlieren, in dem Masse als sie sich durch Theilung verjüngen, ihre Knorpelringe nach und nach, indem diese an den grösseren noch als Querstreisen vorhanden sind, an den kleineren aber zu eckigen und rundlichen Scheibchen werden, welche in der Wand der kleineren Lustwege wie eingesprengt liegen, dann aber spurlos schwinden, so dass die Bronchialäste von 0,1" Durchmesser, nur aus den häutigen Elementen des Bronchus bestehen. Kölliker hat an ihnen eine äussere, aus circulären glatten Muskelfasern bestehende Schichte, eine mittlere mit reichlichen elastischen Fasern gemischte Bindegewebschichte, und ein auf einer structurlosen Schicht aussitzendes Flimmerepithelium nachgewiesen, welches letztere in den Cellulae aëreae in ein Pflasterepithelium übergeht. -Die Cellulas aëreas werden in den beiden Lungen von Huschke auf 1700 -1800 Millionen geschätzt. Ihre Flächen, in eine Ebene zusammengestellt, würden eine Area von 2000 Quadratsuss geben. Die von Bourgery (Annales des sciences nat. 1830. p. 318) aufgestellte Meinung, dass die letzten Enden der Lustwege ein Labyrinth bildeten, ist auf sehr unvollkommene Praparate, die ich selbst in Paris zu prüsen Gelegenheit hatte, basirt. Die Nerven der Lunge stammen vom Vagus und Sympathicus, und bilden um die Lungenwurzel den Plexus pulmonalis, dessen Grösse zum Volumen der Lunge gering genannt werden kann. Die Verästlungen des Plexus pulmonalis folgen grösstentheils den Astbildungen der Bronchi, verlieren sich in ihnen, und besitzen die von Remak in so vielen Parenchymen entdeckten, von Schiff auch an den feineren Bronchien nachgewiesenen Ganglien (Griesinger's Archiv für physiol. Heilkunde. 6. Bd. pag. 792). Der Vagus scheint der chemischen Thätigkeit der Lunge und ihrer Empfindlichkeit vorzustehen, der Sympathicus der Ernährung. Die Empfindlichkeit der Lunge ist so gering, dass selbst weit ausgedehnte Zerstörungen ihres Parenchyms ohne intensiven Schmerz stattfinden (wie die alte Medicin von Lungensüchtigen sagte: non moriuntur. sed vivere cessant). - Die oberflächlichen Lymphgefässe bilden unter der Pleura pulmonalis ansehnliche Netze, welche von den Venen aus zu injiciren Die tiesliegenden solgen dem Zuge der Bronchienäste, und passiren durch kleine (linsen - oder hanskorngrosse) Drüsen, Glandulae pulmonales, welche wahre Glandulae bronchiales im verjungten Massstabe sind, und sich durchaus nicht, wie früher allgemein geglaubt wurde, in die Lustwege öffnen und das schwarze Pigment absondern, welches den Lungenauswurf grau farbt. Sie sind allerdings mit ästigen Pigmentzellen durchdrungen, und erscheinen häufig im höheren Alter zu Säcken mit schmierigem, schwarzem Inhalt metamorphosirt; allein die von Janke und Portal beschriebenen Oeffnungen sind. schon seit Hewson diese Frage näher untersuchte, widerlegt. Eben so wenig kann ich Huschke beistimmen, der ihnen grosse Neigung zur Verknöcherung beilegt. Die Druse kann nur ossificiren, wenn sie früher ein Depot von Tuberkelmasse war, und dann ist die Ossification vielmehr ein verkalkter Tuberkel, als eine wahre Knochenneubildung.

Ausser den grossen Luft - und Blutkanälen, welche die Alten als Vess publica pulmonum bezeichneten, hat die Lunge auch ein besonderes, auf ihre Ernährung abzielendes Gefässsystem - Vasa privata. Diese sind die kleinen Arteriae et Venae bronchiales, welche sich wie die übrigen Schlag- und Blutadern des Körpers verhalten, und ebenfalls die Radix pulmonis bilden helfen. Die Arteriae bronchiales geben schon im Hilus pulmonum oberstächliche Zweige ab, welche sich mit den tiesen, nachdem diese das Lungenparenchym durchdrangen, und auch an die Obersläche getreten sind, zu Netzen vereini-Ihre Aeste nehmen auch an der Bildung der Endnetze der Arteria pulmonalis Antheil (Haller, Reisseisen). Die Venae bronchiales entleeren sich theils in die Blutbahn der oberen Hohlvene, theils in die Venas pulmonales, wodurch dem linken Herzen nicht rein arterielles, sondern mit einem kleinen Antheil Venenblut versetztes Blut zugeführt werden muss. Dass übrigens beide Gesassysteme — das respiratorische und nutritive — eine gewisse Unabhängigkeit behaupten, beweist der Umstand, dass in der Klasse der Fische, wo die Lunge auf eine nicht respirirende Schwimmblase reducirt ist, und das respiratorische Gefässsystem nur in den Kiemen austritt, die nutritiven Gestasse der Schwimmblase ihre Selbstständigkeit behaupten.

Durch die Inspirationsmuskeln wird der Thorax erweitert, und die Lust in die Lungen eingezogen. Hiebei vergrössert sich die Lunge um so viel, als die Erweiterung des Thorax beträgt. Sie bleibt also mit der inneren Fläche der Brusthöhle in Contact. Die einströmende Lust erzeugt durch Ausdehnen der Lustzellen ein knisterndes Geräusch, welches in jenen Krankheiten, wo die Lustzellen durch Exsudate gefüllt werden, sehlt, und deshalb von den Aerzten als Hilssmittel benutzt wird, die Wegsamkeit des Lungenparenchyms zu untersuchen. Beim Ausathmen wird nicht alle Lust, die in den Lungen war, herausgetrieben. Es bleibt ein Quantum zurück, da die Lustwege nicht vollends comprimirt werden. Auch die Leichenlunge ist nicht luftleer. - Die ausgeathmete Lust enthält, statt des Oxygens, welches sie an das venöse Blut abgegeben, um arterielles daraus zu machen, eine entsprechende Menge Kohlensäure, Wasserdampf und flüchtige thierische Stoffe (z. B. beim stinkenden Athem). Mit jeder Inspiration (deren im Mittel, bei ruhigem Körper und Geist, 16 auf die Minute kommen, binnen welcher Zeit der Puls 65mal schlägt) ändern die vorderen Ränder der Lungen ihre Lage, und schieben sich vor den Herzbeutel, nähern sich also, umschliessen das Herz vollkommener, und dämpsen seinen Schlag. Die Spitzen der Lungenkegel erheben sich etwas über den Rand der ersten Rippe. Vielleicht bedingt die hiebei stattfindende Reibung das häufige Vorkommen von Tuberkeln in der Lungenspitze. Die hinteren Rander bleiben in den Vertiefungen zwischen der Wirbelsäule und den Rippen, und verrücken sich nicht. Man kann an der Leiche diese Bewegung der Lunge durch Ausblasen nachahmen, und sich überzeugen, dass sie für die Gefährlichkeit der Brustwunden und für die auscultatorische Untersuchung der Brusteingeweide von Wichtigkeit ist.

§. 244. Nebendrüsen der Respirationsorgane.

Mit dem Hals- und Brusttheil der Athmungsorgane stehen zwei Drüsen in näherer anatomischer Beziehung, deren physiologische Bedeutung noch unbekannt ist; die Schilddrüse und die Thymusdrüse.

a) Die Schilddrüse, Glandula thyreoidea, liegt mit ihrem mittleren schmalsten Theile (Isthmus) vor dem Anfange der Lustrühre, mit ihren paarigen Seitenlappen, Cornua lateralia, an und auf der Cartilago thyreoidea. Vom Isthmus erhebt sich häufig (nach Gruber unter hundert Leichen vierzig Mal) noch der unpaarige Processus pyramidalis s. Cornu medium über die linke, seltener rechte Schildknorpelplatte, bis zu deren oberen Rand, und selbst darüber hinaus. Ihre vordere Fläche wird von den Musculis sterno-thyreoideis bedeckt, die hintere des Isthmus deckt den Ringknorpel und die oberen Knorpelringe der Luströhre, die hintere der Seitenlappen deckt die Arteria carotis communis, und erhält, wenn die Drüse sich zum Kropfe vergrössert, von letzterer einen longitudinalen Ihr sehr gefässreiches Parenchym (daher der ältere Ausdruck: Ganglion vasculosum) ist in eine sibros-zellige Hüllungsmembran, Tunica propria glandulae thyreoideae, eingeschlossen, und zeigt, wenn es gesund ist, eine zahllose Menge kleiner, rundlicher, vollkommen geschlossener Zellen (Bläschen), von verschiedener Grösse, mit körnigem Inhalt und Epithel. Die diese Bläschen umgebende Masse der Drüse ist ein ungemein gesasreiches Zellgewebslager, welches mehrere dieser Bläschen zu einem Läppchen vereinigt. Die Trennungsfurchen der Läppchen werden an der Oberfläche der Drüse durch die grüsseren Blutgestässe eingenommen.

Bei strumöser Entartung der Drüse (Kropf) werden die Zellen grösser, und füllen sich durch endogene Bildung mit neuen Zellenformationen. Ausführungsgänge, von welchen Schmidtmüller, Coschwitz und Vater träumten, existiren weder im Erwachsenen noch im Embryo, wo sie Meckel für möglich hielt. Den Levator glandulae thyreoideae, vom Zungenbeine kommend, und sich in der Tunica propria der Drüse verlierend, kann man bei grossen Kröpfen deutlich sehen. — Dass die Schilddrüse mit dem Kehlkopfe in näherer physiologischer Beziehung steht, ist eine blosse Vermuthung, die allerdings durch die Nähe dieser beiden Organe und durch die Beobachtung wahrscheinlich wird, dass in der Klasse der Vögel, wo der Stimmkehlkopf in die Brusthöhle an die Theilungsstelle der Luströhre herabrückt, auch die Schilddrüse in den Thorax versetzt wird, wenn nicht der Umstand, dass sie auch bei stimmlosen Amphibien vorkommt, und bei den Schlangen, deren Kehlkopf am Boden der Mundhöhle sich öffnet, weit davon entsernt liegt, sür das Gegentheil spräche.

Bei Unterbindung der Carotis, dem Speiseröhren – und Luströhrenschnitt sind die anatomischen Verhältnisse der Druse von grossem Belange. Die nach unten zunehmende Vergrösserung des Isthmus der Druse bei Erwachsenen, und seine geringe Höhe bei Kindern, macht, dass die Luströhre der Kinder dem Messer zur Tracheotomie leichter zugänglich wird, während bei Erwachsenen die Laryngotomie häusiger geübt wird. Ihr Gestssreichthum ist so bedeutend, dass ihre Verwundung durch Selbstmordversuch tödtlich werden kann, ohne dass die grossen Stämme des Ilalses verletzt werden. Man hat die Schilddrüse durch Eiterung (Thyreophyma acutum) zerstört werden gesehen, ohne nachtheilige Folgen für Gesundheit und Sprache. Dieses war bei Peter Frank der Fall.

b) Die Thymusdrüse ist, wo möglich, physiologisch noch räthselhafter, als die Schilddrüse. Sie existirt in ihrer vollen Entwicklung nur im Embryo, und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres, wo sie zu schwinden beginnt, und um die Zeit der Geschlechtsreise herum entweder ganz

werschwunden, oder auf einen unansehnlichen Rest reducirt ist, der sich auch durchs ganze Leben erhalten kann. Sie hat beim Neugeborenen das körnige Ansehen einer Speicheldrüse, und besteht aus zwei durch eine Zellgewebsmembran zu einem länglichen platten Körper vereinigten, ungleich grossen Seitenlappen, welche wieder in kleinere Läppchen zerfallen. Sie liegt hinter dem Manubrium sterni auf den grossen Gestässen der oberen Brustapertur und dem Herzbeutel, erstreckt sich beim Embryo vor dem letzteren bis zum Zwerchfell hinab. Ihr unterer Rand ist concav, und seitlich mit zwei stumpsen Hörnern versehen.

Nach Kölliker findet sich in der Axe der Thymus ein Gang, der zwei blinde Enden hat. Auf diesem Gang sitzen die Läppchen der Drüse auf, welche selbst hohl sind, und ihre Höhlen in jene des Ganges einmünden lassen. Die Höhlen der Läppchen buchten sich wieder aus, und werden von Wandungen begrenzt, welche aus einer blutgefässreichen, faserigen, bindegewebartigen Substanz mit zahlreichen Kernen und Zellen bestehen.— Die Hauptstämme der Blutgefässe der Thymus liegen nicht auf ihrer Oberstäche, wie jene der Schilddrüse, sondern dringen gerade in die Axe ein, wo sie sich an die Wand des centralen Ganges anlegen, und von hier aus ihre zahlreichen, seinen Aeste in die Läppchen der Drüse entsenden.

In der ersten Entstehung bestehen Schilddrüse und Thymusdrüse aus paarigen Hälften, welche sich erst später zu Einem Drüsenkörper verbinden. Ob ihre Vergrüsserung die Respirations- und Kreislaußorgane comprimiren, und dadurch das sogenannte Asthma thymicum bewirken könne, scheint sehr zweifelhaft. Man findet sie häufig bei Kindern, welche nicht am Asthma starben, den ganzen vorderen Mittelfellraum einnehmen. Die Vorschläge Allan Burns, wie man sich zu benehmen habe, um eine vergrüsserte Thymus zu exstirpiren, wird hoffentlich Niemand am Lebenden in Ausführung bringen.

§. 245. Brustfelle.

Es finden sich in der Brusthöhle drei seröse, vollkommen geschlossene Säcke. Zwei davon sind paarig, und zur Umhüllung der rechten und linken Lunge bestimmt. Der dritte ist unpaarig, liegt zwischen den beiden paarigen, und schliesst das Herz ein. Die paarigen heissen: Brustfelle (*Pleurae*) — der unpaarige: Herzbeutel (*Pericardium*), und wird bei der speciellen Beschreibung des Herzens geschildert.

Das rechte und das linke Brustsell besteht aus zwei in einander geschobenen Säcken, die man sich auf solgende Weise entstanden denken kann. Man denke sich jede Hälste der Brusthöhle durch eine einsache seröse Blase eingenommen (Pleura), und die Lungen noch sehlend. Jede Blase sei an die innere Oberstäche der Rippen und ihrer Zwischenmuskeln angewachsen — Pleura costalis, Rippenfell. Beide Blasen stehen mit ihren einander zugewendeten Seiten nicht in Berührung. Es bleibt somit ein sreier Raum zwischen ihnen, der sich vom Brustbeine zur Wirbelsäule erstrecken wird. Dieser Raum heisst: Mittelsellraum, Cavam media

und die Seitenwände desselben; Mittelselle, Mediastina (ein verdorbenes Wort, soll heissen: per medium theracem tensa). In dem Mittelfellraum lasse man nun beide Lungen entstehen und gegen die Seiten zu sich vergrössern, was nur dadurch geschehen kann, dass jede Lunge das ihr zugekehrte Mittelfell in die Höhle der serosen Blase einstülpt, und dadurch von ihr einen Ueberzug erhält, der als Pleura pulmonalis (Lungenfell) in der Pleura costalis eingeschlossen sein wird. Die Stelle, wo das Mittelfell in die Pleura pulmonalis übergeht, wird von der Lungenwurzel eingenommen. Auch das Herz denke man sich sammt seinem Beutel in dem Mittelsellraum entstehen. Da es nicht so gross wird, um den ganzen Raum auszufüllen, so bleibt vor und hinter ihm ein Theil dieses Raumes frei. und wird als vorderer und hinterer Mittelfellraum, Cavum mediastini anterius et posterius, bezeichnet. Da das Herz serner nicht in der Medianlinie des Thorax liegt, sondern nach links abweicht, so kann der vordere Mittelfellraum nicht mit dem Sternum parallel liegen, sondern er muss derselben Abweichung nach links unterliegen. Das Herz und die, an seiner nach oben gerichteten Basis, entspringenden grossen Gefässe, bilden somit die Grenze zwischen dem vorderen und hinteren Mittelfellraum. Der vordere kann nur so lang als das Sternum sein, welches, zugleich mit den linkseitigen Rippenknorpeln, seine vordere Wand bildet. Das hintere ist. wegen der nach hinten abschüssigen Lage des Zwerchfells, so lang als die Brustwirbelsäule, welche seine hintere Wand vorstellt. Die Seitenwände beider, werden durch das rechte und linke Mittelfell gegeben, welche, da sie die Pleura costalis mit der Pleura pulmonalis vereinigen, auch umgeschlagene Pleuraplatten genannt werden.

Jede Pleura ist dem Gesagten zusolge ein einfacher seröser Sack, wie das Peritoneum; welcher aber sich nur an Einer Stelle einstülpt, um Ein Eingeweide (die Lunge) zu überziehen, und zwei Ballen darzustellen, einen äusseren und einen inneren. Der äussere Ballen ruht unten auf dem Zwerchfell (Pleura phrenica), und ist an dieses, so wie an die innere Oberstäche der Brustwand, durch kurzes Zellgewebe angehestet, welches sich, gegen die Wirbelsäule zu, als besondere Schichte entwickelt, sestere Textur annimmt, und von mir als Analogon der Fascia transversa abdominis betrachtet, und als Fascia endothoracica ausgesührt wird. Vom hinteren Theile der Pleura phrenica erhebt sich constant eine laxe Duplicatur derselben zum hinteren Rande des unteren Lungenlappens als Ligamentum pulmonale, welches nicht zu verwechseln ist mit den, am hinteren Rande der ganzen Lunge zusällig vorkommenden, krankhasten Adhäsionen, welche durch Organisirung pleuritischer Exsudate entstehen (Ligamenta spuria).

Verfolgt man die vorderen Umbeugungsstellen der Pleurae costales zur Mittelfellwand, so findet man, dass diese, so wie die Wände des vorderen Mediastinumraums, nicht mit einander parallel laufen. Sie nähern sich von den Rändern des Manubrii sterni nach abwärts, um am Corpus sterni wieder auseinander zu weichen, wo dann das linke hinter den äusseren Enden

der linken Rippenknorpel, das rechte hinter der Mitte des Sternum (zuweilen selbst am linken Rande desselben) herabgeht. Der vordere Mittelfellraum hat somit die Form eines)(, dessen beide Hälften sich nicht berühren, und dessen linker Schenkel an seiner unteren Hälfte länger ist, als an der oberen.

Man sieht diese Verhältnisse am schönsten, wenn man durch die Bru-thöhle einer Kindesleiche an mehreren Stellen Querschnitte führt.

Die rauhen und glatten Flächen verhalten sich an der Pleura costalis und pulmonalis, wie am Peritoneum parietale und viscerale.

Siehe A. W. Ouo, von der Lage der Organe in der Brusthöhle. Berlin, 1829. 4., und C. Ludwig, icones cavitatum thoracis et abdominis. Lips., 1750. 4.

§. 246. Lage der Eingeweide in der Brusthöhle.

Die Lage der Brusteingeweide zu untersuchen, erfordert weit weniger Mühe, als die der Bauchhöhle, indem es sich im Thorax nur um drei Eingeweide handelt, welche nach Entfernung der vorderen Brustwand leicht zu übersehen sind. Zwei davon - die Lungen - bilden Kegel mit nach oben gerichteter Spitze; das dritte - das Herz - einen Kegel mit unterer Die seitlichen Räume des Thorax, aus welchen sich die Lungen herausheben lassen, bedürsen keiner besonderen Präparation. fellraum dagegen, in welchem das Herz und die grossen Gesässe liegen, wird durch den Verkehr dieser Gesässe unter einander, und ihre Beziehungen zu den Lungen, etwas complicirter. Man untersucht die Contenta des Mittelfellraumes, von vorn nach rückwärts, auf folgende Weise. trägt die vordere Brustwand, nicht wie gewöhnlich an der Verbindungsstelle der Rippen mit ihren Knorpeln ab, sondern sägt die grüsste Convexität, also beiläufig die Mitte der Rippen und der Clavicula, durch, wozu eine feingezahnte Säge verwendet wird, da die gewöhnlichen grobgezahnten Amputationssägen mehr reissen als schneiden, wodurch die Schnitte der Rippen nicht rein und eben, sondern zackig werden, und zu den bei dieser Arbeit häufig vorkommenden Verletzungen Anlass geben. Man bedeckt den Schnittrand der Thoraxwand mit einem dicken Leinwandlappen, oder besser noch mit der abgelösten Cutis, um sich noch besser gegen diese Verletzungen zu sichern.

Ist dieses geschehen, so reinigt man den Herzbeutel, der den unteren Theil des vorderen Mittelfellraums einnimmt, von dem laxen Zellgewebe, welches ihn bedeckt, und überzeugt sich von seiner Einschiebung zwischen die beiden Mittelfelle. Der Zwerchfellnerv steigt an seiner Seitengegend nach abwärts. In dem oberen Theile des vorderen Mittelfellraums, ist das Zellgewebe copiöser, und schliesst, wenn man an einer Kindesleiche arbeitet, die Thymusdrüse ein. Hinter diesem Zellgeweblager trifft man, an der rechten Mediastinumwand anliegend, die obere Hohlvene, welche durch die beiden ungenannten Venen zusammengesetzt wird. Die rechte ist kürzer und fast senkrecht zur Hohlvene gehend; die linke muss einen weiteren Weg machen, um von links zur recht

, .

und läuft deshalb fast quer über die, in der Medianebene des Thorax aufund absteigenden Gesässe herüber, wo sie die mittleren Schilddrüsenvenen und wandelbare Herzbeutel- und Thymusvenen aufnimmt. Jede ungenannte Vene, nach aussen verfolgt, führt zu ihrer Bildungsstelle aus der Vena jugularis und subclavia. Nun wird der Stamm der oberen Hohlader vorsichtig isolirt, wobei man die in ihre hintere Wand sich einpflanzende Vens azygos gewahr wird, welche im Cavum mediastini posterius an der rechten Seite der Wirbelsäule nach aufwärts zieht, und sich über den rechten Bronchus nach vorn krümmt, um zur Cava superior zu stossen. — Hinter den genannten Venen liegt der Bogen der Aorta, aus dessen convexem Rande von rechts nach links 1. die Arteria innominata, 2. die Carotis sinistra, und 3. die Arteria subclavia sinistra entspringen. Man versäume nicht, auf etwa vorkommende Ursprungsvarietäten dieser Gefässe zu achten. - Hinter dem Aortenbogen stösst man auf die Luströhre, und hinter dieser, etwas nach links, auf die Speiseröhre. - Die Arteria innominata theilt sich in die Arteria subclavia und Carotis dextra. Man verfolgt diese Gefasse des Aortenbogens so weit, als es nothig ist, um den Durchgang der Subclavia zwischen dem vorderen und mittleren Scalenus, und die geradlinige Ascension der Carotis zu sehen. Vor der Arteria subclavia sieht man den Vagus, und am inneren Rande des Scalenus anticus den Nervus phrenicus in die obere Brustapertur eindringen. Hinter der Subclavia, auf den Querfortsätzen der Wirbel, zieht sich der Nervus sympathicus herab, und umfasst die Arterie mit einer Schlinge - Ansa Vieussenii.

Nun wird der Herzbeutel, der mit seiner Basis an das Centrum tendineum diaphragmatis angewachsen ist, geöffnet. Man überzeugt sich, dass er, ausser dem Herzen, einen Theil der grossen Gesässe einschliesst, die vom oder zum Herzen gehen. Er schlägt sich an diesen Gefässen nach abwärts um, um nach Art der Pleurae einen kleineren Beutel zu bilden, der die Herzsubstanz sest umhüllt. Nur sein inneres Blatt ist seröser Natur; sein ausseres ist eine Faserhaut, welche an der Einstülpung nicht participirt. Er wird nun von den grossen Gefässen abgelöst, um diese isoliren zu können. Die obere Hohlader steigt gerade herab zur rechten Herzvorkammer. Wird das Herz aufgehoben, so bemerkt man auch die untere Hohlader durch das Zwerchfell zur selben Vorkammer ziehen. Von der Basis des Herzens findet man die Arteria pulmonalis und die Aorta abgehen. Erstere entspringt aus der rechten Herzkammer, und geht nach links und oben; letztere aus der linken Kammer, und läuft nach rechts und oben-Beide Gestasse decken sich somit gleich nach ihrem Ursprunge, so dass die Arteria pulmonalis auf dem Anfange der Aorta liegt. Man reinigt nun den Aortenbogen, und verfolgt ihn, um seine Krümmung über den linken Bronchus zu finden. - Am concaven Rande des Aortenbogens theilt sich die Arteria pulmonalis in den rechten und linken Ast. Der rechte Ast ist länger, geht hinter dem aussteigenden Theile des Aortenbogens und der Cava superior zur rechten Lungenpforte; der linke, kürzere, hängt durch

das Aortenband (obsoleter Ductus arteriosus Botalli des Embryo) mit dem concaven Rande des Arcus aortae zusammen, und geht vor dem absteigenden Theile der Aorta zu seiner Lungenpforte, aus welcher jederseits zwei Venen zur linken Herzvorkammer zurücklausen. Um letztere zu sehen, muss auch die hintere Wand des Herzbeutels entfernt werden. Alle diese Arbeiten erfordern eine vorläufig durch Lecture der betreffenden Beschreibungen erworbene Kenntniss des relativen Lagenverhältnisses, und können ohne Gehilfen (der durch Finger oder Haken die bereits isolirten Gestasse aus einander hält, um Raum für das Aussinden der tieseren zu schaffen) kaum unternommen werden. Hat man den Bronchus, die Arteria und Vena pulmonalis, bis zur Pforte der Lunge dargestellt, so kann man an ihnen die Lunge, wie an einem Griffe, aus der Brusthöhle heben, auf die der anderen Seite legen, und durch Klammern befestigen, und sich die Seitenwand des hinteren Mittelfellraumes zugänglich machen. Diese Seitenwand wird eingeschnitten, und gegen die Rippen zu abgezogen, worauf die hintere Wand des Bronchus erscheint, welche der Vagus kreuzt, und sich zum Theile daselbst in den Plexus pulmonalis auflöst. Hat man beide Wände eingeschnitten und weggenommen, so sieht man, wie der Aortenbogen auf dem linken Bronchus gleichsam reitet, ebenso wie rechts der Bogen der Vena azygos auf dem rechten Bronchus aufliegt. Werden nun Herz und Lungen ganz entfernt, der Aortenbogen aber gelassen, so überblickt man die oben geschilderte Verlaufsweise des Oesophagus, §. 229 (lange Spiraltour um die Aorta), und den Inhalt des hinteren Mittelfellraums: die Vena azygos rechts, die nur halb so lange Vena hemiazygos links von der Aorta descendens, den Ductus thoracicus mit seiner Fettumhüllung zwischen Vena azygos und Aorta. Verfolgt man den Ductus thoracicus nach aufwärts, so findet man ihn hinter der Speiseröhre nach links und oben gehen, und sich in die hintere Wand des Vereinigungswinkels der Vena jugularis und subclavia sinistra einmunden. Die Vagi begleiten, von der Lungenwurzel an, den Oesophagus; der Knotenstrang des Sympathicus läust an den Rippenköpschen herab, und liegt schon nicht mehr im Cavum mediastini.

III. Harn- und Geschlechtsorgane.

§. 247. Eintheilung der Harn- und Geschlechtsorgane.

Die Harn- und Geschlechtswerkzeuge (Organa uro-genitalia) stehen durch ihre Entwicklungsgeschichte, und durch das Zusammensliessen ihrer Aussthrungsgänge in einem, beiden Werkzeugen gemeinschaftlich angehörigen unpaarigen Schlauch (Harnröhre beim Manne, Vorhof der Scheide beim Weibe) in so naher Verwandtschaft, dass sie, ungeachtet ihrer sehr verschiedenen Functionen, als Einem anatomischen Systeme angehörend betrachtet werden. Diese Einheit im männlichen Geschlechte eine

wollkommenere, als im weiblichen ist, spricht sich am deutlichsten durch das Verhalten der Schleimhaut aus, welche ohne Unterbrechung, die Harnund die Geschlechtsorgane, als Zweige desselben Stammes, auskleidet, und an dasselbe Verhalten der Schleimhaut der Verdauungs- und Athmungsorgane erinnert, welche in der Rachenhöhle zusammenfliessen, und erst unterhalb derselben getrennte Wege verfolgen.

Die Harnwerkzeuge bestehen aus paarigen, den Harn absondernden Drüsen und deren Aussührungsgängen (Nieren und Harnleiter), und aus einer unpaarigen Sammlungshöhle des Harns (Harnblase), welche durch die Harnröhre an der Leibesobersläche ausmündet.

Dieselbe Eintheilung ist auch auf die Geschlechtswerkzeuge anwendbar, welche in beiden Geschlechtern 1. aus einer die Zeugungsstoffe absondernden paarigen Drüse (Hode, Eierstock), 2. aus deren Ausführungsgängen (Samenleiter, Eileiter), 3. aus einer Sammlungs- und Aufbewahrungshöhle (Samenbläschen, Gebärmutter) und 4. aus einem, mit den Harnwerkzeugen zusammenmündenden Excretionswege (Ausspritzungskanäle, Scheide) bestehen.

A. Harnwerkzeuge.

§. 248. Nieren und Harnleiter.

Die Nieren, Renes, liegen in der Regio lumbalis der Bauchhöhle, extra cavum peritonei, an der vorderen Seite des Musculus quadratus lumborum. Sie grenzen nach vorn unmittelbar an das ohne Einstülpung über sie herabsteigende Bauchfell, und mittelst dieses an das Colon ascendens (rechts), Colon descendens (links), nach innen an die Pars lumbalis des Zwerchfells, und nach oben an die Nebenniere. Die rechte Niere liegt etwas tiefer als die linke, da sie durch die voluminose Leber mehr herabgedrückt wird. — Die Gestalt der Nieren ist bohnensormig, der aussere Rand convex, der innere concav, und mit einem Einschnitte (das Stigma der Bohne) versehen, welcher als Aus- und Eintrittsstelle der Nierengesässe dient, und deshalb, wie bei der Lunge, Leber, und Milz, Hilus s. Porta renis genannt wird. Das obere Ende ist flacher und breiter als Ihre Farbe ist rothbraun, bei Blutcongestion dunkler und blauroth; ihre Consistenz bedeutend; ihre Länge das Doppelte der Breite, ihr Gewicht zwischen 8-12 Loth. Ein fettreiches und lockeres Zellgeweblager (Capsula adiposa) umgiebt sie, und sichert ihre Lage. Ihre aussere Oberstäche wird von einer knapp anliegenden sibrösen Hülle (Tunica propria s. Capsula fibrosa) überzogen, welche sich abziehen lässt, und am Hilus nicht in das Parenchym eindringt, um Scheiden für die Gefässe zu bilden, sondern einfach von diesen durchbohrt wird.

Schneidet man eine Niere ihrer Länge nach, vom convexen gegen den concaven Rand durch, so findet man, dass ihre Substanz keine gleichförmige ist. Man bemerkt weissliche, dreieckige, mit der Basis gegen den

convexen Rand gerichtete Stellen (Substantia medullaris), und eine sie umgebende braunrothe Masse (Substantia corticalis). Diese Benennungen, die dem blossen Ansehen entnommen wurden, sind jedoch veraltet, und man gebraucht aus gleich zu erörternden Gründen heut zu Tage für Substantia medullaris den Namen Substantia tubulosa, und für Substantia corticalis, lieber Substantia vasculosa s. glomerulosa. Die dreieckigen Stellen sind die Durchschnitte von 10—15 Pyramiden, Pyramides Malpigkii, deren nach dem Hilus gerichtete, abgerundete Spitzen Nieren wärzchen, Papillae renales, heissen.

Die sehr mächtige Arteria renalis dringt, vom Hilus aus, mit mehreren Aesten zwischen den Malpighi'schen Pyramiden gegen die Oberfläche der Niere vor, spaltet sich in immer kleiner und kleiner werdende Zweigchen, welche, wenn sie eine Dünnheit von 0,008" erreichten, sich knäuelförmig zusammendrehen, und die sogenannten Gefässknäuel, Glomeruli renales s. Corpuscula Malpighii, bilden. Diese Knäuel werden von häutigen Kapseln umgeben. Während der Ausknäuelung spaltet sich die Arterie mehrmal, geht aber, nachdem sie durch die Vereinigung ihrer Spaltungsäste wieder einfach geworden, aus dem Knäuel heraus, und löst sich nun erst in capillare, netzformig anastomosirende Verzweigungen auf, aus welchen sich die Ansange der Venen hervorbilden. Die Grösse der Knäuel beträgt zwischen 0,10"-0,06", und ihre Zahl ist so gross, dass die ganze Substantia corticalis nur ein Aggregat derselben zu sein scheint, weshalb sie den passenden Namen Substantia glomerulosa erhielt. — Die Harnkanälchen (Tubuli uriniferi), in deren Höhle der Harn bereitet wird, nehmen ihren Anfang aus den Kapseln der Malpighi'schen Körperchen. Jede solche Kapsel hat nämlich eine Oeffnung, welche der Eintrittsstelle der Arterie des Knäuels gegenüber liegt, und an welcher ein Harnkanälchen beginnt. Die Harnkanälchen, deren es also so viele als Kapseln giebt, verlaufen anfangs geschlängelt durch die Corticalsubstanz als Tubuli contorti, dann geradlinig als Tubuli Belliniani durch die Malpighischen Pyramiden, welche durch sie gebildet werden, und somit den Namen Substantia tubulosa führen können. Je zwei und zwei Tubuli Belliniani vereinigen sich fortwährend unter sehr spitzigen Winkeln, wodurch ihre Zahl fortwährend halbirt wird, bis endlich an der als Papilla renalis bezeichneten, abgerundeten Spitze einer Pyramide, die ansangs ungeheure Anzahl der Tubuli Belliniani auf circa 200 reducirt ist, welche an der Oberfläche der Papille mit eben so vielen seinen Oessnungen (das Cribrum benedictum der älteren Anatomen) münden. Jede Malpighi'sche Pyramide ist somit nur ein Bündel Bellini'scher Röhrchen, welche durch ihre gabelformige Verschmelzung, und dadurch gegebene, gegen die Warze fortschreitende Verminderung ihrer Zahl, eben die Pyramidenform des Bündels bedingen. Da nicht alle Harnröhrchen einer Pyramide in ein einziges zusammensliessen, sondern viele Oeffnungen an der Warze einer Pyramide vorkommen, so muss das Röhrchenbundel einer Malpighi'schen Pyramide

aus eben so vielen kleineren Bündeln (Pyramides Ferreinii) bestehen, als Oeffnungen an der Warze vorkommen. Eine Malpighi'sche Pyramide ist also die Summe von circa 200 Ferrein'schen Pyramiden. — Die Papillae renales werden von kurzen häutigen Schläuchen umgeben. Diese sind die Nierenkelche (Calyces renales minores), welche zu zwei oder drei in einen weiteren Schlauch übergehen (Calyces majores), durch deren Zusammenfluss endlich der grösste Calyx entsteht - das Nierenbecken, Pelvis renalis. Dieses liegt hinter der Arteria und Vena renalis im Hilus, überragt denselben mit seinem trichterformig zugespitzten Ende, und geht in den Harnleiter (Ureter) über, welcher an der vorderen Fläche des Psoas magnus herabsteigt, sich mit der Arteria und Vena iliaca am Eingange des kleinen Beckens kreuzt, in der Plica Douglasii, mit dem entgegengesetzten Ureter convergirend, zur hinteren Wand der Harnblase tritt, sich hier (beim Manne) neuerdings mit dem Samengange kreuzt, und am Grunde der Harnblase, deren Muskel- und Schleimhaut schief durchbohrt wird, in die Blasenhöhle einmundet. Im weiblichen Geschlechte fassen beide Ureteren, bevor sie zum Blasengrunde kommen, den Hals der Gebärmutter zwischen sich.

§. 249. Näheres über die Structur der Nieren.

1. Malpighi'sche Körperchen.

Die in ein Malpighi'sches Körperchen (Gefässknäuel) eintretende Arterie ist nicht capillar. Sie wird es erst nach ihrem Austritte durch Theilung. In das Malpighi'sche Körperchen eingetreten, theilt sie sich in Aeste, welche sich aufknäueln und zu einem einfachen austretenden Stämmchen vereinigen. Das Zerfallen einer Arterie (gross oder klein) in Aeste, und das Wiedervereinigen der Aeste zu einem einsachen Stämmchen, nennt man Wundernetz, ein Name, der schon von Galen für Gestechte grosserer Arterien an der Gehirnbasis gebraucht wurde (διατοειδές πληγμα). Die Malpighi'schen Körperchen sind also wahre Wundernetze. Das austretende Gefäss eines Knäuels ist constant enger als das eintretende, ein Umstand, der für die Ausklärung der Function der Knäuel von der höchsten Wichtigkeit ist, indem sich hiebei nothwendig der Gedanke aufdringt, dass der wässerige Bestandtheil des in den Knäuel gelangten Blutes, durch die Wände der Knäuelgesässe durchgepresst wurde, das Blut somit an Quantum verliert und an Consistenz gewinnt, - eingedickt wird. Das eben erwähnte Durchpressen des wässerigen Blutbestandtheils und der in ihm aufgelösten Salze, wird um so erklärlicher, wenn man bedenkt, dass eine Flüssigkeit, die durch gewundene Kanälchen strömt, einen stärkeren Druck auf die Wand der Kanälchen ausübt, als in geraden. Die Knäuelung der kleinen Schlagaderäste im Malpighi'schen Kürperchen ist somit fur die so copiose Abscheidung des Blutserums eine nothwendige Bedingung.

Es bilden jedoch nicht alle Aestchen der Nierenarterie solche Knäuel. Einige, und zwar in der That capillare Aestchen dringen, ohne sich aufzuknäueln, in die Malpighi'schen Pyramiden ein, wo sie zwischen den Tubuli Belliniani bis in die Rindensubstanz der Niere hinauslausen, und in die Capillarnetze derselben einmunden.

2. Capillargesassnetze der Niere.

Die aus den Knäueln heraustretenden Blutgefässe werden durch Theilung capillar, und bilden durch Anastomosen Netze, in welche die Malpighi'schen Knäuel wie eingesprengt sind. Aus diesen Capillargefässnetzen gehen lange und unverästelte Zweige hervor, welche in die Malpighi'schen Pyramiden eindringen, zwischen den Tubuli Belliniani bis zur Papilla renalis herablaufen, und auf diesem Wege sich mit den nicht aus aufgeknäuelten Arterien hervorgegangenen Capillaren der Malpighi'schen Pyramiden verbinden. Alle Zweige dieser Art anastomosiren häufig durch kurze Querästchen, wodurch ein, die Tubuli Belliniani vielfach umstrickendes Blutgefässnetz gebildet wird, dessen Inhalt zu jenem der Tubuli, in exund endosmotische Wechselwirkung treten kann, wovon in 3.

3. Kapseln der Malpighi'schen Körperchen.

Wenn die gewundenen Arterien eines Malpighi'schen Körperchens den wässerigen Blutbestandtheil ausscheiden, so muss dieser von der Kapsel, die das Körperchen umgiebt, aufgefangen werden, und da die Kapsel sich in ein Harnkanälchen fortsetzt, so wird er sofort in letzteres einströmen. Die geradlinigen Harnkanälchen (Tubuli Belliniani) sind aber in der Substanz der Nierenpyramiden mit langgestreckten Blutgefässen in Contact, welche, weil sie zum grössten Theile aus dem jenseits der Malpighi'schen Körperchen gelegenen Capillargefässnetz der Rinde abstammen, eingedicktes Blut führen. Dieses eingedickte Blut enthält Harnstoff und andere stickstoffige, zur Ausscheidung bestimmte Bestandtheile, welche durch den Athmungsprocess im Lungenblute gebildet wurden (Harnsäure, Kreatin etc.), während die Tubuli Belliniani blos Blutwasser sühren. Wenn nun zwei Flüssigkeiten von verschiedener Concentration durch eine thierische Haut (hier die äusserst dünnen Wandungen der Tubuli Belliniani und der Capillargestisse) von einander getrennt sind, so geschieht, durch die trennende Wand hindurch, ein wechselseitiger Austausch ihrer Bestandtheile, in Folge dessen hier das Serum der Tubuli Belliniani, durch Aufnahme der auszuscheidenden, stickstoffigen Bestandtheile des Blutes (unter welchen der Harnstoff der wichtigste ist) zu Harn wird. Dieses Wenige kann genügen, um dem Anfänger beiläufig eine Idee vom Hergange der Harnbereitung zu geben, und es ihm verständlich zu machen, warum die Nieren, die dieser Darstellung zufolge Reinigungsorgane des Blutes sind, so nahe an dem Hauptstamme des Arteriensystems liegen, so grosse Schlagadern erhalten, und eine grössere Menge Absonderungsstüssigkeit liesern, als die um so viel umfangsreichere Leber.

4. Mikroskopische Eigenschaften der Kapseln und der Harnkanäl

Die Membran der Kapseln und der Harnkanälchen ist structurlos. Nur die grösseren Tubuli uriniferi zeigen Spuren einer unregelmässigen Faserung, welche aber auch der optische Ausdruck von Faltungen einer homogenen Grundmembran sein können. An der inneren Fläche der Harnkanälchen findet sich eine einfache Schichte Pflasterepithelium. Auch die innere Fläche der Kapsel eines Malpighi'schen Körperchens besitzt eine Schichte kernhaltiger Zellen, welche auch die Oberfläche des Gefässknäuels überzieht. (Bei kaltblütigen Thieren findet sich im Anfange eines Harnkanälchens deutliches und lebhaft vibrirendes Flimmerepithelium.) — Der Durchmesser der Harnkanälchen bleibt sich nicht gleich, da aus der Vereinigung zweier Harnkanälchen ein, wenn auch kein doppelt so grosses, doch ganz bestimmt etwas weiteres Kanälchen entsteht. Die kleinsten Harnkanälchen haben 0,0075", die grössten 0,0150" Durchmesser.

Organische Muskelfasern finden sich erst in den Nierenkelchen, wo sie eine äussere longitudinale, und eine innere transversale Schichte bilden. Eben so im Nierenbecken und im oberen Theile des Ureter. Im unteren Ende des Ureter tritt noch eine innere Längenfaserschicht hinzu (Kölliker).

§. 250. Nebennieren.

Die Nehennieren oder Obernieren, Glandulae suprarenales s. Capsulae atrabiliariae, sind zwei gelbbraune, schwammige, drüsige Organe ohne Aussuhrungsgang, welche mit einer concaven Fläche am oberen Ende der Nieren aufsitzen, ohne mit ibnen in directem Gefässverkehr zu stehen. Ihre hintere convexe Fläche liegt auf der Pars lumbalis diaphragmatis, ihre vordere, mehr geebnete Fläche grenzt rechterseits an die Leber, linkerseits an den Magengrund. Beide Flächen sind gefurcht, die untere besitzt einen tieseren Einschnitt, Hilus, durch welchen die Blutgestasse passiren. Sie besitzen eine zellgewebige Kapselhaut, eine derbere Rindenund eine weichere, schwammige Marksubstanz. Die Rindensubstanz besteht durchaus aus einer grossen Menge von Bindegewebblättern, welche von der Umhüllungshaut der Nebennieren ausgehen, und, indem sie die Rinde senkrecht von aussen nach innen durchsetzen, schmale Fächer zwischen sich lassen, welche wieder durch kleinere, schief oder quer ziehende Blätter in kleinere Räume zerfallen, die mit einer seinkörnigen, viele Fettkügelchen und Pigment enthaltenden Masse gefüllt sind. Ecker lässt diesen Inhalt der Fächer von structurlosen Blasen umschlossen sein, welche, indem sie sich der Länge nach zu Säulen aneinander reihen, auf den ersten Blick wie Röhren aussehen. Die Marksubstanz besteht aus einem Netzwerk von Bindegewebe, mit eingestreuten Körnchen und Zellen, welche letztere durch ihre eckigen Formen, und durch hie und da vorkommende, ein- oder mehrfache, zuweilen auch verästelte Fortsätze, an Nervenzellen erinners (Kölliker).

Die verborgene Lage und die unbekannte Bestimmung der Nebennieren

sind der Grund, warum in der Heilwissenschaft um sie noch keine Frage war. Dass sie bei Acephalen fehlen, ist durch Bischoff's Erfahrungen widerlegt. In den Erstlingsperioden der Entwicklung der Harnwerkzeuge sind sie selbst zweimal grösser, als die Nieren; im Erwachsenen beträgt ihr Gewicht nur ¹/4 Loth. Wenn man die Nebenniere zwischen den Fingern knetet, und die Marksubstanz zerquetscht, so kann man die letztere durch einen Stich in die derbere Rindensubstanz als Brei (atra bilis der Alten) herausdrücken, worauf die Rindensubstanz als leere Schale zurückbleibt. Dies veranlasste die Benennung Capsula atrabiliaria. — Nach Ecker's Entdeckung besitzt die Nebenniere der Schlangen eine zuführende Vene (Pfortader).

§. 251. Harnblase.

Die Harnblase, Vesica urinaria s. Urocystis, ist ein häutig musculöser Behälter, in welchem der Harn, der fortwährend durch die Ureteren zustiesst, aufbewahrt wird, um nicht ununterbrochen abzuträuseln. Sie hat eine ovale Gestalt, mit grösserer Ausbuchtung der hinteren und unteren, als der vorderen Wand. Sie liegt hinter der Symphysis ossium pubis, über deren oberen Rand sie sich im vollen Zustande erhebt, und den Punctionsinstrumenten zugänglich wird. Nach hinten grenzt sie an das Rectum beim Manne, an die Gebärmutter beim Weibe, und ist deshalb in letzterem Geschlechte von vorn nach hinten weniger geräumig, was aber durch ihre grössere Seitenausdehnung so reichlich compensirt wird, dass eine weibliche Harnblase überhaupt geräumiger als eine männliche ist. (Die Weiber aber uriniren nicht aus diesem Grunde allein seltener als die Männer, sondern auch deshalb, weil vieles Trinken eine männliche Tugend ist.) Der höchste Theil oder die Kuppel der Blase heisst der Scheitel, Vertex, und ist durch das Ligamentum vesico-umbilicale (embryonischer Urachus) an den Nabel geheftet. Auf den Scheitel folgt der Körper der Blase, und auf diesen der breiteste Theil oder Grund, Fundus, welcher auf dem Mittelsleische und einem Theile der vorderen Mastdarmwand aufruht (beim Weibe auf der vorderen Wand der Mutterscheide). Ihre Seitenwände werden durch die Ligamenta lateralia (vertrocknete Nabelarterien) mit dem Nabel verbunden. Wo die vordere und untere Wand zusammenstossen, verlängert sich die Blase in den trichterförmigen Blasenhals, Collum s. Cervix, welcher im männlichen Geschlechte von der Vorsteherdrüse umgeben wird. Diesem seit je von mir festgehaltenen Begriffe des Cervix vesicae zufolge, ist letzterer eigentlich die Pars prostatica urethrae (siehe den nächsten §.). Cervix oder Collum vesicae als jenen Theil des Blasenkörpers zu nehmen, welcher sich trichterförmig bis zum Orificium urethrae vesicale verlängert, ist eine ganz willkürliche, durch keine einzige Autopsie begründete Vorstellung, die nur von den Chirurgen stammt.

Die Häute der an ihrem Scheitel, nach innen gezählt: 1. ein nur eitlichen Wandungen, vorhandener Bauchfellüberzug, 2. eine grösstentheils aus Längenfasern (Detrusor urinae), und Quer- oder Kreuzfasern bestehende Muskelhaut, mit einem Sphincter am Blasenhalse, 3. eine Bindegewebschicht (submuköses Bindegewebe), und 4. eine Schleimhaut, welche im leeren Zustande unregelmässige Falten bildet, und besonders am Blasenhalse zahlreiche kleine Schleimfollikel enthält. Die Schleimhaut der Harnblase ist, so wie jene des Nierenbeckens und der Ureteren, mit einem mehrschichtigen, aus rundlichen und flachen Zellen bestehenden Epithelium bedeckt, welches sich, wie jenes der übrigen Harnwege, abstösst und regenerirt, mit dem Harne entleert wird, und die Ursache der wolkigen Trübung ist (Nubecula), welche im Harne, wenn er längere Zeit steht, bemerkt wird.

Am Blasengrunde bemerkt man die Einmündungen der Ureteren, als spaltförmige, 1½ Linien lange Oeffnungen, welche ½ Zoll von einander entfernt liegen, und mit dem Ansange der Harnröhre, die Spitzen eines fast gleichschenkeligen Dreieckes darstellen (Trigonum Lieutsudii), an welchem die Musculatur der Harnblase stärker entwickelt ist, als sonst wo.

Die Lage der Harnblase genau zu kennen, ist für den Chirurgen von hoher Wichtigkeit. Man kann sich von ihren Beziehungen zu den übrigen Beckeneingeweiden nur dadurch eine richtige Idee bilden, wenn man sie nicht, wie gewöhnlich in den Secirsälen geschieht, aus der Beckenhöhle sammt den Geschlechtstheilen herausnimmt, und im aufgeblasenen Zustande studirt. sondern an dem Becken einer Leiche ein Os innominatum so entfernt, dass die Symphysis pubis ganz bleibt. Man hat sich dadurch die Beckenhöhle seitlich geöffnet. - Ist die Blase leer, so liegt sie genau hinter der Symphysis, und ein Theil des lleum lagert sich zwischen sie und das Rectum in der Excavatio recto-vesicalis; wird sie aufgeblasen, so nimmt sie den Raum des kleinen Beckens so sehr in Anspruch, dass die Schlingen des fleum in die grosse Beckenhöhle hinaufgedrängt werden. Man bemerkt zugleich, dass sie nicht vollkommen senkrecht steht, sondern mit ihrem Scheitel etwas nach rechts abweicht (wegen der Lage des Mastdarms nach links). - Von jener Stelle an, wo das Peritoneum die hintere Blasenwand verlässt, um als Ptics Douglasii zum Mastdarm zu treten, bis zum Blasenhalse herab, erstreckt sich der Fundus vesicae, der in seiner Mitte auf dem Rectum ausliegt, und seitwärts durch laxes Zellgewebe mit den Samenbläschen verbunden ist. Der in den Mastdarm eingestihrte Finger erreicht leicht die Mitte des Blasengrundes, welcher durch Druck vom Mastdarm aus gehoben werden kann. Die Exploration eines Blasensteines, und die Möglichkeit eines Recto-Vesicalschnittes, um ihn auszuziehen, beruhen auf diesem anatomischen Verhältnisse. - Der Fundus vesicae steht bei voller Blase tiefer, als bei leerer, nähert sich somit. dem Mittelsleische, und es muss deshalb beim Steinschnitt durch das Mittelfleisch, eine Injection der Blase vorausgeschickt werden. Der Scheitel ragt bei Fullung der Blase, besonders bei Kindern, stark über die Symphyse hinaus, und es ware deshalb bei Kindern die Eröffnung der Blase über der Symphysis (Sectio hypogastrica) um so mehr dem Perinealschnitte vorzuziehen, als der Fundus der kindlichen Blase, wegen Enge des Beckens, weit weniger entwickelt ist, und das Peritoneum einen Theil desselben überzieht, wodurch eine Verletzung der Excavatio recto-vesicalis schwer zu vermeiden ist.

Im weiblichen Geschlechte überzieht das Peritoneum einen viel kleineren Theil der hinteren Blasenstäche, und geht bald zur vorderen Gebärmutterwandt uber. - Brangt sich die Schleimhaut durch das Gatter der Muskelbundel heraus, so entstehen die Diverticula vesicae urinariae, welche nie am Grunde, sondern an der Seite der Blase sich entwickeln. — Die Längenmuskelsasern sind, vorzüglich in der Mitte der vorderen und hinteren Blasenwand, zu einem breiten Bündel zusammengedrängt, welches die Blase wie eine Schleuder umgiebt (Huschke). - Durch Hypertrophie der Muskelbündel (welche in seltenen Fällen die Dicke eines halben Zolles annehmen können), entsteht die sogenannte Vessis à colonnes. - Im Trigonum Lieutaudii sieht man, an den Seitenrändern desselben, sehr häufig gerade Muskelbundel vom hinteren Rande der Vorsteherdrüse zur Einmündung der Ureteren ziehen, welche die Bestimmung zu haben scheinen, auch bei voller Blase die Mündungen der Ureteren klaffend zu erhalten, und das Einströmen neuer Absonderungsquantitäten des Harns möglich zu machen. - Grösse und Capacität der Harnblase variiren so sehr, dass 12 Unzen nur als beiläufiges Mass ihres Inhalts angenommen werden können. Bei Harnverhaltungen kann sie sich bis zum Nabel ausdehnen, und Hunter hat ihren Scheitel bis an die Regio epigastrica aufsteigen gesehen. - Die Ursache, warum die Ureteren sich in den Grund. und nicht in den Scheitel der Blase einmunden, liegt darin, dass in letzterem Falle die Ureteren bei der Zusammenziehung der Blase eine Zerrung erleiden müssten, die bei ihrer Einmundung am Grunde der Blase gar nie vorkommen kann.

§. 252. Harnröhre.

Die Harnröhre, Urethra, ist der Ausführungsgang der Harnblase, deren Schleimhaut und submuköses Bindegewebe ihn allein bilden. Die männliche und weibliche Harnröhre unterscheiden sich in so vielen Punkten, dass sie eine besondere Schilderung erfordern.

a) Mannliche Harnröhre.

Die männliche Harnröhre ist ein 6"-8" langer, 2"-3" breiter, bis auf 4" erweiterbarer Schlauch, der einen so hohen Grad von Ausdehnbarkeit besitzt, dass er die Einführung der dicksten (4"') Instrumente zur Steinzertrümmerung gestattet. Von ihrem Beginne am Orificium vesicale, bis zum äusseren Ende an der Eichel (Orificium cutaneum) nimmt sie folgenden Weg. Sie durchbohrt in schwach bogenformiger Richtung zuerst die Vorsteherdrüse (Prostata) schräg nach vorn und unten, geht dann, halbmondstrmig gekrummt, unter der Schamfuge weg, steigt etwas nach vorn und oben, und legt sich an der Wurzel des männlichen Gliedes in die Furche, welche zwischen den beiden Schwellkörpern der Ruthe (Corpora cavernosa penis) übrig bleibt, und in welcher sie bis zur Eichelspitze herabläuft. Ihr Verlauf ist somit kein geradliniger, sondern schwach Sformig. Die erste Krummung liegt unter dem Schambogen, und kehrt ihre Concavität nach oben, die zweite Krummung liegt an der Wurzel des hängenden Gliedes, und ist nach unten concav. Durch Ausheben des Gliedes gegen die Bauchwand kann die Krümmung ausgeglichen werden, wie es bei der Einstthrung eines Katheters in die Harnblase jedesmal geschieht.

Die ganze Länge der Harnrühre bietet somit drei Abschnitte dar, welche sind: 1. die Pars prostatica, 2. der Isthmus s. Pars membranacea (Harnrührenenge), 3. die Pars cavernosa (Gliedtheil der Harnrühre).

- 1. Die Pars prostatica durchbohrt bei Individuen mittleren Alters die Vorsteherdrüse nicht in ihrer Axe, sondern der vorderen Wand näher als der hinteren, und liegt zuweilen nur in einer Furche der vorderen Fläche der Drüse. Bei Greisen nähert sie sich der hinteren Wand der Prostata. Die Schleimhaut, welche sie auskleidet, bildet an ihrer hinteren Wand eine longitudinale Falte, den sogenannten Schnepfenkopf (Crista urethrae, Colliculus seminalis, Caput gallinaginis, Veru montanum), auf deren Höhe die Ausspritzungskanäle des Samens münden, wodurch der weitere Verlauf der Harnröhre nicht mehr dem Harnapparate allein, sondern zugleich den Geschlechtswerkzeugen angehört. Rechts und links von dieser Falte liegen die feinen Oeffnungen der Ausführungsgänge der Prostata.
- 2. Der Isthmus urethrae ist nicht der engste, aber der am wenigsten erweiterbare Theil der Harnröhre. Da er weder von der Prostata (wie der Anfangstheil der Harnröhre), noch von Schwellkörpern (wie der Gliedtheil der Harnröhre), umgeben wird, sondern blos aus Schleimhaut, aus einer dünnen Schichte von Kreismuskelfasern, und umhüllendem, membranüsem Bindegewebe besteht, wird er auch allgemein häutiger Theil der Harnröhre genannt. Er bildet eine nach oben concave Krümmung, welche aber nicht an den unteren Rand der Symphysis anliegt, sondern ½ von ihr entfernt bleibt, so dass zwischen ihm und der Symphyse ein Raum bleibt, der durch einen Theil der tiefen Binde des Mittelsleisches verschlossen wird. Man nennt diesen Theil sehr unpassend das Ligamentum triangulare urethrae. Er ist von später zu beschreibenden Muskelfasern umgeben (§. 269), und kann durch sie mehr als jeder andere Theil der Harnröhre verengert werden. Daher sein Name.

lst er unter dem *Ligamentum triangulare urethrae* hervorgekommen (oder besser gesagt: hat er die tiefe Binde des Mittelsleisches durchbohrt), so wird der weitere Verlauf der Harnröhre

3. als Pars cavernosa urethrae von einem Schwellkörper rings umgeben, welcher mit ihr bis zur Wurzel des Gliedes aussteigt, und von da an, sich mit ihr in den hängenden Theil des Gliedes umbiegt, um sie bis zum Orificium cutaneum zu begleiten. Dieser Schwellkörper (Corpus cavernosum urethrae) hat dieselbe Textur, wie die später zu erwähnenden beiden Schwellkörper des Gliedes (Corpora cavernosa penis), in deren unterer Furche er liegt. Jenes Stück des Corpus cavernosum urethrae, welches mit der Harnröhre bis zur Wurzel des Gliedes aussteigt, heisst, seiner Dicke wegen, Harnröhrenzwiebel, Bulbus urethrae. Der Theil der Harnröhre, welcher vom Bulbus umschlossen wird, zeigt eine nicht unbedeutende slache Ausbuchtung seiner unteren Wand. In dieser nimmt er die Aussührungsgänge der hinter dem Bulbus gelegenen beiden Glandulae Cowperi aus. In derselben Vertiefung werden auch unter be-

sonderen ungünstigen Verhältnissen die Instrumente aufgehalten, welche in die Harnblase gesührt werden sollen. Sucht man sie trotz des Hindernisses fortzustossen, so können sie, nachdem sie die untere Wand der Harnrühre im Bulbus durchbrochen haben, in das benachbarte Zellgewebe gelangen, und die so gesurchteten falschen Wege in das Mittelsleisch bohren. — Der Gliedtheil der Harnröhrenschleimhaut ist im leeren Zustande in niedrige Längenfalten gelegt, welche eben die grosse Erweiterungsfähigkeit der Harnröhre bedingen. Zwischen diesen Falten finden sich die, nur bei kranker Harnröhrenschleimhaut vorkommenden, taschenartigen Vertiefungen der Schleimhaut, Lacunae Morgagni, welche namentlich an der unteren Wand so gross werden können, dass sie den Lauf eingesührter dünner Sonden aufzuhalten im Stande sind. Die kleinen traubigen Schleimdrüschen der Pars cavernosa sind als Glandulae Littrianae bekannt. Bevor die Harnröhre an der Eichel mit einer, durch zwei seitliche Lippen begrenzten, senkrechten Oeffnung mündet, erweitert sich ihre untere Wand in der Eichel zur schiffförmigen Grube, Fossa navicularis, in welcher die ersten Erscheinungen der syphilitischen Harnröhrenentzündung, des Trippers, austreten.

b) Weibliche Harnröhre.

Die weibliche Harnröhre ist nur 1 ½" lang, hat weder Schwellkörper, noch eine Pars prostatica, da die Vorsteherdrüse fehlt. Sie ist also durch ihre Lage und häutige Structur dem häutigen Theile der männlichen Harnröhre gleichzustellen, ist aber weiter als dieser, und lässt sich überdies bis auf 6" Durchmesser erweitern. Instrumente sind deshalb leicht in sie einzuführen, und ziemlich grosse Blasensteine können mit dem Strahle des Harnes (der bei Weibern ein dickerer ist, weshalb das Harnen kürzer dauert), oder durch die Zange herausbefördert werden. Sie hat eine schräge, nach vorn und unten abschüssige Lage, und dieselbe Befestigung durch das Ligamentum triangulare urethrae, wie die männliche. Ihre äussere Mündung liegt über dem Scheideneingange in der Tiefe der Schamspalte, und hat eine rundliche Gestalt ohne seitliche Lippen.

Das zur Besichtigung der Lage der Harnblase benützte Präparat dient zugleich zur Untersuchung des Verlauses der Harnröhre, welche eine genaue Bekanntschast mit den topographischen Verhältnissen des Mittelsleisches voraussetzt, und deshalb hier schon dasjenige nachzusehen ist, was später über die Anatomie des Mittelsleisches gesagt wird. Erst wenn man mit dem Verlause der Harnröhre ins Klare gekommen ist, wird sie herausgenommen, ihre Pars prostatica und der Isthmus von oben gespalten, und der Schnitt bis zum Scheitel der Harnblase verlängert. Die Theile werden gespannt und aus einer Unterlage mit Nadeln besetigt, um den Colliculus seminalis, die Oessnungen der Prostatagänge, das Trigonum Lieutaudii, und die Insertionen der Harnleiter zu sehen. Man bemerkt hiebei zuweilen, dass vom oberen Ende des Colliculus seminalis (besonders bei Greisen) halbmondsörmige, niedrige Schleimhautsalten seitwärts auslausen, die ihre Concavität nach vorn kehren, und ein Hinderniss beim Katheterisiren abgeben können. Ebenso trisst es sich,

dass bei abnormer Vergrösserung der Prostata, der hintere Rand ihres mittleren Lappens, die Schleimhaut des Blasenhalses in die Höhe hebt, und einen
queren Vorsprung erzeugt, der von Amussat (Recherches sur l'urètre de
l'homme et de la femme, Arch. gén. de méd. tom. IV.) als Valvula pylorica
vesicae beschrieben wurde. Wie gross die Erweiterungsschigkeit der weiblichen Harnröhre ist, hat mir ein Fall bewiesen, wo ein 7" Querdurchmesser
haltender Blasenstein, den ich ausbewahre, ohne Kunsthilse entleert wurde,
und ein zweiter noch seltener und vielleicht beispielloser, wo ein Frauenzimmer mit completer Atresia vaginae, durch die Harnröhre, welche bei
der ärztlichen Untersuchung der Geschlechtstheile den Zeigesinger leicht in
die Blasenhöhle gelangen liess, ostmals begattet wurde.

B. Geschlechtswerkzeuge.

§. 253. Eintheilung der Geschlechtswerkzeuge.

Die Geschlechts- oder Zeugungs-Organe, Organa sexualia s. genitalia, bestehen aus denselben Abtheilungen, wie die Harnwerkzeuge. Ihre Bestimmung ist nicht, wie die aller übrigen Eingeweide, auf die Erhaltung des Individuums, sondern auf die Fortpflanzung seiner Art gerichtet. Eine doppelte, den Zeugungsstoff secernirende Drüse mit ihrem Ausführungsgange, ein Behälter zur Aufbewahrung und Reifung desselben, und ein an die Körperoberstäche sührender Kanal, sind ihre wesentlichen Bestandtheile. Ihre Eintheilung in aussere, mittlere, und innere, ist nicht auf beide Geschlechter anwendbar, da die den inneren weiblichen Genitalien entsprechenden männlichen, ausserhalb der Bauchhöhle liegen. Besser ist die Eintheilung in eigentliche Zeugungs- und Begattungsorgane. Erstere bereiten die Zeugungsstoffe, letztere vermitteln die durch die geschlechtliche Vereinigung zu Stande kommende Befruchtung. Jene sind im mannlichen Geschlechte: die Hoden, die Samenleiter, und die Samenblaschen; - im Weibe: die Eierstöcke, die Eileiter, und die Gebärmutter; diese im Manne: das Zeugungsglied; — im Weibe: die Scheide und die ausseren Geschlechtstheile.

I. Männliche Geschlechtsorgane.

§. 254. Hode. Nebenhode.

Die Hoden sind, als Secretionsorgane des männlichen befruchtenden Zeugungsstoffes, das Wesentliche dieses Systems, und bedingen allein den Geschlechtscharakter des Mannes, indem, wie man an Castraten und verschnittenen Thieren sieht, ihr Verlust das Zeugungsvermögen vernichtet, und die übrigen Attribute des Geschlechtes nutzlos werden, oder schwinden. Sie hängen am Samenstrange, und liegen im Grunde des Hodensackes neben einander, der rechte meistens höher als der linke, und bestehen aus dem eigentlichen Hoden (Testis, Testiculus, Orchis s. Didymus) und dem Neben- oder Oberhoden (Epididymis s. Parastata).

- a) Der Hode hat eine eiformige, etwas flachgedrückte Gestalt, mit einer äusseren und inneren Fläche, einem vorderen und hinteren Rande, einem oberen und unteren Ende. Er liegt nicht ganz senkrecht, indem sein oberes Ende etwas nach vorn und aussen, sein unteres nach hinten und unten, sein vorderer Rand etwas nach unten, und sein hinterer nach aben gewendet ist.
- b) Der Nebenhode ist ein länglicher, an den hinteren Rand des Hoden spangenartig sich anschliessender Körper, dessen dickes oberes Ende der Kopf, dessen unteres dünneres und in den Samenleiter (Vas deferens) sich aufbiegendes Ende, der Schweif genannt wird.

Der Hode wird von einer fibrösen Haut umgeben, Tunica albuginea s. propria, welche seine Gestalt bedingt, und von ihrer inneren Oberstäche eine Menge sehr dunner Scheidewände entstehen lässt, welche den Hodenraum in kleinere Fächer abtheilen. Gegen die Mitte des hinteren Randes des Hoden strahlt ein ganzes Bündel solcher Scheidewände von einem 2"-3" hohen, und 6"-8" langen keilformigen Fortsatz der Albuginea aus, welcher Corpus Highmori genannt wird. Die Scheidewände senken sich in die weiche Substanz des Hoden ein, und theilen diese in viele Lappchen (100-200 Krause), deren jedes aus einem Convolut von zwei bis fünf samenabsondernden Kanälchen, Tubuli seminiferi, besteht. Die Tubuli seminiferi haben einen Durchmesser von 0,07", sind zu Knäueln oder Läppchen zusammengeballt, welche ihre breitere Basis gegen die Flächen des Hoden kehren, ihre Spitze gegen das Corpus Highmori wenden. Das aus einem Läppchen herauskommende Samengefäss anastomosirt mit den übrigen im Corpus Highmori, wodurch das Rete Halleri entsteht, aus welchem 12-19 geradlinige und stärkere Tubuli hervorgehen, welche die Albuginea durchbohren, und in den Kopf des Nebenhoden treten, wo sie sich neuerdings in darmähnlich verschlungene Windungen biegen, welche ähnliche Läppchen, wie die innerhalb der Albuginea befindlichen Samenröhrchen bilden. Diese Läppchen kehren ihre Spitze gegen den Hoden, ihre Basis gegen die Oberstäche des Kopses des Nebenhoden. Der Kops der Epididymis ist somit nichts Anderes, als die Summe aller dieser Lappchen, welche, ihrer umgekehrt kegelformigen Gestalt wegen, Coni vasculosi Halleri genannt werden. Durch den Zusammenfluss aller Coni Halleri entsteht ein einfaches Samengestass, welches in zahlreichen Krümmungen verlaufend, und mit einer sesteren Bindegewebshaut umgeben, die Wesenheit des Nebenhoden bildet, gegen die Cauda an Grösse gewinnt, und durch successive Abnahme seiner Schlängelungen, in den geradlinig aufsteigenden Samenleiter (Vas deferens) übergeht. Das Vas deferens wird auch, seiner vom Hoden gegen den Bauch gehenden Richtung wegen, zurücklaufendes Samengefäss genannt. Es steigt im Samenstrange eingeschlossen (in welchem es, seiner Prallheit und Härte wegen, leicht mit den Fingern zu sühlen ist) gegen den Leistenkanal auf, dringt durch diesen in die Bauchhöhle, biegt sich, die Arteria epigastrica inferior kreuzend, zur hinteren Wand der Harnblase herab, und läuft nun, dem der anderen Seite immer näher rückend, zum Blasengrund, wo es an der inneren Seite seines Samenbläschens liegt, und nachdem es mit diesem sich durch einen kurzen Kanal verbunden hat, als Ductus ejaculatorius am Colliculus seminalis der Pars prostatica urethrae ausmündet.

Die Frage, wie die seinsten Tubuli seminiseri entspringen, kann ich nach den vollkommensten Injectionen derselben, die ich anfertigte, dahin beantworten, dass ihr Ende nie blind ist, wie das eines Speichelganges, sondern immer mit zwei benachbarten Samengestasschen durch Schlingen zusammenhängt. Solche Endschlingen werden nicht blos zwischen den Samengefässchen Eines Läppchens, sondern auch in angrenzende Läppchen hinüber gebildet, wodurch sie alle unter einander zusammenhängen. — Könnte man alle gewundenen Tubuli seminiferi herausnehmen, und sie in gerader Linie an einander stückeln, so erhielte man ein Samengesass von circa 1050 Fuss (Krause), nach Monro sogar von 5208 Fuss Länge. Was an den Speicheldrusen durch wiederholte Spaltungen der Aussührungsgänge an Grösse der absondernden Fläche gewonnen wurde, wird in den Hoden durch Länge der Samenwege erreicht. — Nicht ganz selten hat der Samenkanal, der den Nebenhoden bildet, ein Anhängsel von gleicher Structur, und eben so gewunden (Vasculum aberrans Halleri). Ich habe es mehrmals beobachtet, aber nie aus dem Vas deserens, sondern immer aus der Epididymis entstehen gesehen. Seine Krummungen bilden entweder ein langes, selbstständiges, am oberen oder unteren Rande der Epididymis sich hinziehendes Läppchen, oder es steigt nur wenig geschlängelt im Samenstrange auf, um blind zu endigen. Letztere Form ist von Haller, Sommerring, Krause, Huschke allein erwähnt. Wenn es am Nebenhoden anliegt, endigt es nicht immer blind, sondern mundet öfters in den Samenkanal desselben wieder ein, so dass zwischen beiden eine Insel bleibt, welche an die im Hoden selbst stattfindenden Anastomosen der Samenkanälchen erinnert. Der Durchmesser dieses Inselgefässes ist nie dem des eigentlichen Nebenhodengefässes gleich, sondern 1—2mal kleiner, und kann somit kein anatomisches Artefact, oder eine nur aufgelockerte Schlinge des Canalis epididymidis sein, wie Huschke von Cooper's Abbildung vermuthet (Sömmerring's Eingeweidelehre, pag. 379). Ein mit dem Vas deserens aussteigendes und blind endigendes Vasculum aberrans, muss eine andere Bedeutung haben, und ist den auch an anderen Drüsengängen zufällig vorkommenden Diverticulis analog, welche die Eigenschaften des normalen Ausführungsganges besitzen, und deshalb am Vas deferens sich durch Länge und Windung auszeichnen.

Die Wand des Vas deserens besteht aus einer inneren Schleimhaut mit Cylinderepithelium, einer daraus solgenden dicken Schichte organischer, glatter Muskelsasern, und einer äusseren Bindegewebshaut. Die Dicke des Vas deserens beträgt zwischen 1" und 1 ½"; seine Länge, von der Cauda epididymidis bis zum Ductus esaculatorius. 1 ½—1 ½ Fuss; sein Lumen in der Mitte seiner Länge nur 0,3". — Je dicker das Vas deserens wird, desto mehr entwickeln sich die Schleimdrüschen seiner Membrana mucosa.

Die Arterien des Hoden sind die Arteria spermatica interna, und die Arteria vasis deserentis Cooperi. Erstere stammt aus der Bauchaorta, letztere aus einer Arterie der Harnblase. Beide anastomosiren mit einander, bevor sie am Corpus Highmori die Albuginea durchbohren, um Capillarnetze zu bilden, welche aber nicht jedes einzelne Samenkanälchen, Tubulus seminiferus, sondern ihre Bündel (Läppchen) umspinnen, und äusserst schwer durch.

Injection sichtbar zu machen sind. Die rückführenden Venen bilden, bevor sie sich zur Vena spermatics interna vereinigen, ein mächtiges, aus dicken Strängen zusammengesetztes Netz (Plexus pampiniformis), dessen krankhafte Ausdehnung die Varicocele erzeugt. Es darf nicht wundern, dass die Arterien und Venen des Hoden aus der Bauchhöhle stammen, da der Hode sich nicht im Hodensacke, sondern in der Bauchhöhle des Embryo bildet, und erst später herabsteigt.

Selten sind beide Hoden gleich gross; die Vergrösserung betrifft gewöhnlich den linken Hoden, welcher meist tiefer hängt als der rechte. Würden beide Hoden gleich hoch aufgehangen sein, so wäre es besonders bei relaxirten Hodensäcken unvermeidlich, dass sich die Hoden beim Sprung und Lauf an einander stiessen. — Partielle Anschwellungen des Nebenhoden scheinen die älteren Berichte (Varol, Borelli, Graaf) von Männern mit 3, 4, ja selbst 5 Hoden (Miscell. nat. cur. Annus V. Dec. 3) veranlasst zu haben. Fernel erwähnt eine Familie, deren sämmtliche männliche Sprossen 3 Hoden hatten. Kryptorchismus und Monorchismus (Verbleiben beider oder eines Hoden in der Bauchhöhle) sind Entwicklungshemmungen; — wahrer Desect der Hoden (Anorchismus) wurde nur bei Missgeburten gesehen.

Mit Quecksilber injicirte Hodenpräparate gehören zu den seltensten und werthvollsten Besitzthümern anatomischer Museen. Ich habe solche Präparate in der gelungensten Form nur in den Museen von Strassburg und Kopenhagen angetroffen. Die Präparate der hiesigen Sammlung reihen sich diesen auf wurdige Weise an. Man wähle zur Injection nur Hoden von jüngeren Individuen, welche nach langem Krankenlager starben. Bevor man das Vas deferens injicirt, bemühe man sich seinen Inhalt durch Kneten des Nebenhoden sorgfältig auszupressen. Erwärmung des Hoden ist für den guten Erfolg der Injection unerlässlich. Die Quecksilbersäule soll eine Höhe von 18 Zoll haben, und das Eindringen des Metalls in die Samengestässe kann durch zweckmässig angebrachten Fingerdruck sehr erleichtert werden.

§. 255. Verhältniss des Hoden zum Peritoneum.

Es ist nothwendig, in die Genesis des Hoden einzugehen, um die Bildung jener Haut zu verstehen, welche als besondere Scheidenhaut, Tunica vaginalis testis propria, im Erwachsenen vorkommt, und zwei Ballen bildet, deren innerer mit der ausseren Oberstäche der Albuginea fest verwachsen ist, und deren äusserer den Hoden nur lax umgiebt. Der Hode entwickelt sich, in den Erstlingsperioden des Fötuslebens, in der Bauchhöhle an der inneren und oberen Seite eines drüsigen Organs, welches zu beiden Seiten der Wirbelsäule liegt, in der Entwicklungsgeschichte als Wolff'scher Körper (auch Primordialniere) bekannt ist, und in demselben Masse schwindet, als Niere und Hode sich ausbilden. Das Bauchfell bildet, von der Lende her, eine Einstülpung, um den Hoden zu überziehen. Diese ist das Mesorchium (Seiler). Das Vas deferens und die Blutgefässe senken sich in die hintere Wand des Hoden ein, welche nicht vom Peritoneum überzogen wird, und liegen somit extra cavum peritonei. Das Mesorchium reicht bis zur Bauchöffnung des Leistenkanals als Falte herab, und schliesst einen wahrscheinlich contractilen Strang ein, der vom

Hodensack kommt, durch den Leistenkanal in die Bauchhöhle und bis zum Hoden hinaufgeht, mit welchem er verwächst. Denkt man sich diesen Strang sich von oben nach unten zusammenziehen, so leitet er den Hoden gegen den Leistenkanal, und, durch diesen hindurch, in den Hodensack herab. Er heisst darum Leitband des Hoden, Gubernaculum Hunteri. Da der Hode sest mit dem Bauchselle verwachsen ist, so muss dieses als beutelförmige Ausstülpung dem herabsteigenden Hoden folgen, und es wird eine Periode im Embryoleben geben, wo man, von der Bauchhöhle aus, mit einer Sonde in den offenen Leistenkanal eindringen kann, welcher von dem ausgestülpten Bauchsellbeutel ausgekleidet wird. Die Blutgesasse und das Vas deferens werden, da sie ursprünglich extra cavum peritones lagen, nicht in der Höhle dieses Beutels liegen können. Von der Bauchöffnung des Leistenkanals angefangen, verwächst der Beutel - der allgemein als Processus vaginalis peritonei bezeichnet wird - gegen den Hoden herab (siehe oben §. 239). Die Verwachsung hürt aber dicht über dem Hoden auf, und dieser muss somit in einem aus zwei Ballen gebildeten serösen Sack liegen, dessen innerer Ballen mit seiner Tunica albuoinea schon in der Bauchböhle verwachsen war, dessen äusserer Ballen sich erst durch das Nachziehen des Peritoneum bildete. Beide Ballen kehren sich ihre glatten Flächen zu, und schliessen einen Raum ein, der, vor der Verwachsung des Processus peritonei, mit der Bauchböhle communicirte. In diesem Raume, der wenig Tropfen gelblichen Serums enthält, entwickelt sich durch stärkere seröse Absonderung der sogenannte Wasserbruch - Hudrocele.

Schlitzt man den äusseren Ballen der Tunica vaginalis propria auf, und drückt man den Hoden heraus, so sieht man, dass auch der Nebenhode einen, wenn auch nicht vollständigen Ueberzug von ihr erhält, indem die innere Fläche des Nebenhoden, wegen frühen Umstülpens des inneren Ballens zum äusseren, gar nicht umkleidet wird. Der seröse Ueberzug der äusseren Fläche bildet, während seines Uebersetzens zum Hoden, das Ligamentum epididymidis. Die Stelle der Albuginea testis, wo die Samenund Blutgesässe aus- und eingehen, wird, da sie schon beim Embryo vom Peritoneum unbedeckt bleibt, auch im Erwachsenen von der Tunica vaginalis propria nicht überzogen sein können.

Die Verwandtschaft der Tunica vaginalis propria mit dem Peritoneum wird noch durch die Gegenwart einer interessanten, am oberen Ende des Hoden oder am Caput epididymidis vorkommenden Hydatide (Hydatis Morgagni) bestätigt, welche Meckel zuerst als normales Gebilde erkannte, und welche nach Krause einer Appendix epiploica — wie sie am Bauchfellüberzuge des dicken Darms vorkommen — analog ist. (Nach Kobelt ist sie jedoch das letzte Ueberbleibsel der oberen Blinddärmchen des Wolff'schen Körpers. Note zu §. 273.)

Sollte der *Processus vaginalis peritonei* nicht verwachsen, so können sich Baucheingeweide in seine Höhle vorlagern, und den sogenannten angeborenen Leistenbruch bilden, der sich von dem nach Verwachsung des

Processus entstandenen Leistenbruch, dadurch unterscheidet, dass er keinen besonderen Bruchsack hat, wenn man nicht den offenen Processus peritonsi selbst dafür ansehen will, und dass das vorgefallene Eingeweide mit dem Hoden selbst in Berührung kommt. Die Charakteristik des angeborenen Leistenbruchs wurde zuerst von R. de Garanne gegeben. Essai d'un traité des hernies. Paris, 1726.

Bischoff behauptet mit Unrecht (Entwicklungsgeschichte, pag. 360), dass von dem verwachsenen Theile des Processus peritonei keine Spur im Erwachsenen übrig bleibe, und dass sich das Bauchfell von der Oeffnung des Leistenkanals, so leicht wie von anderen Stellen der Bauchwand abziehen lasse. Ich habe vielmehr, als ich dem in §§. 161 und 239 erwähnten theilweisen Offenbleiben des Eingangs in den Processus peritonei an vielen Leichen nachforschte, gefunden, dass ein Band, welches ich Ligula nennen will, von der Verwachsungsstelle an in den Samenstrang hinabläuft, und sich 2—3 Zoll weit verfolgen liess, bevor es im Bindungszellgewebe der Gefässe unterging. Sollte nicht der Zug, welchen der Hode mittelst der Ligula am Bauchfelle ausübt, die Fossa inguinalis externa erzeugen?

Ueber den Descensus testiculorum handeln, nebst den älteren Werken von Wrisberg, Seiler, Langenbeck, noch: B. Beck, über die Bildung der gemeinschaftlichen Scheidenhaut etc. in der Zeitschrift der Wiener Aerzte. 1847. Oct., und E. H. Weber in Müller's Archiv. 1847. p. 403.

§. 256. Samenstrang und gemeinschaftliche Scheidenhaut.

Der Samenstrang, Funiculus spermaticus, ist ein dickes, cylindrisches, vom Leistenkanal zum Hoden herablaufendes Bündel von Gefässen und Nerven, welche durch lockeres Bindegewebe zusammengehalten werden, und an welchem der Hode gleichsam aufgehängt ist. Es wird von einer dunnen sibrösen Haut umgeben, welche sich von oben nach unten erweitert, und auch den Hoden aufnimmt. Diese Haut, über deren Ursprung und Zusammensetzung die Angaben so sehr differiren, führt, ihrer Beziehung zum Samenstrang und Hoden wegen, den Namen der gemeinschaftlichen Scheidenhaut, Tunica vaginalis communis. Sie ist eine Fortsetzung der Fascia transversa abdominis, welche den durch den Leistenkanal heraustretenden Samenstrang sammt dem Hoden scheidenartig einhüllt. Sie bildet keine Höhle, wie die Tunica vaginalis propria, indem ihre innere Fläche mit dem Bindegewebe der Gesässe des Samenstranges, mit dem äusseren Ballen der Tunica vaginalis propria, und mit der von der Tunica vaginalis propria nicht überzogenen Fläche des Hoden verwachsen ist. Ihre äussere Fläche ist von den schlingenförmigen Bündeln des Cremaster (Hebemuskel des Hoden) bedeckt, worauf nach aussen noch eine feine, fibröse Membran folgt, welche an den Rändern der äusseren Oessnung des Leistenkanals entspringt, und bei alten voluminösen Hernien sich so sehr verdickt, dass sie als besondere Schichte des Samenstranges erwähnt zu werden verdient (Fascia Cooperi).

Verfolgt man den Samenstrang nach aufwärts durch den Leistenkanal in die Bauchhöhle, so findet man ihn, von der äusseren Oeffnung des Leisten-

kanals an, immer dünner werden. Er verliert zuerst die Fascia Cooperi (an der äusseren Oesschung des Leistenkanals), hierauf den Cremaster (im Leistenkanal), dann die Tunica vaginalis communis (an der Bauchösschung des Leistenkanals). Ist der Samenstrang in die Bauchöshle getreten, so ist er durch Verlust seiner Hüllen, und das Ablenken des Vas deserens in die Beckenhöhle, aus ein einsaches, aus der Arteria, der Vena, und dem Plexus spermaticus internus bestehendes Bündel reducirt, welches hinter dem Bauchselle zur Lendengegend aussteigt, um jene grossen Gestsse des Bauches zu erreichen, aus welchen der Hode die zur Samenbereitung nothwendigen Gestsse bezog.

Die Arterien des Samenstranges sind 1. die Arteria spermatica interna aus der Bauchaorta in der Nierengegend entspringend, 2. die Arteria spermatica externa (Arteria cremasterica Cooperi), ein Zweig der Arteria epigastrica inferior, 3. die Arteria vasis deferentis, ein Ast einer Blasenarterie, oder des noch offenen unteren Stückes der Arteria umbilicalis.

Die Venen bilden den *Plexus pampiniformis*, der in die *Vena spermatica interna* übergeht, welche sich in die *Cava inferior* oder in die Nierenvene entleert.

Die Saugadern, zahlreich und Netze bildend, münden in die Lymphdrusen der Leistengegend. Die Nerven entspringen theils aus dem sympathischen System des *Plexus spermaticus internus*, welcher die *Arteria spermatica interna* umstrickt, theils aus den Spinalnerven (Lendengeslecht) als *Nervi spermatici externi*. Erstere sind für das Parenchym des Hoden und Nebenhoden, letztere für die Hüllen des Samenstranges bestimmt.

Das Vas deserens liegt hinter den Blutgestassen.

§. 257. Hodensack und Tunica dartos.

Hode und Samenstrang liegen in einem durch die Haut des Mittelfleisches und der Schamgegend gebildeten Beutel - dem Hodensack, Scrotum. Das Integument des Hodensacks ist dünn, durchscheinend, gebräunt, in quere Runzeln gefaltet, mit krausen, kurzen Haaren und zahlreichen Talgdrüsen versehen, und durch eine mittlere Nath (Raphe) in zwei ungleiche Seitenhälsten getheilt. Unter der Haut, und innig mit ihr zusammenhängend, liegt die sogenannte Fleischhaut des Hodensackes, Tunica dartos (δάρω, abziehen), welche aus Bündeln glatter Muskelfasern besteht, deren vorwaltend longitudinaler Verlauf eben die queren Runzeln der Hodensackhaut hervorrust. Sie wird als settlose, aber gesassreiche Fortsetzung der Fascia superficialis abdominis et perinei angesehen, in welche sie übergeht. Eine der Raphe entsprechende Scheidewand, Septum scroti, theilt ihre Höhle in zwei Fächer, in welchen die Hoden und Samenstränge so lose eingesenkt sind, dass sie leicht aus den Fächern herausgezogen werden können, wobei man jedoch das untere Ende des Hoden, durch einen zellgewebigen Strang mit dem Grunde des Hodensackes zusammenhängen trifft (wahrscheinlich das Residuum des Gubernalum Hunteri).

Die Ungleichheit der beiden Hodensackhälften (indem die linke meistens länger als die rechte ist) ist noch nicht erklärt. Wäre die Compression, welche die Vens spermatica interna sinistra durch die Curvatura sigmoiden

rects ersthrt. (Blandin), der Grund einer grösseren Turgescenz und somit grösserer Schwere des linken Hoden, so müsste bei allen Männern der linke Hode tieser hängen, als der rechte. Allein nach Malgaigne's Beobachtungen an 65 Individuen, war dieses nur an 43 der Fall.

Die Raphe ist der bleibende Ausdruck der ursprünglichen Bildung des Hodensacks aus seitlichen Hälften. Der Hodensack kann, wenn es nicht zur Verwachsung seiner beiden Hälften kommt, die Hoden in der Bauchhöhle bleiben, und das männliche Glied klein ist, einer weiblichen Schamspalte gleichen (Hermaphroditismus).

§. 258. Samenbläschen und Ausspritzungskanäle. Vorsteherdrüse und Cowper'sche Drüsen.

a. Samenbläschen.

Die Samenbläschen, Vesiculae seminales, liegen am Blasengrunde hinter der Prostata. Sie haben die Gestalt von 1½" langen und ½" breiten, flachgedrückten, ovalen Blasen, deren Obersläche höckerig ist. Sie schliessen keine einsache, sondern eine zellige Höhle ein, welche dadurch zu Stande kommt, dass jedes Samenbläschen eigentlich ein 2—3" langer, häutiger, mit kurzen blinden Seitenästen besetzter Schlauch ist, der aber nicht ausgestreckt, sondern zusammengeballt ist, und durch das ihn umgebende Bindegewebe zur gewöhnlichen Form eines Samenbläschens gebracht wird. Entsernt man dieses, so kann man das Samenbläschen in jenen einsachen Schlauch leicht entwickeln. (Besitzt der Schlauch die oben angegebene Länge nicht, so sind dasur seine blinden Seitenäste länger.)

Die vorderen, etwas zugespitzten Enden der Samenbläschen münden in die Vasa deferentia ein, welche jenseits dieser Einmündung: Ausspritzungskanäle, Ductus ejaculatorii, heissen. Jeder Ductus ejaculatorius convergirt mit dem anderen, und läust zuletzt mit ihm parallel. Beide betreten die Prostata, gehen zwischen ihr und der hinteren Wand der Pars prostatica urethrae nach vorn und unten, und münden am Colliculus seminalis entweder in eine gemeinschastliche Grube (Vesicula prostatica s. Sinus pocularis), oder gesondert am Rande dieser Grube aus (der häusigere Fall). — Samenbläschen und Ausspritzungskanäle besitzen denselben Bau, wie die Vasa deferentia (§. 254).

b. Vorsteherdrüse.

Die Vorsteherdrüse, Prostata (προΐσταμαι, vorstehen), hat eine herz- oder kastanienstrmige Gestalt, mit hinterer (oberer) Basis und vorderer (unterer) Spitze, vorderer und hinterer Fläche. Sie umsasst den Anfang der Harnröhre, grenzt nach hinten und oben an die Samenbläschen, nach vorn an das Ligamentum arcuatum pubis, nach unten an die vordere Mastdarmwand, durch welche sie mit dem Finger zu stühlen ist.

Sie wird durch gewisse an sie gehestete Abtheilungen der Fascia hypogastrica (§. 267) in ihrer Lage erhalten. Diese Abtheilungen sind das
Lehrbuch der Anatomie. 5. Aust.

Ligamentum pubo-prostaticum medium, und 2 lateralia. Sie entspringen am Schambogen vom Ligamentum arcuatum, und inseriren sich, das mittlere nahe an der Spitze, die seitlichen an den Rändern der Prostata. Ihre hintere Fläche ist nicht wie die vordere glatt, sondern mit zwei seichten Furchen gestreift, welche die Begrenzungen dreier Lappen sind, von welchen der mittlere der kleinste ist, zuweilen aber, und besonders im vorgerückten Alter anschwillt, und die Schleimhaut des Blasengrundes wulstig wölbt. Ihr Gewebe ist derb und compact, äusserst reich an glatten Muskelfasern, welche von der Gegend des Caput gallinaginis strahlig gegen die Oberstäche der Drüse ziehen, dagegen arm an Blutgesässen, und aus Läppchen zusammengesetzt, deren Acini kurze, sich schnell zu grösseren Stämmchen vereinigende Ausführungsgänge erzeugen, welche gleich die hintere Wand der Pars prostatica urethrae durchbohren, und rechts und links vom Colliculus seminalis ausmünden. Ihre Zahl ist bedeutend, aber nicht numerisch bekannt, indem die Oeffnungen in der Harnröhre so fein sind, dass sie nur im Moment, wenn man durch Druck auf die Prostata ihren Inhalt entleert, gesehen werden.

c. Cowper'sche Drüsen.

Die Cowper'schen Drüsen sind erbsengrosse, rundliche, acinöse Drüsen, welche hinter dem Bulbus urethrae an der unteren Wand des Isthmus liegen, zuweilen durch eine kurze Querbrücke mit einander in Verbindung stehen, und ihre nach vorn gerichteten, langen Aussührungsgänge in den vom Bulbus umschlossenen Theil der Harnröhre einmünden lassen. Ihre Bestimmung ist so wenig, als die der Prostata bekannt, auch haben sie ihrer Kleinheit wegen keine besondere praktische Wichtigkeit, welche aber der Prostata um so mehr zusteht, da ihr Kranksein, der damit verknüpsten Verengerung und Verschliessung der Harnröhre wegen, die drohendsten Zuställe veranlassen kann.

Winslow nannte die Cowper'chen Drusen: Antiprostatae. Mery kannte sie schon 1684; Cowper beschrieb sie nur aussuhrlicher 1699.

Der Same (Sperma), der bei der Begattung entleert wird, stammt aus den Samenbläschen, wo er die zur Befruchtung nothwendige Reife zu erhalten scheint. Seine chemische Zusammensetzung ist bis jetzt für die Physiologie der Begattung weit weniger belehrend gewesen, als seine scheinbar lebendigen Inwohner — die Samenthierchen, Samenfäden, Spermatozoa, — über deren Thiernatur gegründete Zweifel obwalten. Sie bedingen die Zeugungskraft des Sperma, welche mit ihrem Fehlen verloren geht. Die nähere Bekanntschaft dieser sonderbaren, aus einem dickeren Kopfende, und einem 0,02" langen, fadenförmigen Schwanze bestehenden, keine Spur von innerer Organisation, aber eine sehr lebhafte, scheinbar willkürliche Bewegung zeigenden Wesen, sucht die Physiologie. Henle mass ihre Bewegungsschnelligkeit, und fand sie — 1 Zoll in 1½ Minute. — Kölliker hat bewiesen, dass die Samenfäden in den Samenkanälchen des Hoden, und zwar in besonderen Zellen entstehen, welche selbst wieder zu 3—20 in einer Mutterzelle eingeschlossen sind. Jede Tochterzelle bildet nur einen Samenfaden, der aus einem Kopfe und Schweife besteht. Letzterer wächst aus dem Kopfe

hervor, und liegt gekrümmt an der Wand der Tochterzelle. Die Tochterzellen öffnen sich, um zuerst den Schweif, dann den Kopf des Samenfadens heraustreten zu lassen. Die Mutterzelle wird alsdann so viele Samenfaden enthalten, als Tochterzellen waren. Erst im Nebenhoden berstet auch die Mutterzelle, und die Samenfaden werden frei. Siehe Kölliker, die Bildung der Samenfaden in Bläschen. Neuenburg, 1846.

Die Feststellung der Thatsache, dass die Spermatozoën nicht blos mit dem zu befruchtenden weiblichen Ei in Contact kommen, sondern sich durch die Dotterhaut in das Innere des Eies einbohren, ist eine der wichtigsten Entdeckungen der Gegenwart. Newport hat das Eindringen der Spermatozoën in das Froschei, — Barry in das Kaninchenei zuerst gesehen, und täglich mehrt sich die Zahl der hieher gehörigen Beobachtungen. Die Art des Eindringens geschieht mit dem dicken Ende voraus, durch bohrende Bewegung des Schwanzendes der Spermatozoën. Was im Ei aus den Spermatozoën wird, weiss man nicht. Nach Newport scheinen sie sich aufzulösen. Sieh hierüber: W. Bischoff, Bestätigung des Eindringens der Spermatozoën in das Ei. Giessen, 1854. G. Meissner, über das Eindringen der Samenelemente in den Dotter, in der Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie, 6. Bd. 2. Hest.

Die musculöse Natur der Samenbläschen ist bei Thieren (Pferd, Stier. Bock, Nager) noch auffallender als im Menschen. Lampferhoff (Diss. de vesicularum sem. structura. Berol., 1835. pag. 50.) hat beim Meerschwein wurmförmige Bewegungen an ihnen gesehen. Ihr Epithelium ist aus eckigen Zellen zusammengesetzt, während das der übrigen Samenwege ein cylindrisches ist (Valentin, Henle). Der Ductus ejaculatorius ist dunnwandiger als das Vas deferens, und wird von den Theilen, zwischen welchen er hinzieht (Prostata, Pars prostatica urethrae) leicht comprimirt. Diesem Umstande, so wie seinem gegen die Ausmundungsstelle in der Urethra bis auf 0,3" abnehmenden Lumen, ist es zuzuschreiben, dass der Same nicht fortwährend absliesst, und erst durch stärkere vis a tergo stossweise entleert wird. — Die drüsige Structur der Schleimhaut lässt auf starke Absonderung in den Samenblasen schliessen. Worin diese bestehe, und welchen Einsluss sie auf die Umwandlung oder Veredlung des Samens ausübe, ist noch nicht entschieden. Der Same der Samenblasen ist immer armer an Samenthierchen, als der des Vas deserens. J. Hunter und R. Wagner halten die Samenbläschen nicht für Ausbewahrungsorgane des Samens, sondern für besondere Secretionswerkzeuge, deren Absonderung vom Samen verschieden ist. Die vergleichende Anatomie giebt zur Lösung dieser Frage keine Behelfe an die Hand, da die Samenbläschen bei Säugethieren häufig sehlen, und wenn sie vorkommen, ihr Inhalt bald reich an Samenthierchen ist, bald keine Spur derselben enthält. Der Umstand, dass bei Castraten die Samenbläschen nicht schwinden, was sie als blosse Receptacula seminis wohl thun mussten. scheint für ihre Selbstständigkeit zu sprechen. — Gruber fand jungst bei einem Castraten die Samenbläschen zwar verkleinert, aber auch mit einem schleimigen Fluidum gefüllt. Am auffallendsten war der Schwund der Prostata (Müller's Archiv. 1847. p. 463).

Die Vesicula prostatica s. Sinus pocularis war als eine kleine, häutige, in der Prostata gelegene, und am Colliculus seminalis zwischen den Oeffnungen der Ductus ejuculatorii mündende Blase, schon Morgagni und Albin bekannt. E. H. Weber (Annot. anat. et phys. Prol. I. pag. 4.) hat ihre in der Entwicklungsgeschichte gegründete Bedeutung als unpaarige Geschlechtshöhle des Mannes (somit dem weiblichen Uterus analog) zuerst hervorgehoben. Welchen Grad von Entwicklung sie annehmen könne, zeigt der

von mir beschriebene Fall (Eine unpaare Geschlechtshöhle im Manne, Oesterr. med. Wochenschrist. 1841. N. 45.), wo auch beide Duetus ejaculatorii in sie einmündeten. Bei den Nagethieren mit fehlenden Samenblasen ist diese Einmündung Regel. (Siehe die aussührlichen Mittheilungen in Huschke's Eingeweidelehre. pag. 408 sqq. Ferner J. van Deen, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Menschen, mit besonderer Berücksichtigung des Uterus masculinus, in der Zeitschrist für wissenschastliche Zoologie. 1. Bd. 4. Hest., und F. Betz, über den Uterus masculinus, in Müller's Archiv. 1850.) Ausgezeichnet sind die von Prof. Leuckart verfassten Artikel: "Vesicula prostatica", in der Cyclopaedia of Anatomy and Physiology, und in der illustr. med. Zeitung 1. Bd., so wie "Zeugung" in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie.

§. 259. Männliches Glied.

Das männliche Glied, die Ruthe, Penis, von pendere (Synon.: Mentula, Neretrum, Vervus, Virga, Coles, Verpes, Priapus), vermittelt die geschlechtliche Vereinigung der männlichen und weiblichen Sexualorgane. Da die Harnröhre zugleich Entleerungskanal des männlichen Zeugungsstoffes ist, und dieser bei der geschlechtlichen Vereinigung, seiner Bestimmung gemäss, in die inneren Genitalien des Weibes gebracht werden muss, so macht die Harnröhre einen Theil des männlichen Zeugungsgliedes aus. Für einen blossen Entleerungskanal des Harnes würde eine einfache Ausmündung an der Leibesoberstäche - wie beim Weibe - genügen. Das Zeugungsglied erfüllt, nebst Entleerung des Samens, früher noch eine andere. auf die Steigerung des Geschlechtsgesühls im weiblichen Begattungsorgan gerichtete Bestimmung, auf mechanische Weise. Diese Erregung der weiblichen Begattungsorgane ist eine wesentliche Bedingung für die Aufnahme des Samens in das innere Geschlechtsorgan. Das männliche Glied muss somit eine Einrichtung besitzen, durch welche eine Vergrösserung desselben mit gleichzeitiger Rigidität (Erection) möglich wird. Ohne diese würde es weder durch Druck noch Reibung reizend wirken können. Das männliche Glied hat drei Schwellkörper, Corpora cavernosa, zwei paarige und einen unpaaren. Letzterer gehört der Harnröhre an. Sie werden deshalb in die zwei Corpora cavernosa penis, und das Corpus cavernosum urethrae eingetheilt.

· a. Corpora cavernosa penis.

Die zwei Corpora cavernosa penis bilden den grössten Theil des Gliedes. Sie sind walzensörmige, nur an den beiden Enden sich verschmächtigende Körper von schwammiger Textur, die sich durch Blutstauung in ihrem inneren Gewebe erigiren und steisen, und in diesem Zustande dem Gliede hinreichende Festigkeit geben, um in die Geschlechtstheile des Weibes einzudringen. Sie entspringen an den aussteigenden Sitzbeinästen, sassen hier den Bulbus urethrae zwischen sich, steigen zur Schamsuge auf, legen sich hier an einander, und verwachsen zu Einem Körper, der im erschlassten Zustande an der vorderen Seite des Scrotum herabhängt — der Schasst der Ruthe. Der Ruthenschast läust in die Eichel aus. — Durch die Aneinan-

derlagerung beider Schwellkörper der Ruthe entsteht, an der oberen und unteren Seite des Gliedes, eine Furche, wie zwischen den beiden Läusen eines Doppelgewehrs, von denen die obere durch eine einsache Vena dorsalis und zwei Arterias dorsales eingenommen wird, während die untere grössere die Harnröhre mit dem Corpus cavernosum enthält.

Die äussere Oberstäche jedes Schweskörpers wird von einer dichten sibrüsen Haut überzogen (Tunica albuginea), welche von der Vereinigung beider Schwelkörper an bis zur Eichel, eine senkrecht stehende Scheidewand, Septum penis, bildet, welche durch mehrere Oessungen durchbrochen erscheint, so dass die Höhlen beider Schwellkörper mit einander communiciren. Von der inneren Oberstäche der Tunica albuginea und des Septum entspringen eine grosse Anzahl aus elastischen Fasern, Bindegewebe, und glatten Muskelsasern bestehender Bündel, welche sich zu einem Netzwerk (Trabeculae) verketten, und dadurch Räume bilden, in welche man srüher das Blut sich srei ergiessen liess (Graaf, Ruysch, Haller), während man jetzt seit Cuvier's und Tiedemann's Untersuchungen weiss, dass sie mit der inneren Haut der Venen des Penis ausgekleidet sind, und wahre Sinus oder Diverticula derselben darstellen.

Die Arterien und Venen der Schwellkörper zeigen einige Eigenthümlich-Die kleineren Arterien eines Schwellkörpers entspringen aus einem. nahe am Septum verlaufenden Hauptstamme (Profunda penis), treten in die Trabeculae ein, verlaufen in ihnen geschlängelt, um sich bei der Erection strecken zu können, und lösen sich zuletzt in capillare Aestchen auf, welche aber keine Netze bilden, sondern direct in die Sinus venosi einmunden. Nahe der Wurzel des Penis gehen von den kleineren Arterien korkzieherartig gedrehte Seitenäste ab, welche Müller als Vasa helicina beschrieb, und blind endigen liess. Valentin läugnet ihr blindes Ende, und lässt sie, trichterförmig erweitert, in die Schwellkörperzellen einmunden. Die blinden Anhängsel der Arterienäste habe ich zwar nicht im menschlichen Schwellkörper der Ruthe, aber in anderen erectilen Organen der Thiere unbezweiselbar beobachtet. (Med. Jahrb. Oesterr. 1838. 19. Bd.) Dass die Arteriae helicinae nicht das einzige Veranlassende der Erection sind, ergiebt sich aus ihrem nur auf die Wurzel des Gliedes beschränkten Vorkommen. keine abgerissenen und eingerollten Arterienästchen sind, wie Valentin behauptet, zeigt ihr Verhalten im Kamme des Hahns, und in den Karunkeln am Halse des Truthahns, wo ihre blinden erweiterten Enden dicht unter der Haut liegen. — Die Venen der Schwellkörper können dem Gesagten zufolge nie capillar werden, indem ihre eigentlichen Anstange die Sinus der Schwellkörper sind.

A. Kölliker (das anat. und phys. Verhalten der Schwellkörper, in den Verhandlungen der Würzb. phys.-med. Gesellschaft. 2. Bd. p. 118.) erklärt als Bedingung der Erection: die Erschlaffung der Muskelfasern im Balkengewebe der Schwellkörper; dadurch werden die venösen Hohlräume erweitert, und fassen mehr Blut. Schon Günther hat die interessante Beobachtung gemacht, dass nach Trennung der Nerven am Pferdepenis, wodurch Lähmung jener Muskelfasern entsteht, Steifung der Schwellkörper eintritt.

b. Corpus cavernosum urethrae.

Das einfache Corpus cavernosum urethrae wird, seiner ganzen Länge


nach, von der Harnröhre durchbohrt, ist somit selbst eine Röhre. Die Schwellsubstanz desselben ist aber nicht gleichförmig um die Harnröhre herum vertheilt. Am hinteren und vorderen Ende verdickt sie sich, und bildet einerseits die Zwiebel der Harnröhre (Bulbus urethrae) am Mittelfleische, andererseits die Eichel (Glans penis) am Ende des Gliedes. Sie strotzt während der Erection nicht so bedeutend, wie die Schwellsubstanz der Corpora cavernosa penis, und bleibt weich. Durch ihre grössere Entwicklung am vorderen Ende der Harnröhre bildet sie die Glans, welche sich über das vordere, abgerundete Ende der vereinigten Schwellkörper des Gliedes ausbreitet. Das Corpus cavernosum urethrae ist weit feinmaschiger, als die Corpora cavernosa penis, und enthält nur im Bulbus wahre Arterias helicinas.

Die Eichel hat eine stumpfkegelformige Gestalt. Ihre schief abwärts gerichtete Spitze, Apex glandis, ist durch den Harnröhrenspalt senkrecht geschlitzt, ihre nach oben gerichtete Basis ist mit einem wulstigen Rande, Corona glandis, umgeben, hinter welchem eine Furche, Collum s. Sulcus retroglandularis, folgt, durch welche die Eichel vom Gliede abgegrenzt wird.

Die Haut des männlichen Gliedes ist sehr verschiebbar, unbehaart, und ihr Unterhautzellgewebe fettlos. Um die Ausdehnung des Gliedes zu gestatten, bildet sie eine die Glans umgebende Duplicatur - die Vorhaut. Praeputium. Sie läust nämlich vom Collum glandis über die Eichel herab. schlägt sich dann nach innen um, und geht wieder zum Collum glandis zurück, um die Eichel als sehr feiner, mit ihrem schwammigen Gewebe innig verwachsener Ueberzug einzuhüllen, der am Orificium cutaneum urethrae in die Schleimhaut der Harnröhre übergeht. Die Vorhaut wird durch eine ausserst empfindliche, longitudinale Falte - das Bandchen, Frenulum praeputii - an die untere Fläche der Eichel angehestet. Bei der Erection gleicht sich die Hautduplicatur des Praputium zum Theil aus. und seine beiden Platten werden zur Deckung des verlängerten Penis in Anspruch genommen, wodurch die Eichel mehr weniger frei wird. innere Platte der Vorhaut, so wie der Eichelüberzug, ähnelt durch Farbe und Dünnheit einer Schleimhaut, besitzt aber keine Folliculi mucipari. sondern Talgdrüsen am Halse der Eichel (Glandulae praeputiales s. Tysonianae), welche eine käseartige, starkriechende, weisse Schmiere absondern — Sebum praeputiale.

Die Fascia superficialis des Bauches setzt sich unter der Haut des Gliedes als Fascia penis fort, bis zur Corona glandis, wo sie mit der Tunica albuginea der Schwellkürper verschmilzt. Sie wird am Rücken der Wurzel des Gliedes durch ein Bündel Bandfasern verstärkt, welches von der vorderen Fläche der Schamfuge als Ligamentum suspensorium penis entspringt, und in die obere Fläche des Gliedes eindringt. Das Ligamentum suspensorium ist die Ursache der zweiten, vor dem Schambogen liegenden Harnröhrenkrümmung.

G. Simon, über die Tyson'schen Drusen, in Müller's Archiv. 1844. pag. 1.



Der Blutreichthum der Schwellkörper erklärt die grosse Gesährlichkeit der Peniswunden, und die leichte Verschiebbarkeit der Haut ist der Grund. warum bei grossen Geschwülsten in der Schamgegend, so wie bei hohen Graden von örtlicher oder allgemeiner Wassersucht, vom Gliede nichts zu sehen bleibt, als die nabelähnlich eingezogene Praputialöffnung. Die Praputialabsonderung ist in heissen Ländern copiöser, als in der gemässigten Zone, und bedingt wohl, der mit ihrem Ranzigwerden verbundenen örtlichen Reizung wegen, den medicinischen Ursprung der Beschneidung, welche sich im Oriente die Geltung eines volksthümlichen Gebrauches erwarb.

Eine höchst genaue und ergebnissreiche Detailuntersuchung der erectilen Gestssbildungen in den mannlichen und weiblichen Genitalien gab G. L. Kobelt "die männlichen und weiblichen Wollustorgane." Freiburg, 1844.

II. Weibliche Geschlechtsorgane.

§. 260. Anatomischer und physiologischer Charakter der weiblichen Geschlechtsorgane.

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind mehr in die Leibeshöhle zurückgezogen als die männlichen, und bilden eine Folge von Schläuchen oder Höhlen, welche zuletzt zu einer paarigen absondernden Drüse - den Eierstöcken - führen, die als keimbereitende Organe den weiblichen Geschlechtscharakter bestimmen, und das Wesentliche im weiblichen Zeugungsorgane ausmachen.

Die männlichen Genitalien waren, vom Anfange bis zum Ende, aus paarigen Abtheilungen gebildet (die unpaarige Harnröhre gehörte mehr dem Harn - als dem Zeugungsapparate an); bei den weiblichen ist nur der Eierstock und sein Ausführungsgang (Tuba) paarig, Gebärmutter und Scheide unpaar. - Da die weiblichen Zeugungsorgane während des Begattungsactes einen Theil der männlichen in sich aufnehmen, und der befruchtete Keim sich in ihnen zur reisen Frucht entwickelt, so müssen die Durchmesser ihrer unpaarigen Theile schon absolut grösser als die männlichen sein, und in der Schwangerschaft und dem Geburtsacte noch bedeutend vergrössert werden können. - Der Mann ist bei der Zeugung nur für die Momente der Begattung interessirt; das Geschlechtsleben des Weibes erhält durch das periodische Reisen seiner Eier (Menstruation), und durch die lange anhaltende Steigerung seiner bildenden Thätigkeit in der Schwangerschaft, eine grössere Bedeutung, und greist in die übrigen Lebensverrichtungen so vielfach ein, dass Störungen seiner Functionen weit häufiger als im männlichen Geschlechte zu krankheiterregenden Momenten werden.

§. 261. Eierstöcke.

Die Eierstöcke, Ovaria, sind für das weibliche Geschlecht, was die Hoden für das männliche waren: keimbereitende Organe, somit das Wesentliche im ganzen Zeugungssystem. Ihre Gestalt, ihr Bau, ihr Verhältniss zum Peritoneum erinnert an die gleichen Verhältnisse der Hoden, und sie wurden deshalb schon von den Alten Testes muliebres genannt. Sie liegen im Eingange des kleinen Beckens, in einer Ausbuchtung der hinteren Wand des breiten Gebärmutterbandes. Denkt man sich nämlich die Excavatio recto-vesicalis durch eine, quer von einer Seite des kleinen Beckens zur anderen, gespannte Bauchfellfalte, deren freier Rand nach oben sieht, in eine vordere und hintere Abtheilung gebracht, und stellt man sich vor, dass die Gebärmutter mit ihren beiden Trompeten (Eileiter) von unten her in die Mitte dieser Falte hineingeschoben wird, ohne sie ihrer ganzen Breite nach auszufüllen, so werden die zwei unausgefüllten Theile derselben, welche vom Seitenrande der Gebärmutter zur Beckenwand laufen, die breiten Mutterbänder vorstellen. Denkt man sich nun ebenfalls die Eierstöcke in diese breiten Mutterbänder hineingeschoben. und in eine kleine Aussackung des hinteren Blattes derselben hineingedrängt, so hat man einen Begriff von ihrer Lage und ihrem Verhältnisse zum Peritoneum. Der zwischen Eierstock und Tuba besindliche Theil des breiten Mutterbandes heisst bei älteren Autoren Ala vespertilionis.

Die Gestalt der Eierstöcke ist im mittleren Alter eine flach eißermige, mit dem stumpsen Ende nach aussen, mit dem spitzigen gegen die Gebärmutter gerichtet, und durch einen fibrösen Strang, Ligamentum ovarü proprium, an letztere gebunden. Man unterscheidet an jedem Eierstocke eine hintere und vordere Fläche, einen oberen und unteren Rand. Bei Mädchen, die noch nicht menstruirten, sind beide Flächen glatt, — nach wiederholter Menstruation, Empfängniss und Geburt, rissig oder gekerbt. Unmittelbar vor dem Eintritte der ersten Menstruation sind sie am grössten und 2½ Loth schwer: im vorgerückten Alter verlieren sie an Grösse, ändern ihre Gestalt, werden dünner, härter und länglicher, und sind in hochbejahrten Frauen auf ein Drittel ihres Volumens, und darüber, geschwunden.

Ihr Peritonealüberzug (Tunica serosa ovarii) ist kein vollständiger, da er an jenem Rande, welcher dem vorderen Blatte des breiten Mutterbandes zugekehrt ist, fehlt, und einen Theil der Oberstäche unüberzogen lässt, wo die Blutgesässe in einer queren Furche (Hilus ovarii) ein- und austreten. Darauf folgt eine sibröse Haut (Tunica propria s. albuginea), die mit dem Bauchsellüberzuge sest verwachsen ist, und am Hilus durch die Blutgesässe einsach durchbohrt wird, ohne scheidenartige Fortsätze für sie zu erzeugen. — Das Parenchym des Eierstockes besteht aus einem mehr weniger sesten gesässreichen Bindegewebe, Stroma ovarii, in welchem eine veränderliche Anzahl vollkommen geschlossener, häutiger Säckchen, die

Graaf'schen Bläschen, Vesiculae s. Folliculi Graafii, eingesenkt liegt. Man findet deren bei befruchtungsfähigen Frauenzimmern 30-100, -Diese Bläschen werden von einer besonderen keine bei alten Weibern. Bindegewebsmembran (Theca folliculi) gebildet, deren gesässreiche Innenfläche mit einem Pflasterepithelium ausgekleidet ist (die Membrana granulosa der Autoren), und enthalten eine hellgelbe, gerinnbare Flüssigkeit, Liquor folliculi. An der, der Oberstäche des Ovariums zugekehrten Seite des Graaf'schen Bläschens, sind die Zellen des Epitheliums zu einer dickeren Scheibe zusammengedrängt, Discus oophorus (unrichtig Discus proligerus), in deren Mitte das menschliche Ei, Ovulum, liegt. kugelrundes kleines Bläschen von 0,1" Durchmesser, hat die anatomischen Attribute einer Zelle. Die dicke Zellenmembran heisst Dotterhaut, weil der Inhalt der Zelle, Dotter, Vitellus, ist. Der Dotter ist eine zähe und an Elementarkörnchen reiche Flüssigkeit. Er besitzt bei reifen Eiern einen schönen, bläschenförmigen, wasserhellen und excentrischen Kern, von 0,02" Durchmesser, — das Keimbläschen (Vesicula germinativa, von Purkinje entdeckt), welches aus einer unmessbar feinen Hülle mit albuminösem, klarem Inhalt besteht. Das Keimbläschen umschliesst einen weisslichen opaken Fleck, den Keimfleck (Macula germinativa), welcher an die Wand des Keimbläschens anliegt. Vergleicht man nun das Ei mit einer elementaren Zelle, so entspricht die Dotterhaut der Zellenwand, der Dotter dem Zelleninhalt, das Keimbläschen dem Kern, und der Keimsleck dem Kernkörperchen. -

Der Discus oophorus hat an den Metamorphosen, die das befruchtete Ei erleidet, keinen Antheil, er streist sich schon während des Austrittes des Eies aus dem Graat'schen Bläschen, oder während seiner Fortbewegung durch die Tuba vom Ei ab.

Der von Kobelt entdeckte Nebeneierstock (Parovarium) liegt unter dem Hilus ovarii, zwischen den Blättern der Ala vespertilionis. Er ist ein Complex länglicher, vom Hilus ovarii in die Ala vespertilionis eindringender Kanäle, von 0,15"—0,02" Dicke, welche an beiden Enden blind sind, und ist durch die Vorgänge der Entwicklung als der letzte Ueberrest eines embryonischen Organs — des Wolff'schen Körpers (§. 273) — zu deuten.

Die Grösse der Graafschen Bläschen ist in demselben Eierstocke sehr ungleich. In der Regel sind die der Oberfläche näher gelegenen grösser, als die tieferen, ragen über die Fläche des Eierstockes als Hügel hervor, und werden, da die Tunica albuginea an jenen Stellen dünner und durchscheinend wird, leicht gesehen. Durch Bischoff's merkwürdige Untersuchungen ist es constatirt, dass sich in der Brunstzeit der Thiere (und in der Menstrualperiode des Weibes) ein Graafsches Bläschen an seinem vorragendsten Theile öffnet, d. h. durch copiösere Absonderung des Liquor folliculi berstet, und der Liquor folliculi sammt dem Discus und dem darin eingebetteten Ei entleert wird, um durch die Eileiter in die Gebärmutterhöhle befördert zu werden. (Bischoff, Beweis der von der Begattung unabhängigen periodischen

Reifung und Loslösung der Eier etc. Giessen, 1844.). Nach dieser Berstung des Graafschen Bläschens, welche man bisher nur als die Folge eines fruchtbaren Beischlafes ansah, wird die Höhle des Graaf'schen Bläschens durch ergossenes Blut und durch ausgeschwitzte plastische Masse (welche sich durch Zellenbildung und deren Metamorphose zu Bindegewebe organisirt, und häufig wie ein lockerer Schwamm aus der Oeffnung des Bläschens hervorwuchert) ausgefüllt. Durch eine Reihe von Metamorphosen schwindet diese wuchernde Masse, und reducirt sich zuletzt auf einen rundlichen Körper, der die Stelle des Graafschen Follikels einnimmt, und seiner gelbröthlichen Farbe wegen Corpus luteum genannt wird. Die vernarbte Oessnung des Graafschen Bläschens heisst Cicatrix. Die gelbliche Farbe verdanken die Corpora lutea einem gelblichen Fette, welches in ihnen in Gestalt von Tröpschen abgelagert ist. Da dieses Fett in Weingeist löslich ist, so erklärt sich hieraus, warum die gelben Körper, wenn sie in Spiritus ausbewahrt werden, ihre Farbe verlieren. — Da der Same in der That durch die Tuben bis auf den Eierstock gelangt, so wird die Befruchtung des Eichens im Eierstocke selbst stattfinden. (Es ist jedoch nicht unmöglich, dass ein bei der Menstruation des Weibes vom Eierstock in die Tuba gelangtes Ei, in ihr, oder vielleicht erst in der Uterushöhle, durch den Samen einer mittlerweile stattgefundenen Begattung befruchtet wird.) Die Corpora lutea, welche nach dem Austritte eines befruchteten Eies entstehen, sind bedeutend grösser, als jene, welche sich nach dem Austritte eines nicht befruchteten Eies (bei der Menstruation) bilden. Der lang andauernde Reizungszustand, den die fernere Entwicklung eines befruchteten Eies, im weiblichen Geschlechtsorgan unterhält, wird namlich eine copiüsere Ausschwitzung von plastischer Masse im geborstenen Graafschen Bläschen veranlassen, als die nach wenig Tagen wieder schwindende Gesässaufregung im Eierstocke, während der Menstruation. Man unterscheidet deshalb wahre und falsche Corpora lutca.

Dass sich auch ausser der Menstruation durch einen befruchtenden Beischlaf ein Graafsches Bläschen öffnen, und sein Ei entleeren könne, ist eine Vermuthung, welche durch Bischoff's Arbeiten zwar nicht als unmöglich erscheint, aber, Alles erwogen, sehr unwahrscheinlich ist. Wenn nun das Ovarium bei jeder Menstruation ein Ei verliert, und dessen Graafsche Hülle zu einem Corpus luteum eingeht, so muss sein Vorrath an Eiern einmal erschöpst werden, und entwickeln sich mittlerweile keine neuen mehr, so ist das weibliche Zeugungsvermögen erloschen, was durch das Schweigen der Menstruation vor den Fünfziger Jahren (Anni climacterici) angezeigt wird.

An dem Ovarium eines gesunden Mädchens, welches während der ersten Menstruation eines zufälligen Todes starb, und durch Prof. Bochdalek's Güte, völlig frisch, mir zur Untersuchung zugestellt wurde, fand ich den geplatzten Folliculus Graafi 5" im längsten Durchmesser haltend, und ein Ei von 0,13" Durchmesser im Eileiter. Es bestand aus einer durchsichtigen Hülle, in welcher eine Dotterkugel von 0,025" eingeschlossen war. Den Raum zwischen Hülle und Dotterkugel schien eine Flüssigkeit einzunehmen, da die Dotterkugel in der Dotterhaut durch Druck verschiebbar war.

Wenn das Ei noch im *Discus oophorus* liegt, und von oben besehen wird, so bildet die dicke Dotterhaut einen kreisförmigen durchsichtigen Gürtel um den Dotter. Dieser ist die *Zona pellucida* von Baër (oder das *Oolemma pellucidum*), welche kein kreisförmiges Gebilde (wie ihr Name ausdrückt), sondern der optische Ausdruck einer durchsichtigen, dickrandigen Blase mit undurchsichtigem Inhalt (Dotter) und eben solcher Umgebung (*Discus oophorus*) ist.

Das Nähere über das Verhältniss des Nebeneierstockes zum Wolffschen Körper des Embryo enthält Kobelt's interessante Schrift: Der Nebeneierstock des Weibes, das längst vermisste Seitenstück des Nebenhoden des Mannes, etc. Heidelberg, 1847.

§. 262. Gebärmutter und Eileiter.

Die Gebärmutter, Uterus s. Matrix, ist der unpaarige hohle Geschlechtstheil des Weibes, in welchem die Entwicklung des Embryo vor Sie hat eine länglich birnformige Gestalt. Ihr breiter dicker Grund, Fundus, ist nach oben, ihr plattcylindrischer Hals, Collum s. Cervix, nach unten gewendet: Der unterste Theil des Halses ragt in die Mutterscheide hinein (welche sich rings um ihn anlegt, wie ein Calyx renum um eine Nierenwarze), und heisst Scheidentheil der Gebärmutter, Portio vaginalis uteri. Die vordere Fläche ihres Körpers ist platter als die hintere, und an ihre Seitenränder sind die breiten Mutterbänder, Ligamenta lata, befestigt, welche in den ausseren serosen Ueberzug der Gebärmutter übergehen. Die runden Mutterbänder, Ligamenta rotunda, sind wahre Verlängerungen der Gebärmuttersubstanz, welche von den Seiten des Grundes als rundliche, in der vorderen Lamelle der breiten Mutterbänder eingeschlossene Stränge abgehen, und durch den Leistenkanal zur äusseren Schamgegend verlaufen, wo sie sich in der Fascia superficialis verlieren. Nebst den breiten und runden Mutterbändern tragen die Uebergangsstellen des Bauchsells von der Blase zum Uterus (Ligamenta vesico-uterina), und vom Rectum zum Uterus (Ligamenta recto-uterina) zur Sicherung der Lage der Gebärmutter bei.

Hinter den runden Mutterbändern gehen vom Fundus die beiden Eileiter oder Muttertrompeten ab, Oviductus s. Tubae Fallopianae. welche zwischen beiden Blättern der breiten Mutterbänder (im oberen oder freien Rande derselben) geschlängelt nach aussen laufen. Jede Tuba ist ein 3"-4" langer Kanal, der mit der Höhle der Gebärmutter zusammenhängt (Ostium uterinum), und an seinem äusseren Ende, welches vor und unter dem Ovarium liegt, in den Bauchfellsack sich öffnet (Ostium abdo-Diese Oeffnung ist ungefähr 1" weit, und mit gezackten Fransen. Fimbriae s. Laciniae (von laxic, der Zipf eines Kleides), besetzt. welche ihr das Ansehen geben, als wäre sie durch Abbeissen oder Abreissen entstanden, und deshalb bei den Alten auch Morsus diaboli genannt Richten sich diese Fransen auf, so bilden sie einen trichtersormigen Raum — das Infundibulum (wie die Blättchen einer Corona infundibuliformis), welches das Ovarium in jenem Momente umfasst, wo durch Berstung eines Graaf'schen Follikels ein Ei aus dem Eierstocke abgeht. So stellt man sich wenigstens die Sache vor, obwohl es mir nicht recht einleuchtet, wie die dünnen Fransen sich, bei dem vollkommenen Mangel von freiem Bewegungsspielraum, zu einer solchen Umklammerung anschicken

Die Tuba ist somit ein wahrer Ausführungsgang des Ovariums. sollen. der auch wirklich in den ersten Bildungsperioden der Geschlechtstheile mit dem Ovarium zusammenhängt, und erst später von ihm durch Abschnürung sich trennt. Das von der Tuba aufgefangene Ei wird durch sie in den Uterus geleitet, in dessen Höhle es, wenn es nicht befruchtet wurde, durch Aufsaugung verschwindet, aber weitere Umbildungen erfährt, wenn es befruchtet wurde. — Die Gebärmutterhöhle (Cavum uteri) ist, im Verbältnisse zur Grösse des Organs, klein, ihre Gestalt gleicht im Durchschnitte (hei Frauen, die noch nicht geboren haben) einem Dreieck mit eingeboge-Die Basis des Dreiecks entspricht dem Grunde der Gebärmutter, - die beiden Basalwinkel enthalten die Orificia uterina tubarum, - die untere Spitze des Dreiecks setzt sich in einen, durch die Achse des Gebärmutterhalses herablaufenden, engen Kanal fort, Canalis cervicis uteri, an welchem man eine obere Mündung (Orificium uterinum, in nerer Muttermund), und eine untere (Orificium vaginale, ausserer Muttermund) unterscheidet, welcher letztere bei Frauen, die noch nicht geboren haben, eine quere Spalte vorstellt, mit einer vorderen längeren, und einer hinteren kürzeren Lippe (Labium anterius et posterius); bei Weibern, welche schon öfters geboren haben, rundlich erscheint. — Die vordere und hintere Wand der Uterushöhle sind in genauem Contact, und die Höhle ist somit kein eigentlicher Hohlraum mit abstehenden Wänden, sondern bildet sich erst, wenn die zusammenschliessenden Wände durch was immer für einen Einschub von einander entfernt werden.

Man bemerkt an der Gebärmutter drei Schichten. Die äussere ist serös (Bauchfellüberzug), und findet sich nur am Grunde und am Körper, - der Cervix bleibt unüberzogen. Die innere ist eine Schleimhaut, welche sich in die Eileiter fortsetzt, und mit einem Flimmerepithelium bedeckt ist. Am Ostium abdominale tubae geht sie in das serose Bauchfell über - der einzige Fall des Uebergangs einer Schleimhaut in eine seröse Haut. Cervix uteri bildet sie, an der vorderen und hinteren Wand des Canalis cervicis, eine longitudinale Falte, von welcher seitwarts kleinere Fältchen schief abgehen, welche zusammengenommen dem Schafte einer Feder mit der Fahne gleichen, und Palmae plicatae s. Arbor vitae genannt werden. Zwischen den Fältchen finden sich grössere Schleimdrüschen, und zerstreute, vollkommen geschlossene, über die Fältchen vorragende Follikel, welche Ovula Nabothi heissen. In der unteren Hälfte des Canalis cervicis besitzt die Schleimhaut eine bedeutende Menge kleiner Papillen. - Im eigentlichen Cavum uteri ist die Schleimhaut in der Regel vollkommen faltenlos, und mit zahllosen, auf der Schleimhaut senkrecht stehenden, röhrenförmigen Drüsenbälgen (Glandulae utriculares) ausgestattet, welche im Verlaufe der Schwangerschaft eine aussallende Entwicklung eingehen. — Die mittlere Schichte ist die eigentliche derbe Gebärmuttersubstanz, welche, bei dem Missverhältnisse des Volumens zur kleinen Höhle des Uterus, eine bedeutende Dicke haben muss. Sie besteht vorzugsweise aus blassen, nicht gestreisten Muskelfasern, welche in jeder Richtung sich kreuzen und verweben, so dass eine Trennung derselben in Schichten kaum aussührbar wird. Man kann Längen- und Kreisfasern unterscheiden. Letztere haben die drei Oessnungen des Uterus zu ihren Mittelpunkten. Bindegewebe und Blutgesässe nehmen die Zwischenräume der sich kreuzenden Muskelsasern ein. Im schwangeren Zustande werden die Muskelbündel deutlicher, nehmen an Länge und Dicke zu, und werden durch neu entstandene an Zahl vermehrt. Die Venen einer schwangeren Gebärmutter erscheinen beim Durchschnitte als klassende, singergrosse Lücken, welche man srüher für Sinus hielt.

Der Bau der Tuba ist dem Wesen nach derselbe.

Die Arterien der Gebärmutter stammen von den paarigen Arteriis uterinis, — Zweigen der Arteriae hypogastricae. Die Venen, welche netzförmige Geflechte bilden, entleeren sich in die, den Arterien entsprechenden Venae uterinae. Die vom Sympathicus und dem dritten und vierten Kreuznerven abgeleiteten Nerven, bilden Geflechte um die Venen. Die Saugadern verbinden sich mit den Beckengeflechten.

Grösse, Gestalt, Lage und Beschaffenheit der Höhle der Gebärmutter unterliegen, in den verschiedenen Altersperioden des Weibes, zahlreichen Veränderungen. Der Uterus einer Jungfrau hat, bei 2" Länge, eine Breite von 16" am Fundus. Die Uebergangsstelle des Corpus uteri in den Cervix ist der schmalste Theil desselben, und 9" breit. Die lange Axe steht senkrecht auf der Conjugata, und weicht zugleich etwas nach rechts ab, welche Abweichung weder von der geringeren Breite des rechten Ligamenti lati, noch von dem Liegen auf der rechten Seite (Velpeau) abzuleiten ist, sondern höchst wahrscheinlich (wie die schiefe Stellung der Harnblase) von der rechtseitigen Lage des Mastdarms herrührt. Nach vorausgegangenen Geburten nimmt der Uterus nie wieder seine jungfräulichen Dimensionen an, und rückt, wegen Relaxation seiner Befestigungen, etwas tiefer in die Beckenhöhle herab, was auch vorübergehend bei jeder Monatreinigung der Fall ist. — Die Nachbarorgane der Gebärmutter, welche bei deren Vergrösserung in der Schwangerschaft durch Druck zu leiden haben, erklären die Stuhl- und Harnbeschwerden, das schwere Athmen, die Gelbsucht, das Anschwellen der Füsse, das Einschlasen derselben, das Hartwerden und Vorstehen des Unterleibes, und die dadurch bedingte stärkere Biegung des Oberleibes nach hinten, mit Vermehrung der Lendencurvatur der Wirbelsäule, um die Schwerpunktslinie zwischen den Beinen zu erhalten. (Man kennt es aus letzterem Grunde einer Frau auch von rückwärts an, ob sie guter Hoffnung ist.)

Am meisten individuelle Verschiedenheiten bietet der Cervix uteri und seine Portio vaginalis dar. Durch Schwangerschaft ausgedehnt, nimmt der äussere Muttermund nie wieder seine querspaltförmige Gestalt an, sondern wird rundlich, klafft mehr, und seine Umrandung erscheint gekerbt, durch die Risse, die das Ostium uteri vaginale bei Erstgebärenden erleidet. Die

Länge der Portio vaginalis differirt von 3"-1'/1" (Lisfranc). Nach wiederholten Geburten kann sie ganz verstreichen, und der Muttermund liegt dann am obersten blinden Ende der Scheide. Das knorpelharte Anfühlen der Lippen eines jungfräulichen Uterus (ähnlich der Mundspalte einer Schleie, (Cyprinus tinca), hat zu der Benennung Os tincae, museau de tanche, Anlass gegeben, welches zu meiner Schülerzeit noch mit Tinkaknochen übersetzt wurde. Zuweilen erscheint die Portio vaginalis wie glatt abgeschnitten, welche Form Ricord als col tapiroid (Schweinsrüssel, Hundsschnautze unserer gebildeten Hebammen) bezeichnet. — Für die manuelle Exploration der Gebärmutter zu praktischen Zwecken, ist es nothwendig zu wissen, dass sie bei aufrechter Stellung des Weibes tiefer im Becken liegt, und beim Niederkauern der Scheidentheil so weit herabrückt, dass er mit dem Finger leicht zu erreichen ist. Jede Verkleinerung der Bauchpresse treibt den Uterus tiefer in die Beckenhöhle herab.

Die von Madame Boivin beschriebenen Ligamenta uteri sacralia (vom Cervix uteri zur Seite des Kreuzbeins laufend) waren schon Petit bekannt (Mémoires de l'acad. des sciences. 1760), und scheinen überhaupt nur Streifen der Fascia hypogastrica zu sein. Der von Ruysch im Grunde der Gebärmutter als Detrusor secundinarum beschriebene Muskel (De musculo in fundo uteri observato. Amstel., 1726) ist nur eine Schichte der gewühnlichen Kreisfasern. — Ueber die Muskelfasern der Gebärmutter und ihrer Adnexa siehe Kölliker, Zeitschrift für wiss. Zoologie. 1. Bd. pag. 71.

§. 263. Mutterscheide.

Die Mutterscheide oder Scheide, Vagina, ist der vom Uterus zur äusseren Scham führende Schlauch, der im Paarungsacte das männliche Glied aufnimmt - vaginae ad instar. Ihre Länge wird auf 4 Zoll angegeben. Dieses ist unrichtig für die Vagina in situ, welche nur 2½ Zoll lang gefunden wird. Bei 4 Zoll Länge der Scheide, müsste der 2" lange Uterus mit seinem Grunde über der oberen Beckenapertur stehen, was nicht der Fall ist. Der Querdurchmesser beträgt, bei gebührlicher Weite. nur 1 Zoll. Sie beginnt in der ausseren Scham mit dem Ostium vaginge. liegt zwischen Harnblase und Mastdarm, und endigt mit dem Grunde oder Gewölbe, Fornix s. Fundus, in welchen die Pars vaginalis uteri als stumpser kegelsormiger Hügel hineinragt. Ihre Axe stimmt mit der Axe des kleinen Beckens überein, ist somit ein Segment einer Kreislinie, deren Concavität nach vorn sieht. Dieses Umstandes wegen ist die vordere Wand der Scheide um 2/s" kürzer als die hintere, und das Scheidengewölbe hinter der Portio vaginalis uteri tiefer, als vor derselben. Vordere und hintere Scheidenwand stehen im Leben nicht von einander ab, sondern berühren sich, so lange nichts dazwischen kommt. Da das Peritoneum schon von den Flächen des Uterus zur Harnblase und zum Mastdarm überging, so kann die Scheide keinen Bauchsellüberzug haben, welcher nur bei sehr alten Individuen (und bei Embryonen) an einer kleinen Strecke der hinteren Wand vorkommt. Die Wand der Scheide wird durch eine dicke, mit starken Venennetzen (welchen jedoch der Charakter des Schwellgewebes fehlt) umgebene, sehr dehnbare und elastische Bindegewebhaut, und durch eine Schleimhaut gebildet, welche keine Schleimdrüsen, wohl aber zahlreiche Papillen, und ein mehrfach geschichtetes Pflasterepithelium besitzt. Eine unter der Schleimhaut liegende Muskelschichte (glatte Fasern), wurde in neuester Zeit durch Kölliker und Virchow nachgewiesen. Der Scheideneingang ist mit einem deutlichen Schnürmuskel, Constrictor cunni. versehen, welcher der Willkür gehorcht, und aus quergestreisten Fasern besteht. Die Schleimhaut ist an der vorderen und hinteren Wand in quere. gekerbte Falten (Runzeln) gelegt, Columna plicarum anterior et posterior, welche gegen den Fornix verschwinden. Durch häufige Begattung, und noch mehr durch östere Geburten, werden die Runzeln der hinteren Wand geglättet; die vorderen erhalten sich. Ihre härtere Consistenz als bei anderen Schleimhautsalten, und ihre Empsindlichkeit, steigert während der Begattung die Geschlechtslust des Weibes, und vermehrt, durch Reibung an der Glans, den Impetus coëundi des Mannes. Je näher dem Scheideneingange, desto dicker und härter sind diese Falten. Bei Jungfrauen fühlen sie sich knorpelhart an. Die Schleimhaut bildet im jungfräulichen Zustande am Scheideneingange, durch Faltung von unten auf, eine halbmondförmige Duplicatur - die Scheidenklappe, Hymen, Membrana virginitatis, deren oberer concaver Rand nur so viel von der Scheidenöffnung übrig lässt, als für den Absluss der Reinigung nothwendig ist. Nach Zerstörung derselben, bleiben die sogenannten Carunculae myrtiformes, als gekerbte Schleimhautreste zurück.

Die Form der Scheidenklappe ist, so wie ihre Festigkeit, vielen Verschiedenheiten unterworfen. Zuweilen ist sie ringförmig (Hymen annularis), und die Oessnung nicht in der Mitte, sondern mehr nach vorn (oben) gelegen. Seltener hat sie mehrere Oessnungen (Hymen cribriformis), und am seltensten ist sie undurchbohrt (Hymen impersoratus). Bei angeborener Duplicität der Scheide ist das Hymen nicht doppelt (wie Huschke angiebt), sondern fehlt in beiden Scheiden. Die Festigkeit des Hymen kann ein unbesiegbares Begattungshinderniss abgeben, und die Trennung desselben durch den Schnitt nothwendig machen. Da es als Duplicatur der Schleimhaut auch Blutgesässe enthält, so wird der mit der ersten Begattung verbundene Blutverlust von vielen Völkern als Zeichen der Jungfrauschaft genommen. (Heutzutage noch bei den Mauren, den Juden im Orient, den Kirgisen und Samojeden. Auf Sierra Leona ist, bei Fehlen dieses Zeichens, die Ehe nichtig.) - Dass ein fehlendes Hymen den Verlust der Jungfrauschast nicht verbürgt, ebensowenig als ein vorhandenes ein untrüglicher Zeuge der Reinheit ist, ist schon lange den Gerichtsärzten bekannt. Es wurden angeborener Mangel des Hymen und zufällige Zerreissung desselben im zarten Kindesalter (durch Verwundung, Bohren mit dem Finger in der Scheide bei Pruritus verminosus etc.) beobachtet. Dass aber durch Reiten, Springen, oder einen Fall mit ausgespreiteten Füssen das Hymen zerreissen könne, ist nach Versuchen mit Cadavern, die ich 1836 anstellte, eine Unmöglichkeit. Auch an Fällen, wo das Hymen erst durch die Geburt zerrissen, oder bei Prostituirten unversehrt gefunden wurde, fehlt es nicht. — Einhufer, Wiederkäuer, Fleischfresser und Affen haben ein Analogon der Scheidenklappe; die übrigen Thiere nicht. Ueber die physiologische Bedeutung des Hymen haben wir keine Vermuthung. — Die Zerstörung des Hymen bei der ersten Begattung (Deftoratio) ist wohl das einzige Beispiel einer auf rein mechanischem Wege bewerkstelligten, physiologischen Vernichtung eines Organs. Bei sehr verweichlichten Völkern des Alterthums wurde sie den Götzenpriestern, im Mittelalter auch den Gutsherren überlassen (Jus primas noctis).

§. 264. Aeussere Scham.

Die Faltenbildung, die in der Gebärmutter als Palmae plicatae, und in der Scheide als Columnae rugarum austrat, erhält in der äusseren Scham ihre grösste Entwicklung. Die Scham, Pudendum muliebre s. Vulva s. Cunnus, besteht aus den grossen und kleinen Schamfalten oder Lippen, zwischen welchen eine senkrechte Spalte zu den Mündungen der Harnrühre und der Scheide sührt.

Die grossen Schamlippen, Labia majora, erstrecken sich vom Schamhügel (Mons Veneris, Pubes crinosa, bei früheren Anatomen eleganter Weise auch Hebe) zum Mittelsleisch, wo sie durch das Frenulum labiorum mit einander verbunden werden. Hinter und über dem Frenulum vertiest sich die Schamspalte (Rima pudendi) zur schiffformigen Grube. Fossa navicularis. Die äussere Fläche der Schamlippen hat den allgemeinen Charakter des Integuments, mit Haarbälgen und Talgdrüsen; die inneren Flächen beider Lippen haben schon das Ansehen einer Schleimhaut, besitzen aber keine Schleimdrüsen, sondern noch Glandulae sebaceae, und schliessen durch wechselseitige Berührung bei jungfräulichen Individuen die Schamspalte, welche durch wiederholte Begattung und Geburten klaffend wird. Fettreiches, dichtes Zellgewebe - eine Fortsetzung der Fascia superficialis - giebt ihnen eine gewisse Prallheit, welche erst im späteren Frauenalter schwindet. Zwischen den grossen Schamlippen, und mit ihnen parallel, finden sich die kleinen, Labia minora s. Nymphae, welche von der Clitoris bis zur Seite des Scheideneinganges herabreichen, und mit ihren freien gekerbten Rändern nicht über die grossen Lippen hervorragen. Unter der Clitoris spaltet sich jede in zwei Fältchen, deren eines sich, mit demselben der anderen Seite verbunden, an die untere Fläche der Glans clitoridis inserirt (als Frenulum clitoridis), deren anderes über die Glans hinaufsteigt, um sich mit den gleichen Fältchen der gegenständigen kleinen Schamlippe zu verbinden, und die Vorhaut der Clitoris zu bilden.

Der Kitzler (Clitoris, κλειτορίζω, titillare), ist dem männlichen Gliede analog, und wie dieses gebaut, aber undurchbohrt. Er besteht aus zwei Schwellkürpern, die von den Sitzbeinen entspringen, sich an einander legen, und einen, durch Gestalt und Lage dem Penis gleichenden, erectilen Kürper bilden, der eine Glans, ein Präputium, und ein doppeltes Frenulum, aber keine Harnrühre besitzt.

Die weibliche Harnröhre mündet vielmehr in der Mitte des Raumes, zwischen den kleinen Schamlippen (Atrium s. Vestibulum vaginae s. Pronaus), 4"—5" unter der Clitoris, und unmittelbar über dem Scheideneingange, mit einer rundlichen wulstigen Oeffnung, um welche herum, so wie an den Seiten des Scheideneinganges, schon traubenförmige Schleimdrüschen austreten.

Erst an der inneren Oberstäche der kleinen Schamlippen nimmt die sie bildende Haut den Charakter einer wahren Schleimhaut mit Folliculis muciparis an. Am Scheideneingange münden links und rechts die Bartholin'schen oder Tiedemann'schen Drüsen aus (den Cowper'schen Drüsen der männlichen Harnröhre analog gebaut, aber grösser).

Die kleinen Schamlippen haben nur bei Personen, wo sie nicht über die grossen Lippen hervorstehen, die rosenrothe Schleimhautfarbe; ragen sie über diese vor. so werden sie trockener, härter und brauner, und bei Missbrauch der Genitalien zuweilen so lang, dass sie wie laxe, hahnenkammförmige Lappen 1" weit herabhängen. Bei den Weibern der Hottentotten und Buschmänner haben sie die excessive Länge von 6"-8", und sind als Schurze (tablier) beschrieben worden. (Cuvier, in den Mem. du musée d'hist. nat. Tom. III. pag. 259.) Ihre bei einigen Völkern (im nördlichen Afrika) constant vorkommende Verlängerung erfordert die blutige Resection derselben. -Die Clitoris ist in südlichen Zonen grösser, als in den gemässigten und kalten Breiten. Bei den Abyssinierinnen, den Mandingos und Ibbos, so wie den hermaphroditischen Frauen (Androgynae), ist ihre Grösse bedeutend, und erfordert bei ersteren ebenfalls die Beschneidung als volksthümliche Operation. Als bei der Bekehrung der Abyssinier zum Christenthume (im 16. Jahrhundert) die Missionäre die weibliche Beschneidung als Ueberrest des Heidenthums abstellten, machten die Männer Revolution, die nicht srüher beigelegt wurde, als bis ein von der Propaganda in Rom abgesandter Wundarzt die Nothwendigkeit des alten Brauches seststellte. - Bei besonderer Entwicklung kann die Clitoris die Stelle des männlichen Gliedes vertreten, und eine Anomalie geschlechtlicher Vermischung veranlassen (Amor lesbicus), welche nach Parent Duchatelet nicht allein dem Alterthume angehört. — Taylor und Krause haben zwei besondere Schwellkörper der Urethra, die an ihrer unteren Seite verlaufen, aber sie nicht, wie beim Manne, umgeben, als Corpora cavernosa vestibuli beschrieben.

Die Bartholin'schen Drüsen wurden zuerst von J. G. Duverney an der Kuh gefunden (Tiedemann, von den Duverney'schen, Bartholin'schen oder Cowper'schen Drüsen des Weibes. Heidelb., 1840.) und neuester Zeit durch Tiedemann der Vergessenheit entrissen. Sie sind bei jungen Mädchen und Frauen grösser, und schwinden im höheren Alter. Sie liegen hinter der Fascia perinei superficialis, hinter dem Constrictor cunni, und über der Basis des hinteren Theils der grossen Schamlippen. Ihre Grösse beträgt gewöhnlich die einer Bohne, und ihr Ausführungsgang, der an der Seite des Scheideneinganges mündet, ist 7"-8" lang. Drückt man den hinteren Theil der grossen Schamlippen, so entleert man zuweilen eine schmutzig-gelbe Flüssigkeit aus ihrer Mündung am Scheideneingange. Schlüpfrigmachen des Scheideneinganges scheint ihre Bestimmung zu sein. Ich habe sie zweimal in Abscesse übergehen gesehen, welche lange fistulös blieben.

§. 265. Brüste.

Die Brüste, Mammae (bei Thieren Ubera), sind der Ausdruck des ganz nach aussen gekehrten, und für die Erhaltung eines fremden Daseins wirkenden Zeugungslebens. Sie sitzen bei den meisten Thieren am Unterleibe, und rücken beim Menschen und bei den Affen (wo die obere Extremität am freiesten wird und den Säugling trägt), an die seitliche Gegend der vorderen Brustwand.

Sie liegen auf dem grossen Brustmuskel, von der dritten bis sechsten Rippe, und sind durch eine mittlere, dem Brustbein parallele Furche den Busen, Sinus - von einander getrennt. Ihre aussere Gestalt ist halbkugelig, unterliegt jedoch, wie ihre Grösse, sehr vielen Verschiedenheiten, welche durch die physiologischen Lebenszustände, durch Klima, Nationalität, Alter, Tracht etc. bestimmt werden. An der höchsten Wölbung der Bruste ragt die erectile Brustwarze (Papilla), bei Thieren Zitze (von τιτθός) genannt, hervor, welche, da die Axen beider Brüste mässig nach aussen divergiren, nicht nach vorn, sondern nach aussen gerichtet ist. Sie ist, so wie der sie umgebende Warzenhof (Arcola), von bräunlicher Farbe, mässig vorragend, oder in ein Grübchen zurückgezogen, runzelig, und ihres Reichtbums an feinen Tastwärzchen wegen, sehr empfindlich. Talgdrüsen kommen nur auf der Areola vor, und verleihen derselben durch ihr Hervorragen ein höckeriges Ansehen. — Nicht immer sind beide Brustwarzen an Dicke und Länge gleich, und stillende Frauen reichen ihren Säuglingen lieber und öster jene Brust, welche die grössere Warze hat. — Am männlichen Thorax steht zuweilen eine Brustwarze höher als die andere, und ihr Standort, der gewöhnlich dem Zwischenraum der 4. und 5. Rippe entspricht, steigt zuweilen in den nächst unteren Zwischenrippenraum herab (nach Luschka unter 60 Individuen zweimal).

Jede Brust besteht (nach der Zahl ihrer Ausführungsgänge zu urtheilen) aus 16—24 Lappen, welche durch Umhüllungszellstoff zu einem scheibenförmigen Körper zusammengefasst, und in ein reiches Zellgeweblager (Panniculus adiposus) eingesenkt werden, welches der Brust ihre runde Form, und ihre weiche Consistenz giebt. Die Structur der Lappen kann nur an milchgefüllten Brüsten untersucht werden (bei Jungfrauen ist die Schnittsäche der Brust ein scheinbar vollkommen homogenes Gewebe). Jeder Lappen ist ein Aggregat von traubenförmig gehäusten, häutigen Bläschen (Acini), deren kleine Aussührungsgänge sich baumförmig zu einem grösseren Kanale (Ductus lactiferus s. galactophorus) vereinigen. Jedem Lappen entspricht ein Ductus lactiferus. Sie convergiren gegen den Grund der Warze, erweitern sich unter der Areola zu den sogenannten Milchbehältern (Sinus lactei), ohne zu anastomosiren; verengern sich hierauf, und steigen zuletzt gegen die Spitze der Warze auf, wo sie, zu zwei oder drei, zwischen den Runzeln mit seinen Oessnungen münden.

Die Brustwarze und der Warzenhof besitzen glatte Muskelfasern. Milchgänge entbehren derselben (?), und bestehen aus Bindegewebe mit Cylinderepithelium, welches in den seineren Ramisicationen der Milchgänge psiasterformig wird. Die Arterien der Brust stammen aus der Arteria mammaria interna und der Arteria axillaris. Die Venen verhalten sich entsprechend, und übertreffen die Arterien so sehr an Umfang, dass ihre hochliegenden Zweige auch bei gesunden Brüsten durch das zarte Integument als blaue Stränge durchscheinen. Die Saugadern verbinden sich mit den Lymphdrusen des vorderen Mittelfellraums, und mit jenen der Achselhöhle. Auch eine oder zwei an der Clavicula liegende Lymphdrüsen nehmen Saugadern aus der Brust auf. Sympathische Nervenzweige sind problematisch. Animale Nervenzweige entspringen aus dem Plexus supraclavicularis, und dem 2. - 4. Intercostalnerv. - Im strotzenden Zustande beträgt der Durchmesser der einzelnen Endbläschen der Milchkanäle 0,054". Sie werden von capillaren Gefässnetzen umwebt, wodurch der Bau der Druse mit jenem der Speicheldrusen und der Lunge verwandt wird. Die Aussuhrungsgänge der Lappen sind 1", die Sinus lactei 3"-4", die Ausmündung an der Warzenspitze aber höchstens 0,3" weit. Das fibröse Element, wie es von allen Schriftstellern über chirurgische Anatomie in der Brust angenommen wird (als Scheidewände zwischen den einzelnen Lappen), existirt nicht. Die Lappen werden nur durch gewöhnlichen Zellstoff mit einander verbunden, behaupten jedoch soweit eine gewisse Selbstständigkeit, dass bei Entzündungen der Brustdrüse nicht Ein Abscess, sondern so vicle Abscesse entstehen, als Lappen erkrankten.

Die männlichen Brüste, welche im frühen Embryoleben den weiblichen vollkommen gleichen, verkümmern bei Erwachsenen (ohne jedoch gänzlich zu schwinden), und es gehört unter die seltenen Ausnahmen, wenn ihre Vitalität sich bis zur Erzeugung wahrer Milch steigert. Der merkwürdigste und verbürgteste Fall dieser Art wird von A. Humboldt (Reise in die Acquinoctialgegenden des neuen Continents. 2. Bd. pag. 40) erzählt, wo ein Mann, während der Krankheit seiner Frau, sein Kind fünf Monate lang stillte. Ein neuerer Fall der Art wird von Häser in dessen Archiv, 1844. pag. 272. berichtet. Ueber die Rückbildung der Brust bei männlichen Individuen siehe C. Langer, über den Bau und die Entwicklung der Milchdrüsen, in dem Denkschristen der kais. Acad. III. Bd. 1851., und Luschka in Müller's Archiv. 1852.

Vermehrung der Warzen auf Einer Brust (Tiedemann, Siebold, Flechsig), Vermehrung der Brüste bis auf 5 (Haller, Moore, Percy), abnorme Lage derselben in der Achsel, auf dem Rücken, am Schenkel (Bartholin, Siebold, Robert), gehören unter die Seltenheiten.

Die von J. F. Meckel (Nova experimenta de finibus venarum. Berol., 1772.) angenommenen Anastomosen der Milchgänge existiren weder in der menschlichen Brust, noch im Euter der Thiere. (Ich habe sie wenigstens beim Hunde, Schweine, der Hauskatze, und dem Marder, deren injicirte Brustdüsen ich untersuchte, nicht auffinden können.) Der von Haller und jüngst von Sebastian (De circulo venoso areolae. Gröningae, 1837.) beschriebene Venenkreis im Warzenhofe ist an zwei Exemplaren, die ich vor mir habe, nicht geschlossen, sondern umgiebt nur ²/₂ der Brustwarze.

Die Milch, Lac, die naturgemässeste Nahrung des Neugeborenen bis zum Ausbruche der Zähne, ist eine Fettemulsion, welche aus Wasser, Käsestoff, Fett (Butter), Milchzucker, und einem geringen Antheil mineralischer Salze besteht. Mikroskopisch untersucht zeigt sie: 1. Milchkörperchen.

Globuli lactis, von 0,050"—0,005" Durchmesser. Sie sind Fetttröpschen, mit einer Hülle von Käsestoff (Henle), sliessen beim Stehenlassen der Milch zu grösseren Kügelchen zusammen, und bilden den Rahm. 2. Colostrumkugeln (Donné) von 0,01"—0,05" Durchmesser. Sie sinden sich nur in der, durch einige Tage vor und nach der Geburt abgesonderten Milch (Colostrum), und scheinen nur Aggregate von Milchkörperchen zu sein. 3. Epitheliumzellen. — Durch Filtriren lassen sich die Milchkörperchen von dem slüssigen Menstruum der Milch, Plasma lactis, abscheiden. Das Plasma trennt sich durch den Act des Gerinnens in Käsestoff und Molkenstüssigkeit (Serum lactis), welche letztere aus Wasser, Milchzucker und Salzen besteht.

III. Mittelfleisch.

§. 266. Ausdehnung und Grenzen des Mittelfleisehes.

Mittelsleisch oder Damm, Perineum (πηρίνεον, nicht περίνεον oder $\pi \epsilon \rho i \nu \alpha i \sigma v$, da es von $\pi \eta \rho i \sigma$ oder $\pi \eta \rho \alpha$, Beutel — Hodensack und nicht von negl und valos stammt), ist die zwischen Aster und Hodensack bei Männern, zwischen After und hinteren Winkel der Schamspalte bei Weibern liegende Gegend. Das weibliche Perineum ist viel kurzer als das männliche, aber breiter (wegen grüsserer Entfernung beider Sitzknorren von einander), und wird auch Interfemineum genannt, quia inter femina (alte Diction statt femora) jacet. Man kann also auch das männliche Mittelsleisch sehr wohl Interfemineum, aber niemals Interfemininum nennen, was gar keinen Sinn hat. Bei äusserer Besichtigung geht es seitwärts, ohne bestimmte Grenze, in die innere Fläche der Schenkel über. In der Tiese bestimmen die Knorren und die aussteigenden Aeste der Sitzbeine seine Breitenausdehnung. Seine Tiefe, d. h. die Dicke der Weichtheile, welche es enthält, ist um so bedeutender, je mehr man sich dem Aster nähert. Die hier folgende Beschreibung gilt nur vom männlichen Perineum, welches in chirurgischer Beziehung eine der wichtigsten Leibesregionen ist, und in der topographischen Anatomie nicht geschildert wurde, weil seine innige und in operativer Hinsicht höchst bedeutungsvolle Beziehung zu den Geschlechtstheilen die Kenntniss dieser voraussetzt. Bei der Zergliederung, so wie bei der Beschreibung des Mittelsleisches, hält man sich nicht genau an die oben angegebenen Grenzen desselben, sondern nimmt auf alle Theile des Urogenital- und Verdauungssystems Rücksicht, welche in der Ausgangsöffnung des kleinen Beckens liegen.

§. 267. Beckenbinde.

Zuvörderst ist es nothwendig, eine Aponeurose kennen zu lernen, welche eine Scheidewand zwischen dem Mittelsleische und der Beckenhöhle bildet, somit die Tiese des Perineums bestimmt, und Beckenaponeurose oder Beckenbinde, Fascia pelvis s. hypogastrica, genannt wird.

Der Ausgang des *Pelvis minor* stellt, am Skelete oder Bandpräparate des Beckens, eine grosse, herzförmige Oeffnung, mit vorderer abgerundeter Spitze dar, welche nur durch Weichtheile verschlossen wird, und das Ende des Verdauungskanals, so wie die Ausmündungsgänge des Urogenitalsystems enthält. Der Druck der Baucheingeweide nach abwärts, der durch jede Wirkung der Bauchpresse noch gesteigert wird, würde die den Beckenausgang verschliessenden Weichtheile bald nach aussen drängen, und Vorfälle der Unterleibsorgane bewirken, wenn diese Weichtheile nicht durch starke Aponeurosen gestützt, und dem Drucke dadurch ein hinlänglich starker Damm entgegengestellt würde. Diese Aponeurosen sind die Beckenbinde und die eigentliche Mittelsleischbinde. Zwischen beiden liegen die Weichtheile des Perineums.

Die Beckenbinde entspringt vom Eingange des kleinen Beckens, bis zur Incisura ischiadica major hin. Ihre Ursprungspunkte sind, von vorn nach rückwärts gezählt, die hintere Wand der Symphysis ossium pubis. die Crista ossis pubis, die Linea arcuata interna ossis ilei. Sie hängt an diesen Stellen mit den sich daselbst festsetzenden Aponeurosen des grossen Beckens (Fascia iliaca) und der Bauchwand (Fascia transversa) zusammen. Der von der Symphyse entspringende Theil der Beckenbinde ist der kurzeste, indem er im männlichen Geschlechte zur Prostata, im weiblichen zum Blasenhalse herabsteigt, und sich daselbst befestigt. Er wird als rechtes und linkes Ligamentum pubo-prostaticum laterale beim Manne, pubovesicale beim Weibe bezeichnet. Das Ligamentum pubo-prostaticum medium und pubo-vesicale medium liegt zwischen diesen beiden Bändern in der Mitte, und fullt ihre Lucke aus. - Der von der Crista pubis entsprungene Theil der Beckenbinde überzieht die obere Halste des Musculus obturator internus, steigt also etwas tiefer herab, und schickt eine trichterformige Fortsetzung in den Canalis obturatorius, als Scheide für die hier aus- und eingehenden Gefässe und Nerven. Der von der Linea arcuata entsprungene Antheil dieser Binde geht an der vorderen Fläche des Musculus puriformis herab, nähert sich der Mittellinie des Kreuzbeins, erreicht sie aber nur mit einigen fibrosen Bundeln, oder hort mit einem schärferen, wie abgeschnittenen, concaven Rande auf, hinter welchem der Plexus ischiadicus und die Vasa glutaea superiora et inferiora zum grossen Hustloch gehen. Der zweite und dritte Ursprungstheil der Beckenbinde laufen an den Seitenwänden der kleinen Beckenhöhle nicht bis zu deren unterer Ausgangsöffnung herab, da sie einem von unten herauf wachsenden Theile der eigentlichen Mittelsleischbinde begegnen, sich mit ihm verbinden, und, die Seitenwand der Beckenhöhle verlassend, gegen die Beckenaxe schräg nach ein- und abwärts laufen, um sich theils an die Seitenränder des Steissbeins zu besestigen, theils an die Seitenwand des Mastdarms, und den Grund der Harnblase zu treten. Jenes Stück der Fascia pelvis. welches zum Grunde der Harnblase geht, theilt sich in drei Lamellen: eine aussteigende, welche an der Seitensläche der Blase hinausläust, um den Körper der Blase einzuhüllen, eine mittlere, welche zwischen Blase und Mastdarm eindringt (Fascia recto-vesicalis nach Tyrrel), und eine untere, welche hinter dem Mastdarm fortläust. Alle drei Lamellen stossen in der Mittellinie mit denen der anderen Seite zusammen. Die Stelle, von welcher an die Beckenbinde die Seitenwand des Beckens verlässt, um nach einwärts zu lausen, erscheint als ein starker, sehniger Streif, Arcus tendineus fasciae pelvis, welcher vom Ligamentum pubo-prostaticum laterale bis zur Spina ischii in ziemlich horizontaler Richtung verläust. Wenn vom rechten und linken Arcus tendineus aus, beide Beckenbinden nach einwärts ziehen, und in der Mitte des Beckens zusammenstossen, so wird eben dadurch eine fibrose Scheidewand, Diaphragma pelvis, gebildet, welche die obere grössere Abtheilung der kleinen Beckenhöhle von der unteren scheidet, und so viele Oeffnungen besitzt, als Schläuche durch sie durchtreten (zwei beim Manne: für den Mastdarm, und den Blasenhals; drei beim Weibe: für den Mastdarm, die Scheide, und den Blasenhals). Dieses Diaphragma pelvis bildet die Grenze, bis zu welcher die Tiefe des Mittelfleisches reicht, und ihre Beschreibung musste der des Perineums vorausgeschickt werden, um eine pracise Vorstellung von der Ausdehnung dieser Gegend zu haben.

§. 268. Mittelfleischbinden und topographische Anatomie des Mittelfleisches.

Unter Fascien oder Binden des Mittelfleisches, Fasciae perineales. versteht man die mit der Fascia superficialis und Fascia propria anderer Gegenden übereinstimmenden Aponeurosen. Sie werden von der Haut aus untersucht, und man versährt hiebei auf solgende Weise. Man sixirt den Leichnam am Rande eines Tisches in der Stellung, dass die im Knie gebeugten Schenkel gegen den Bauch geschlagen, und in den Hüstgelenken nach auswärts gerollt werden. Dadurch wird die Ansicht des Perineums frei. Dann wird der Hodensack gegen den Bauch heraufgezogen, und mit Haken an der Bauchwand befestigt. Denkt man sich zwischen beiden Sitzknorren eine Querlinie gezogen, so kann man streng die eigentliche Mittelfleischgegend, welche vor dieser Linie liegt, von der hinter ihr besindlichen Aftergegend trennen. Man bemerkt in der Medianlinie die Mittelfleischnath, Raphe perinei, welche sich nach vorn in die Scrotalnath fortsetzt, gegen den After zu aber undeutlich wird, und zuletzt gänzlich verstreicht. Die Haut des Mittelsleisches ist dunn, bei mageren Leuten verschiebbar, bei fetten prall, meist dunkel gefärbt und behaart, und mit zahlreichen Folliculis sebaceis versehen, welche gegen den Aster hin zahlreicher werden. Nun trennt man die Haut mittelst zweier halbmondformiger Schnitte, welche beiderseits von der Basis des Scrotums zur Steissheinspitze laufen, und ihre concaven Seiten nach einwärts kehren. Nach Abtragung der Haut erscheint das fettreiche subcutane Zellgewebe, welches nur bei sehr abgezehrten Leichen als Haut (Fortsetzung der Fascia superficialis benachbarter Gegenden) erscheint, und bei sehr wohlgenährten Körpern eine Dicke von anderthalb Zollen erreicht. In der Richtung gegen den After nimmt sein Fettreichthum ab, und es erscheint als deutliches zelliges Blatt, welches mit der tiefer folgenden Mittelsleischbinde verwachsen ist. Nach vorn wird es ebenfalls fettarm, und geht in die Dartos des Hodensacks über. Es wird ebenso entfernt, wie die allgemeine Decke. Hierauf folgt die eigentliche Fascia perinei. Sie besteht aus zwei Blättern, welche nur bis zum Sitzknorren herab deutlich von einander getrennt sind, vom Sitzknorren angesangen dagegen mit einander zu einer einsachen Aponeurose verschmelzen. Ich unterscheide somit einen ein blätterigen und zweiblätterigen Theil der Mittelsleischbinde.

Der zweiblätterige Theil der Mittelsleischbinde füllt den Raum des Arcus pubis aus, indem er vom aufsteigenden Sitzbeinaste und absteigenden Schambeinaste einer Seite, zu denselben Theilen der anderen Seite ausgespannt ist. Die Ansange der Schwellkörper der Ruthe, der Bulbus urethrae, und die queren Muskeln des Dammes liegen zwischen beiden Blättern. Das hochliegende Blatt geht nach vorn und oben in eine Hülle der Pars membranacea urethrae, und zuletzt in die Fascia des Gliedes oder der Clitoris über, das tiefliegende Blatt dagegen setzt sich am unteren Rande des Ligamentum arcuatum pubis fest. Das tiesliegende Blatt wird von der Pars membranacea urethrae durchbohrt. Der Theil des Blattes. welcher von der Harnröhre zum unteren Rande des Ligamentum arcuatum hinausgeht, wird Ligamentum triangulare urethrae genannt, da es stärker als der übrige Theil des Blattes ist, und früher als dieser durch Colles bekannt wurde, der es für ein selbstständiges Band hielt. Es nimmt auch an der Bildung des Ligamentum pubo-prostaticum medium, bei Weibern pubo-vesicale medium, Antheil.

Prof. Retzius hat aus einzelnen Abtheilungen der in diesem und in dem vorhergehenden Paragraphe abgehandelten Fascien sein Ligamentum pelvio-prostaticum capsulare zusammengesetzt, indem er es als den Hauptzweck dieser Fascien ansieht, die Prostata und den musculösen Theil der Harnröhre in eine feste Kapsel aufzunehmen, deren breiter Grund zugleich die untere Beckenöffnung verschliesst. Dieser Ansicht zufolge, von welcher ich, der übersichtlichen Zusammenfassung so complicirter Aponeurosen wegen, auch in meinen Vorlesungen Gebrauch mache, wäre die obere Wand der Capsula pelvio-prostatica durch unsere Ligamenta pubo-vesicalia, die vordere Wand durch das Ligamentum triangulare urethrae, die Seitenwände durch die auf den Levatores ani zur Prostata herabsteigenden Theile der Fascia pelvis, und die hintere Wand durch die im vorigen Paragraph als Fascia recto-vesicalis (Tyrrel) erwähnte Lamelle der Beckenbinde gebildet (Müller's Archiv. 1849. pag. 182).

Der einblätterige Theil der Mittelsleischbinde beginnt hinter den

queren Dammuskeln. Er entspringt vom Ligamentum tuberoso-sacrum und vom Sitzknorren selbst, läust an der inneren Fläche des Sitzknorrens und des Musculus obturator internus bis zum Arcus tendineus der Fascia pelvis hinaus, welchen er bilden hilst, wendet sich von hier unter einem spitzigen Winkel nach ab- und einwärts, überzieht die untere Fläche des Musculus levator ani, an welcher er bis zum Sphincter ani externus herabsteigt, wo er mit der Fascia superficialis verschmilzt. Durch diese Winkelbeugung des tiesen Blattes wird ein Raum umschrieben, dessen äussere Grenze der Sitzknorren mit seinen Aesten, — dessen innere Grenze die äussere Mastdarmwand und der sie deckende Levator ani bildet. Dieser Raum wird Fossa perinei s. Cavum ischio-rectum genannt, und ist mit Zellgewebe und reichlichem Fett ausgefüllt.

In diesem Raum bilden sich die geschrichen Mittelseischabseesse, welche in die Mastdarmhöhle durchbrechen können, und die inneren Mastdarmsisteln veranlassen. Das Cavum ischio-rectum misst in der Quere 1 Zoll, in der Höhe 2 Zoll und darüber. Es hat eine pyramidale Gestalt mit unterer Basis. Seine hintere Wand wird durch das Ligamentum tuberoso-sacrum, und der hintere Theil seiner Basis durch die unteren Fascikeln des grossen Gestssmuskels gebildet. Von der Stelle an, wo das hoch- und tiesliegende Blatt der Fascia perinci mit einander verschmolzen sind, lausen sie nach rückwärts, um den zwischen den Ligamentis tuberoso-sacris und der Steissbeinspitze besindlichen Raum auszusullen, und sich an den genannten Festgebilden zu inseriren. — Die Aponeurosen des weiblichen Perineums behandelt nicht sehr klar Jarjavay in den Archives d'anat. et de physiologie. 1846. Octobre.

§. 269. Muskeln des Mittelfleisches und der Aftergegend.

Nebst den schon beim Mastdarme beschriebenen Schliess- und Hebemuskeln des Afters, gehören noch folgende hieher:

a) Der Sitzknorren - Schwellkörpermuskel, Musculus ischiocavernosus. Er bedeckt die Wurzel des Schwellkörpers des Gliedes von
unten, entspringt, wie dieser, am Sitzknorren, schlägt sich um den Schwellkörper herum zu dessen Aussensläche, und verliert sich in der sibrösen
Hülle desselben. Bei Weibern hat er dieselbe Beziehung zum Schwellkörper
der Clitoris. Zuweilen geht eine sehnige Fortsetzung desselben, auf dem
Rücken des Gliedes, mit demselben Muskel der anderen Seite eine Verbindung ein, wodurch eine Schlinge über die Rückengestsse des Gliedes gebildet wird, welche durch Compression der Dorsalvene vielleicht Einsluss
auf den Mechanismus der Erection nehmen kann.

Dieser Muskel drückt die Wurzel des Schwellkörpers gegen den Sitz-knorren, und soll dadurch den Rücksluss des venösen Blutes hemmen — somit Erection veranlassen, weshalb er früher Erector, auch Sustentator penis, genannt wurde. Da die Wirkung dieses Muskels eine willkurliche, die Erection dagegen häufig unwillkürlich und mitunter bei dem besten Willen unmöglich wird, kann in der Wirkung dieses Muskels nicht das einzige Bedingende der Erection liegen.

b) Der Zwiebel-Schwellkörpermuskel, Musculus bulbo-caver-

nosus. Er umfasst den Bulbus urethrae von unten, und liegt, wie dieser, zwischen den Ursprüngen der beiden Schwellkörper der Ruthe. Er fehlt, sammt dem Bulbus, im weiblichen Geschlechte, und wird durch den Constrictor cunni ersetzt. Er entspringt, mit dem gleichnamigen Muskel der anderen Seite vereinigt, von einer tendinösen Längenlinie, an der unteren Fläche des Bulbus, hängt nach hinten mit dem vorderen Ende des Sphincter ani externus und dem oberflächlichen Musculus transversus perinei zusammen, und geht nach aussen mit seinen hinteren Fasern in das oberflächliche Blatt der Mittelsleischbinde, mit seinen vorderen und mittleren Fasern in die sibröse Haut der Schwellkörper des Gliedes über. Beide Muskeln bilden somit eine Art Halster um den Bulbus urethrae, können diesen durch Heben seiner unteren Wand verengern, und wenn dieses Heben mit einer zuckenden Geschwindigkeit geschieht, Harn und Samen aus der Harnröhre stossweise hervortreihen. Sie werden beide deshalb Ejaculatores semmis, auch Acceleratores uringe genannt.

Ihre Wirkung ist nur beim Harnlassen willkürlich, wo sie die letzten Tropfen Harns heraustreiben. Bei der Entleerung des Samens erfolgen ihre zuckenden Bewegungen unwillkürlich, und werden deshalb von Herophilus mit epileptischem Krampfe (Epilepsia brevis) verglichen. Da die Wirkung dieses Muskels nicht auf die Schwellkörper, sondern auf den Bulbus urethras loszielt, so wäre es zweckmässiger, ihn vom Schwellkörper entstehen, und an der sehnigen Linie des Bulbus endigen zu lassen, wie Albin und Theile thaten. Seine vordersten Fasern sind so sehr entwickelt, dass sie bis zum Dorsum penis reichen, und mit dem Ligamentum suspensorium penis verschmelzen. Lässt man sie nun von diesem Ligament entspringen, statt dort endigen, so können sie als Levator penis s. Pubo-cavernosus wirken, der als vollkommen isolirter Muskel nur bei Thieren vorkommt.

c) Die queren Dammmuskeln, Musculi transversi perinei. Der oberflächliche entspringt von der inneren Fläche des aussteigenden Sitzbeinastes, geht nach ein- und etwas nach vorwärts, breitet sich zugleich aus, und stösst in der Mittellinie mit dem entgegengesetzten zusammen. Seine vorderen Bündel hängen mit dem Bulbo-cavernosus, seine hinteren mit dem Sphincter ani externus und Levator ani zusammen. Da die Richtung des Muskels nicht vollkommen gerade nach einwärts (horizontal), sondern zugleich schräge nach unten geht, so werden beide oberflächliche Dammmuskeln eine musculöse Schlinge vorstellen, auf welcher die höher im Becken liegenden Organe des Mittelsleisches ruhen, und durch deren Wirkung sie gehoben, also auch von unten her gedrückt werden können, wie bei der Harn-, Samen- und Stuhlentleerung geschieht. — Der tiefe Dammmuskel entspringt über dem vorigen, aber weiter nach vorn, vom absteigenden Schambein- und außteigenden Sitzbeinast, und hat dieselbe Richtung und Insertionsweise, wie der oberstächliche. Sein vorderer Rand hängt mit dem Constrictor urethrae, sein hinterer mit dem Asterheber zusammen. Seine , mus oper-Wirkung stimmt mit der des oberstächlichen überein. Er flächlichen durch das tiefliegende Blatt der Mittelliei

d) Der Zusammenschnürer der häutigen Harnröhre, Musculus constrictor urethrae membranaceae (besser wohl Compressor urethrae). Ueber diesen complicirten und schwerlich selbstständigen Muskel weichen die Angaben von Wilson, Guthrie (die beiden Entdecker seiner einzelnen Abtheilungen), und J. Müller, der die Anatomie dieses Muskels einer genauen Revision unterzog, bedeutend ab. Andere übergeben ihn ganz und gar mit Stillschweigen. Nach meinen Beobachtungen verhält sich die Sache wie folgt. Man muss die Durchbohrungsstelle des tiefen Blattes der Mittelfleischbinde durch die Harnröhre als den Sammelpunkt von Muskelfasern denken, welche theils von der hinteren Wand der Schamfuge herabkommen (Wilson's Schnürer), theils von den verschmelzenden Sitz- und Schambeinästen nach innen ziehen (Guthrie's Schnürer). Letztere gehen theils über, theils unter der Pars membranacea urethrae weg, und bilden dadurch eine Art Zwinge, welche diesen Theil der Harnröhre comprimiren kann. Die senkrecht von der Schamfuge herabkommende Portion besteht aus zwei Bündeln, welche aber nicht eine Schlinge um die Harnröhre bilden, sondern sich in das über die Harnröhre weglausende Bündel von Guthrie's Schnürmuskel einsenken. Wilson's Muskel kann deshalb. wenn man ihn als besonderen Muskel gelten lassen will, was er allerdings verdient, nie ein Constrictor urethrae, sondern nur ein Antagonist des Guthrie'schen Muskels sein. Die Pars membranacea urethrae besitzt übrigens noch wahre Kreisfasern.

Diese Muskeln liegen alle über dem tiesen Blatte der Mittelsleischbinde. zwischen ihm und der Fascia pelvis. Unter dem tiesen Blatte dieser Binde kommen allerdings Muskelfasern vor, welche auf die Harnröhre verengend einwirken, sie aber nie zusammenschnüren können. Ich kann somit diese Fasern nicht mit J. Müller zum Constrictor urethrae rechnen. Sie entspringen von den verschmolzenen Sitz- und Schambeinästen, selbst von der unteren Fläche des tiesen Blattes der Fascia perinci, ich sah sie jedoch niemals über und unter der Urethra weggehen, wodurch sie allein schnürend oder vielmehr zusammenpressend wirken könnten, sondern jedesmal unter der Urethra verlaufen. Ich halte sie, da sie nicht immer vorkommen, für keine wesentlichen Bewegungsorgane, und überhaupt nur für eine höher gediehene Entwicklung der queren Dammmuskeln, mit welchen sie durch Ursprung, Richtung und Verhältniss zur Mittellinie des Dammes, übereinstimmen. Einen besonderen Depressor vesicae anzunehmen, scheint mir nicht thunlich. da die als Depressor beschriebenen, von der hinteren Fläche des Schambogens und von der Vordersläche der Prostata entspringenden, und in der Wand der Blase nach aufwärts laufenden Muskelbundel nichts Anderes, als die longitudinale Muskelschicht der Harnblase (Detrusor urinae) sind.

Der Steissbeinmuskel, Musculus coccygeus, gehört nicht dem Mittelsleisch, sondern der seitlichen Astergegend an, entspringt von der Spina ischii, und geht, mit den Sehnenfasern des Liyamentum spinososacrum gemischt, zum Seitenrande des Steissbeins, welches er nach vorn ziehen, und den geraden Durchmesser des Beckenausgangs dadurch verengern kann.

Im weiblichen Geschlechte findet sich am Scheideneingang der Scheidenschnürer, Constrictor cunni. Er entspringt von der Wurzel der Corpora cavernosa clitoridis, und bildet eine Schleise um den Scheideneingang, welche hinten mit dem Sphincter ani externus und den Transversis perinei zusammenhängt. Es ist nicht sehr schwer, sich durch Präparation dieses Muskels zu überzeugen, dass die größere Anzahl seiner Fasern dem Sphincter ani externus angehört, dessen rechte Hälste zur linken Wand des Scheideneingangs, und dessen linke zur rechten Wand dieser Oessnung, mittelst Kreuzung, übergeht, wodurch Sphincter ani externus und Constrictor sich als Ein Muskel von der Gestalt einer 8 auffassen lassen, welche oben durch die Clitoris geschlossen wird. Da der Sphincter ani externus ein willkürlicher Muskel ist, steht es wohl zu erwarten, dass auch ein gewisser Grad von Verengerung des Scheideneingangs gleichzeitig mit Zusammenziehung des Asters erzielt werden kann.

Vergleiche: J. Wilson, Description of two Muscles surrounding the Membranous Part of the Urethra, in Lond. med. surg. Transact. 1806. G. J. Guthrie, Beschreibung des Musculus compressor. Leipzig, 1836. J. Müller, über die organischen Nerven der erectilen männlichen Geschlechtsorgane. Berlin, 1836. G. L. Kobelt, die männlichen und weiblichen Wollustorgane. Freiburg, 1844. — Vorzügliche Beachtung verdient Kohlrausch, zur Anatomie und Physiologie der Beckenorgane. Fol. Mit 3 Taf. Leipz. 1854. Diese Schrift reformirt viele herkömmliche Ansichten über Lagerungs- und Formverhältnisse der Beckenorgane, und ist durchaus auf eigene, höchst verlässliche Untersuchungen gegründet.

§. 270. Praktische Behandlung des Mittelsleisches.

Die Präparation des Mittelsleisches ist eine der schwierigsten Aufgaben für den Neuling in der praktischen Zergliederungskunst, und wird wohl kaum beim ersten Versuch gelingen, wenn nicht eine exacte Vorstellung über die localen Verhältnisse der Binden und Muskeln, wie sie durch das Studium guter chirurgisch-anatomischer Tafeln erworben wird, das Messer führen hilft. Sehr empsehlenswerth ist es, sich an einem guten Bandpräparate eines Beckens die Ursprünge der Muskeln und die Grenzen der Fascien durch Linien zu markiren, und sich die Anatomie dieser Gegend so zu sagen im Geiste zu construiren, bevor man die Untersuchung am Cadaver vornimmt.

Hat man die Haut, die Fascia superficialis, und das hochliegende Blatt der Fascia perinei lospräparirt, und sich überzeugt, dass die Fascia superficialis mit dem einblätterigen Theile der Fascia perinei gegen den After zu verschmilzt, so sieht man die Musculi ischio-cavernosi, bulbocavernosi, und transversi perinei, von denen der erste die äussere, der zweite die innere, der dritte die kurze hintere Wand eines dreieckigen Raumes bildet, in welchem die Arteria und der Nervus perinealis superficialis, nachdem sie die Fascia perinei propria durchbohrten, nach

laufen. In diesem Dreiecke wird auch beim Steinschnitt die erste Eröffnung der Harnröhre gemacht, um das Steinmesser auf der Furche der in die Harnröhre vorher eingeführten Leitungssonde, bis in die Blase vorzuschieben. Hat man in die Harnröhre einen Katheter eingeführt, welches nie unterlassen werden soll, so fühlt man den Lauf derselben durch den Bulbus urethrae, kann hierauf den Musculus bulbo-cavernosus und den transversus perinei superficialis ganz entfernen, um die Art und Weise kennen zu lernen, wie der Katheter am leichtesten in die Blase gleitet. Dieses nützliche Experiment kann überhaupt nicht häufig genug vorgenommen werden, und wird dem Studirenden eine gewisse Fertigkeit in dieser chirurgischen Manipulation verleihen, die er am Krankenbette sich nicht so bald eigen machen wird. Das bedeutendste Hinderniss der Vorwärtsbewegung erfährt der Katheter an jener Stelle der Harnröhre, welche durch die Oeffnung des tiefen Blattes der Mittelsleischbinde geht. Vor dieser Binde liegt der Bulbus urethrae, in welchem die untere Wand der Harnröhre sich etwas ausbuchtet. Ist der Schnabel des Katheters in diese Bucht gerathen, was bei zu starkem Druck nach abwärts immer der Fall sein wird, so muss, wenn man den Griff des Katheters senkt, in der Meinung, seinen Schnabel durch den Isthmus urethrae weiter gleiten zu lassen, der Schnabel sich vielmehr unter dem Loche der Mittelseischbinde an diese stemmen. Senkt man den Griff noch mehr, und mit Gewalt, so wird der Schnabel die Mittelsleischbinde durchbohren, und sich einen falschen Weg bahnen, der nicht in die Harnblase führt. Am Lebenden kann das Nämliche geschehen, und es ist das beste Mittel, diesem gesährlichen Accidens vorzubeugen, wenn der Schnabel auf ein Hinderniss stösst, das Glied auf dem in seiner Harnrühre steckenden Katheter, so viel als möglich in die Höhe zu ziehen. Dadurch wird die Urethra gespannt, ihre untere ausgebuchtete Wand im Bulbus gehoben, und der Katheter dringt nicht selten von selbst durch seine eigene Schwere in die Pars membranacea urethree ein. Hat man den Verlauf der Urethra durch das Perineum bis zur tiesen Mittelsleischbinde blosgelegt, so wird jeder Schüler die Regeln des Katheterisirens selber entwerfen können, welche, wenn sie nur aus Büchern memorirt werden, kaum verstanden werden können.

Man wird aus dem bisher über den Verlauf der Mittelsleischbinden Gesagten zugleich entnehmen können, dass, wenn eine Ruptur der Harnröhre unter der Fascia perinei propria stattsand, der Harn sich nicht gegen den Aster in jenes Zellgewebe insiltriren kann, welches das Cavum ischio-rectum ausfüllt, indem die Verwachsung des hochliegenden mit dem tiesliegenden Blatte der Binde, dieser Verbreitung ein Hinderniss setzt. Dagegen wird sich der Harn unter die Dartoshaut ergiessen, und den Hodensack schwellen machen, weil die Fascia perinei supersicialis in die Dartos übergeht. Durch Wasserinjection in die Harnröhre lässt sich diese chirurgisch-wichtige Bemerkung praktisch bewahrheiten.

Hat man den hoch- und tiesliegenden Musculus transversus perinci

und den bulba-cavernosus sorgfältig abgetragen, so findet man leicht, dass die fibrose Hulle des Bulbus urethrae eine Fortsetzung eines Blattes der Fascia perinei propria ist, welches sich, von der Durchbohrungsstelle, an den Harnröhrenkanal nach vorn umschlägt. Räumt man nun das Fett aus dem Cavum ischio-rectum heraus, so kann man den Verlauf des einblätterigen Theiles der Mittelsleischhinde verfolgen, und wird hierauf der Tuber ischii abgesägt, so sieht man den Zug der Fasern des Musculus levator ani, welche gegen den After herab convergiren, hinten an den Musculus coccygeus und vorn an den Musculus Wilsonii stossen (weshalb letzterer auch als ein losgelöstes und zu einem anderen Zwecke verwendetes Bündel des Levator ani betrachtet wird). Die geringe Spannung dieser Muskeln erschwert ihre Darstellung bedeutend, und es ist deshalb unerlässlich nothwendig, den Mastdarm mit einem cylindrisch-zugeschnittenen Schwamme mässig anzufullen, und ein mit einem Faden versehenes Querhölzchen über dem Limbus ani in der Mastdarmhöhle zu fixiren, damit man das Rectum nach unten anspannen, und die zum Orificium ani convergirenden Muskeln deutlicher unterscheiden kann. Man wird hiebei nicht vermissen zu sehen, dass die hintersten Fasern des Levator ani nicht zum Aster herabgelangen, sondern hinter demselben sich in einer sehnigen Raphe (welche jedoch nicht immer deutlich ist), mit denen der anderen Seite vereinigen.

Ist der ganze Hodensack entfernt, und nur das Glied belassen worden, so wird man, bei starkem Herabsenken des Gliedes, jenes Stückes der Fascia perinci ansichtig werden, welches zwischen dem häutigen Theil der Harnröhre und dem Ligamentum arcuatum pubis als sogenanntes Ligamentum triangulare urethrae liegt, und man wird zugleich die Durchhohrung dieses Stückes durch die Arteria und Vena dorsalis penis darstellen können.

Die Fascia pelvis, die Ligamenta pubo-prostatica oder vesicalia, konnen nur von der Beckenhöhle aus präparirt werden. Es wird die Beckenhöhle (wie bei den Geschlechtstheilen schon erwähnt wurde) durch Abtragung des linken ungenannten Beins seitwärts eröffnet. Ist die Harnblase mit Wasser mässig gefüllt, und vom rechten ungenannten Beine abgezogen. so spannt sich das Peritoneum, welches von der Seitenwand des kleinen Beckens zur Harnblase geht, und muss entfernt werden, um die Umbeugungsstelle (Arcus tendineus) der Fascia pelvis von der Beckenwand nach einwärts zur Harnblase und zum Rectung sehen zu können. Wird nun auch die Fascia pelvis entfernt, so übersieht man die ganze Ausdehnung des Ursprungs des Asterhebers (von der Symphysis bis zur Spina ischii). Hat man den Schnitt nicht durch die Symphysis, sondern links von ihr geführt, so sieht man das relative Verhältniss der Becken- und Mittelfleischbinde, und die Organe, welche zwischen diesen Fascien Platz greifen. Die Ligamenta pubo-prostatica werden sich beim Zurückbiegen der Blase gegen das Kreuzbein anspannen. Zwischen ihnen und der Fascia perinei propria liegt die Prostata, hinter dem unteren Rande des Schambogens. Zwischen der Fascia perinei propria und superficialis findet man den Bulbus urethrae, und dicht hinter diesem die Glandulae Cowperi, unter welchen die unteren Bündel des Constrictor urethrae quer herübergehen. — Oefteres Wiederholon dieser schwierigen Zergliederung wird nicht ermangeln, jenen Grad von befriedigender Ortskenntniss zu erzeugen, welcher unerlässlich ist, um die Technik des Steinschnittes, und die Pathologie der Mastdarmabscesse und Mastdarmfisteln zu verstehen.

Das weibliche Perineum enthält dieselben Muskeln, wie das männliche, wenn man den Constrictor cunni dem Musculus bulbo-cavernosus analog annimmt, was seiner Beziehung zum Sphincter ani externus und zu den Schenkeln der Clitoris wegen, leicht zu rechtfertigen ist. Der Unterschied der weiblichen und männlichen Mittelfleischbinden beruht darin, dass die Fascia perinei superficialis sich nach vorn in zwei Theile spaltet, welche in die Labia majora übergehen, und dass die eigentliche Fascia perinei eine Oeffnung mehr hat, als die männliche — für das Ostium vaginae. Die Gefässe und Nerven verhalten sich, dem Verlaufe nach, ebenso wie im Manne, nur sind ihre Endigungen verschieden, da das, was beim Manne zum Hodensack geht, beim Weibe zu den grossen Schamlippen verläuft (Arteria et Nervus perinealis superficialis), und die Gefässe und Nerven des Gliedes zur Clitoris gelangen.

Siehe über das Mittelsleisch, Froriep, über die Lage der Eingeweide im Becken. Weimar, 1815. 4. — J. Houston, Views of the Pelvis. Dublin, 1829. fol. — A. Monro, The Anatomy of the Pelvis of the Male. Edinb., 1825. fol. — C. Denonvilliers sur les aponeuroses du périnée, in Arch. gén. de méd. 1837, und in Froriep's Notizen. 1838. N. 123. — Th. Morton, Surgical Anatomy of the Perineum. Lond., 1838. — Denonvilliers, propositions et observations d'anatomie etc. Paris, 1837. Art. 3. Anatomie du périnée. — A. Retzius, über das Ligamentum pelvio-prostaticum etc. in Müller's Archiv. 1849.

Die Schriften über den Steinschnitt von Scarpa, Sanson, Dupuytren, und die in der allgemeinen Literatur angeführten Werke über chirurgische Anatomie gehören ebenfalls hieher.

B. Fragmente aus der Entwicklungsgeschichte.

§. 271. Veränderungen des Eies im Eileiter bis zum Auftreten der Keimhaut.

Die hier zu schildernden Processe sind den Beobachtungen an Thieren entnommen. Sie werden hier nicht mit erschöpfender Umständlichkeit, sondern nur in so weit abgehandelt, als es nöthig ist, um die anatomischen Attribute eines zur Geburt reifen Embryo und seiner Hüllen zu verstehen (§. 276—281).

Das reife und zum Austritt vorbereitete Ei des Eierstocks besteht, wie oben gesagt wurde, 1. aus einer durchsichtigen, structurlosen, ziemlich dicken und festen Hülle, Dotterhaut, Zona pellucida, 2. aus dem Dot-

ter, Vitellus, einer rundlichen, zähen, aus körnigen, das Licht stark brechenden Elementen bestehenden Masse, 3. aus dem Keimbläschen, Vesicula germinativa s. Purkinii, welches anfangs in der Mitte des Dotters, später an der inneren Wand der Dotterhaut liegt, in einer durchsichtigen Hülle eine klare eiweissartige Flüssigkeit enthält, und an seiner inneren Oberstäche den Keimfleck zeigt. — Wird das Ei als Zelle genommen, so ist die Zona: die Zellenmembran, — das Keimbläschen: der Zellenkern, — der Dotter: Zelleninhalt zwischen Kern und Zellenmembran, — der einsache oder mehrsache Keimsleck: das einsache oder mehrsache Kernkörperchen.

Hat sich das Ei vom Eierstock getrennt, so wird es von den schon in Bereitschaft stehenden, offenen Abdominalenden der Muttertrompeten, deren Fransen den Eierstock umklammern, aufgenommen, und durch den Kanal der Tuba in die Gebärmutterhöhle geleitet, wobei die contractilen Fasern der Tuba und die Flimmerbewegung ihres Epitheliums als bewegende Kräste wirken. Die Veränderungen, welche das befruchtete Ei während dieses Weges, welcher ziemlich langsam zurückgelegt wird (bei Kaninchen 3-4, bei Hunden 8-14 Tage dauert), sind im Menschen nicht bekannt. Die Gelegenheit, verlässliche Beobachtungen über die ersten Veränderungen des Eies im Eileiter und in der Gebärmutter anzustellen, ereignet sich nur sehr selten, indem das Weib, welches eben auf die Fortpflanzung des Menschengeschlechts bedacht gewesen, sich in solchen Gesundheitsumständen besinden wird, dass sein plötzlicher Tod nur durch Zufall oder Gewalt erfolgen kann. Auch sind die Beobachtungen über solche Fälle, oder über abortive Eier aus den ersten Schwangerschaftsperioden so unbestimmt, und so wenig übereinstimmend, dass es nothwendig wird, diese Vorgänge am Thiere zu studiren, und durch vorsichtige Anwendung der Resultate auf die menschliche Entwicklungsgeschichte, diese Lücke derselben auszufüllen. Was die Untersuchung des Thiereies über diesen Fragepunkt lehrte, ist in Kürze Folgendes.

- 1. Das Ei erscheint auch im Eileiter von einem Reste des Discus oophorus, in welchem es im Eierstocke eingebettet war, umhüllt. Dieser Rest stellt ein unregelmässiges, an mehreren Stellen wie eingerissenes Zellenstratum dar, welches, während der Wanderung des Eies durch den Eileiter, allmälig schwindet, so dass beim Eintritte in den Uterus nichts mehr von ihm übrig ist.
- 2. Die Zona pellucida schwillt auf, tränkt sich wahrscheinlich durch Imbibition von Flüssigkeit, und das Ei wird grösser.
- 3. Es lagert sich an die äussere Oberfläche der Zona eine Schichte Eiweiss ab (Kaninchenei).
- 4. Der Dotter wird consistenter, und seine Körnchen häusen sich so an, dass sie das Keimbläschen vollständig bergen. Man sieht es also nicht mehr, und viele Beobachter glauben deshalb, es habe aufgehört zu existiren. Der Dotter fliesst beim gewaltsamen Zersprengen des Eies nicht mehr als

körnige Masse aus, sondern hält zusammen. Es bildet sich eine Furche um ihn herum, die immer tieser und tieser wird, und endlich den Dotter in zwei Theile theilt, deren jeder einen hellen Fleck (wahrscheinlich das gleichfalls getheilte Keimbläschen) enthält. Eine zweite Furche, senkrecht auf die erste entstehend, theilt den doppelten Dotter in vier Kugeln, eine dritte in acht, eine vierte in sechszehn u. s. w., deren jede einen hellen Flecken (Bläschen) zeigt. Die Zahl der Kugeln wächst somit in geometrischer Progression: 2, 4, 8, 16, 32 u. s. f. - Man nennt diese Theilung des Dotters in kleinere Kugeln den Furchungsprocess, und die Kugeln selbst: Furchungskugeln. Jede Furchungskugel schliesst ein vollkommen durchsichtiges Bläschen ein. Durch das Zerfallen des Dotters in kleinere Kugeln (welche noch immer von der Zona pellucida zusammengehalten werden) verliert er seine Kugelform, und erhält, um einen rohen Vergleich zu machen, das höckerige Ansehen einer Maulbeere. Anfangs sind die Furchungskugeln mit keiner Hülle umgeben, werden es aber später, und stellen dann wahre Zellen im Sinne Schwann's dar, aus welchen sich die Gewebe des Embryo entwickeln.

- 5. Während des Furchungsprocesses hat das Ei durch Vergrösserung seiner Zona pelhicida so an Umfang zugenommen, dass die Furchungskugeln, welche sich nicht so rasch vermehren, als die Grösse des Eies zunimmt, auseinander weichen, und sich an die innere Oberstäche der Zona als einsaches Stratum von Zellen anlegen, und so eine Haut bilden, welche Keimhaut, Blastoderma, genannt wird. Nur an einer bestimmten Stelle der Keimhaut finden sich mehrsache Zellenschichten. An dieser Stelle wird die Keimhaut weiss und opak erscheinen sie wird einen Fleck zeigen und dieser Fleck ist der Ausgangspunkt aller ferneren auf die Bildung eines Embryo abzweckenden Vorgänge, weshalb er Embryonalfleck (Tache embryonaire der Franzosen), Keimflock, auch Keimhügel (Discus proligerus) genannt wird.
- 6. Die Dotterkugel dreht sich, während des Ganges des Eies durch die Tuba, langsam, aber ununterbrochen, um ihre Axe, in Folge der Ausbildung eines Flimmerepitheliums an ihrer Oberstäche.

Diese Beobachtungen wurden von Bischoff am Kaninchenei angestellt, und stimmen mit jenen von Barry und Wharton Jones bis auf geringe Differenzen überein. Die Entwicklung des Hundeeies unterscheidet sich durch einige, jedoch nicht wesentliche Punkte. Die Theilung des Dotters in kleinere Kugeln geht langsamer von Statten, die ganze Fortbewegung des Eies ist träger, und es bildet sich keine Eiweissschicht. — Die Auffindung des Eies im Eileiter ist oft sehr schwierig, besonders dann, wenn die anhängenden Reste des Discus oephorus verschwunden sind. Bischoff empfiehlt zur Untersuchung in diesem Stadium das Hundeei, dessen dichter und bei auffallendem Lichte weiss erscheinender Dotter, es viel leichter auffinden lässt, als das fast durchsichtige Ei anderer Haussäugethiere. Man befestigt den von seinem Peritonealüberzug gereinigten, und mit einer kleinen Schere der Länge nach geöffneten Eileiter einer eben läufig gewordenen und belegten Hündin

auf einer schwarzen Wachstafel mittelst Nadeln, und durchsucht die innere Oberfläche desselben genau mit der Loupe, oder, wenn man geübter ist, mit freiem Auge. Man findet die Eierchen gewöhnlich als weisse, sehr kleine Pünktchen, auf Einer Stelle des Eileiters zusammengehäust, kann sie mit einer Scalpellspitze ausheben, und mit einem Zusatze von Speichel oder Hühnereiweiss (um das schnelle Vertrocknen so zarter Gebilde zu verhüten), unter das Mikroskop bringen.

Am Kaninchenei beobachtete Bischoff zuerst die bereits bei vielen niederen Thierklassen constatirte Zerklüftung oder Furchung, und die Axendrehung oder Rotation des Dotters, und erkannte als die veranlassenden Organe der letzteren flimmernde Cilien (Müller's Archiv. 1841. pag. 14).

Ob das menschliche Ei analoge Veränderungen während des Durchgangs durch den Eileiter erleide, ist bis jetzt nur Sache des Vermuthens. Wie lange es im Eileiter verweile, ist bei dem Mangel aller hier einschlagenden Beobachtungen nicht anzugeben. Bischoff vermuthet, dass es vor dem 12.—14. Tag nicht in den Uterus gelangen dürfte.

Siehe Bischoff's Entwicklungsgeschichte, pag. 43 seqq., und R. Wagner's Physiologie. 2. Aufl. pag. 91. — Ueber den Furchungsprocess siehe Reichert in Müller's Archiv. 1846. pag. 196.

§. 272. Veränderungen des Eies im Uterus. Erscheinen des Embryo.

Auch hierüber liegen nur Beobachtungen an Thiereiern vor. - Das während seines Ganges durch den Eileiter vergrösserte Kaninchenei, war am Ende des Eileiters von einer starken Schichte Eiweiss umgeben, und sein Dotter in zahlreiche Furchungskugeln zerlegt, welche die Keimhaut und den Keimhügel bildeten. Der Durchmesser des Eies mit der Eiweissschichte betrug 0,015, ohne dieselbe 0,007 Par. Zoll. Die ersten Veränderungen, welche das Ei in der Gebärmutter erleidet, betreffen seine Zone Von ihrer ganzen äusseren Obersläche nämlich wuchern lange sadensormige Fortsätze hervor, welche in die gleichsalls verlängerten Drusen der Gebärmutterschleimhaut (Glandulae utriculares) hineinwachsen. sind keine bleibenden Gebilde, sondern verschwinden wieder zusammt der Zona pellucida selbst, deren Bestand somit nur ein sehr kurzer war. Man nennt die von der Zona ausgehenden, vergänglichen Zotten: primäre. und ihren Complex: primeres Chorion. Für diese vergänglichen primären Zotten entstehen später neue aus der ganzen äusseren Oberfläche der Keimhaut selbst, und diese sind die secundären, aus denen sich in der Folge der Mutterkuchen, als Verbindungsorgan zwischen Embryo und Der mit Zotten besetzte Theil der Keimhaut heisst Mutter, entwickelt. secundares oder permanentes Chorion.

Das Ei besteht somit nun aus zwei in einander eingeschlossenen Bläschen, einem äusseren (Chorion), und einem inneren (Blastoderma). An der Stelle der Keimhaut, welche als Embryonalsteck im vorigen §. erwähnt wurde, trennt sich die Keimhaut in zwei Blätter. Beide Blätter liegen dicht an einander, erstrecken sich auch etwas über die Peripherie

des Embryonalslecks hinaus, und können mittelst seiner Nadeln von einander getrennt, und isolirt untersucht werden. Beide bestehen aus kernhaltigen Zellen, mit dem Unterschiede, dass die Zellen des äusseren Blattes dichter an einander liegen, und theilweise schon verschmolzen erscheinen, während die des inneren noch lose zusammenhängen, rundlicher und zarter sind, und weniger granulirt erscheinen. Bischoff nennt, der Analogie mit der Keimhaut des Vogeleies zufolge, das äussere Blatt das serose oder animalische, das innere das Schleimblatt oder das vegetative. (Es entwickeln sich nämlich aus dem äusseren Blatte die Organe des animalen Lebens, aus dem inneren der Darmkanal mit seinem Zugehör.) Haben die Eier eine Grösse von 2-21/2 Par. Lin. erreicht, so wird ihre Gestalt elliptisch, und auf der äusseren Fläche des Chorion erscheinen zahlreiche, zerstreute Erhabenheiten, welche sich wie Punktchen oder Tupfeln Sie sind die ersten Anlagen der secundären Zotten, und bestehen nicht aus Zellen (ein Ausnahmsfall der Gewebsentwicklung aus Primitivzellen), sondern zeigen unter dem Mikroskope nur feinkörnigen Bau.

Bei weiterer Entwicklung der Eier bis auf einen Längendurchmesser von 4 Par. Lin. sind die Stellen, wo sie im Uterus liegen, schon äusserlich als Anschwellungen kennbar, welche zugleich dünner erscheinen, als die übrige Uteruswand. Am neunten Tage ist das Ei von der Uteruswand, wie von einer fest anliegenden Kapsel, umschlossen, welche nur die beiden Pole des Eies frei lässt. Versucht man, das Ei aus dieser Kapsel des Uterus herauszupräpariren, so findet man, dass die äussere Eihaut (Chorion) so innig mit der gewulsteten Uterinalschleimhaut zusammenhängt, dass sie beim Losschälen der letzteren nothwendig ebenfalls verletzt wird, worauf etwas Flüssigkeit ausströmt, welche zwischen Chorion und Keimblase gebildet wurde. Die Keimblase bleibt hiebei ganz, und kann unversehrt herausgenommen werden. Der Grund des festen Zusammenhangs zwischen dem Chorion des Eies und der Gebärmutterschleimhaut liegt in der Grössenzunahme der Drüsenschläuche der Uterusschleimhaut, in deren Höhlen die Zotten des Chorion hineinwachsen. Der Keimsleck selbst erscheint nicht mehr rund, sondern oval, und zuletzt birnförmig. Seine äusserste Umrandung bildet ein dunkler Saum, welcher, der Analogie mit dem Vogelei wegen, dunkler Fruchthof, Area vasculosa, genannt wird. Der von ihm eingeschlossene lichtere Theil des Fruchthofes heisst durchsichtiger Fruchthof - Area pellucida. Der Unterschied beider Fruchthöfe beruht auf der grösseren oder geringeren Anhäufung von Zellen. In der Axe des durchsichtigen Fruchthofs erscheint ein heller Streisen, der Primitivstreifen, Nota primitiva. Baer hält ihn für einen erhabenen Wulst, Reichert und Bischoff richtiger für eine Rinne. Zu beiden Seiten des Primitivstreisens entstehen ein paar längliche Erhabenheiten oder Kämme. die Rückenplatten, Laminae dorsales, welche sich über der Rinne schliessen, und einen Kanal bilden, in welchem später das Gehirn und

Rückenmark sammt ihren Hüllen entstehen. Nach aussen von diesen Kämmen entstehen ein paar neue Längenwülste, welche sich gegen die Höhle der Keimblase zu entwickeln, und die erste Anlage der zukünstigen Rumpfwandungen des Embryo vorstellen. Sie werden Bauchplatten, Laminae ventrales, genannt. Unter dem Kanal für das Rückenmark entsteht ein neuer, zwischen den Bauchplatten liegender Streisen, die Chorda dorsalis, um welche herum sich die Körper der Wirbel entwickeln.

§. 273. Weitere Fortschritte der Entwicklung des Embryo.

Die bis jetzt geschilderten Vorgänge der Bildung eines Primitivstreifens (Primitivrinne), der Rücken- und Bauchplatten, und der *Chorda dorsalis* gehen vom äusseren oder serösen Blatte des Keimflecks aus.

Die Rückenplatten schliessen sich nicht in der ganzen Länge ihrer convergirenden Ränder; die Verwachsung beginnt vielmehr zuerst in ihrer Mitte, und schreitet von hier aus gegen beide Enden vor. Hat sich der Kanal für das Rückenmark ganz geschlossen, so erweitert er sich an seinem vorderen Ende blasenartig, und bildet drei hinter einander liegende Ausbuchtungen. Die diese Ausbuchtungen allmälig füllende Nervenmasse wird zum Gehirn, und die blasenartige Erweiterung als Ganzes ist der zukünftige Kopf des Embryo. Gegen das hintere Ende schliesst sich der Kanal erst später, und bildet, so lange er offen bleibt, eine lanzettsormige Spalte (Sinus rhomboidalis des Vogelembryo) für die Cauda equina des Rückenmarks. Sobald sich das Kopfende des Kanals als blasenartige Erweiterung zu erkennen giebt, erhebt es sich über die Ebene der Keimhaut, tritt aus ihr heraus, und schnürt sich gleichsam von ihr ab. Zugleich krummt es sich so, dass die drei Ausbuchtungen nicht mehr in einer geraden, sondern in einer gebogenen Linie liegen, deren höchsten Punkt die mittlere Ausbuchtung einnimmt. Da das innere oder Schleimblatt an das äussere oder seröse Blatt fest adhärirt, so wird die Erhebung des aus dem serösen Blatte gebildeten Kopfendes, eine gleichzeitige Erhebung des Schleimblattes bedingen, mit anderen Worten, das seröse Blatt wird das Schleimblatt nachziehen, und wenn nun die vordersten Theile der Visceralplatten dieses nachgezogene Schleimblatt von den Seiten her durch ihr Wachsthum einstülpen, so wird der Kopf des Embryo an seiner unteren Seite eine Höhle einschliessen müssen, welche mit der Höhle der Keimblase durch eine Oeff-Erhebt sich später auch der mittlere und hintere nung zusammenhängt. Theil des rudimentären Embryo über die Ebene der Keimhaut, und zieht er das Schleimblatt nach, so wird, wenn auch nun die Visceralplatten den aufgezogenen Theil des Schleimblattes von den Seiten her einstülpen, eine der ganzen Wirbelsäule entlang laufende Höhle (Visceralhöhle) entstehen mtissen, deren vorderster, am meisten erhabener Theil die Visceralhöhle des Kopfes (nicht Schädelhöhle) vorstellt.

Hat sich der Embryo noch nicht seiner ganzen Lange nach, sondern

blos mit seinem Kopfende aus der Ebene der Keimhaut emporgehoben, und legt man ihn, während er noch mit der Keimblase in Verbindung ist, auf den Rücken, so sieht man von der Keimblase her das Kopfende nicht, da es unter der Keimhaut hiegt, und von ihr verdeckt wird. Die Eingangsstelle von der Höhle der Keimblase in die im Kopfende enthaltene Visceralhöhle wird (nach der von Wolff beim bebrüteten Hühnchen gewählten Bezeichnung) Fovea cardiaca, — der das Kopfende verdeckende Theil der Keimhaut: Kopfkappe genannt.

Rings um den Embryo erhebt sich das serose Blatt in eine Falte (als erste Anlage der Amnionhaut), welche von allen Seiten her über ihn wächst, und deren Ränder über dem Rücken desselben zusammenstossen, wo sie auch verwachsen (Amnionnabel). Das innere Blatt dieser Falte wird, wenn es bis zur Verwachsung gekommen ist, einen Beutel oder Sack vorstellen, dessen untere Wand der Embryo selbst ist. Das aussere Blatt wird in den übrigen peripherischen Theil des serösen Blattes (welcher ausserhalb der Faltungsstelle liegt) übergehen. Beide Blätter der Falte liegen anfangs dicht an einander, und umschliessen den Embryo ziemlich eng. Sammelt sich in der vom inneren Blatte der Falte gebildeten Blase Flüssigkeit an. so wird sie ausgedehnt, und wächst zu einer grösseren Blase an, welche Amnion (Schaf- oder Wasserhäutchen), und ihr flüssiger Inhalt Schafwasser, Liquor amnii, genannt wird. Auch zwischen dem inneren und äusseren Blatte der Falte, und unter der ganzen serösen Eihaut wird Flüssigkeit abgesondert, wodurch diese von dem darunter liegenden Gefäss- und Schleimblatt losgetrennt, und auch von der Amnionblase gleichsam abgehoben wird. Es hat sich die ganze serose Haut wie eine Schale von dem Amnion gelöst, und verwächst dasur mit der inneren Flache des Chorion, dessen serose oder innere Schichte es von nun an darstellt.

Nachdem sich das Amnion gebildet, beginnt auch der übrige Embryo (von welchem nur das Kopfende bisher über die Ebene der Keimhaut sich erhob) sich von der Keimhaut zu erheben. Es wiederholt sich zuerst am Schwanzende derselbe Vorgang, wie am Kopfende. Indem es sich erhebt, das Schleimblatt nachzieht, und die Visceralplatten sich auf einander zuneigen, um zu verwachsen, entwickelt sich eine vom Schleimblatt gebildete Höhle in ihm (hinteres Ende der Visceralhöhle). Das abgeschnürte Schwanzende des Embryo wird, von der Keimblase aus gesehen, ebenfalls durch einen Theil der Keimhaut verdeckt, und dieser ist die Schwanzkappe.

Zuletzt kommt die Reihe des Convergirens auch auf die mittleren Theile der Visceralplatten. Ihr Verschluss, und die dadurch bewirkte Bildung der Rumpfhöhle, erfolgt aber viel langsamer. Der sich über die Fläche der Keimhaut erhebende Rücken des Embryo zieht das mit seiner unteren Fläche verwachsene Gefäss- und Schleimblatt nach, welche somiteine gegen die Höhle der Keimblase offene Rinne (Darmrinne) bilden.

Diese wird durch die, von vorn und von hinten gegen die Mitte vorschreitende, allmälige Schliessung der Visceralplatten in ein Rohr umgewandelt - der einfache und geradlinige Darmkanal. Ist die Schliessung der Visceralplatten bis zur Mitte der Darmrinne gelangt, so geht die Verwachsung bis zur vollkommenen Abschnürung weiter. Es wird somit das Darmrohr, d. i. der in der Rumpfhöhle des Embryo zwischen den Visceralplatten eingeschlossene, und durch sie gleichsam abgeschnürte Theil des Gesäss- und Schleimblattes der Keimblase, mit dem ausserhalb der Rumpfhöhle verbliebenen Theile der Keimblase durch eine Oeffnung communiciren. Diese Oeffnung heisst: Darmnabel, und der extra embryonem liegende Theil der Keimblase: Nabelblase, Vesicula umbilicalis. Die Communicationsstelle der Nabelblase mit dem Darmrohr zieht sich nach und nach in einen Gang aus, Nabelblasen- oder Dottergang, Ductus omphalo-entericus. Der kreisförmige Rand, der um den Ductus omphaloentericus zusammengezogenen Visceralplatten, ist der sogenannte Hautnabel oder eigentliche Nabel. Die Nabelblase ist, da sie aus dem vereinigten Gefäss- und Schleimblatte der Keimblase besteht, sehr gefässreich, und da das in der Rumpfhöhle des Embryo enthaltene Darmrohr ebenfalls ein Theil der Keimblase ist, so müssen Blutgefässe vom Embryo zur Nabelblase und umgekehrt verlaufen. Diese Blutgefässe liegen am Ductus omphalo-entericus, und werden Vasa omphalo-mesenterica genannt. Sie bestehen aus einer Arterie und zwei Venen.

Nebst der Nabelblase entwickelt sich noch eine zweite Blase, welche für die Entwicklung des Embryo, und seine einzuleitende Verbindung mit der Gebärmutter, von grösster Wichtigkeit ist - die Allantois, Harnhaut. Ueber ihre Entstehung sind die Meinungen getheilt. Baer, Valentin. Rathke und M. Langenbeck betrachten sie als eine Ausstülpung des Endstückes des Darmrohres, und lassen sie aus denselben Blättern wie jenes bestehen - Gefass- und Schleimblatt. Reichert lässt sie (nach Beobachtungen am Hühnchen) aus den Ausführungsgängen der Wolffschen Körper (zwei drüsige Organe, welche der Wirbelsäule des Embryo entlang gelagert sind, bevor noch Harn- und Geschlechtstheile sich zu entwickeln anfingen) entstehen. Bischoff leitet die erste Anlage der Allantois von einer aus Zellen bestehenden, nicht hohlen Wucherung der Visceralplatten des Schwanzes ab. Diese Wucherung ist sehr gefässreich, indem die Enden der beiden an der Wirbelsäule herablaufenden Aortenäste sich in ihr verzweigen, und ihre Venen sich zu zwei ansehnlichen Stämmchen vereinigen, welche in der Substanz der Visceralplatten zum Herzen verlaufen. Hat sich die Allantois, durch Verflüssigung ihrer inneren Zellenmasse, in eine Blase umgestaltet, so communicirt sie allerdings mit dem Darmende, und kann, der Form nach, als Ausstülpung desselben genommen werden. Allantois wächst rasch, und erreicht schon frühzeitig eine solche Grösse, dass sie durch die sich zum Hautnabel zusammenziehenden Visceralplatten in zwei Theile getheilt wird, deren einer innerhalb, der andere ausserhalb

des Embryo liegt. Der vom Nabel eingeschlossene Theil der Blase verlangert sich zu einem Kanal, welcher später obliterirt, und dann Harnstrang, Urachus, genannt wird. Die starken Arterien der Allantois sind die Fortsetzungen der beiden oben erwähnten Aortenäste (Arteriae iliacae), und werden Nabelarterien genannt. Die Venen vereinigen sich zu einem oder zwei Stämmen - Nabelvenen - welche zur Hohlader gehen. sehen nun durch die eigentliche Nabelöffnung der Rumpfwand folgende Theile treten: 1. den Ductus omphalo-entericus, mit den Vasis omphalo-mesentericis, 2. den Urachus, mit den Vasis umbilicalibus; dazu kommt noch 3. bei sehr jungen Embryonen eine Darmschlinge, welche durch den noch nicht gehörig verengerten Nabel aus der Bauchhöhle hervorragt, und den Ductus omphalo - entericus ausnimmt, und 4. eine vom Amnion sur diese Theile gebildete Hülle — die Nabelscheide — welche an der Peripherie des Nabels in die aussere Haut des Embryo übergeht. Der Complex aller dieser Gebilde heisst Nabelstrang, Funiculus umbilicalis.

Der innerhalb des Embryo befindliche kleinere Theil der Allantois wird in der Folge zur Harnblase; der ausserhalb des Embryo liegende grössere Abschnitt wird dazu verwendet, eine Gesässverbindung zwischen dem Embryo und der Gebärmutter einzuleiten, und zwar auf folgende Weise. Bisher hatte das in der Gebärmutter nur lose befestigte Ei, die zu seiner Entwicklung nöthigen Stoffe nur durch Imbibition absorbiren können. Von nun an soll die Verbindung eine innigere werden, und dazu wird der peripherische Theil der Allantois verwendet. Es wächst dieser Theil so rasch. dass er die aussere Eihaut (Chorion) erreicht, sich an ihre innere Flache anlegt, mit ihr verwächst, und seine Arterien in sie eindringen lässt. Diese verlängern sich bis in die, an der Aussenfläche des Chorion außitzenden Zotten, und beugen sich in diesen schlingensormig um, um in Venen überzugehen. Gleichzeitig entwickeln sich die Blutgesässe der Schleimhaut des Uterus, begegnen jenen des Chorion, und munden zwar nicht mit ihnen zusammen, gerathen jedoch in eine so innige Beziehung, dass ein Austausch der Bestandtheile beider Blutsorten durch Diffusion möglich wird. Verbindung der Gesässsysteme des Uterus und des Embryo bildet den Mutterkuchen, Placenta, dessen genauere Untersuchung in §. 279 folgt.

M. Langenbeck, Untersuchungen über die Allantois. Göttingen, 1847. Mit Kupfern.

Der im Texte dieses §. erwähnte Wolff'sche Körper findet sich in der frühesten Periode der Entwicklung des Embryo, bevor noch dessen Geschlechtscharakter erkennbar ist, als eine paarige, aus parallelen, querlaufenden Röhrchen bestehende Drüse, zu beiden Seiten der Wirbelsäule. Der Ausführungsgang desselben liegt an ihrem äusseren Rande, und mündet in das Ende des Darmkanals. Nach innen von diesem Ausführungsgang liegt ein weisslicher Strang, — der Müller'sche Faden oder Gang.

Die Wolffschen Körper secerniren Harn, für dessen Ausscheidung noch keine Nieren da sind. Man nennt sie deshalb auch Primordialnieren. An ihrem oberen Ende entstehen die Nieren und Nebennieren (letztere vor ersteren), während an ihren inneren Rändern Hode oder Eierstock gebildet wer-

den. In dem Masse, als diese Nachbarsorgane sich entwickeln, nimmt der Wolffsche Körper an Umfang ab, wird jedoch nicht gänzlich verschwinden, da sein oberster Theil sich zum Nebenhoden des Mannes, oder zum Nebeneierstock des Weibes umwandelt. Von den beiden erwähnten Gängen erhält sich in jedem der beiden Geschlechter ein anderer, indem der Wolffsche Gang zum Vas deserens, der Müller'sche Gang zur Tuba Fallopiae wird. Einer dieser Gänge dagegen schwindet im weiteren Verlause der Entwicklung. Durch dieses Schwinden wird der Geschlechtsunterschied des Embryo zeitlich anatomisch erkennbar.

§. 274. Menschliche Eier aus der frühesten Schwangerschaftsperiode. Entstehung der Membranae deciduae.

Der Vergleich sehr junger menschlicher Eier mit den in den vorausgegangenen Paragraphen geschilderten Thiereiern zeigt, bis auf minder wesentliche Differenzen, eine grosse Uebereinstimmung. Nach Thomson's Beobachtungen eines 12-14 Tage alten menschlichen Eies, hat dieses einen Durchmesser von ⁹/₁₀ Zoll. Sein Chorion war mit Zotten besetzt. In diesem befand sich ein zweites Bläschen, welches die Höhle des Chorion nicht ganz ausfüllte, und auf welchem der Embryo dicht auslag. Die Seitentheile des Embryo gingen ohne Erhebung in das Bläschen über. Dieses Bläschen war also die Keimblase. Von Amnion und Allantois war nichts zu sehen; wahrscheinlich wurde ersteres übersehen, und fehlte nicht, da der Embryo, wie es heisst, mit seinem Rücken an das Chorion befestigt war. was so zu verstehen ist, dass das Amnion in seinem Schliessungspunkte über dem Embryo noch nicht vom Chorion losgelöst war. - In einem von Wagner beobachteten Falle, wo der Durchmesser des Eies fünf Linien betrug, war bereits das Darmrohr gebildet, und hing durch einen kurzen Kanal, Ductus omphalo-entericus, mit der Nabelblase zusammen. Allantois und Amnion waren schon entwickelt. Wagner schätzte das Alter dieses Eies auf drei Wochen. Müller's Fall stimmt mit diesem genau überein. und ebenso ein vierter, von Coste auf zwanzig Tage geschätzt. wenigen Data genügen, um aus der Uebereinstimmung der ersten Entwürfe auf eine gleiche Entwicklungsweise zu schliessen. - In der Bildung der sogenannten hinfälligen Häute, Membranae deciduae, liegt aber ein wichtiges Unterscheidungsmoment der menschlichen und thierischen Eibil-Die Membranae deciduae sind Eihüllen, welche nur im Menschen (und wahrscheinlich auch bei den Affen) vorkommen. Ihre Entstehung geht aber nicht vom Ei aus, wie die des Amnion und Chorion, sondern von der Es ist hinlänglich constatirt, dass, bevor noch das menschliche Ei in die Gebärmutter gelangt, an der inneren Oberfläche der letzteren eine Haut entwickelt wird, welche von Einigen für ein neues Erzeugniss, für ein Absonderungsproduct der Uterinalschleimhaut gehalten wurde. gegenwärtig jedoch von allen Anatomen als die hypertrophirte Uterusschleimhaut selbst anerkannt ist. Sie wurde von Hunter zuerst untersucht und

beschrieben, und führt, weil sie bei jeder Geburt ausgestossen und bei jeder folgenden Schwangerschast wieder neu gebildet wird, den Namen der hinfälligen Haut, Membrana decidua Hunteri. Sie ist weich, weisslich, gesasert, bei oberstächlicher Besichtigung geronnenem Faserstosse oder plastischem Exsudate, wie es bei Entzündungen gebildet wird, ähnlich (daher ihre Verwechslung mit diesem), mit grösseren und kleineren Löchern, wie ein feines Sieb, durchbohrt. Ihre Dicke beträgt in ihrem höchsten Entwicklungsflor bis 3 Linien. Als aufgelockerte Uterinalschleimhaut besitzt die Decidua vergrösserte, verlängerte, selbst mehrfach verzweigte Glandules utriculares (§. 262) in grösster Anzahl, deren erweiterte Mündungen das siebsörmige Ansehen der freien Fläche der Decidua bedingen (E. W. Weber, Bischoff, Reichert, Virchow). - Da die Verdickung der Uterinalschleimhaut zur Decidua, vor dem Eintressen des Eies in der Höhle des Uterus stattfindet, so ist es leicht erklärlich, dass die Mündungen der Tuben durch die wuchernde Decidua verlegt werden. Sie besitzt Blutgefasse, welche vom Uterus aus in sie eindringen, und so zart und dinnwandig sind, dass sie bei der Ablösung der Decidua ohne Widerstand entzwei gehen, deshalb häufig übersehen wurden, und somit die Decidua für ein nicht organisirtes Gebilde gehalten wurde, wie der von Velpeau ihr gegebene Name Membrane anhiste (α priv. und ἱστὸς, das Gewebe), beweist. schoff hat die Blutgefässe derselben durch Injection dargestellt. Robin soll sich, während die Schleimhaut des Uterus sich zur Decidua umwandelt, unter ihr eine neue Uterusschleimhaut zu entwickeln beginnen.) Die viel grössere Vaginalmundung des Uterus wird nicht durch die Decidua als Membran, sondern durch einen halbharten, gallertartigen Pfropf verschlossen, der von den Drusen des Canalis cervicis uteri geliesert wird. und den Muttermund so genau ausfüllt, dass ein von nun an in der Schwangerschaft vollzogener Begattungsact keine befruchtende Wirkung haben kann. Kommt nun das Ei durch die Tuba in den Uterus, so muss es den. das Ostium uterinum verschliessenden Theil der Decidua vor sich her drängen. So entsteht die Membrana decidua reflexa, durch welche das Ei, bevor es noch mit der Gebärmutterwand in Contact geräth, gleichsam wie in einer Schwebe aufgehangen wird. Die Decidua reflexa wäre somit, nach dieser Vorstellung, ein Theil der Decidua vera. Man darf sich aber die Einstelpung der Decidua vera zur Decidua reflexa nicht als ein gewaltsames mechanisches Vordrängen derselben vorstellen, wozu das kaum 1/10 Linie grosse Ei wohl schwerlich genug Gewicht haben wird. Es ist auch nicht unmöglich, dass das Orificium uterinum der Tuba gar nicht verschlossen wird, und das Ei somit frei in die Gebärmutterhöhle schlüpst, worauf es von einem aus der Uterusschleimhaut sich rings um das Ei erhebenden Wall umschlossen, und gänzlich von ihm umwachsen wird. Die grössere Wahrscheinlichkeit scheint mir jedoch für die Einstülpungstheorie zu sein, da der Mutterkuchen in der Regel auf oder nahe bei einem Orificium uterinum tubae sitzt, was nicht so gewöhnlich vorkommen könnte, wenn das

Ei frei in die Uterushöhle gelangte, und deshalb lieber eine tiefere Anheftungsstelle erhielte. Genau genommen, ist die Sache mehr ein Wortstreit, als eine wirkliche Ansichtsverschiedenheit, denn es wird sehr schwer sein, zu beobachten, ob ein so kleines Körperchen, wie das Ei, bei seinem Anlangen in der Uterushöhle die aufgelockerte, und die Tubenöffnung überragende Schleimhaut vor sich herdrängt, oder von der gewulsteten Schleimhaut umwachsen wird. Es kommt, scheint mir, beides so ziemlich auf dasselbe hinaus.

Die Bildung einer Decidua scheint mir nicht blos auf den Fall einer geschehenen Befruchtung des Eies zurücksührbar. Ich fand in zwei Uteri von Mädchen, welche während der Reinigung eines plötzlichen Todes starben, und deren eine ein vollkommen tadelloses Hymen besass, die Uterinalschleimhaut verdickt, aufgelockert, mit verlängerten Drüsenschläuchen versehen. kurz einer beginnenden Decidua ähnlich. Es ist somit anzunehmen, dass die mit jeder Menstruation eintretende Vitalitätssteigerung des Uterus der Grund der Entwicklung einer hinfälligen Haut ist, welche theils durch Aufsaugung, theils durch Abstossung zur Norm zurückkehrt, wenn nicht der, durch eine stattgefundene Befruchtung gegebene Impuls, eine höhere und bleibende Entwicklung derselben bedingt. Dass das Ei selbst auf die Entstehung der Decidua vera keinen Einfluss nimmt, beweist ferner die durch zahlreiche Erfahrungen bestätigte Wahrheit, dass auch in Fällen, wo das befruchtete Ei gar nicht in die Uterushöhle gelangt, sondern im Ovarium, in der Tuba, oder selbst in der Bauchhöhle seine Schwangerschaftsstadien durchmacht (Graviditas extrauterina) dennoch die Decidua vera sich, wie bei normaler Schwangerschaft, entwickelt.

Die Theilnahme der Uterinaldrüsen an der Bildung der Decidua vera soll nach Weber dadurch am besten erkannt werden, dass man die Schnittstäche des mit der Decidua ausgekleideten Uterus im Sonnenscheine mit der Loupe betrachtet, wo man auf ihr lange cylindrische Schläuche bemerkt, welche, gegen die Höhle des Uterus zu, sich verengern, und auf der freien Fläche der Decidua münden, gegen die Wand des Uterus zu aber mit blindem geschlängelten Ende aushören. Presst man die Wand eines schwangeren Uterus, so kann man auf der Oberstäche der Decidua einen dicken weissen Sast aus den Mündungen der Uterinaldrüsen hervorquellen sehen. Die Drüsenschläuche sind sast ¹/4 Zoll lang, und theilen sich zuweilen in zwei, selbst in mehrere Gänge. Die Zahl der Drüsen ist gross, und ihre Stellung eine so dicht gedrängte, dass nur wenig Raum zwischen ihnen sür die Blutgesässe und das Bindegewebe übrig bleibt.

§. 275. Menschliche Eier aus dem zweiten Schwangerschaftsmonate.

Ueber menschliche Eier aus dem zweiten Schwangerschaftsmonate sind die Beobachtungen viel zahlreicher, als aus den früheren Perioden (J. Müller, Velpeau, Coste, J. C. Mayer, Seiler u. m. A.). Ein im Anfange des zweiten Monats durch Missfall (Abortus) abgegangenes Ei hat 8—12 Linien Durchmesser. Es ist von der Decidua reflexa, oder zugleich, obwohl viel seltener, von der Decidua vera umhüllt. Die ist an ihrer äusseren Fläche rauh, zottig, an ihrer inneter

zend. Der Raum zwischen beiden ist häufig mit geronnenem Blute gefüllt, wodurch das ganze Ei meistens für einen Blutklumpen gehalten wird. Das Chorion ist rings herum mit Zotten oder Flocken besetzt, welche durch die Decidua reflexa hindurchwachsen, und an jener Stelle des Chorion, wo sich später die Placenta entwickelt, besonders dicht stehen und seitliche Aeste hervortreiben, wodurch sie das Ansehen von kleinen Bäumchen er-Der Embryo selbst ist 2-3 Linien lang, und aus seinem Nabel kommt ein kleines Bläschen (Nabelblase), an einem Stiele (Ductus omphaleentericus mit den gleichnamigen Blutgefässen) hängend, hervor. lantois existirt nicht mehr, dagegen sindet sich ein aus dem Bauche des Embryo kommender, und zu jener Stelle des Chorion verlaufender Strang. wo die Zotten bereits die Baumform angenommen haben. Dieser Strang besteht aus den Nabelgestassen: zwei Arteriae und eine Vena umbilicalis. Die Arterien senken ihre Zweige in die baumförmigen Zotten des Chorion ein, an deren Enden sie schlingenformig in die Venen umbeugen. Stiel, an welchem das Nabelbläschen hängt, wird länger, als bei irgend einem Säugethiere, obliterirt aber schon um diese Zeit vollkommen, so dass das Bläschen auf die weitere Entwicklung des Darmkanals keinen Bezug nehmen kann. Es rückt also vom Nabel weg, und entfernt sich so weit von ihm, dass es in den Raum zu liegen kommt, wo das peripherische Amnion sich zur Nabelscheide einstülpt. Zwischen Chorion und Amnion befindet sich ein noch immer ansehnlicher Zwischenraum, der mit einer gallertahnlichen, wie mit feinen Fäden durchzogenen Flüssigkeit (Magma reticule, Velpeau) angefüllt ist.

Das frühzeitige Schwinden der Allantois ist eine dem menschlichen Eie eigenthümliche Erscheinung. Man hat, bevor die im vorigen Paragraphe mitgetheilten Untersuchungen jüngster Embryonen bekannt waren, wohl an der Existenz einer Allantois beim Menschen gezweifelt. Nachdem diese festgestellt war, erklärte man das schnelle Verschwinden derselben für scheinbar, und nur durch das äusserst rapide Wachsthum derselben bedingt, indem man dachte, es vergrössere sich die Allantoisblase so rasch, dass, nachdem sie über die Nabelscheide hinausgewachsen, sie den ganzen Embryo sammt Amnion umwüchse, und sich am entgegengesetzten Punkte des Eies (wie das Amnion über dem Rücken des Embryo) schliesse. muss nach dieser sonderbaren Vorstellungsweise die Allantois eine doppelte Blase um das Amnion herum bilden, und da man diese natürlich niemals fand, sah man sich zu der Annahme genüthigt, dass die äussere Blase mit der inneren Fläche des Chorion, - die innere mit der äusseren Fläche des Amnion verwachse. Der Vertreter dieser in Deutschland nie gebilligten Ansicht ist Velpeau, und dessen Magma reticulé ware der chemalige Inhalt der Allantois. Wenn man berücksichtigt, dass die Allantois eine sehr gefässreiche Haut ist, so müssen, wenn eine solche Verwachsung derselben mit dem Chorion und Amnion ja geschähe, beide Membranen ein Gefassblatt besitzen, welches noch von keinem Beobachter gesehen wurde. -

Die Allantois hat die Bestimmung, die Nabelgesasse des Embryo auf das Chorion zu leiten, damit sie in dessen Zotten ihre letzte Verästlung sänden. Da nun im menschlichen Ei nur jene Zotten Gesässe erhalten, welche der Placentarinsertion entsprechen, so braucht die Allantois nicht weiter zu wachsen, als bis sie diese Stelle des Chorion erreicht; und sind ihre Gesässe in die Zotten eingetreten, so sängt ihre Rückbildung an, und sie wird zu einem soliden Strange, der eigentlich nur den Weg andeutet, welchen die Nabelgesässe vom Embryo zum Chorion genommen haben (Nabelstrang).

Die Entwicklung des Eies und des Embryo durch alle Schwangerschaftsmonate zu verfolgen, ist nicht Aufgabe dieses Buches. Ich breche somit hier ab. da das bereits Gesagte vollkommen genugt, die Entstehungsweise der im reisen Ei zur Geburtszeit vorhandenen Gebilde zu verstehen, welche in den folgenden §§. beschrieben werden. Die Entwicklungsgeschichte überhaupt ist ein Object der Physiologie, da sie sich nicht mit dem bereits Vollendeten und Bleibenden, sondern mit Veränderungen beschäftigt, welche zur Vollendung führen. Die Aufgabe, die ich mir in diesem Buche stellte, die Anatomie des Menschen nur in jener Ausdehnung zu behandeln, als für das praktische Bedürfniss zunächst erforderlich ist, veranlasst mich, nur dem reisen Eie, welches Gegenstand geburtshilslicher Behandlung ist, einen grösseren Raum zu gönnen. Die in der allgemeinen Literatur angeführten Werke über Entwicklungsgeschichte, worunter ich R. Wagner's Physiologie, der Bundigkeit und der trefflichen Taseln wegen (Icones physiologicae), so wie R. Remak, Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbelthiere. Berlin, 1850. fol. mit Tafeln, ganz vorzüglich empfehle, werden Jedem, der Belehrung hierüber sucht, sie in reichlichem Masse gewähren.

&. 276. Zur Geburt reifes Ei. Schafhaut.

Die Schafhaut (Amnion) des reisen Eies, ist eine zunächst den Embryo umschliessende Hülle, oder die innere Eihaut desselben. Sie ist gefäss- und nervenlos, und bildet eine weite Blase, welche ganz das Aussehen einer serüsen Membran besitzt, und mit einer trüben, dicklichen Flüssigkeit - dem Frucht- oder Schafwasser, Liquor amnii - gefullt ist. Ihre innere Obersläche ist glatt und glänzend, ihre äussere liegt entweder am Chorion an, und ist mit ihm so lose verklebt, dass sie leicht abgezogen werden kann, oder ist von ihm durch eine dem Liquor amnii ähnliche, grössere oder geringere Flüssigkeitsmenge getrennt - das falsche Wasser, Liquor amnii spurius. In der Höhle des Amnion schwimmt, vom Liquor amnii verus umgeben, und an seinem Nabelstrange aufgehangen, der Embryo. Der Nabelstrang, welcher den Embryo mit dem ausserhalb des Amnion liegenden Mutterkuchen verbindet, durchbohrt nicht das Amnion. Es stulpt sich letzteres vielmehr um den Nabelstrang herum ein, bildet eine Scheide für ihn, gelangt an ihm zum Nabel des Embryo, und verschmilzt daselbst mit den Bauchdecken. Betrachtet man die Amnionblase, die Nabelscheide, und das Integument des Embryo, als continuirliche Theile, so liegt der Embryo in ihnen, wie das Herz im Herzbeutel. 1

der Embryo sich nicht in der Amnionhöhle entwickle, wie noch von Velpeau behauptet wird, ist aus den ersten Entwicklungsvorgängen, wo der Embryo in der Wand des Amnion lag, ersichtlich. Da, wie bei der Entstehung des Amnion gezeigt wurde, der Embryo seine Rückensläche der Amnionblase zukehrt, so kann er zuletzt nur so in die Höhle der Blase zu liegen kommen, dass die aus seinem Nabel hervorwachsenden Gebilde, Nabel- und Allantoisblase, sich immer weiter vom Nabel entfernen, sich stielartig in die Länge ziehen, und einen Ueberzug vom Amnion erhalten. Dieselbe Vorstellung scheinen Oken und Döllinger, und neuerer Zeit auch Serres, gehabt zu haben, wenn sie sich der Worte bedienen, dass der Embryo sich mit dem Rücken in die Amnionblase einsenkt, und die Theile des Nabelstranges gleichsam wie ein Seiler aus sich herausspinnt. Structur des Amnion aus kernhaltigen Zellen ist nur bei jungen Eiern zu erkennen. Um die Zeit der Geburt ist die Zellenbildung nicht mehr deutlich, dagegen ein sehr schönes Pflasterepithelium an der inneren Oberfläche angebildet.

§. 277. Fruchtwasser.

Die Menge des Frucht- oder Schafwassers, Liquor amnië, ist in verschiedenen Schwangerschaftsstadien, und um die Geburtszeit, bei verschiedenen Frauen sehr ungleich. Seine Quantität nimmt bis zur Mitte des Fruchtlebens zu, und gegen die Geburt wieder ab, wo es im Mittel ein Pfund beträgt. Ebenso variirt seine Zusammensetzung, und die bisher vorgenommenen chemischen Analysen stimmen deshalb nicht überein. Bei sehr jungen Embryonen ist es wasserhell, später wird es gelblich, schmeckt salzig, und hat den thierischen Geruch vieler organischer Flüssigkeiten. Nach Vogt enthält es im vierten Monate 97, im sechsten aber 99 Procent Wasser; das Uebrige sind Salzspuren und Eiweiss. Der geringe Eiweissgehalt macht es unwahrscheinlich, dass, wenn es vom Embryo verschluckt wird, es als Nahrungsstoff verbraucht werden kann.

Der mechanische Nutzen des Fruchtwassers ist einleuchtend. Seine Gegenwart schützt den Embryo vor den Gefahren mechanischer Beleidigungen. welche bei der Zartheit und Vulnerabilität der Frucht, seine normgemässe Entwicklung leicht beeinträchtigen könnten. Es gestattet dem Embryo freie Beweglichkeit, ohne sich an den Wänden der Gebärmutter zu reiben, oder hestig gegen sie zu stossen. Nimmt die Menge des Fruchtwassers ab, wie es in den letzten Schwangerschaftsmonaten Regel ist, so werden die Bewegungen der Frucht für die Mutter lästig und schmerzhaft. Der im Fruchtwasser slottirende Nabelstrang weicht den Bewegungen des Embryo aus, und kann somit weder gedrückt, noch gezerrt werden, wodurch die Ab- und Zufuhr des Fruchtblutes gesichert wird. Ob das Fruchtwasser als Zwischenkörper die Verwachsung einzelner Theile des Embryo verhindere, mag dahingestellt bleiben. Früher Verlust des Fruchtwassers bedingt Abortus, und das Eindringen der, durch den Druck der contrahirten Gebärmutter in den Muttermund gepressten Amnionblase (das sogenannte Einstellen der Blase), erweitert gleichformig während der Geburt den engsten Theil der Geburtswege.

und befeuchtet sie beim Platzen der Blase. Sind die Fruchtwässer abgelausen, und die Geburtswege trocken und heiss geworden, so wird die Geburt mit namhasten Schwierigkeiten zu kämpsen haben.

§. 278. Gefässhaut.

Die Gefässhaut, Chorion, des reisen Embryo, umschliesst das Amnion, und heisst deshalb auch äussere Eihaut. Es wurde bereits erwähnt, dass das Chorion bei sehr jungen Eiern an seiner ganzen äusseren Fläche zottig ist, während seine innere Fläche glatt erscheint. Man kann diesen Unterschied immerhin durch die Ausdrücke Chorion fungosum s. frondosum, et Chorion laeve s. glabrum bezeichnen, vorausgesetzt, dass man darunter keine besonderen Häute, sondern nur Flächen Einer Haut Mit dem fortschreitenden Wachsthume des Eies und der damit verbundenen Ausdehnung des Chorion werden die Zotten an der unteren Gegend des Chorion sparsamer, häufen sich dagegen in der oberen Peripherie, und besonders an der, der zukünstigen Placentarinsertion zugekehrten Stelle mehr und mehr an. Dieses ist nicht als ein Wandern der Zotten zu verstehen, sondern die Folge einer stärkeren Zottenbildung an der oberen Gegend, während die Zotten an der unteren Peripherie des Chorion, schon der Ausdehnung dieser Haut wegen, weiter aus einander rücken, durch Druck atrophisch werden müssen, und beim reifen Ei in so grossen Abständen stehen, und zugleich so verkümmert sind, dass man diesen Abschnitt des Chorion immerhin zottenlos nennen kann. Die dichtgedrängten, langen und baumförmigen Zotten an der oberen Peripherie des Chorion bilden den Körper des Mutterkuchens — Placenta.

Die zerstreuten, verkümmerten Zotten des Chorion eines reifen Eies haben ein ganz anderes Ansehen als die Placentarzotten. Sie sind fadenförmig, sehnigen Filamenten ähnlich, gehen mit breiterer Basis vom Chorion ab, und senken sich mit ihren zugespitzten Enden in die Decidua ein, mit welcher sie oft so innig zusammenhängen, dass die Trennung beider Häute Schwierigkeiten macht. Sie enthalten in der Regel keine Gefässe; nur die der Placenta näher stehenden bekommen zuweilen Aeste der Nabelgefässe. Es ist auch nur der gefässreiche Zustand dieser Membran bei Thieren, und ihre Theilnahme an der Bildung des Mutterkuchens, welche ihr den Namen der Gefässhaut beilegen machte. Sie besteht sonst aus Zellen, welche einen grossen Kern einschliessen, in den Zotten aber mit fein granulirtem Inhalt gefüllt erscheinen.

§. 279. Mutterkuchen.

Der Mutterkuchen, *Placenta*, ist ein äusserst gefässreiches Organ, durch welches allein der Embryo mit der Gebärmutter verbunden wird, und in welchem das Blut des Embryo jene Veränderung erleidet, durch welche es zur Ernährung desselben befähigt wird. Er hat die Gestalt eines länglich-runden, convex-concaven Kuchens, dessen grösster Durchmesser

5—8 Zoll, dessen Dicke 1—1½ Zoll, und dessen Gewicht 1—2½ Pfund beträgt. Seine convexe oder äussere Fläche sitzt an der inneren Oberfläche des Fundus uteri fest, jedoch nicht in dessen Mitte, sondern gegen das eine oder andere Orificium uterinum tubae; seine concave Fläche ist mit dem Amnion überzogen, und nimmt den Nabelstrang in sich auf, welcher sich nicht in ihre Mitte, sondern excentrisch, und immer in schräger Richtung einpflanzt. Sein weiches, schwammiges Gewebe ist sehr reich an Blutgefässen, welche, indem sie theils dem Embryo, theils dem Uterus angehören, die Eintheilung des Mutterkuchens in einen Gebärmutter- und einen Fötaltheil, Pars uterina et foetalis, veranlassten. Letzterer, welcher häufig für die ganze Placenta genommen und als solche beschrieben wird, übertrifft ersteren an Grösse und Entwicklung.

A. Fötaltheil des Mutterkuchens. Es wurde früher erwähnt. dass die ganze Aussensläche des Chorion ansänglich mit Zotten besetzt erscheint, und dass diese später (im dritten Monate) sich an jener Stelle des Chorion anhäufen und stärker entwickeln, wo das Ei sich mit der Gebärmutter in Gefässverbindung setzen soll. Die Zotten wachsen an dieser Stelle durch Aeste und Zweigchen, welche sie austreiben, zu kleinen Bäumchen an, gruppiren sich zu dicht gedrängten Büscheln, welche selbst wieder grössere, an der Aussenfläche einer vollkommen ausgetragenen Placenta noch erkennbare Lappen oder Inseln, Cotyledones, bilden. Die Gefasse des Nabelstrangs theilen sich an der inneren Fläche der Placenta in Aeste und Zweige, welche in die Lappen eindringen, und sich durch wiederholte Theilung in kleinere Gefässe auflösen, welche zu den Zotten gehen. Das in die Zotte eindringende arterielle Gefässchen folgt allen Aesten und Reiserchen der Zotte, macht also so viele Schlingen oder Schleifen, als die Zotte Aeste hat, und geht zuletzt in die Vene der Zotte über, welche durch allmälige Vereinigung mit allen übrigen Zottenvenen die Vena umbilicalis zusammensetzt. Es muss also das durch die beiden Arteriae umbilicales in die Placenta foetalis geführte Blut, durch die Vena umbilicalis wieder zum Embryo zurücksliessen, - es gelangt, wegen vollkommenen Abgeschlossenseins der Gestasschlingen in den Zotten, nicht in die Gestasse der Gebärmutter, und die Placenta verhält sich in dieser Hinsicht wie jedes andere innere Organ des Embryo.

Kölliker's Versuche (durch C. Wild bestätigt) haben an den Stämmen und Aesten der Arteria und Vena umbilicalis Contractilität nachgewiesen. Die Versuche wurden an frischen, eben geborenen Placenten durch Reizung mittelst des elektro-magnetischen Apparates vorgenommen. — Da noch keine Nerven in der Placenta (wohl aber im Nabelstrang) entdeckt wurden, so ist die experimentell constatirte Contractilität der Blutgestässe in derselben ein höchst wichtiges Moment in der Beantwortung der Frage, ob die Contractilität vom Nervensystem abhängig ist oder nicht.

Kölliker, Mittheilungen der naturforsch. Gesellschaft in Zürich. 1848. März. — C. Wild, Beiträge zur Physiologie der Placenta. Würzburg, 1849.

B. Gebärmuttertheil des Mutterkuchens. Die Theilnahme

des Uterus an der Bildung der Placenta äussert sich auf folgende Weise. Die grossen, ästigen, zur Placenta sich zusammendrängenden Zotten des Chorion wachsen in die gleichfalls vergrösserten Glandulae utriculares der Decidua hinein. Zugleich entwickeln sich Blutgefässe in der Decidua, als wahre Verlängerungen der Uterinalgefässe, drängen sich zwischen die Zotten des Chorion ein, und umgeben dieselben. Diese Blutgefässe mit dem zwischen ihnen befindlichen Rest der zur Decidua umgewandelten Schleimhaut der Gebärmutter bilden die Pars uterina placentae. Die Blutgefässe haben insofern eine Uebereinstimmung mit den Blutgefässen der Corpora cavernosa, als die feinsten Arterien in viel dickere Venenanfänge übergehen, welche äusserst dünnhäutig sind, und so häufig mit einander anastomosiren, dass sie eine Art von grobstämmigem, aber feinmaschigem Netz bilden, in dessen Lücken die Zotten des Chorion eindringen.

Diese Angaben über den Bau der Placenta foetalis sind den Untersuchungen von E. H. Weber, welche in Hildebrandt's Anatomie. IV. Band. pag. 495 seqq. und mit weiteren Berichtigungen in R. Wagner's Physiologie. 2. Aufl. pag. 122 niedergelegt wurden, entnommen. Die Structur der Placenta uterina durste noch weitere Arbeit veranlassen. Eschricht (prolusio academica de organis quae respirationi foetus mammalium inserviunt. Hafniae, 1837) weicht insofern von Weber's Schilderung ab, dass er das Gefässsystem der Placenta uterina nicht in gleich anfangs dicke Venenstämme, sondern in ein ebenso seines Capillargesassystem übergehen lässt, als in den Zotten der Placenta foetalis vorkommt. Der Punkt, auf welchen es am meisten ankommt, und welcher nach den Ansichten von Weber und Eschricht sich gleich bleibt, ist die Nichtcommunication des embryonischen und mütterlichen Gestasssystems. Soll bei der Nichtcommunication der embryonischen und mütterlichen Blutgefässe das Embryoblut aus dem Mutterblute Stoffe aufnehmen, oder dahin abgeben, so kann dieses nur durch Endosmose geschehen, und die auswandernden Stoffe haben somit zweifache Gestsswandungen zu durchdringen. Physiologische Thatsachen sprechen gleichfalls zu Gunsten des Abgeschlossenseins beider Gesässsysteme, und es gehört nur gänzliche Unwissenheit mit feineren mikroskopischen Gestassverhältnissen dazu, um noch an einen Uebergang des Blutes aus der Mutter in den Embryo zu glau-

Man kann sich die Wechselwirkung zwischen Embryo- und Mutterblut so vorstellen, wie jene in den Lungen zwischen dem venösen Blute und der atmosphärischen Lust, nur handelt es sich in der Placenta nicht blos um den Uebertritt gassormiger Stoffe, sondern auch wirklicher Nahrungsbestandtheile. Es ist deshalb immer nur figürlich, die Placenta einen Pulmo uterinus zu nennen.

Im Jahre 1844 trat Kiwisch (Bericht über die Naturforscherversammlung zu Gratz, p. 270, und dessen Beiträge zur Geburtskunde, Würzburg, 1846), mit einer von E. H. Weber abweichenden Ansicht über die Art der Verbindung zwischen Placenta und Uterus auf, welcher ich, nach den Ergebnissen einer eben vorgenommenen, wiederholten Untersuchung des Gegenstandes, beizupflichten mich bestimmt fühle. Kiwisch läugnete die Pars uterina placentae gänzlich, und nahm dagegen an, dass die Venen des Uterus, an der der Placenta entsprechenden Stelle, mehrere Schicht

weiter und anastomosirender Kanäle bilden (wie Kiwisch sich ausdrückt: ein colossales Capillargefässnetz), von denen die innersten so oberflächlich verlausen, dass sie nur von einer dünnen Uterusschichte bedeckt werden, die sie endlich an vielen Stellen in schieser Richtung durchbohren, und mit offenen Mündungen an der inneren Uteruswand endigen, wodurch diese ein siebartiges Ansehen erhält. Die Placenta soetalis ist an diese Stelle des Uterus ringsum durch Zellgewebe so angehestet, dass kein Austritt des Blutes aus den Uterinalvenen in die Uterushöhle stattsinden kann. Das Blut badet somit die convexe Obersläche der Placenta soetalis, und bespült die Capillargesässe derselben, ohne in besonderen Gesässen einer Placenta uterina (welche sehlt) zu circuliren.

C. Wild (Beiträge zur Physiologie der Placenta. Würzb., 1849.) stimmt insofern mit Kiwisch überein, dass er einen freien Erguss des mütterlichen Blutes um die Capillargestsse der Placenta foetalis annimmt. Er fand, dass die Venen der Gebärmutter theils zwischen die Cotyledonen der Placenta foetalis eindringen, um alsbald ihre Wände zu verlieren, und ihr Blut zwischen die Zotten der Cotyledonen zu ergiessen, theils aber am ganzen Umkreise der Placenta zu einem Ringgestsse verschmelzen, welches zahlreiche Seitenäste in die Cotyledonen hineinsendet. Auch diese Seitenäste verlieren nach kürzerem oder längerem Verlause ihre Wandungen, und lassen ihr Blut srei in die Zwischenräume der Zotten einströmen. Die Zotten werden somit überall von venösem Mutterblute bespült, aus welchem sie die zur Ernährung des Embryo verwendbaren Stosse absorbiren.

Insertionsanomalien der Placenta können, zur Zeit der Geburt, für Mutter und Kind sehr gefährlich werden. Sitzt die Placenta auf dem Muttermunde fest, die sogenannte Placenta praevia (ein Fall, der sehr gegen die Einstülpungsansicht der Decidua vera zur restexa spricht, indem eine solche Einstülpung das Ei nicht bis auf den tiefsten Punkt des Uterus herabkommen lässt), so muss bei der Erweiterung desselben im Beginne der Geburt, die Placenta theilweise aus ihrer Verbindung mit dem Uterus gewaltsam gerissen werden, und eine Blutung entstehen, welcher nur durch Beschleunigung der Geburt mittelst künstlicher Lösung der Placenta Einhalt gethan werden kann.

§. 280. Nabelstrang.

Der Nabelstrang oder die Nabelschnur, Funiculus umbilicalis, ist im reifen Embryo ein Bündel von Blutgefässen, welche den Mutterkuchen mit dem Embryo in Verbindung bringen. Seine Länge stimmt gewöhnlich mit der des Embryo überein, und beträgt somit im Mittel 18 Zoll, jedoch sind Ausnahmen dieser Regel sehr gewöhnlich. Man hat Nabelstränge von 2½ Zoll Länge gesehen (Guillemot), und in der pathologisch-anatomischen Sammlung zu Wien befindet sich einer, der über 5 Schuh lang ist. Seine Dicke variirt von der eines kleinen Fingers bis zu jener des Daumens. — Die erste Entstehung des Nabelstranges fällt zugleich mit der Bildung des Nabels in jene Periode, wo sich der Embryo von der Keimblase abzuschnüren beginnt, und die aus dem Unterleibe des Embryo herausgewachsene Allantois, mit ihrer doppelten Arterie und einfachen Vene.

bis an die innere Fläche des Chorion gelangte, und zu einem Strange obliterirte, während ihre Gefässe wegsam bleiben.

Der Nabelstrang besteht aus folgenden Theilen:

- a) Zwei Nabelarterien. Sie sind Fortsetzungen der beiden Arteriae hypogastricae des Embryo, gehen an der hinteren Fläche der vorderen Bauchwand zum Nabel herauf, betreten den Nabelstrang, in welchem sie keine Seitenäste abgeben, sondern in mehr weniger schraubenförmigen Windungen zur Pfacenta verlaufen, um dort mit ihren letzten Verzweigungen die Schlingen in den Zotten zu bilden. An der Eintrittsstelle in die Placenta communiciren sie durch einen dicken Verbindungszweig. Die rechte Arteria umbilicalis ist gewöhnlich kleiner als die linke.
- b) Eine Nabelvene. Sie liegt in der Axe des Nabelstrangs, ist voluminöser als die Arterien, und klappenlos. Die Spiraltouren der Nabelarterien unwinden sie (vom Embryo ausgehend) meistens von links nach rechts; unter 32 Nabelsträngen war dieses nach Hunter 28 mal der Fall. Sie läust innerhalb des Embryo vom Nabel zum vorderen Theile der Fessa longitudinalis sinistra der Leber, und ist während dieses Lauses im unteren Rande des Ligamentum suspensorium eingeschlossen. Am linken Ende der Quersurche der Leber angelangt, theilt sie sich in zwei Zweige, deren einer sich mit dem linken Aste der Pfortader verbindet, der andere, kleinere, durch den hinteren Theil der linken Längensurche als Ductus venosus Arantii zum Stamme der unteren Hohlvene tritt. Zuweilen ist die Nabelvene doppelt, was bei den meisten Säugethieren immer der Fall ist.
- c) Die Wharton'sche Sulze. Sie ist eine gallertige, durchscheinende Masse, welche die Blutgesässe des Nabelstrangs verbindet, und, stellenweise in grösserer Masse angehäust, die sogenannten falschen Knoten des Nabelstrangs bildet.
- d) Die Scheide des Nabelstrangs. Sie wird durch die Einstülpung des Amnion gebildet, und geht an der Peripherie des Nabels in die Integumente des Embryo (nach E. H. Weber in die Epidermis) über.

Bei sehr jungen Embryonen enthält der Nabelstrang noch den Ductus omphalo-entericus, nebst den Vasis omphalo-mesentericis.

Nach Hunter und Cruikshank soll sich noch eine Spur des Urachus als weisser Faden im Nabelstrange vorsinden. Das Vorkommen von Nerven ist durch die Untersuchungen von Schott (die Controverse über die Nerven des Nabelstranges, Frankfurt, 1936.) und Valentin (Repertorium. II. Bd. pag. 151.) constatirt. Sie stammen aus den Lebergessechten (sur die Umbisicalvene), und aus dem Plexus hypogastricus (sur die Umbisicalarterien). Valentin hat sie im Nabelstrang 3—4 Zoll weit vom Nabel mikroskopisch nachgewiesen. Die Lymphgesässe sollen von Fohmann (Tiedemann und Treviranus Zeitschrist. IV. pag. 276.) injicirt worden sein. Wie bei so vielen Fohmann'schen Präparaten, von welchen ich Einsicht genommen, bleibt es auch hier unentschieden, ob die Räume, welche im Nabelstrange mit Quecksilber gestüllt wurden, Lymphgesässe, oder (was viel wahrscheinlicher ist) Bindegewebzellen sind. — Durch Reizung mittelst des elektromagnetischen: Apparates hat Kölliker sehr intensive Contractionen in den Gesässen des. Lehrbuch der Anatomie. 5. Aus.

Nabelstranges entstehen gesehen (Mittheilungen der Zürcher naturforsch. Gesellschaft. 1848. 2. Hft.).

Zu grosse Länge des Nabelstrangs veranlasst verschiedene Uebelstände. Diese sind: a. Umschlingung desselben um die Körpertheile des Embryo (Hals, Schulter, Gliedmassen). Ist die Umschlingung mit Einschnütrung verbunden, so kann es bis zur sogenannten spontanen Amputation der Gliedmassen, oder Strangulation des Embryo kommen. β. Wahre Knoten, wie beim Knüpfen eines Fadens. Die Bewegungen des Embryo, der sich in seinem langen Nabelstrange verwickelt, bedingen die Umschlingungen, und das Durchschlüpfen desselben durch eine Schlinge, die Knoten. Beide Fälle sind mit Störungen des Kreislauss im Nabelstrange verbunden, und können das Absterben der Frucht veranlassen. γ. Vorfälle. Sie entstehen, wenn beim Sprengen der Amnionblase im Ansange der Geburt, das abströmende Fruchtwasser den Nabelstrang mit sich herausschwemmt. — In den durch Anhäufung von Wharton'scher Sulze gebildeten salschen Knoten, welche nichts zu bedeuten haben, macht gewöhnlich eine oder beide Nabelarterien eine seitliche Schlingenbiegung.

Der normale Geburtsact geht gewöhnlich in der Weise vor sich, dass die Eihäute am Muttermunde platzen (Sprengen der Blase), das Fruchtwasser absliesst, und hierauf der Embryo praevio capite ausgestossen wird. Die Eihäute mit dem Mutterkuchen folgen in einer längeren oder kürzeren Pause nach, und werden deshalb von den Geburtshelfern Nachgeburt, Secundinae, genannt.

§. 281. Veränderungen der Gebärmutter in der Schwangerschaft.

Die Gebärmutter nimmt während der Schwangerschaft an Grösse und Gewicht zu, sie wird also nicht blos passiv ausgedehnt. Nach Meckel's an zwölf Gebärmüttern nach regelmässig erfolgter Niederkunft vorgenommenen Wägungen, war das Gewicht derselben im Minimum zwei Pfund, und verhielt sich zu dem einer nicht schwangeren Gebärmutter wie 24:1. Die Dicke ihrer Wandungen nimmt in den ersten Monaten, wiewohl nicht bedeutend, zu, — gegen das Ende der Schwangerschaft aber so weit ab, dass sie an den dünneren Stellen (um den Muttermund herum) nur zwei Linien beträgt, und deshalb Einrisse derselben, namentlich bei Erstgebärenden, fast regelmässig vorkommen.

In den ersten beiden Monaten rückt die vergrösserte und dadurch schwerer gewordene Gebärmutter tiefer in das kleine Becken herab, ihr Muttermund ist leichter zu fühlen, und die ganze Vaginalportion ist stärker nach rückwärts gekehrt. Der Unterleib wird, dieses Herabrückens des Uterus wegen, etwas flacher, und die Nabelgrube sinkt ein. Vom dritten Monate an, wo sich die Placenta bildet, hat der Uterus im kleinen Becken nicht mehr Raum genug, er erhebt sich durch sein eigenes Wachsthum, die Vaginalportion wird nachgezogen, und ist schwer mit dem Finger zu erreichen. Der Grund ist im vierten Monate etwas über dem Schambogen zu fühlen. Im fünsten Monate steht er zwischen Schamfuge und Nabel, im sechsten in gleicher Höhe mit dem Nabel, im siebenten über demselben,

im achten und neunten erreicht er die Herzgrube, und im zehnten (Mondmonat) steht er wieder tiefer, zwischen Nabel und Herzgrube. Die Bauchdecken werden dadurch kugelig gewölbt, die Nabelgrube hebt sich, die Nabelfalten glätten sich. Die Vaginalportion wird allmälig zur Vergrösserung des Uterus, der Canalis cervicis zur Vergrösserung der Uterushöhle verwendet. Der Muttermund öffnet sich vom fünften Monat angefangen, und ist in letzter Zeit so weit geworden, dass man mit dem Finger die gespannte Blase der Eihäute fühlt. Die vordere und hintere Lefze des Muttermundes sind ausgeglichen, und der Muttermund ist eine runde Oeffnung geworden. - Das Gewebe des Uterus verändert sich auffallend. Seine Muskelfasern werden deutlicher, röther, und in mehrfache Schichten, besonders am Grunde, getheilt, zwischen welchen die starken Venennetze Platz greifen. Zu den im nicht schwangeren Uterus schon vorhandenen Muskelbündeln kommen neue hinzu. - Die Arterien erweitern sich ungleichförmig, werden zugleich länger, und drehen sich in Spirallinien mit häufigen Knäuelungen auf. (Im jungfräulichen Uterus sollen die Arterien zwar geschlängelt, aber nie in Spiralcurven verlaufen). - Hat der Uterus durch die Geburt sich seiner Bürde entledigt, so zieht er sich so rasch zusammen, dass er schon in der ersten Woche nach der Entbindung auf seine früheren Durchmesser zurückgeführt erscheint. Die spiralen Krümmungen der Arterien ziehen sich an einander (die Spirale wird schärfer gewunden und zugleich kleiner) und nähern sich so sehr, dass eine Arterie wenigstens stellenweise wie perlenschnurartig erscheint (Briquet). Die Venen haben eine viel grössere Capacität, als die Arterien, und geradlinigen Verlauf. Merkwürdig ist es, dass nicht blos die Venen der Gebärmutter, sondern auch jene benachbarter Organe (Scheide, Harnblase, breite Mutterbänder) eine höhere Entwicklung erfahren, und unter den Gebärmuttervenen jene des Grundes (der Placenta entsprechend) sich viel mehr erweitern, als die des Halses. Sie verlängern sich auch nach Weber in die Grundlage der Placenta uterina, und dringen als äusserst feinwandige, aber grobe Stämme zwischen die Lappen (Cotyledones) der Placenta foetalis ein, weshalb sie bei der Geburt, wenn sich die Placenta foetalis von der Gebärmutter trennt, abgerissen werden, und die Blutung bedingen, welche jeden Geburtsact begleitet, und ihn längere oder kürzere Zeit (zugleich mit serösen Absonderungen des Uterus als Wochenfluss, Lochia) überdauert. Die Nerven des Uterus werden erwiesener Weise in der Schwangerschaft zahlreicher, und es sind vorzugsweise die Remak'schen Fasern, welche durch ihre Vermehrung die grössere Entwicklung der Uterinalnerven bedingen.

Die Vergrösserung der Gebärmutter kann nur dadurch vor sich gehen, dass die Organe, welche sie beschränken könnten, aus ihrer Lage weichen, und dadurch das topographische Verhältniss der Baucheingeweide geändert wird. Die Gedärme sind auf die Seiten ausgewichen, die Rippenweichen sind deshalb voller, der Uterus liegt an der vorderen Bauchwand dicht an, und

kann leicht gefühlt werden. Man überzeugt sich eben so leicht durch das Gehör, dass der Embryonalkreislauf einen schneileren Rhythmus hat, als aus dem Puls der Mutter gefolgert werden kann (spricht gegen die Gefässcommunication zwischen Mutter und Kind). Der Druck auf die Eingeweide erzeugt Störungen der Verdauung, auf den Mastdarm Stuhlverstopfung, auf die Gallengefässe Gelbsucht, auf die Harnblase Unregelmässigkeiten in der Urinentleerung, auf die Venen des Beckens Varicositäten der Saphena interns, auf die Lymphdrüsen ebendaselbst Oedem der Füsse, — Zufälle, welche meistens sich mindern, wenn durch eine längere Zeit beobachtete Rückenlage, der Druck der Gebärmutter auf andere Gebilde gerichtet wird. Die Bewegung des Zwerchfells wird ebenfalls beeinträchtigt; Gehen, Laufen, Stiegensteigen, wird häufig nicht gut vertragen; der Gang ist wackelnd, mit stark gestrecktem Rücken, um die Schwerpunktslinie des nach vorn belasteten Leibes noch zwischen den Fusssohlen durchfallen zu machen, etc.

§. 282. Lage des Embryo in der Gebärmutter.

Hat der Embryo einmal eine bestimmte Lage eingenommen, d. h. eine solche, in welche er immer wieder zurückkehrt, wenn er sie durch selbstthätige Bewegung oder durch äussere Veranlassungen für eine Zeit aufgegeben hat, so ist diese in der weitaus grösseren Mehrzahl der Fälle eine solche, dass der Kopf nach abwärts und der Rücken nach vorn gekehrt ist. Es scheint der Häufigkeit dieser Lagerung ein rein mechanisches Verhältniss zu Grunde zu liegen. Der Kopf, als der schwerste Körpertheil, sinkt nach unten, und der stark gekrummte Rücken legt sich an die vordere Uteruswand, weil diese, der Nachgiebigkeit der Bauchdecken wegen. weiter ausgebaucht ist, als die hintere, welche durch die nach vorn convexe Lendenwirbelsäule beschränkt wird. Da der Kopf des Embryo gegen die Brust geneigt ist, so wird das Hinterhaupt - nicht die Stirn oder das Gesicht - auf dem Muttermunde stehen, und zuerst bei der Geburt vorrücken. Man fühlt deshalb beim Touchiren vor der Geburt die kleine Fontanelle (Hinterhaupt-Fontanelle) im Muttermunde. Der gerade Durchmesser des Kopfes kann aber nicht im geraden Beckendurchmesser liegen. da letzterer zu klein ist. Der Kopf muss also schief stehen, was durch die Richtung der ebenfalls leicht zu fühlenden Pfeilnath erkannt wird. Es ist noch nicht ausgemittelt, warum die schiese Stellung des Kopses meistens (unter vier Fällen dreimal) mit dem linken schiesen Beckendurchmesser des Beckeneinganges übereinstimmt, d. h. das Hinterhaupt der Frucht gegen die linke Schenkelpfanne, das Gesicht gegen die rechte Symphysis sacro-iliaca gerichtet ist. (Nach Schweighäuser soll der Grund davon in der grösseren Länge (?) dieses schiefen Beckendurchmessers liegen.) Diese Lagerung ist die einzig normale, und gesährdet den Geburtsact am wenigsten. Sie kommt nach Desormeaux unter 1000 Geburtsfällen 962 Mal vor.

Die Gesichtslage der Frucht ist schon weniger gunstig, da wegen des zum Nacken zurückgebogenen Hinterhaupts, nebst dem senkrechten Durchmesser des Kopfes zugleich der Hals in das Becken tritt; auch ist die Drehung des Kopfes im Becken (welche geschehen muss, damit die langen Durchmesser des oblongen Kindskopfes in die langen Durchmesser des Beckens fallen) schwieriger, wenn die durch ihre Erhabenheiten unregelmässige (wenigstens nicht gleichförmig gewölbte) Antlitzstäche sich drehen soll, als wenn das glatte und kugelige Hinterhaupt diese Drehung auszuführen hat. Ihre Häusigkeit verhält sich zu jener der Hinterhauptlage nach Carus wie 1:92.

Die Steisslage bringt den Nachtheil mit sich, dass der am schwersten zu gebärende Theil der Frucht — der Kopf — zuletzt entwickelt wird, wozu die durch frühere Anstrengungen erschöpfte Expulsivkraft der Gebärenden häufig nicht mehr ausreicht, und deshalb die Geburt durch Kunsthilfe vollendet werden muss. Geht die Nabelschnur zwischen den Füssen durch, und wird sie nicht gelöst, so wird der auf ihr reitende Embryo bei seinem Hervorkommen sie so comprimiren, dass Unterbrechung des Kreislaufes eintritt, welche um so gesährlichere Folgen sür das Leben des Kindes haben wird, als der noch in der Gebärmutter verweilende Kopf nicht athmen kann, um das Vonstattengehen des Kreislauss auf neuen Wegen (durch die Lunge) einzuleiten.

Unter den übrigen abnormen Fruchtlagen ist die Fusslage wohl die häufigste, und minder gefährlich, wenn beide Füsse, als wenn nur einer zur Geburt vorliegt, in welchem Falle die Kunsthilfe nothwendig interveniren muss, um den sogenannten Partus agrippinus zu vollziehen, dessen Namen Plinius erklärt, wo er (Nat. hist. VII. 8.) sagt: in pedes procedere nascentem contra naturam est, quo argumento eos appellavere Agrippas, ut aegras partos. Krause (kritisch etymolog. Lex. pag. 39) leitet den Ausdruck von άγρία ἵππα, άγρίππα, wilde Stute, ab, weil die griechischen Nomaden so viel Gelegenheit hatten, das Werfen der Stuten zu beobachten, und dabei zwei Füsse vorauskommen sahen.

Anatomisch physiologische Urtheile über die verschiedenen Fruchtlagen enthält Burdach's Physiologie. 3. Bd. §. 486.

§. 283. Literatur der Eingeweidelehre.

I. Verdauungsorgane.

Die Literatur des Verdauungsorgans besteht, mit Ausnahme der ausführlichen anatomischen Handbücher, grösstentheils nur in Specialabhandlungen über die einzelnen Abschnitte dieses Systems. So weit es sich dabei über Structurverhältnisse handelt, sind nur die neueren Arbeiten brauchbar. Eine vortreffliche Zusammenstellung alles Bekannten, und eine reiche Fundgrube eigener Untersuchungen über sämmtliche Eingeweide ist Huschke's Eingeweidelehre. Leipzig, 1844. — Henle's und Kölliker's Gewehslehren, und die physiologischen Handbücher von Markelientin, enthalten einen Schatz von mikroekopisch-anzeit tungen, und das grosse Drüsenwerk von J. Mall

nentium structura. Lips., 1830. fol.) ist noch immer die Grundlage für mikroskopische Studien über den Bau der Eingeweide, obwohl einzelne Details derselben nicht mehr richtig sind.

Kopf-, Hals- und Brusttheil des Verdauungsorgans.

- E. H. Weber, über den Bau der Parotis des Menschen. In Meckel's Archiv. 1827.
- C. Rahn, Einiges über die Speichelsecretion. Zurich, 1850.
- C. H. Dzondi, die Functionen des weichen Gaumens, Halle, 1831. 4.
- F. H. Bidder, neue Beobachtungen über die Bewegungen des weichen Gaumens. Dorpat, 1838. 4.
- Watt, Anatomical Views of the Mouth, Larynx and Fauces. Lond., 1809. Sebastian, recherches anat. physiol. etc. sur les glandes labiales. Groning., 1842. 4.
- C. Th. Tourtual, neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlund- und Kehlkopfes. Leipzig, 1846. 8.

Die älteren Schristen von Wharton, N. Steno, Nuck, van Horne, C. Bartholinus, Vater, A. F. Walter über die Aussührungsgänge der Speicheldrüsen, haben nur geschichtliches Interesse.

Zunge.

Ausser den im Texte citirten Schriften:

- S. Th. Sömmerring, Abbildung der menschlichen Geschmacks und Sprachorgane. Frankfurt a. M., 1806. fol.
- R. Froriep, de lingua anatomica quaedam et semiotica. Bon., 1828. 4. Mayer, neue Untersuchungen etc. Bonn, 1842.

Fleischmann, de novis sub lingua bursis mucosis. Norimb., 1841. 8.

Magen und Verdauung.

- L. Bischoff, über den Bau der Magenschleimhaut, in Müller's Archiv. 1838.
- A. Wasmann, diss. de digestione nonnulla. Berol., 1839. 8.
- J. A. Eberle, Physiologie der Verdauung. Würzburg, 1834. 8.
- T. Schwann, über das Wesen des Verdauungsprocesses. Müller's Archiv. 1836.
- S. Pappenheim, zur Kenntniss der Verdauung. Breslau, 1839. 8. Der Artikel "Verdauung" in R. Wagner's Handwörterbuch.

Darmkanal.

- J. C. Peyer, exercitatio anat. de gland. intestin. Scaphus. 1677. 8.
- J. C. Brunner, novarum glandularum intestinalium descriptio; in Miscellacad. nat. curios. Dec. II. 1686.
- J. N. Lieberkühn, diss. anat. physiol. de fabrica et actione villorum intest. Lugd. Bat., 1745. 4.
- L. Böhm, de glandularum intestinalium structura penitiori. Berol., 1835. 4.
- J. Goldschmid Nanninga, de processu vermisormi. Groning., 1840. 8.
- C. O. Steinhäuser, experimenta de sensibilitate et functionibus intestini crassi-Lips., 1841. 4.
- M. J. Weber, tiber die Valvula coli, im Organ für die gesammte Heilkunde_ 1843. 2. Bd.

- Ph. Middeldorpf, de glandulis Brunnianis. 1846. 4.
- R. Ziegler, über die solitären und Peyer'schen Follikel. Würzb., 1851.
- E. Brücke, über den Bau der Peyer'schen Drüsen, in den Denkschristen der kais. Akad. II. Bd. 1850.

Derselbe, über das Muskelsystem der Magen – und Darmschleimhaut, in den Sitzungsberichten der kais. Akad. 1851.

Die älteren Abhandlungen von Kerkring, Trew, Heister und Albin über die Falten der Darmschleimhaut, von Hedwig und Lieberkühn über die Darmzotten, von Bosch und Michell über die dicken Gedärme, von Bleuland und Albin über die Blutgefässe der Gedärme, sind durch Rudolphi's, Meckel's, Döllinger's, Müller's und Anderer Arbeiten werthlos geworden.

Bauchfell und dessen Duplicaturen.

- F. M. Langenbeck, comment. de structura peritonei, etc. Gotting., 1817. fol.
- C. J. Baur, anatomische Abhandlung über das Bauchsell. Stuttgart, 1838. 8.
- C. H. Meyer, anatomische Beschreibung des Bauchfells. Berlin, 1839.
- G. S. Rath, das Mesenterium, dessen Structur und Bedeutung. Würzburg, 1823. 8.
- J. Müller, über den Ursprung der Netze und ihr Verhältniss zum Peritonealsack, in Meckel's Archiv. 1830.
- H. C. Hennecke, comm. de functionibus omentorum. Gott., 1836. 4.
- H. Meyer, über das Vorkommen eines Processus peritonei vaginalis beim weiblichen Fötus, in Müller's Archiv. 1845.

Sämmtliche Schriften über chirurgische Anatomie gehören ebenfalls hierher.

Leber.

Ausser den im Text citirten Abhandlungen:

- F. Kiernan, Anatomy and Physiology of the Lever, in Philos. Transact. 1833. P. II.
- E. H. Weber, über den Bau der Leber, in Müller's Archiv. 1843.
- A. Krukenberg, Untersuchungen über den feineren Bau der menschlichen Leber. Müller's Archiv. 1843.
- Krause, in Müller's Archiv, 1845, pag. 524. (Spricht sich für blinde, bläschenförmige Anfänge der Gallenkanälchen aus.)
- L. J. Backer, de structura subtiliori hepatis. Traj. ad Rh. 1845.
- A. Retzius, über den Bau der Leber, in Müller's Archiv. 1849. pag. 151.
- R. Wagner, Handwörterbuch der Physiol. Art. Leber, von Professor Theile in Bern.
- M. Rosenberg, de recentioribus structurae hepatis indagationibus, Vratisl. 1853.

Die Werke von Rolfink, Glisson, Huber, Bianchi, Ferrein, Lobstein, C. F. Wolf, sind für die Gegenwart ohne Werth.

Bauchspeicheldrüse und Milz.

- J. G. Wirsung, figura ductus cujusdam cum multiplicibus suis ramulis noviter in pancreate observati. Padov., 1643. fol.
- F. Tiedemann, über die Verschiedenheiten des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse, in Meckel's Archiv. IV.
- M. Malpighi, de liene, in ejusdem exercitat. de viscerum structura. Bonon., 1664. 4.

- J. Müller, über die Structur der eigenthümlichen Körperchen in der Milz einiger pflanzenfressender Säugethiere, im Arch. für Anat. und Physiol. 1834.
- C. G. Giesker, anat. physiol. Untersuchungen über die Milz des Menschen. Zurich, 1835. 8.
- G. Rachem, diss. de liene. Berol., 1839. 8.
- O. Funke, de sanguine venae lienalis. Lips., 1851.

Ueber den Situs viscorum handeln alle chirurgischen Anatomien ausführlich, und eine sehr getreue bildliche Darstellung desselben gab Ortalli, Abbildungen der Eingeweide der Schädel-, Brust- und Bauchhöhle des menschlichen Körpers in Situ naturati. Mainz, 1838. fol.

II. Respirationsorgan.

Kehlkopf.

- J. D. Santorini, de larynge, in ejus obs. anat. Venet. 1724. 4.
- J. B. Morgagni, adversaria anat. Lugd. Bat. 1723. 4. adv. I.
- S. Th. Sömmerring, Abbildungen des menschlichen Geschmack- und Sprachorgans. Frankfurt a. M., 1806. fol.
- F. G. Theile, de musculis nervisque laryngis. Jenae, 1825. 4.
- C. Th. Tourtual, neue Untersuchungen etc. Leipzig, 1846. 8.
- H. Rheiner, Beiträge zur Histologie des Kehlkopses. Wurzburg, 1852.

Luströhre, Lungen und Pleura.

- F. D. Reisseisen, de structura pulmonum. Argentor. 1803.
- S. 7h. Sömmerring und F. D. Reisseisen, über die Structur und Verrichtung der Lungen, 2 gekrönte Preisschriften, Berlin, 1808. 8.
- Ev. Home, An Examination into the Structure of the Cells of the Human Lungs. Philos. Transact. 1827., und G. Rainey, On the Minute Structure of Lungs. Med. Chir. Transact. 1845.
- J. E. Hebenstreit, de mediastino postico. Lips., 1743. 4.
- A. W. Otto, von der Lage der Organe in der Brusthöhle. Breslau, 1829. 4.

Die neuesten Forschungen über den Bau der Lungen enthalten folgende Schriften:

- J. Moleschott, de Malpighianis pulmonum vesiculis, Heidelberg, 1845, und in den Holländ. Beiträgen zu den anat. phys. Wissenschaften. 1. Bd. (Auffindung der von Retzius in der Vogellunge entdeckten Parietalzellen.)
- Rossignol, Recherches sur la structure du poumon de l'homme etc. Bruxelles, 1846. (Trichterformige Erweiterungen der Enden der kleinsten Lustwege. Moleschott's Parietalzellen sind keine Ausbuchtungen der trichterformigen Erweiterungen, entonnoirs, sondern sitzen wie die Zellen einer Honigwabe auf ihrer inneren Fläche, daher der neue Name: Alvéoles.)
- A. Adriani, de subtiliori pulmonum structura. Trajecti ad Rh. 1847. (Eine unter Schroeder van der Kolk's Aegide geschriebene Inauguralis.)
- Köstlin, zur normalen und pathol. Anatomie der Lunge, in Griesinger's Archiv. 1848.
- E. Schultz, disquisitiones de structura canalium aëriferorum. Dorpat., 1850.

 Ueber die elastischen und glatten Muskelfasern der Lustwege siehe Gerlach's und Kölliker's schon östers im Texte citirte Schriften.

Schilddrüse und Thymus.

- J. A. Schmidtmüller, über die Ausführungsgänge der Schilddrüse. Landshut, 1804. 4.
- A. F. Bopp (und Rapp) über die Schilddrüse. Tübingen, 1840.
- S. C. Lucae, anat. Untersuchungen der Thymus im Menschen und in Thieren. Frankfurt am M., 1811, 1812. 4.
- F. W. Becker, diss. de gland. thoracis lymphat. et de thymo. Berol., 1826. 4.
- A. Cooper, Anatomy of the Thymus Gland. Lond., 1832. 4.
- F. C. Haugsted, thymi in hom. et per seriem animalium descriptio anatom. physiol. Hafn., 1832. 8.
- J. Simon, Physiological Essay on the Thymus Gland. Lond., 1845. 4.
- A. Ecker, in der Zeitschrift für rat. Medicin. VI. Bd., und Th. Frerich's, über Gallert- und Colloidgeschwülste. Gött., 1847. Ferner der Artikel: Blut-gestssdrüsen in R. Wagner's Handwörterbuch.
- C. Rokitansky, zur Anatomie des Kropfes. Denkschriften der kais. Akademie.

 1. Band.

III. Harnwerkzeuge.

Nieren.

Aeltere Schriften, nur von historischem Werth.

- L. Bellini, exercitationes auat. de structura et usu renum. Florent., 1662. 4.
 M. Malpighi, de renibus, in ejusdem Exercitat. de viscerum structura. Bonon., 1666. 4.
- A. Schumlansky, diss. de structura renum. Argent., 1782. 4.
- Ch. Cayla, observations d'anat. microscopique sur le rein des mammifères.

 Paris, 1839. 4. (Nimmt Verbindungen der Harnkanälchen mit den Capillargestissen an.)

Neuere Arbeiten:

Bowman, in Lond. Edinb. and Dublin Philos. Magaz. 1842.

- J. Gerlach, Beiträge zur Structurlehre der Niere. Müller's Archiv. 1845. pag. 378. (Lässt mehrere Malpighi'sche Kapseln auf Einem Harnkanälchen aufsitzen.)
- F. Bidder, über die Malpighi'schen Körper der Niere. Ebendas p. 508 seqq. und dessen vergleichend-anatom. Untersuchungen über die männlichen Geschlechts- und Harnwerkzeuge der nackten Amphibien. Dorpat., 1846. (Lässt die Malpighi'schen Körperchen nicht in der Höhle der Kapsel, sondern ausserhalb derselben liegen, und nur mehr weniger in dieselbe hineinragen.)
- C. Ludwig, Nieren, in Wagner's Handwörterbuch. 11. Heft.
- Kölliker, über Flimmerbewegung in den Primordialnieren. Müller's Archiv. 1845. p. 518.
- G. Nicolucci, sull' intima structura dei reni; in Filiatre Sebezio. Feb. p. 65 (bildet sogar Nervenästchen im Glomerulus ab).
- v. Patruban, Beiträge zur Anatomie der menschlichen Niere, in der Prager Vierteljahrsschrift, Bd. XV. pag. 87 (sah in der Schlangenniere zwei Harnkanälchen aus Einer Kapsel entspringen).
- v. Carus, über die Malpighi'schen Körper der Niere, im 2. Bde. der Zeitschr. für wissensch. Zoologie. (Der Knäuel liegt entweder in einer erweiterten

Stelle eines Harnkanälchens [Triton], oder in dem blinden, angeschwollenen Ende desselben [die übrigen Thiere], und wird von einer einfachen Schichte eines Pflasterepitheliums überzogen).

Wittich, im Archiv für path. Anat. 1849.

Hessling, Histologische Beiträge zur Lehre von der Harnsecretion. Jena, 1851. J. Markusen. über das Verhältniss der Malpighi'schen Körperchen zu den Harnkanälchen, in den Verhandl. der Petersb. Akademie, 1851.

Nebennieren.

L. Jacobson et Reinhard, recherches sur les capsules surrénales, im Bulletin des sciences méd. 1824. I.

Nagel, diss. sistens renum succent. mammalium descript. anatom. Berol., 1838. 8.

H. B. Bergmann, diss. de glandulis supraren. Gott., 1839. 8.

Schwager-Bardeleben, diss. observ. microsc. de glandulis ductu excretorio carentibus. Berol., 1842. 8.

A. Ecker, der feinere Bau der Nebennieren. Braunschw., 1846. (Auf gründliche, vergleichend anat. Untersuchungen basirtes Hauptwerk.)

Harnblase und Harnröhre.

- Ch. Bell, Treatise on the Urethra, Vesica urinaria, Prostata and Rectum. Lond., 1820. 8.
- J. Wilson, Lectures on the Structure and the Physiology of the male Urinary and Genital Organs. London, 1821. 8.
- J. Houston, Views of the Pelvis, etc. Dublin, 1829.
- G. J. Guthrie, On the Anatomy and Diseases of the Neck of the Bladder and the Urethra. Lond., 1834. 8.

Die chir.-anat. Schristen von Leroy d'Etioles, Amussat, Civiale, Cazenave, widmen diesem in operativer Beziehung höchst wichtigen Capitel besondere Ausmerksamkeit. Ebenso die sür die topographische Anatomie aller Beckenorgane höchst wichtige Schrist von O. Kohlrausch: zur Anat. und Physiol. der Beckenorgane. Leipzig, 1854.

IV. Mannliche Geschlechtsorgane.

Hoden.

- R. de Graaf, de virorum organis generationi inservientibus. Lugd. Bat. 1668. 8.
- A. Haller, Observ. de vasis seminalibus. Gott., 1745. 4.
- Cooper, Observ. on the Structure and Diseases of the Testis. Lond., 1830.
 Deutsch Weimar, 1832.
- E. A. Lauth, mém. sur le testicule humain, in Mém. de la soc. de l'histoire nat. de Strasbourg. Tom. I. livr. 2.
- C. Krause, in Müller's Archiv. 1837. pag. 20.

Samenbläschen, Prostata und Cowper'sche Drüsen.

- J. Hunter, Observ. on the Glandes between the Rectum and Bladder, etc., in dessen Observ. on Certain Parts of the Animal Occonomy. Lond., 1786.
- E. Home, On the Discovery of a Middle Lobe of the Prostata. Philos. Transact. 1806.

- W. Cowper, glandularum quarumdam nuper detectarum descriptio, etc. Lond., 1702. 4.
- A. Haase, de glandulis Cowperi mucosis. Lips., 1803.
- E. H. Weber, über das Rudiment eines Uterus bei männlichen Säugethieren, über den Bau der Prostata etc. 1846.
- R. Leuckart, das Weber'sche Organ und seine Metamorphosen, in der illustr. med. Zeitung. 1852.
- Fr. Will, über die Secretion des thierischen Samens. Erlang., 1849.

Penis.

- F. Tiedemann, über den schwammigen Körper der Ruthe, etc. Meckel's Archiv. 2. Bd.
- A. Moreschi, comm. de urethrae corporis glandisque structura. Mediol. 1817. fol.
- J. C. Mayer, über die Structur des Penis. Froriep's Notizen. 1834. N. 883.
- B. Panizza, osservazioni anthropo-zootomico-fisiol. Pav., 1836. fol.
- J. Müller, in dessen Archiv. 1835. Krause, ebenda, 1837. Valentin, 1838. Brdl, 1841. (Ueber die Vasa helicina.)
- G. L. Kobelt, über die m\u00e4nnlichen und weiblichen Wollustorgane. Freiburg, 1844. 4.
- Kölliker, über das Verhalten der cavernösen Körper. Würzburger Verhandl. 1851.

V. Weibliche Geschlechtsorgane.

Eierstöcke.

- R. de Graaf, de mulierum organis. Lugd. Bat. 1672. 8.
- F. Autenrieth, über die eigentliche Lage der inneren weiblichen Geschlechtstheile, in Reil's Archiv. VII. Bd.
- C. Negrier, recherches anat. et physiol. sur les ovaires. Paris, 1840. 8.
- G. C. Kobelt, der Nebeneierstock des Weibes, etc. Heidelberg, 1847. 4.
- W. Steinlin, über die Entwicklung der Graafschen Follikel. In den Mittheilungen der Zürcher naturforschenden Gesellschaft. 1847.
- H. Kittner, de corporibus luteis. Vratisl. 1853.

Die Schriften über Entwicklungslehre von Purkinje, Baer, Coste, Valentin, Wagner, Bischoff.

Gebärmutter.

- C. G. Jörg, über das Gebärorgan des Menschen, etc. Leipzig, 1808. fol.
- G. Kasper, de structura fibrosa uteri non gravidi. Vratisl., 1840. 8.

Purkinje, in Froriep's Notizen. N. 459.

- Bischoff, über die Glandulae utriculares des Uterus und ihren Antheil an der Bildung der Decidua. Müller's Archiv. 1846.
- Ch. Robin, mémoire pour servir à l'histoire anat. de la membrane muqueuse uterine, de la caduque, et des oeufs de Naboth. Archives génér. 1848. Juillet. p. 257—286 und 405—533.
- A. Kölliker, Zeitschrift für wiss. Zool. I. (glatte Muskelfasern).
- V. Schwartz, de decursu musculorum uteri et vaginae. Dorpat., 1850.
- M. Kilian, die Nerven des Uterus, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift, X. Bd. 1. u. 2. Heft. Sehr wichtig.

Acussere Scham und Brüste.

- A. Vater, de hymene. Gott., 1742. 4.
- B. Osiander, Abhandlung über die Scheidenklappe, in dessen Denkwürdigkeiten für Geburtshilfe. 2. Bd.
- C. Devilliers, nouv. recherches sur la membrane hymen et les caroncules hymenales. Paris, 1840. 8.
- Mandt, zur Anatomie der weibl. Scheide, in Henle und Pfeuffer's Zeitschr. VII. Bd. 1. Heft.
- A. B. Kölpin, schediasma de structura mammarum. Gryphisw., 1765. 4.
- J. G. Klees, über die weiblichen Brüste. Frankfurt am M., 1795. 8.
- A. Cooper, On the Anatomy of the Breast. Lond., 1839. 4.
- Fetzer, Diss. über die weiblichen Brüste. Wurzb., 1840.
- G. L. Kobelt, die männl. und weibl. Wollustorgane. Freiburg, 1844.

Ueber die Metamorphose des Eies und die Veränderungen der weiblichen Geschlechtstheile in der Schwangerschaft handeln die in der allgemeinen Literatur §. 13 angesuhrten Schristen über Entwicklungsgeschichte. Ueber die Uebereinstimmungen im Baue der Harn- und Geschlechtswerkzeuge der Wirbelthiere handelt: H. Meckel, zur Morphologie der Harn- und Geschlechtswerkzeuge der Wirbelthiere. Halle, 1848, und R. Leuckert, in dem Artikel "Zeugung" im Handwörterbuch der Physiologie.

SECHSTES BUCH.

Gehirn-und Nervenlehre.



A. Centraler Theil des animalen Nervensystems.

Gehirn und Rückenmark.

§. 284. Hüllen des Gehirns und Rückenmarks.

Die drei häutigen Hüllen des Gehirns und Rückenmarks folgen in nachstehender Ordnung von aussen nach innen auf einander:

A. die harte oder fibrose Hirnhaut, Dura mater s. Dura meninx, ist die ausserste Hülle des Gehirns und Rückenmarks. aus kreuzweis verslochtenen Bindegewebbündeln, wie die sibrösen Häute überhaupt, ist dicker, härter, und minder elastisch, als die übrigen Hirnhüllen, und bildet einen geschlossenen Sack, welcher an die innere Oberfläche der Schädel- und Rückgratshöhle fest anliegt, und für die erstere die Stelle der mangelnden inneren Beinhaut vertritt. Die Dura mater dringt in alle Oeffnungen ein, durch welche Gestasse und Nerven zum oder vom Gehirn und Rückenmark gehen, umhüllt diese scheidenartig, und begleitet sie theils in ihrem ferneren Verlaufe, theils sliesst sie mit der Beinhaut Ihre äussere Oberfläche ist rauh, indem sie durch eine Menge Fortsätze, Gefässäste, und kurzen straffen Zellstoff, mit den Knochen so fest zusammenhängt, dass eine gewisse Gewalt dazu gehört, sie von ihnen zu Ihre innere Oberstäche dagegen ist glatt und glänzend, und besitzt einen Beleg von Pflasterepithelium, welchen man bis auf die neueste Zeit für eine Lamelle der Arachnoidea hielt. Man nimmt an der Dura mater zwei Schichten an, welche zwar durch anatomische Hilfsmittel nicht isolirt darstellbar sind, aber an gewissen Stellen von selbst divergiren, wodurch es zur Bildung von leeren Räumen kommt, welche, da sie das Venenblut sammeln, bevor es in die Abzugskanäle einströmt, Blutleiter (Sinus durae matris) genannt werden.

Der Theilung des centralen Nervensystems entsprechend, unterscheidet man einen Gehirn- und Rückenmarktheil der harten Hirnhaut.

a) Der Gehirntheil der harten Hirnhaut, Pars cephalica durae matris, hängt in der Richtung der Suturen, der vorspringenden Knochenkanten (Crista frontalis, oberer Winkel der Pyramide, him

schwertsormigen Keilbeinstügel, kreuzsormige Erhabenheit des Hinterhauptbeins etc.), so wie an den Rändern der Schädellöcher sester mit den Knochen zusammen. Er bildet einen longitudinalen und einen queren, gegen die Schädelhöhle srei vorspringenden Fortsatz, welche sich kreuzen, und deshalb zusammengenommen Processus cruciatus durae matris genannt werden. Der longitudinale Fortsatz senkt sich zwischen die Halbkugeln des grossen und kleinen Gehirns, der quere zwischen die Hinterlappen des grossen und das kleine Gehirn ein. Auf der Protuberantia occipitalis interna stossen die Schenkel dieses Kreuzes zusammen. Jeder derselben führt einen besonderen Namen.

- a) Der Processus faleiformis major, Sichel des grossen Gehirns ein, und entspricht mit seinem oberen, convexen, besestigten Rande der Mittellinie des Schädeldaches, von der Protuberantia occipitalis interna angesangen bis zur Crista galli des Siebbeins. Sein unterer, concaver, scharser Rand ist srei, und gegen die obere Fläche des, beide Halbkugeln des Gehirns verbindenden, Corpus callosum gewendet. Da man sich diesen Fortsatz durch Faltung (Einstülpung) der inneren Lamelle der harten Hirnhaut entstanden denkt, so muss am oberen Besestigungsrande desselben eine Höhle sichelsörmiger Blutleiter, Sinus salcisermis s. longitudinalis superior existiren, welchem ein ähnlicher, aber kleinerer am unteren Rande der Sichel entspricht. Die Krümmung der Ränder, und die von hinten nach vorn abnehmende Breite dieses Fortsatzes, ist der Grund seiner Benennung: Hirnsichel.
- β) Der Processus falciformis miner, Sichel des kleinen Gehirns, schaltet sich zwischen die Halbkugeln des kleinen Gehirns ein, und erstreckt sich von der Protuberantia occipitalis interna zum hinteren Umfange des Foramen occipitale magnum herab. Er ist, wie natürlich, in allen Dimensionen viel kleiner, als die grosse Hirnsichel, in deren unterer Verlängerung er liegt.
- γ) Des Tentorium cerebelli, Zelt des kleinen Gehirns, wird durch den Querschenkel des Processus cruciatus gebildet, und schiebt sich horizontal zwischen die Hinterlappen des grossen und die Halbkugeln des kleinen Gehirns ein, um letztere gegen den Druck der ersteren zu schützen, so wie die grosse Hirnsichel den nachtheiligen Druck beseitigt, welchen, bei Seitenlage des Schädels, eine Hemisphäre des grossen Gehirns auf die andere ausüben müsste. Es liegt so ziemlich in gleicher Höhe mit der Pars orbitalis des Stirnbeins.

Um dem Zelte mehr Tragkrast und Stabilität zu geben, ist es mit seinem vorderen Rande an die oberen Kanten beider Pyramiden der Schläseknochen besestigt, und erstreckt sich bis zu den Processibus clinoideis der Sattellehne. Hinter der Sattellehne ist die Mitte des vorderen Zeltrandes wie ein gothisches Thor mit nach hinten und oben gerichteter Spitze ausgeschnitten, wodurch eine Oessnung entsteht (Incisura tentorii), welche

der mittlere Stamm des grossen Gehirns (Vierhügel und Varolsbrücke) einnimmt. Die Ebene des Gezeltes ist nicht plan. Die Mitte der oberen Fläche wird durch die mit ihr zusammenhängende Sichel etwas in die Höhe gezogen, wodurch zwei seitliche Abdachungen entstehen.

An den Besetigungsrändern des Zeltes und der kleinen Sichel kommen Blutleiter vor, deren Beschreibung, zugleich mit den übrigen Blutleitern der harten Hirnhaut, in §. 339 solgt.

b) Der Rückenmarktheil der harten Hirnhaut, Pars spinalis durae matris. Da durch alle Schädellöcher scheidensörmige Fortsätze der harten Hirnhaut austreten, so muss durch das grösste Schädelloch (Foramen occipitale magnum) die ansehnlichste Verlängerung derselben, welche eine Scheide sür das Rückenmark bildet, gehen. Der Rückgratkanal hat bereits ein wahres Periosteum; — die Pars spinalis durae matris ist somit hier eine reine Hüllenmembran, ohne Nebenbedeutung einer Beinhaut (wie in der Schädelhöhle). Sie erstreckt sich durch den ganzen Rückgratkanal, süllt ihn aber nicht so genau aus, wie dieses in der Schädelhöhle geschah, indem zwischen ihr und den Wirbelbogen, ein durch starke Venengeslechte eingenommener Raum übrig bleibt. Sie endigt als Blindsack im zweiten oder dritten Kreuzwirbel.

Ihre beiden Blätter weichen häufig aus einander, um für die inneren Venengeslechte des Rückgrats Raum zu geben. An ihrem Beginne unterhalb des grossen Hinterhauptloches hängt sie nach vorn mit dem Apparatus ligamentosus, und nach hinten mit der Membrana obturatoria posterior innig zusammen, wo sie zugleich durch die Arteria vertebralis durchbohrt Sie schliesst das Rückenmark nicht enge ein. An jenen Stellen, wo die Beweglichkeit der Wirbelsäule gross ist, ist der Sack der Dura mater weit (Hals, Lenden), im Bruststück der Columna vertebralis dagegen knapp an die Medulla spinalis anliegend. Jeder Rückenmarksnerv erhalt von ihr eine Scheide, die ihn durch das entsprechende Foramen intervertebrale geleitet, und im weiteren Verlaufe zu dessen Neurilemma wird. Ihre innere Oberstäche ist mit dem Epithelium der Arachnoidea überzogen, und sendet 20 - 23 paarige, zackenähnliche Fortsätze (nicht genau zwischen je zwei Nervenwurzeln) nach innen zur Seitensläche der Medulla Diese Zacken sind sämmtlich dreieckig (mit Ausnahme der un-Sie kehren ihre Spitze nach aussen, und ihre tersten, fadenförmigen). mit der Pia mater verschmelzende Basis nach innen. Sie sind als eben so viele Besestigungsmittel des Rückenmarks zu nehmen, und bilden, als Ganzes betrachtet, das gezahnte Band, Ligamentum denticulatum, des Rückenmarks.

Animale Nervenfasern wurden von Arnold in der harten Hirnhaut aufgefunden, von Purkinje, Schlemm, Bochdalek und Luschka bestätigt. —

Die sogenannten Verknöcherungen der harten Hirnhaut beders an der Sichel nicht selten vor. Sie gehören eigen Lehrbuch der Anatomic. 5. Aus.

Oberstäche der harten Hirnhaut an, hängen mit der Dura mater nur lose zusammen, und werden, obwohl selten, auch unter der Arachnoidea cerebralis gesunden. Vor dem 30. Lebensjahre sind sie selten. Ihre Grösse variirt von dem Umsange einer Linie bis zu jenem eines Kreuzers, und darüber. In der Mitte sind sie am dicksten, und schärsen sich gegen den Rand zu. Zuweilen erscheinen sie als in Hausen gruppirte oder isolirt stehende Nadeln. Sie besitzen wahre Knochentextur, dürsen aber mit jenen Verknöcherungen nicht verwechselt werden, welche als mehr weniger umsangreiche Platten, zwischen der harten Hirnhaut und der inneren Tasel der Schädelknochen vorkommen, und mit letzterer allmälig verwachsen. Auch in der durch Entzündung verdickten und callös gewordenen Substanz der harten Hirnhaut kommen wahre Knochenconcretionen vor.

B. Die Spinnwebenhaut, Arachnoidea s. Meninx serosa (ἀράγγη, Spinne), wurde bisher allgemein als ein zarter, seröser Doppelsack aufgefasst, dessen ausserer Ballen fest mit der inneren Oberstäche der Dure mater, dessen innerer mit der ausseren Obersläche des Gehirns und Rückenmarks lose zusammenhängt. Man unterschied deshalb eine Arachnoides meningea, und eine Arachnoidea cerebralis. Man zählte mehrere Stellen. an welchen der aussere Ballen mit dem inneren in Verbindung tritt. Man dachte sich nämlich, dass jeder vom Gehirn und Rückenmark abgehende Nerv eine Scheide vom inneren Ballen erhält, welche, bevor der Nerv durch die harte Hirnhaut austritt, in den ausseren Ballen übergeht. Luschka hat jedoch bewiesen, dass die Arachnoidea nur aus einem einfachen Ballen — der Arachnoidea cerebralis der Autoren — besteht, und dass die angenommene Arachnoidea meningea weiter nichts, als das Pflasterepithelium der harten Hirnhaut ist. - An der Oberstäche des Gehirns sinkt die Arachnoidea nicht in die Vertiefungen zwischen den Windungen ein, sondern geht brückensormig darüber weg. Ebenso setzt sie über einige Einschnitte und Spalten an der Gehirnbasis hinüber, und deckt als gerade gespanntes Fell die zwischen der Varolsbrücke und der Sehnervendurchkreuzung befindlichen, und im Circulus Willisii eingeschlossenen Erhabenheiten der Gehirnbasis. Mit der Auskleidung der Gehirnkammern hat sie keinen nachweisbaren Zusammenhang. — Die Arachnoidea umhollt auch das Rückenmark, obwohl bei weitem nicht so knapp, wie das Gehirn. Namentlich bleibt am oberen und unteren Ende des Rückenmarks zwischen ihm und der Arachnoidea ein ansehnlicher Zwischenraum - Cavum subarachnoidale. - Nur die äussere Oberstäche der Arachnoidea besitzt ein Epithelium, welches jenem an der inneren Oberstäche der Dura mater vollkommen gleicht.

Rainey und Bourgery wollen in der Arachnoidea sympathische Nervensasern gesunden haben. Ersterer wurde von Henle zurechtgewiesen (Canstatt's Jahresbericht 1846). Von letzterem war noch nichts wahr, was er entdeckte. Auch Bochdalek hat zahlreiche seine Nervensasern beschrieben, welche von der Wurzel des 3.5.6.9. und 11. Hirnnervenpaares, vom Oliven- und Pyramidenstrang des verlängerten Markes, vom Pserdeschweisetc. zur Arachnoidea und (einige) zur Pia mater treten. (Neue Beobacht. im Gebiete der phys. Anatomie, in der Prager Vierteljahrsschrist. 1849. 2. 24)

Ebenso Luschka, welcher selbst Theilungen der Primitivsasern beobachtete. Kölliker erklärt diese Funde sämmtlich für Bindegewebsasern.

Zu beiden Seiten der grossen Sichel finden sich auf der Arachnoides cerebralis die sogenannten Glandulge Pacchioni, als gelbliche oder gelbgraue. plattgedrückte Körper, welche auf einer milchig getrübten Stelle der Arachnoidea aufsitzen, und deren Entwicklung unter Umständen so zunehmen kann, dass sie die harte Hirnhaut durchbohren, sie wie Hügel überragen, und an der inneren Fläche der Schädelknochen entsprechende Vertiefungen bilden (§. 87). Bei Menschen, die an habituellem Kopfschmerz leiden, und bei Saufern, werden sie besonders gross gefunden. Die mikroskopische Untersuchung schliesst sie aus der Klasse der Drüsen, wohin sie seit ihrer Entdeckung gestellt wurden, aus, und reiht sie unter die Producte krankhafter Ausschwitzungen, wohin sie, ihren feinsten Elementartheilchen nach (Exsudatkugeln und -Fasern), zu gehören scheinen. A. Pacchioni, diss. phys. anat. de dura meninge. Romae, 1721. 8. — Jos. und Carl Wenzel, de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Tubingae, 1812. fol. pag. 1-17. - Luschka erklärt die Pacchionischen Körper, ihres Vorkommens an bestimmten Orten, und ihres mit der Arachnoidea übereinstimmenden Baues aus Bindegewebfasern wegen, für normale Gebilde, welche er mit den zottenartigen Verlängerungen anderer seröser Häute auf dieselbe Stufe stellt (Müller's Archiv. 1852. pag. 101.).

C. Die weiche Hirnhaut, Pia mater s. Meninx vasculosa, umhüllt genau die freie Oberfläche des Gehirns und Rückenmarks. Sie ist dünn und halbdurchsichtig, und reichlich mit Blutgesässen ausgestattet, welche sie theils aus dem Gehirn empfängt (Venen), theils in dasselbe eindringen lässt (Arterien). Dieser Gesässverbindungen wegen hängt sie ziemlich innig mit der Oberstäche des Gehirns und Rückenmarks zusammen. stülpt sich in alle Vertiefungen derselben ein, und lässt sich nur mit Gewalt, durch welche alle Gesassverbindungen abgerissen werden, in grösseren Partien abziehen. Am Rückenmark, mit welchem sie inniger verbunden ist, bildet sie beiderseits eine niedrige, longitudinale Falte, welche die Basen der dreieckigen Zacken des Ligamentum denticulatum aufnimmt. Vom unteren Ende des Rückenmarks, welches in gleicher Höhe mit dem ersten oder zweiten Lendenwirbel liegt, setzt sich die Pia mater am sogenannten Endfaden. Filum terminale, bis zum unteren Ende des im Kreuzbeinkanal befindlichen Blindsackes der Dura mater fort. Er enthält Blutgefässe und das letzte Paar der Rückenmarksnerven. Haller hatte somit seine Benennung dieses Fadens als Nervus impar nicht so unpassend gewählt.

Die Pia mater dringt durch den Querschlitz des grossen Gehirns in die mittlere Gehirnkammer ein, und bildet daselbst das mittlere Adergeslecht, dessen Fortsetzungen die beiden seitlichen Adergeslechte (Plexus choroidei) sind. Der sonstige Ueberzug der Wände der Gehirnkammer (Ependymas. Indumentum ventriculorum; — Endyma wäre besser, von èvôvou, überziehen) besteht blos aus einschichtigem Psiasterepithelium. Bei Embryonen soll es slimmern. Auch bei Erwachsenen hat merbewegung im vierten Hirnventrikel beobachtet (an

Leiche eines gerichteten Verbrechers). Ich vermuthe, dass auch das *Ependyma* des Rückenmarkkanals, welcher eine Fortsetzung der vierten Hirn-kammer ist, Flimmerbewegung zeigt.

Purkinje hat organische, Bochdalek animale Nervenfasern in der Pia mater nachgewiesen, welche Kölliker nicht beanständet.

In einzelnen Gehirnen enthalten die Adergeflechte (besonders die seitlichen) kleine, kaum durch das Gesicht, aber besser durch das Gefuhl wie Sandkörner zu unterscheidende, krystallinische, runde oder höckerige Concremente von phosphorsaurer Ammonium-Magnesia (Stromeyer), welche mit dem sogenannten Ilirnsand an der Zirbeldrüse denselben Ursprung und gleiche Beschaffenheit haben.

Die Adergeslechte der einzelnen Kammern werden an ihrem Fundorte erwähnt.

§. 285. Eintheilung des Gehirns.

Das centrale Nervensystem wird in das Gehirn (Encephalon), und das Rückenmark (Medulla spinalis) eingetheilt. Das Gehirn ist die in der Schädelhöhle eingeschlossene Hauptmasse des Nervensystems, das Rückenmark die strangförmige Verlängerung derselben in den Rückgratskanal. Das Gehirn ist von weit complicirterem Baue als das Rückenmark, mit welchem es gleichzeitig entsteht, und deshalb nicht als ein Anwuchs, oder, wie man zu sagen pflegte, als die Blüthe des Rückenmarks zu nehmen ist.— Das Gehirn ist, der Hauptsache nach, symmetrisch, d. h. es besteht aus paarigen Hälsten, und selbst seine mittleren Bestandtheile sind durch einen mittleren Längenschnitt in gleiche Hälsten zu theilen. Allein die Einzelnheiten der Seitenhälsten sind nicht durchwegs congruent, sondern variiren in Grösse und Gestalt.

Das Gehirn wird in das grosse und kleine (Cerebrum et Cerebellum) eingetheilt, und an jedem derselhen zwei seitliche Hälften oder Halbkugeln (Hemisphaerae cerebri et cerebelli), und ein mittlerer Theil unterschieden. Die Fortsetzung des Rückenmarks, welche durch das Foramen occipitale magnum in die Schädelhöhle aufsteigt, und sich an das Gehirn anschliesst, wird als verlängertes Mark (Medulla oblengata, nach Chaussier: Bulbus rhachiticus) noch zum Gehirne gerechnet.

Die Halbkugeln des grossen Gehirns sind nur bei der Ansicht von oben her, ihrer ganzen Länge nach, durch eine tiese Spalte getrennt, in welche sich der grosse Sichelsortsatz der harten Hirnhaut hineinsenkt. Vorn dringt diese Spalte bis auf die Schädelbasis durch, so dass die vorderen Enden beider Halbkugeln auch bei unterer Ansicht von einander getrennt erscheinen. Hinten dagegen erreicht der Spalt nur eine gewisse Tiese, indem der sogenannte mittlere Theil des grossen Gehirns nicht durchschnitten wird. Am kleinen Gehirn sehlt dieser Spalt, und wird nur durch einen Einbug seines hinteren Randes (in welchen sich der kleine Sichelsortsatz der harten Hirnhaut einschiebt) unvollkommen repräsentit.

Dagegen hat die untere Fläche des kleinen Gehirns einen longitudinalen tiefen Eindruck, in welchem das verlängerte Mark zu liegen kommt.

Bei oberer Ansicht werden somit die Halbkugeln des kleinen Gehirns in der Mittellinie ununterbrochen in einander übergehen, und das verlängerte Mark bedecken.

Man unterscheidet an den Halbkugeln des grossen Gehirns drei, an jenen des kleinen Gehirns nur zwei Flächen. Für die Halbkugeln des grossen Gehirns giebt es eine untere, äussere, und innere Fläche. tere Fläche ist durch eine dem schwertförmigen Keilbeinflügel entsprechende tiefe Furche (Fossa Sylvii) in einen vorderen und hinteren Lappen geschnitten, und letzterer selbst wieder durch einen seichten flachen Eindruck in einen unteren und hinteren Lappen getrennt. Von diesen Lappen ist bei oberer Ansicht des Gehirns nichts zu bemerken. Die untere Fläche liegt theils auf der Schädelbasis (vorderer und unterer Lappen), theils auf dem Zelte des kleinen Gehirns (hinterer Lappen). Die äussere convexe Fläche liegt an der Schädelwand an, und geht in der Medianlinie derselben in die innere, ebene und senkrechte Fläche über, welche derselben Fläche der anderen Halbkugel zugekehrt ist, und sie berühren würde, wenn der grosse Sichelfortsatz nicht dazwischen träte. Bei Mangel der Sichel, in Folge angeborener Hemmungsbildung des Gehirns, verschmelzen auch beide Halbkugeln zu Einer Sphäre.

Für die Halbkugeln des kleinen Gehirns giebt es nur eine obere und untere Fläche, welche beide convex sind, und durch einen abgerundeten Rand in einander übergehen. Die obere Fläche ist dem Zelte zugekehrt, die untere in die unteren Gruben des Hinterhauptbeins eingesenkt.

Sämmtliche Flächen der Halbkugeln des grossen und kleinen Gehirns sind nicht glatt und eben, sondern mit Wülsten besetzt, welche am grossen Gehirn darmähnlich, am kleinen Gehirn mehr parallel und bogenförmig gewunden erscheinen, und als Windungen (Gyri s. Intestinula cerebri) bezeichnet werden. Sie bestehen oberflächlich aus grauer, im Inneren aus weisser Masse, und sind durch mehr weniger tief penetrirende Furchen von einander getrennt (Sulci), in welche Falten der weichen Hirnhaut eindringen. Die Gyri und Sulci sind — wenigstens am grossen Gehirn — nicht symmetrisch in beiden Halbkugeln. Dass Unsymmetrie und Vermehrung der Gyri, so wie bedeutendere Tiefe der Zwischenfurchen, bei geistvollen Menschen vorkommen, mag seine Richtigkeit haben, wurde jedoch von mir und Anderen auch im höchsten Grade des Blödsinns (Cretinismus) gefunden. Das grosse Gehirn verhält sich zum kleinen wie 8:1. Das Gewicht beider beträgt im Mittel drei Pfund. Das weibliche ist um 1—2 Unzen leichter (absit invidia dicto).

Das vom Prof. L. Fick in Marburg (1855) herausgegebene Phantom des Menschenhirns, leistet dem Antimonat stellung über die Oberfläche des des von Verhältnisses seiner Zusseren Gestaltung, sehr ich

Einzelne Wülste, und Gruppen von Wülsten, mit besonderen Namen zu unterscheiden, hat für die Zukunst der Gehirnphysiologie gewiss seinen unbezweiselbaren Nutzen. Es scheinen mir jedoch diese Angaben, da sich mit ihnen gegenwärtig, wie mit der überwiegend grossen Mehrzahl der übrigen Formtheile des Gehirns, keine physiologische Vorstellung verknupfen lässt, zur Aufnahme in ein elementares Handbuch nicht geeignet. Weitläufiges hiertiber findet sich bei Valentin (Sömmerring's Nervenlehre, pag. 170 seqq.). - Die oben angestihrte Eintheilung des Gehirns susst auf dem ausseren Habitus des Gehirns. Die auf die Entwicklung des Gehirns Rücksicht nehmende Eintheilung in Vorder-, Mittel- und Hinterhirn ist allerdings wissenschaftlicher, aber minder praktisch. Streng genommen könnte man unter Mittelgehirn (Mesencephalon) nur das Corpus quadrigeminum, welches sich aus der mittleren embryonalen Hirnzelle entwickelt, verstehen, und wurde dadurch einem der Grösse nach sehr untergeordneten Gebilde die Bedeutung einer Hauptabtheilung anweisen.

Es soll in den folgenden §§. die Anatomie des Gehirns auf jene Weise geschildert werden, wie sie sich bei der Zergliederung von oben und von unten her ergiebt, ohne Rücksicht auf den inneren Zusammenhang der einzelnen Gehirnorgane. Die Verbindung derselben zum Ganzen bildet den Inhalt des §. 291.

§. 286. Grosses Gehirn.

Um die Auslindung der hier zu erwähnenden Gehirnorgane zu erleichtern, wird die Beschreibung derselben mit der Zergliederungsmethode ver-Wurde die Schädelhöhle durch einen Kreisschnitt geöffnet. der zwischen den Arcus superciliares und Tubera frontalia beginnt, und dicht über der Protuberantia occipitalis externa endet, und das Schädeldach abgetragen, was zuweilen bei sesteren Adhäsionen der harten Hirnhaut mit den Schädelknochen einige Gewalt erfordert, so untersucht man vorerst die häutigen Hüllen des Gehirns, so weit dieses von oben her möglich ist. Die harte Hirnhaut wird durch einen Kreisschnitt, der mit jenem des Schädeldaches übereinstimmt, getrennt, und die Anhestung des grossen Sichelfortsatzes vorn an der Crista galli und rückwärts über dem Niveau des Zeltes durchgeschnitten. Die von der Oberstäche des Gehirns in den oberen Sichelblutleiter eindringenden Venen mussen mit der Schere getrennt werden, um die harte Hirnhaut ohne Beeinträchtigung der übrigen Hirnhaute abnehmen zu können. Man überblickt nun die äusseren Oberstächen beider Hemisphären, und legt durch vorsichtiges Abziehen der mit der Arachnoidea verwachsenen weichen Hirnhaut die Windungen bloss. Man zieht beide Hemisphären etwas von einander ab, um die Tiese des longitudinalen Zwischenspaltes zu prüsen, und dadurch zu ersahren, wie weit man die Hemisphären durch Horizontalschnitte mit einem breiten und langen Messer abtragen darf, um die Seitenkammern nicht zu eröffnen. Ist man durch diese Schnitte bis zur oberen Fläche des Balkens, an welcher der Längenspalt endet, eingedrungen, so bemerkt man, dass der Balken (Corpus callosum s. Commissura maxima s. Trabs cerebri) ein Bindungsmittel zwischen der

ten und linken Hemisphäre abgiebt. Die beiden Seitenränder desselben strahlen nämlich in die Markmasse der beiden Hemisphären aus, welche in gleicher Höhe mit dem Balken die grösste Ausdehnung als Decke der Seitenkammern (Tegmentum ventriculorum) erreicht.

An der oberen Fläche des Balkens bemerkt man eine, zwischen zwei Längenerhabenheiten von vorn nach rückwärts verlaufende Furche (Chorda longitudinalis Lancisii s. Raphe superior), welche durch viele quere Streifen (Chordae transversales Willisii) rechtwinkelig gekreuzt wird. An der unteren, bei dieser Behandlung nicht sichtbaren Balkenfläche, verläuft die Raphe inferior. Der vordere Rand des Balkens biegt sich nach ab- und rückwärts bis zur Basis des Gehirns, wo er den grauen Kolben, Tuber cinereum, erreicht. Der durch den Umbug des vorderen Balkenrandes gebildete Winkel heisst das Balkenknie, Genu corporis callosi. Der hintere, sich verdickende Rand des Balkens heisst die Balkenwulst, Tuber s. Splenium corporis callosi. (Balkenknie und Balkenwulst werden am besten gesehen, wenn man den Balken vertical durch die Chorda Lancisii durchschneidet, was an dem Gehirne, welches zur Untersuchung vorliegt, und an welchem möglichst viele Organe ganz erhalten werden sollen. nicht gemacht werden kann.) - Wo die Seitenränder des Balkens in die Hemisphären übergehen, wird durch einen verticalen kurzen Schnitt die Seitenkammer (Ventriculus lateralis) geöffnet, und von ihrer Decke so viel abgenommen, bis man ihre ganze Ausdehnung übersieht. Jede Seitenkammer schickt von ihrem mittleren Theile (Cella media) drei bogenförmig gekrümmte, sich nach verschiedenen Richtungen in die Markmasse einbohrende Fortsätze oder Hörner aus, und heisst deshalb auch Ventriculus tricornis. Das Vorderhorn kehrt seine Concavität nach aussen, das Hinterhorn nach innen, und das bis an die Basis des Gehirns sich hinabkrümmende lange Unterhorn nach vorn. (Um die den Sehnervenhügel umgreifende Krümmung des Unterhorns zu sehen, muss ein grosser Theil der Seitenmasse der Hemisphäre abgetragen werden.) Man findet im Vorderhorn der Seitenkammer:

a) den Streifenhügel, Corpus striatum s. Ganglion cerebri anterius, dessen freie birnformige Oberstäche mit ihrem dicken kolbigen Ende nach vorn und innen, mit ihrem zugespitzten Ende (Schweif) nach rückund auswärts gerichtet ist. Er besteht vorzugsweise aus grauer Masse, welche seine freie Fläche ganz einnimmt, und im Inneren desselben, mit der weissen, abwechselnde Schichten — nach Art einer Volta'schen Säule — bildet.

Schneidet man die Markmasse der Hemisphäre, welche an der äusseren Seite des Streifenhügels liegt, schief nach aus- und abwärts durch, so findet man in ihr den Linsenkern, Nucleus lentiformis, als einen ringsum von weisser Marksubstanz umschlossenen, nirgends frei zu Tage liegenden, biconvexen Klumpen von grauer Masse. wie durch weisse, vom Pedunculus cerebri aufsteigende Markbündel, or und unter dem Linsenkern liegt der Mandelkei ein kleineres, eben-

falls vollkommen von Marksubstanz eingeschlossenes graues Lager, und nach aussen vom Linsenkern eine fast lothrecht stehende graue Schicht, die Vormauer, Claustrum. Die weisse Markmasse, welche den Linsenkern vom Streifenhügel trennt, heisst die innere Hülse, Capsula interna, jene zwischen Linsenkern und Claustrum, äussere Hülse, Capsula externa.

- b) Den Sehhügel, Thalamus opticus s. Ganglion cerebri posterius. Er liegt hinter dem Streifenhügel, dessen Schweiß sich an seiner äusseren Peripherie hinzieht, und scheint bei dieser Ansicht, wo die mittlere Hirakammer noch nicht geöffnet ist, kleiner als der Streifenhügel zu sein. Seine Farbe ist markweiss. Im Inneren enthält er drei graue Kerne: einen äusseren, inneren, und oberen. Seine Oberstäche ist weniger gleichmässig, als die des Sehhügels, gewölbt. Zwischen ihm und dem Streifenhügel findet man:
- c) den halbkreissormigen Saum oder Hornstreisen, Taenia semicircularis, welcher die Grenze zwischen Streisen- und Sehhügel bildet, und dessen vorspringender Theil Grat (Acies) genannt wird. An seinem anteren vorderen Ende geht ein Bündel divergirender Fasern (Penicillus) zum unteren Ende des gestreisten Körpers. Der Hornstreis ist nur der freie Rand einer von unten nach auswarts, zwischen Seh- und Streisenhügel eindringenden Markplatte.

Im Hinterhorne findet sich:

- d) Der Vogelsporn oder kleine Seepferdesuss, Calcar avis s. Pes hippocampi minor. Er bildet eine, an der inneren Wand des Hinterhorns vorspringende, gebogene Erhabenheit, die nach hinten und aussen lausend mächtiger wird, und meistens einem gesalteten Tuche ähnlich mehrere Wülste zeigt.
- e) Die seitliche Erhabenheit, Eminentia collateralis Meckelii, deren Name von ihrer Nachbarschaft am grossen Seepferdefuss herrührt, an dessen äusserer Seite sie in das Unterhorn hinabläuft. Sie beginnt mit einem dreieckigen Wulste, der an der unteren Wand des Hinterhorns hervorragt.

Im Unterhorne wird beobachtet:

f) Der grosse Seepferdefuss oder das Ammonshorn, Pes hippocampi major s. Cornu Ammonis. Er läuft als ein nach aussen, vorn, und unten gekrümmter Wulst (ungefähr wie ein Widderhorn) durch die ganze Länge des Unterhorns bis zu dessen unterem Ende, wo er mit mehreren (3-4) gerundeten Höckern, den Klauen (Digitationes), zu endigen scheint, sich aber bei genauerer Untersuchung in den sogenannten Haken (Anmerkung zu §. 287) fortsetzt.

An dem concaven Rande des Seepferdesusses verläust, als Fortsetzung der hinteren Schenkel des weiter unten zu beschreibenden Gewölbes:

g) Der Saum, Fimbria, als ein dunnes, sichelformig gekrummes Markblatt, welches unten gleichfalls in den Haken übergeht.

Unter dem Saume und von dessen innerem oder freiem Rande bedeckt, findet sich:

h) Die gezahnte Leiste, Fascia dentata Tarini, als eine Reihenfolge von 12-18 nach innen gerichteten Zacken, ähnlich dem schneidenden Rande eines Sägeblattes.

Die die Seitenkammern umschliessende Markmasse (Corpus medullare cerebri) bildet eine Art ovaler Kapsel um die Seitenkammer und ihren Inhalt, fehlt aber an der inneren Kammerwand, da an dieser die Seitenkammer mit der dritten Kammer und mit dem Querschlitz des Gehirns in Communication steht. Sie wird deshalb als Centrum semiovale Vieussenii bezeichnet. Von der äusseren Peripherie dieser Kapsel strahlen Markfortsätze gegen die Oberstäche des Gehirns, welche mit ihrem Ueberzuge von grauer Rindensubstanz die Gyri darstellen.

Nach genommener Einsicht dieser in den Hörnern der Seitenkammer befindlichen Vorsprünge schreitet man zur Eröffnung der unpaaren oder dritten Kammer, Ventriculus medius s. tertius, welche vom Balken und dem unter ihm liegenden Gewölbe, Fornix tricuspidalis, bedeckt wird.

Hebt man den Balken in die Höhe (welches bei harten Gehirnen mit den Fingern, bei weicheren aber dadurch geschehen kann, dass man einen trockenen Leinwandstreisen oder ein Stück sesteres Fliesspapier an seine obere Fläche ansaugen lässt und dann emporhebt), so sindet man zwischen ihm, und dem tieser gelegenen Fornix senkrecht ausgespannt die durchsichtige Scheidewand, Septum pellucidum, welche den einspringenden Winkel des Balkenkniees einnimmt, und aus zwei parallelen Lamellen besteht, welche von dem vorderen Theile der unteren Balkenraphe gegen das Gewölbe senkrecht hinabsteigen. Zwischen beiden Lamellen ist ein schmaler Zwischenraum besindlich, — der Ventriculus septi pellucidi (Duncan's Höhle einiger englischer Anatomen).

Das Gewölbe liegt in der Furche, welche zwischen den sich an einander lehnenden Sehnervenhügeln nach oben übrig bleibt, hat eine dreieckige Gestalt, indem es sich wie ein Keil zwischen die Thalami optici lagert, und geht nach vorn und hinten in zwei Schenkel über. Die vorderen Schenkel (Crura anteriora s. Columnae fornicis, Säulen des Gewölbes) senken sich anfangs stark gekrümmt vor den Sehhügeln in die Tiefe, und steigen zuletzt geradlinig zu den beiden Markhügeln (Corpora candicantia §. 287) der Hirnbasis herab. Zwischen jedem vorderen Gewölbschenkel und dem Sehhügel, über welchen er sich herabkrümmt, bleibt eine Oeffnung (Foramen Monroi) frei. Da die Gewölbschenkel sich scharf abwärts krümmen, das Balkenknie aber, welches vor ihnen liegt, keine so scharfe Krummung, sondern vielmehr einen nach hinten offenen Winkel wieckiger Raum übrig bleiben, macht, so muss zwischen beiden ein fa dessen oberer Rand durch die n vorderer Rand durch den absteigenden & nterer Rand durch die vorderen Schenkel des Gewölbes gebildet wird. Dieser dreieckige Raum wird durch das Septum pellucidum ausgefüllt.

Der hintere Theil des Gewölbes zersährt in die beiden hinteren Schenkel (Crura posteriora), zwischen welchen ein einspringender Winkel mit vorderer Spitze frei bleibt, durch welchen man, von unten her gesehen, ein dreieckiges Stück der unteren Balkensläche zu Gesichte bekommt. Dieses ist quer gestreist. Die Streisen ähneln den in einem dreieckigen Rahmen ausgespannten Saiten einer Harse, weshalb der Name Leier, Lyrs Davidis s. Psalterium, nicht unpassend gewählt ist. Jeder hintere Gewölbschenkel geht in die Fimbria des Seepserdesusses über.

Schneidet man nun den Fornix in seiner Mitte quer durch, und schlägt man seine beiden Hälsten nach vor- und rückwärts zurück, so hat man die dritte Kammer noch nicht geöffnet. Sie wird vielmehr noch durch das mittlere Adergeflecht, Plexus choroideus medius s. Tela choroideu, bedeckt, welches als Fortsetzung der weichen Hirnhaut unter der Balkenwulst nach vorn tritt, sich zwischen Fornix und Sehhügel horizontal von hinten her einschiebt, und sich bis zum Foramen Monroi ausdehnt. Zwei Seitenstügel desselben gehen als Plexus choroidei laterales durch die Foramina Monroi in die Seitenkammern, und jeder derselben verläust am Saume des Seepferdesusses, allmälig dicker werdend, bis in das untere Ende des Unterhorns, wo er seine Gestässe in den Haken eindringen lässt.

Löst man nun den Plexus choroideus von der convexen Sehhogelflache vorsichtig los, und zieht man hierauf beide Sehhügel (welche mit ihren inneren glatten Flächen an einander schliessen) von einander ab, se überblickt man die ganze Ausdehnung der dritten Kammer. sechs Wände unterscheiden. Die obere war durch den Plexus choreideus medius gebildet, die beiden seitlichen sind durch die inneren Sebhügelstächen gegeben, die untere entspricht der Mitte der Hirnbasis, die vordere wird durch die vorderen absteigenden Schenkel des Gewößes (Säulen, Columnae), die hintere durch den sich zwischen beide Sebhügel etwas hineinschiebenden Vierhügel (Corpus quadrigeminum) vorgestellt. Da die Sehhügel sich an der Leiche mit ihren inneren Flachen berühren, so wird die mittlere Kammer in ihrer Mitte am schmalsten, vom und hinten dagegen erweitert getroffen werden. Die beiden Seitenwande stehen durch drei Querstränge (Commissurae) in Verbindung. missura anterior liegt an der vorderen Wand, vor den absteigenden Schenkeln des Fornix, und zeigt sich, wenn man diese anspannt. Die Commissura posterior liegt an der hinteren Wand vor dem Vierhügel. Beide sind markweiss. Unter der Commissura anterior vertiest sich der Boden der dritten Kammer zum sogenannten Trichtereingung, Aditus ad infundibulum, und unter der Commissura posterior besindet sich die kleinere Eingangsöffnung der Sylvi'schen Wasserleitung (Aditus ad aguseductum Sylvii), welche durch den Vierhügel hindurch zur vierten Himkammer führt. Die Commissura media ist breit, weich, und gran.

suweilen, und ist, wie ein Schwibbogen, von einem Sehhügel zum anderen gespannt.

Der Vierhügel (welcher besser Corpus bigeminum als quadrigeminum genannt werden könnte, da letzterer Ausdruck acht Hügel bedeutet). ist ein unpaarer, durch einen Kreuzschnitt in vier Hügel getheilter Höcker. der die dritte Hirnkammer von der vierten trennt, und unter welchem die Sylvi'sche Wasserleitung eine Verbindung beider Kammern unterhält. Sein vorderes Hügelpaar ist grösser, und steht höher, das hintere ist kleiner und niedriger. Die alte Anatomie nannte das vordere Paar die Hinterbacken (Nates), das hintere die Hoden (Testes) des Gehirns. Diese Ausdrucke im umgekehrten Sinne zu gebrauchen (Vesal, Valverda, Varol, Riolan), ist wegen des Grössenverhältnisses beider Hügelpaare unrichtig. Zwischen Vierhügel und Sehnervenhügel, letzterem jedoch näher, und von seinem hinteren Ende (Pulvinar, Polster) überragt, liegen die sogenannten Kniehocker, Corpora geniculata, ein ausserer und innerer. Ersterer steht mit dem hinteren, letzterer mit dem vorderen Hügelpaar durch markige Streifen, Brachia corporis quadrigemini, in Verbindung. Auf dem vorderen Hügelpaare ruht die sogenannte Zirbeldrüse, Glandula pinealis s. Conarium (obsconer Weise Penis cerebri genannt). Sie besteht überwiegend aus grauer Substanz, mit spärlichen markweissen Streisen im Inneren, welche in die Zirbelstiele überzugehen scheinen. Sie ist, so wie die obere Fläche des Vierhügels, mit dem Plexus choroideus umhüllt, hat die Gestalt eines mit der Spitze nach hinten gewendeten Tannenzapfens (woher ihr Name), und hängt nicht mit dem Vierhügel, wohl aber mit der hinteren Commissur durch weiche Fadenbündel zusammen. Von ihrem vorderen abgerundeten Ende laufen zwei markweisse Bändchen (Habenulas. Zügel, oder Pedunculi conarii, Zirbelstiele) aus, welche sich an die inneren Flächen der Sehhügel anschmiegen, und nach vor- und abwärts bis in den Trichtereingang zu verfolgen sind.

Wollte man schon einen Theil des Gehirns als Vulva cerebri bezeichnen, so wäre die Oeffnung, welche dicht vor der Zirbel zwischen beiden Zirbelstielen liegt, als länglich elliptische Spalte am meisten dazu geeignet. Die Sehnervenhügel stellen gewissermassen die aufgestellten oder angezogenen Schenkel dar, um diese Vulva für den Penis cerebri (Zirbel) zugänglich zu machen. Häufig wird das Foramen Monroi, oder das hintere Ende des Aquaeductus Sylvii, auch Vulva genannt.

Theils in der Masse der Zirbel, theils in dem sie umgebenden Plexus choroideus medius, findet man (nie vor dem 6. Lebensjahre) einfache oder drusig zusammengebackene krystallinische Kugeln, von der Grösse eines Sandbis Mohnkorns und darüber (Acervulus glandulae pinealis).

Der Vierhügel hat über sich die Balkenwulst. Beide berühren sich nicht, sondern lassen eine Oeffnung zwischen sich (Querschlitz des grossen Gehirns), durch welche die Pia mater, als Brand medius, zur mittleren und von hier aus durch die Poesitlichen Kammern gelangt.

Im Verfolge dieser Zerglieden

wähnung gethan, da es unter dem Tentorium verborgen liegt, und die Hinterlappen des grossen Gehirns noch nicht abgetragen wurden.

Da sich die ganze Hirnanatomie nicht an Einem Hirne durchmachen lässt, so kommt es nun darauf an, sich zu entscheiden, ob man mit der eben geendeten Untersuchung des grossen Gehirns von oben her, auch die des kleinen verbinden will, in welchem Falle die Hinterhauptschuppe, die Hinterlappen des grossen Gehirns, und das Tentorium cerebetli abzutragen wären, oder ob man das grosse und kleine Gehirn zugleich herausnehmen, und die Organe der Gehirnbasis vornehmen will. Letzteres ist jedenfalls gerathener. Die Untersuchung des kleinen Gehirns von unten her ist mit jener des verlängerten Markes zu verbinden, und bleibt dem §. 288 vorbehalten.

J. G. Haase, de ventriculis cerebri tricornibus. Lips., 1789. 4. — S. Th. Sömmerring, de lapillis vel prope vel intra gl. pinealem sitis. Mogunt, 1785. 8. — Jung, über das Gewölbe. Basel, 1845. 4.

§. 287. Grosses Gehirn von unten untersucht.

Wurde das Tentorium vom oberen Rande der Felsenbeinpyramiden getrennt, und die Ursprünge der Gehirnnerven an der Hirnbasis, so wie die vier grossen Hirnarterien, und das verlängerte Mark im grossen Hinterhauptloche, durchgeschnitten, so lässt sich das Gehirn mit der seine Basis umgreifenden Hand herausnehmen oder herausstürzen. Jede Gefäss- oder Nervenverbindung zwischen Gehirn und Schädel muss richtig durchgeschnitten sein, damit bei der Herausnahme des Gehirns nichts mehr von selbet entzwei zu reissen habe, wodurch die Reinheit der Basalansicht sehr gefährdet werden könnte.

Man übersieht nun, nachdem auch hier die häutigen Hüllen vorsichtig weggeschafft wurden, die untere Fläche (Basis) des grossen Gehirns (mit Ausnahme der Hinterlappen, welche durch das kleine Gehirn bedeckt werden), ferner die untere Fläche des kleinen Gehirns, der Varolsbrücke, und des verlängerten Marks.

In der Mittellinie des grossen Gehirns, vom Ende des Längeneinschuittes bis zur Varolsbrücke, folgen:

a) Die vordere durchlöcherte Lamelle, Substantia s. Lamins perforata anterior. Sie liegt dicht hinter dem Längeneinschnitte und vor der Sehnervendurchkreuzung, und zerfällt in eine mittlere und zwei seitliche perforirte Stellen, welche letztere sich gegen den Anfang der Sybischen Gruben hinziehen. Ihre Farbe ist vorherrschend grau, und die Löcher derselben sind als Durchgangspunkte von Blutgefässen zu nehmen, weshalb sie am sichersten während des Abstreisens der weichen Hirnhaut, bevor noch die Gesässe gerissen sind, gesehen werden. Vor der Substantia perforata anterior liegt an der unteren Fläche jedes Vorderlappens eine dreiseitig pyramidale, graue Erhabenheit, mit drei weissen eingelegten Streisen (Caruncula mammillaris s. Trigonum olfactorium), deren nach vorn gehende Verlängerung (in einer eigenen Longitudinalfurche des Vorderlappens) der Nervus olfactorius ist.

b) Die Sehnervenkreuzung, Chiasma s. Decussatio nervorum opticorum. Sie ähnelt einem (), hängt vorn mit der mittleren perforirten Stelle, hinten mit dem grauen Höcker zusammen. Die in das Chiasma eintretenden Stücke der Sehnerven, welche den Pedunculus cerebri von aussen nach innen umgürten, heissen, ihrer Plattheit wegen, Tractus optici. Man sieht sie erst, wenn man die stumpfe Spitze des Unterlappens vom Pedunculus cerebri etwas abzieht. Die aus dem Chiasma austretenden runden Stücke sind die eigentlichen Nervi optici. Nicht alle Fasern eines Tractus opticus kreuzen sich mit denen des anderen. Die Kreuzung beschränkt sich blos auf die inneren, während die äusseren auf ihrer Seite bleiben. Jeder Nervus opticus erhält somit Fasern vom rechten und linken Tractus opticus.

Hannover erwähnt am vorderen und hinteren Rande des Chiasma bogenförmige, von einer Seite zur anderen lausende Fasern, als Commissura arcuata anterior et posterior.

Bei einigen Knorpelfischen (Bdellostoma Forsteri) kreuzen sich die Sehnerven gar nicht. Bei den Rochen, Haifischen und Stören, stehen sie durch eine Querbinde in Zusammenhang. Bei den Knochenfischen ist die Kreuzung eine vollkommene — ein Sehnerv geht über den anderen hinüber, oder schiebt sich durch eine Spalte desselben durch, wie beim Häring. — Bochdalek fand, dass die am äusseren Rande des Tractus opticus vorkommenden Löcherchen in hohle, erbsen- und bohnengrosse, mit einem besonderen Ependyma ausgekleidete Zellen in der Substanz des Gehirnes führen, und ein Gefässbündel dahin geleiten, welches sich zu den Zellen, wie die Ptexus choroidei zu den Kammern des Gehirns verhalten. (Prag. Vierteljahrsschrift. 1849. 2. Bd. pag. 132.)

- c) Der graue Höcker oder Hügel mit dem Trichter, Tuber cinereum cum infundibulo. Er liegt hinter dem Chiasina und zwischen den beiden Pedunculis cerebri, bildet einen Theil des Bodens der mittleren Hirnkammer, ist mässig convex, nur aus einer dünnen, grauen, bei roher Herausnahme des Gehirns leicht platzenden Lamelle gebildet, welche sich zu einem kegelförmigen, nach vorn und unten gerichteten Zapfen verlängert. Dieser Zapfen ist hohl, und heisst deshalb der Trichter, Infundibulum. Seine Höhle ist eine Fortsetzung der Höhle des Ventriculus tertius. Sie erstreckt sich nicht bis in die Spitze des Trichters, welche solide ist, und sich mit der Hypophysis cerebri verbindet.
- d) Der Hirnanhang, Hypophysis cerebri (von ὑπὸ-φύω, unten, wachsen, auch Glandula pituitaria cerebri, s. Colatorium, s. Sentina, lauter Namen, welche die Vorstellung ausdrücken, die die Alten über die Function dieses räthselhasten Hirnorgans hatten), liegt im Türkensattel, welchen er ganz ausstüllt. Die Hypophysis cerebri ist beim Menschen im Verhältniss zum Gehirn kleiner, als bei irgend einem Säugethiere. Da die harte Hirnhaut über den Sattel hinüber gespannt ist, und nur eine kleine Oessnung hat, durch welche das In mit dem Hirnanhang verbinden kann, so muss, wu und Gehirne herausnehmen will, die hart

Sattelgrube laufenden Einschnitt, getrennt, und ein scheibenformiges Stück (Deckel der Sattelgrube) mit der Hypophysis herausgehoben werden.

Bei genauer Untersuchung findet man den Hirnanhang aus einem vorderen und hinteren Lappen bestehend. Der vordere enthält entschieden keine Elementartheile des Nervensystems. Er besitzt in einem gesässreichen Bindegewebe, welches ihm eine röthliche Farbe giebt, eine Menge vollkommen geschlossener Blasen (Drüsenblasen) von 0,030 — 0,090 —, die in einer structurlosen Hülle ein seinkörniges Plasma mit kernartigen Gebilden führen, und mit ähnlichen Vorkommnissen in der Rindensubstanz der Nebennieren analog zu sein scheinen (Ecker). Der hintere, kleinere, grauliche Lappen enthält in einer seinkörnigen, kernsührenden Grundsubstanz wahre Nervensasen, welche ihm durch den Trichter zugeführt werden.

- e) Die beiden Markhügel, Globuli medullares, Corpora memmillaria s. candicantia (auch Weiberbrüste und Bulbi fornicis genannt — letzteres wegen ihrer Verbindung mit den vorderen Schenkeln des Gewölbes), sind zwei weisse, erbsengrosse, dicht an einander liegende Markkörper, zwischen den Pedunculis cerebri.
- f) Die hintere durchlöcherte Lamelle, Substantia s. Lamins perforata posterior, ist dreieckig, da sie den durch die Divergenz der Pedunculi cerebri entstehenden Winkel ausfüllt. Ihre Spitze stösst an die Varolsbrücke, und ihre Löcher sind Gestassöffnungen.
- g) Die Schenkel des grossen Gehirns, Pedunculi s. Crurs, s. Caudex cerebri, kommen divergent aus der Brücke hervor, und stellen längsgefaserte Markbündel dar, welche sich nach vorn und aussen in die Massen der Hemisphären einsenken, und, als directe Fortsetzungen des verlängerten Markes, dieses mit jenen in Verbindung bringen. Schneidet man einen Gehirnschenkel senkrecht auf seine Längenaxe durch, so findet man, dass er aus einem unteren, breiten, aber dünnen, und einem oberen, stärkeren Bündel von Längenfasern besteht, zwischen welchen eine Schichte schwarzgrauer Substanz, Substantia nigra pedunculi, sich einschiebt. Nur das untere Markbündel des Hirnschenkels (welches eine flache Rinne für das obere bildet) heisst Pedunculus, das obere führt den Namen der Haube, Tegmentum caudicis.

Die Gyri an der unteren Fläche des grossen Gehirns haben vor jenen der oberen Ansicht nichts Unterscheidendes voraus. Jener Gyrus, welcher den Tractus opticus bedeckt, und gelüstet werden muss, um diesen zu sehen, heisst, seiner Beziehung zum Pes hippocampi major wegen, Gyrus hippocampi s. Subiculum (Unterlage) cornu Ammonis. Sein vorderes Ende krümmt sich hinter dem Seitentheile der Lamina perforata anterior nach innen und hinten, und bildet den Haken, der im Inneren eine abwechselnde Schichtung grauer und weisser Masse zeigt, und deshalb auch Hakenknoten, Ganglion uncinatum, genannt wird.

Zieht man die einander zugekehrten Flächen der Vorderlappen auseinander, so erblickt man die sogenannte Zwinge, Gyrus cinguli, als den zunächst am Balkenknie liegenden, mit ihm sich nach oben unschlagenden, über seinem Seitenrande nach hinten, und über das Splenium wieder nach abwärts zur unteren Fläche der Unterlappen laufenden

: Wulst, wo er zuletzt mit dem hinteren Ende des Gyrus hippocampi zusammensliesst.

In der Sylvi'schen Furche liegt die Insel, eine Gruppe von 6-8 mit einander zusammensliessenden Windungen, welche von den Wänden der Furche und einigen überhängenden Wülsten der äusseren Fläche der Hemisphäre (dem sogenannten Klappdeckel, Operculum) so verdeckt wird, dass sie erst nach Abtragung der letzteren in ihrem ganzen Umsange gesehen werden kann. Schneidet man sie schief nach innen und oben durch, so bemerkt man, dass ihre Basis nach dem Linsenkern gerichtet ist.

Sömmerring, de basi encephali, etc. Gött., 1778. 4. — Ejusdem tabula baseos encephali. Francof., 1799. fol. — J. Engel, über den Gehirnanhang und den Trichter. Wien, 1839. 4.

§. 288. Anatomie des kleinen Gehirns von unten. Verlängertes Mark.

Da bei der vorausgegangenen Behandlung der unteren Fläche des grossen Gehirns, das kleine Gebirn unbeeinträchtigt blieb, so lässt sich die Detailuntersuchung des kleinen Gehirns hier anschliessen. Man bemerkt zuerst, dass die beiden Halbkugeln des kleinen Gehirns durch eine Querbrücke mit einander verbunden sind (Pons Varoli), und dass sich hinter dieser ein unpaarer Markzapfen (Medulla oblongata) zwischen beide Halbkugeln hineinlegt.

Die Varolsbrücke, Hirnknoten, Pons Varoli s. Nodus cerebri. s. Protuberantia basilaris, wurde, ihrer Beziehung zum kleinen Gehirn wegen, am treffendsten Commissura cerebelli zu nennen sein. Sie ruht auf dem Mittelstück des Os basilare, und besitzt eine untere, zugleich vordere, und eine obere, zugleich hintere Fläche, einen vorderen gegen die Hirnschenkel, und einen hinteren an die Medulla oblongata stossenden Rand. An ihrer unteren Fläche verläuft ein leichter Längeneindruck, Sulcus basilaris, ein Abdruck der unpaaren Arteria basilaris. Ihre Seitentheile hängen mit den beiden Halbkugeln des kleinen Gehirns durch die verschmächtigten Brückenarme, Processus cerebelli ad pontem, zusammen. - Ueber ihr liegt der Vierhügel, und zwischen beiden der Aquaeductus Sulvii. Da ein Theil der Stränge der Medulla oblongata sich durch die Brücke durchschiebt, um in die Hirnschenkel überzugehen, so wird der Pons aus gekreuzten Quer- und Längenfasern bestehen müssen, von welchen oberstächlich nur die Querfasern zu sehen sind. Zwischen den gekreuzten Fasern der Brücke ist graue Masse eingetragen, wie am horizontalen Schnitt derselben zu bemerken ist.

Das verlängerte Mark, Medulla oblongata s. Bulbus medullae spinalis, ist ein weisser, unpaarer Markzapfen, der durch das Foramen occipitale magnum in das Rückenmark übergeht, von welchem und Bau zum Theil beibehält. Er wird durch seichte Längen mehrere Stränge eingetheilt, welche theils Fortsetzungen

Stränge des Rückenmarks sind, theils aus dem Inneren des Rückenmarks gegen die Obersläche des verlängerten Marks austauchen. An dem unteren (in natürlicher Lage zugleich vorderen) Umfange der Medulla oblongete sieht man die beiden Pyramiden (Pyramides) durch den Sulcus leneitudinalis anterior getrennt. Nach aussen von ihnen liegen die stark eewölbten Oliven (Olivae), und neben diesen die strangförmigen Korper, Corpora restiformia, welche von der Seite der Medulla oblonests weg, zu den Hemisphären des kleinen Gehirns treten, und (weil sie sich in diese so einsenken, wie die Pedunculi cerebri in die Halbkugeln des grossen Gehirns) auch Pedunculi cerebelli, Schenkel des kleinen Gehirns, genannt werden. Sucht man durch Auseinanderziehen der beiden Pyramiden eine tiefere Einsicht in den Sulcus longitudinalis anterior a gewinnen, so erblickt man gekreuzte Bündel von einer Pyramide zur aderen gehen; und schneidet man die Olive ein, so sieht man in ihr einen weissen, mit einer dunnen, grauen, zackig ein- und ausgebogenen Lamele umgebenen Markkern - den Nucleus s. Corpus dentatum olivae.

Um die obere (in natürlicher Lage zugleich die hintere) Fläche der Medulla oblongata zu sehen, genügt es nicht, sie einfach umzubeugen; man würde dadurch nur das hintere Ende der Schreibseder, d. h. den in den Sulcus longitudinalis posterior sich sortsetzenden hinteren Winkel der Rautengrube sehen. Es ist vielmehr nothwendig, vor der Hand von der Medulla oblongata abzustehen, und die untere Fläche des kleinen Gehirs zu untersuchen. Um sie ganz zu übersehen, exstirpirt man die Medulla oblongata durch Trennung der Corpora restisormia und Ablösung von Pons Varoli, worauf man die untere Fläche des kleinen Gehirns in ihre ganzen Breite übersieht.

Man sindet nun beide Hemisphären des kleinen Gehirns zwar mit einander in Verbindung stehend, aber durch eine tiese, mittlere Furche (in welcher die Medulla oblongata lag) von einander getrennt. Diese Furche ist das Thal, Vallecula Reilii. Sie endet nach hinten in der Incisura marginalis posterior (ein Einbug zwischen den hinteren convexen Rändern der Hemisphären). Jede Hemisphäre zeigt an ihrer unteres Fläche vier Lappen, deren jeder aus mehreren, häusig parallelen, aber schmalen Gyri besteht.

- a) Der hintere Unterlappen, Lobus inferior posterior s. semilunaris, läust als ein Bündel mehrerer Gyri, dem hinteren Rande der unteren Fläche entlang, von der Incisura marginalis an nach aussen.
- b) Der keilförmige Lappen, Lobus cuneiformis, läust von aussen und vorn nach hinten und innen zum Thale, und nimmt auf diesem Zuge an Breite ab, wodurch er keilförmig wird.
- c) Die Mandel, Tonsilla, liegt an der inneren Seite des vorigen 22nächst am Thale, und springt unter allen Lappen am meisten hervor.

Die Furchen, welche diese drei Lappen von einander trennen, laufen mit dem hinteren Rande der Hemisphäre fast parallel, und sind bedouten tieser als jene, welche die einzelnen Gyri Eines Lappens von einander scheiden.

d) Die Flocke, Flocculus s. Lobulus (das Anhangsläppchen), ist ein loses Büschel kleiner Gyri, welches auf dem Processus cerebelli ad pontem liegt, und sich in den markweissen Stiel, Pedunculus flocculi, fortsetzt, welcher sich bis zum Unterwurm (siehe weiter unten) als hinteres Marksegel verfolgen lässt.

Der im Thale liegende mittlere Theil des kleinen Gehirns heisst Unterwurm, Vermis inferior. Er besteht aus vielen schmalen, parallel auf einander folgenden, queren Gyri, welche wieder in mehrere grüssere Abtheilungen zusammengefasst werden. Diese sind von rück- nach vorwärts:

- a) Die Klappenwulst (Burdach), oder besser, die kurze Commissur (Reil), weil ihre Gyri die der hinteren Unterlappen verbinden.
- b) Die Pyramide, eine aus stark nach hinten gebogenen, transversalen Gyri bestehende Commissur, welche die *Lobi cuneiformes* verbindet.
- c) Das Zäpschen (*Uvula cerebelli*). Diese passende Benennung führt jener Abschnitt des Unterwurms, der zwischen den Mandeln zu liegen kommt.
- d) Das Knötchen (Nodulus) begrenzt als kleiner, rundlich eckiger Körper mit schwach angedeuteter Läppchenabtheilung, den Unterwurm nach vorn, und hängt rechts und links durch eine äusserst zarte durchscheinende halbmondförmige Markfalte (die beiden hinteren Marksegel, Vela cerebelli posteriora s. Tarini) mit den Flockenstielen zusammen. Jedes hintere Marksegel kehrt seinen freien concaven Rand schief nach vorn und unten, bildet also eine Art Tasche (wie die Valvulae semilunares in den grossen Schlagadern des Herzens), in welche man mit dem Scalpellhest eingehen, das Segel ausheben, und bis in die Flockenstiele versolgen kann. Thut man es nicht, so hat man ost Mühe, die Segel (ihrer Durchsichtigkeit und ihres Anklebens an die Nachbarwand wegen) zu sehen.

Man bemerkt bei dieser Ansicht noch die Bindearme des kleinen Gehirns, Processus cerebelli ad corpus quadrigeminum. Sie erstrecken sich — auf jeder Seite einer — von den Hemisphären scheinbar nur zum hinteren Paar des Vierhügels, setzen sich jedoch unter dem Vierhügel in die Haube fort. Ihr Austrittspunkt aus der Hemisphäre liegt vor und über der Eintrittsstelle des Pedunculus cerebelli. Sie convergiren gegen den Vierhügel zu, und sassen ein dünnes, graulich durchscheinendes Markblättchen — die graue Gehirnklappe, vorderes Marksegel, Valvula cerebelli s. Velum medullare anterius, zwischen sich, welches vorn mit dem hinteren Vierhügelpaar, rückwärts mit dem Vordertheile des Unterwurms zusammenhängt, und somit an allen seinen vier —ie das Glas in dem Rahmen, besetigt ist.

Zieht man beide Mandeln stark nach ansdas Thal des kleinen Gehirns sich rechts u Lehrbuch der Anatomie. 5. Auß. sogenannten Nester) ausbreitet, der zwischen dem Marklager des kleinen Gehirns und der oberen Fläche der Mandel liegt, und an dessen oberer Wand das hintere Marksegel mit seinem convexen Rande befestigt ist.

Es ist leicht begreislich, dass zwischen der Medulla oblongata und dem Unterwurme ein freier Raum tibrig bleiben muss, in welchen man von hinten her, durch eine, zwischen dem Centrallappen (p. 643a.) und dem verlängerten Marke besindliche Oessnung — dem Querschlitz des kleinen Gehirns — eindringen kann. Dieser freie Raum, dessen obere Wand durch den Unterwurm und die vordere Verlängerung desselben (graue Gehirnklappe) gebildet wird, dessen Seitenwände die Mandeln und die Bindearme erzeugen, und als dessen paarige Ausbuchtungen die Nester angesehen werden müssen, ist die vierte Gehirnkammer, Ventriculus cerebri quartus, deren räumliche Verhältnisse durch die im nächsten §. solgende Darstellung anschaulich werden.

§. 289. Anatomie des kleinen Gehirns von oben. Vierte Gehirnkammer.

Zur Vornahme dieser Untersuchung soll ein frisches Gehirn verwendet werden. Nur im Nothfalle könnte dasselbe, an welchem das kleine Gehim von unten auf studirt wurde, benützt werden, wobei das abgeschnittene verlängerte Mark mit einem dunnen Holzspan der Länge nach durchstochen, und in der Varolsbrücke wieder befestigt werden müsste. structiver ist es, an einem zweiten Schädel dessen Decke sammt den Hirahauten abzutragen, hierauf durch zwei im Foramen occipitale magnus convergirende Schnitte die Hinterhauptschuppe herauszusägen, die Hinterlappen des grossen Gehirns senkrecht zu trennen (um das Tentorium frei zu machen), und letzteres sammt dem Reste der das kleine Hirn umgebenden Dura mater zu entsernen. Man kann, um grösseren Spielraum zu gewinnen, noch die hinteren Bogen des Atlas und Epistropheus ausbrechen, um den Uebergang des verlängerten Markes in das Rückenmark übersehen zu können. Diese Behandlungsweise gewährt den grossen Vortheil die Theile in ihrer natürlichen Lage zu überblicken, und die Stellung der Flächen und Axen des Gehirnstammes richtig zu beurtheilen, was am herausgenommenen Gehirne, welches auf einer Horizontalebene liegt, nicht zu erreichen ist. Man bedient sich jedoch meistens eines herausgenommenen Gehirns, weil die Arbeit leichter ist.

Die beiden Hemisphären des kleinen Gehirns hängen auch an ihrer oberen Fläche in der Mittellinie durch den stark hervorragenden Oberwurm, Vermis superior, zusammen, indem die Gyri, meist ohne Unterbrechung, von einer Hemisphäre in die andere übergehen. Der Oberwurm ist der schmälste Theil des kleinen Gehirns, welches somit die Gestalt einer querliegenden Acht (∞) besitzen wird. Der dem vorderen und histeren Ende des Oberwurms entsprechende Einbug wird auch als Incisure marginalis anterior et posterior bezeichnet.

Die obere Fläche beider Hemisphären wird von der unteren durch einen tiefen, an der äussersten Umrandung des kleinen Gehirns herumlaufenden Einschnitt, Sulcus magnus horizontalis, geschieden.

Man unterscheidet an jeder Hemisphäre zwei Lappen:

- a) Der vordere oder ungleich vierseitige Lappen, Lobus superior anterior s. quadrangularis.
- b) Der hintere oder halbmondförmige Lappen, Lobus superior posterior s. semilunaris.

Die Grenze zwischen beiden bildet eine nach hinten convexe, ½"
tiefe Furche. — Der Oberwurm besteht aus einer Colonne querer und
parallel hinter einander folgender Gyri, welche zusammengenommen einen
erhabenen, beide Hemisphären vereinigenden Rücken bilden, dessen quere
Furchung allerdings mit dem geringelten Leibe einer Raupe Aehnlichkeit
hat, wodurch der sonderbare Name des Wurmes entstand. Die Summe
der Gyri wird durch tiefere Furchen (wie am Unterwurme) in drei Abtheilungen gebracht. Diese sind, von vor- nach rückwärts gezählt,
folgende:

- a) Das Centralläppchen, Lobulus centralis, eine Folge von 8 bis 10 Gyri, mit einem Mittelstücke und den beiden Flügeln, Alae, welche in die vordersten Gyri der vorderen Lappen der Hemisphären übergehen.
- b) Der Berg, Monticulus, dessen höchste Stelle Cacumen (Wipfel), und die darauf folgende, schief nach hinten und unten abfallende Neige Declive (Abhang) genannt wird. Er ist die grösste Abtheilung des Oberwurmes, und verbindet die hinteren Gyri der vorderen Lappen.
- c) Das Wipfelblatt, Folium cacuminis, besser Commissura loborum semilunarium, liegt als einfache, kurze und quere Commissur, zwischen den inneren Enden der Lobi semilunares, dicht über dem Anfange des Unterwurmes, in der Incisura marginalis posterior.

Die Gyri von a) und b) sind sämmtlich nach vorn concav. Biegt man das Centralläppchen mit dem Scalpellheste zurück, so sieht man beide Bindearme des kleinen Gehirns (voriger Paragraph) zum Vierhügel aufsteigen, und zwischen ihnen die graue Gehirnklappe ausgespannt, welche aber nicht, wie bei der unteren Ansicht, eben und glatt, sondern mit sünf sehr niedrigen und platten, geradlinigen, grauen und quergestellten Gyri besetzt ist, welche zusammengenommen ein zungenförmiges, nach vorn abgerundetes graues Blatt bilden — die Zunge, Lingula. Die Zunge hängt nach hinten mit dem Centralläppchen zusammen. Sie bedeckt nicht die ganze graue Klappe. Ein kleines Stück derselben bleibt vorn unbedeckt, und zudiesem sieht man von der mittleren Furche des hinteren Vierhügelpaares das kurze Bändchen, Frenulum veli medullaris, heruntersteigen.

Zieht man den Lobus superior anterior stärker vom Vierhügel ab, um den Bindearm frei zu bekommen, so sieht man sein mit einer Markschleife umgürtet, welche zum hintereaufsteigt, und der Gurt, Laqueus s. Lemniscu sur so innig mit einander verbunden werden, dass sie nur Einen Cylinder zu bilden scheinen, an welchem jedoch die Gegenwart eines vorderen und hinteren Sulcus longitudinalis s. medianus den Begriff der Paarung aufrecht erhält. (Der Sulcus longitudinalis posterior ist nur am Hals- und Lendensegment des Rückenmarks deutlich ausgesprochen.)

An jeder Seitenstäche lausen zwei Sulci laterales, ein anterior und posterior (nicht parallel mit den Sulci longitudinales) herab, und dienen den vorderen und hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven zur Enpstanzung. Der vordere ist viel weniger deutlich ausgeprägt, als der hintere, und selbst letzterer ost nur angedeutet. Sie verschwinden gegen die untere Ende des Rückenmarks früher, als die Sulci longitudinales, und am Conus medullaris ist von keiner Furche mehr eine Spur zu sehen. Am Halstheile des Rückenmarks wird zwischen dem Sulcus lateralis enterior und longitudinalis anterior noch ein Sulcus intermedius anterior, und zwischen dem Sulcus lateralis posterior und longitudinalis posterior noch ein Sulcus intermedius posterior eingeschaltet.

Die äussere Obersläche des Rückenmarks besteht aus weisser, der innere Kern aus grauer Substanz. Der graue Kern besteht ebenfalls aus zwei Seitentheilen, welche durch eine mittlere graue Commissur zusanmenhängen. Jeder Seitentheil hat die Gestalt einer nach aussen concaves. nach innen convexen Rinne. Die convexen Flächen beider Rinnen hänger durch die Commissur zusammen, und gewähren somit im Querdurchschnitte die Gestalt eines)-(. Die beiden hinteren Hörner dieses)-(sind läner und dunner, und gegen den Sulcus lateralis posterior gerichtet, welche sie fast erreichen; die vorderen sind kürzer und dicker, und sehen gegu den Sulcus lateralis anterior. Die hinteren Hörner verdanken ihre griesere Länge einem nicht mehr grauen, sondern aus hellerer, gelblicher, gelatinoser Substanz bestehenden Ansatze (Substantia gelatinosa, Rolando). Im Halstheile des Rückenmarks ragt zwischen beiden Hörnern des Kers noch ein mittleres stumpfes Höckerchen hervor. — Der graue Kern des Rückenmarks besteht, nebst sehr feinen Nervenröhrchen, vorzugsweise aus eckigen, granulirten Zellen, mit mehreren Kernen und verästelten blassen Fortsätzen. Die Zellen der Substantia gelatinosa der hinteren Horner sind kleiner, haben weniger Fortsätze, und in der Regel nur Einen Kern.

Durch die Richtung der Sulci wird die Obersläche des Rückenmarts in sechs markweisse Stränge getheilt. Diese sind:

- a) Die beiden vorderen Stränge, rechts und links vom Sulcus longitudinalis anterior. Ihre innersten und zugleich tiefsten Fasern kreuzen sich im Grunde des Sulcus longitudinalis anterior, wodurch die sogenannte Commissur des Rückenmarks entsteht.
 - b) Die beiden Seitenstränge, zwischen den Sulci laterales.
- c) Die beiden hinteren Stränge, zu beiden Seiten des Sulcus longitudinalis posterior, deren Fasern sich jedoch nicht, wie jene der vorderen Stränge, kreuzen.

Die Zabl dieser Stränge wird gegen den ersten oder zweiten Halswirbel durch einige neue, zwischen ihnen austauchende Strangbildungen vermehrt. So schiebt sich zwischen beiden vorderen Strängen ein aus der Tiese des Rückenmarks zur vorderen Fläche desselben strebendes Doppelbundel ein - die beiden Pyramidenstränge, welche im Aussteigen breiter werden, und in die beiden Pyramides der Medulla oblongata übergehen. Im Atlas kreuzen sich die inneren Faserbundel der Pyramidenstränge im Sulcus longitudinalis anterior (Decussatio pyramidum). Die Kreuzungsfasern scheinen nicht dem Pyramidenstrange allein anzugehören, sondern auch von den Seitensträngen und hinteren Strängen abzustammen, so dass ausser der seitlichen Kreuzung auch eine von hinten nach vorn eingeleitet wird. Zwischen beiden hinteren Strängen tritt zunächst am Sulcus longitudinalis posterior ein neues Strangpaar - die zarten Stränge - auf, und der noch übrige Rest der hinteren Stränge führt von nun an den Namen der Keilstränge.

Alle diese Stränge sind nur auf der Oberfläche deutlich, haben keine tief greifende Sonderung, wenigstens ist diese auf anatomischem Wege, ohne vorhergehende Härtung des Gehirns in absolutem Alkohol, nicht zu constatiren.

— Das Rückenmark enthält einen an dünnen Querschnitten leicht erkennbaren, sehr feinen Kanal (Canalis medullae spinalis), als Fortsetzung der vierten Hirnkammer. Derselbe ist mit Cylinderepithelium ausgekleidet.

§. 291. Faserung des Gehirns und Rückenmarks.

Was in den vorausgegangenen Paragraphen gesagt wurde, betrifft nur die Lage, Gestalt, und die Art des Nebeneinanderseins der einzelnen Gehirnorgane. Ihr innerer Zusammenhang unter sich und mit dem Rückenmark, ist der Gegenstand einer besonderen Untersuchung eigens hierzu vorbereiteter und in Chromsäure gehärteter Gehirne. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind bei weitem noch nicht so weit gediehen, um einen auch noch so bescheidenen Anspruch auf Vollkommenheit machen zu können, und es durste, wenn es je geschehen sollte, - einer späten Zukunst vorbehalten sein, diese Lücke der anatomischen Wissenschaft auszufüllen. Höchst wahrscheinlich werden das physiologische Experiment am lebenden Thiere, und die Pathologie der Gehirnkrankheiten srüher zu einigen Erfolgen kommen, als die Anatomie bei dem in diesem Gebiete so unvollkommenen Zustande ihrer Technik. - Die bisherigen Versuche, den Gehirnorganismus unter Einem Gesichtspunkte aufzufassen, waren auf Verfolgung der Markfasern, Bündel, und Stränge, gerichtet. Was dabei gewonnen wurde, bildet den Inhalt der Faserungslehre, welche, wenn auch kaum noch des Namens einer Skizze werth, doch so viel leistete, dass man die complicirten Verhältnisse der Hirnorgane auf einfache Ursprünge zurückführen, und die Strahlungsgesetze der Fasern nach gewissen Hauptrichtungen aufstellen konnte.

Einen gedrängten Ueberblick der Gehirnfaserung enthält die folgende Schilderung:

- 1. Da die graue Substanz des Gehirns und Rückenmarks mehr Ganglienzellen als Nervenröhrchen enthält, und deshalb für sich allein keine deutlich gesaserten Bündel oder Stränge bildet (obwohl der Ausdruck grauer Kernstrang für das graue Substanzlager des Rückenmarks häusig gebraucht wird), sondern nur als Einschaltungs- oder Belegungsmasse der weissen Markgebilde getroffen wird, so kann bei der Faserung des Gehirns auf sie nur Nebenrücksicht genommen werden. Sie bildet, nach der Ansicht Förg's, die centrale Axe, um welche sich sämmtliche Gehirntheile ausbauen. Sie setzt sich vom Rückenmark, dessen Kern sie bildete, durch die runden Stränge des verlängerten Markes, in die Haube, und von dieser in den Trichter zum grauen Hügel sort.
- 2. Die weisse Substanz des Rückenmarks zeigt theils quere, theis longitudinale Faserung. Die longitudinale Faserung bleibt durch die ganze Länge des Rückenmarks so ziemlich constant eine parallele. Die quere Faserung findet sich an der Commissur (Kreuzungsstelle) der Vorderstränge, und in jenen Schichten der Seiten- und Hinterstränge, welche zunächst am grauen Kernstrang liegen. Die weissen Fasern der vorderen und hinteren Wurzeln sämmtlicher Rückenmarksnerven lassen sich gleichfalls als quere Fasergänge bis zu den vorderen und hinteren Hörnern des grauen Kernstranges verfolgen. (Ueber das Verhältniss der Wurzeln der Rückenmarksnerven zur grauen und weissen Substanz des Rückenmarks siehe Note zu §. 303.)
- 3. Die Markmasse des Centralorgans nimmt von unten nach oben (von der Medulla spinalis zu den Hemisphären) zu. Es kann somit das Gehirn nicht blos eine Ausbreitung der Rückenmarkstränge sein. Es müssen vielmehr successive zu den bestehenden, und im Rückenmark präformirten Fasern, neue hinzukommen. Als Entstehungspunkte dieser neuen Fasern müssen die im verlängerten Mark, im kleinen und im grossen Gehirn vorkommenden Ganglien angesehen werden. Jede Anhäufung grauer Substanz zu grösseren oder kleineren Massen, welche in der weissen Substanz eingesprengt liegen, wird ein Ganglion genannt.
- 4. Die Faserung schlägt im Gehirn zwei Hauptrichtungen ein: α) nach der Länge (Fortsetzung der Stränge des Rückenmarks); β) nach der Quere (Commissuren und Kreuzungen). Erstere gehört den Rückenmarksträngen an, die Commissuren sind wahrscheinlich selbstständige Gebilde.
- 5. An jedem Hauptabschnitte des Gehirns Medulla oblongata, Cerebellum, Cerebrum, lassen sich beide Faserrichtungen erkennen. Die vorderen Rückenmarkstränge werden zu den Pedunculis cerebri, und als solche zur Grundlage der Hemisphären, ihrer Ganglien und Marklager; die seitlichen treten vorzugsweise zu den Organen des Mittelhirns, und die hinteren zum Marklager des kleinen Gehirnes.
 - 6. Es wurde bereits bemerkt, dass die sechs Hauptstränge des Rucken-

marks an der Medulla oblongata durch neuen Zuwachs an Strängen vermehrt werden. Es schieben sich zwischen die vorderen Stränge die beiden Pyramidenstränge ein, und die durch sie auf die Seite gedrängten Vorderstränge erleiden durch die Oliven eine Durchbrechung. Es spaltet sich nämlich jeder Vorderstrang in zwei kleinere Stränge, welche einen aus der Tiefe austauchenden, bohnenförmigen Markkörper zwischen sich fassen. Dieser Markkörper (die Olive) ist offenbar die erste Andeutung einer seitlichen Entwicklung von Hemisphären, welchen er dadurch noch mehr verwandt wird, dass er (wie die Halbkugeln des grossen und kleinen Gehirns) ein Ganglion enthält (Corpus dentatum olivae). Die Spaltungsschenkel des Vorderstranges heissen in ihrer Beziehung zur Olive, welche sie einschliessen, innerer und äusserer Hülsenstrang (Burdach). Zwischen den hinteren Strängen des Rückenmarks dringen am verlängerten Marke die beiden zarten Stränge (Burdach) vor, drängen sie aus einander, und da die hinteren Stränge einen Theil ihrer Fasern nach vorn treten liessen, um die Pyramidenstränge zu erzeugen, so werden sie zugleich schmächtiger werden, und eben dadurch den zarten Strängen Platz machen. Der Rest der hinteren Stränge heisst von nun an im weiteren Verlaufe Keilstrang (Burdach). Der Seitenstrang der Medulla spinalis geht in den Seitenstrang der Medulla oblongata geradezu fort. Indem die zarten Stränge am hinteren Winkel der Rautengrube zu divergiren anfangen, erscheint durch die ganze Länge der Rautengrube noch ein neues Strangpaar, welches am Rückenmark nicht zu Tage lag: die beiden runden Strange, welche aber nicht markweiss sind, da sie die Fortsetzungen des grauen Kerns des Rückenmarks sind, welche durch die als Rautengrube austretende Spaltung der Medulla oblongata, oberstächlich zu liegen kommen. Geht man nun vom Sulcus longitudinalis anterior bis zum posterior um die Medulla oblongata herum, so trifft man auf jeder Seite 8 Stränge: 1. die Pyramidenstränge, 2. die inneren Hülsenstränge, 3. die Oliven, 4. die äusseren Hülsenstränge, 5. die Seitenstränge, 6. die Keilstränge, 7. die zarten, und 8. die runden Stränge.

7. Zu diesen, mit Ausnahme der Pyramidenkreuzung, vorwaltend longitudinalen Faserzügen des verlängerten Markes, gesellen sich, in wandelbarer Menge und Entwicklung, oberstächliche und tiesliegende Quersasern. Die oberstächlichen gehen von dem Sulcus longitudinalis anterior aus, treten vor den Pyramiden und den Oliven quer nach aussen, um theils in den äusseren Hülsenstrang, theils in die Corpora restisormia überzugehen. Einige derselben (die hinteren) beugen als Fibrae arcisormes um den unteren Theil der Olive herum, um ebenfalls in die Corpora restisormia einzutreten. Sind sie stark entwickelt, so sühren sie den Namen der Gürtelschicht, Stratum zonale. Springt die hinter der Varolsbrücke liegende Abtheilung des Stratum zonale gewölbt vor, so sührt sie inabesondere den Namen der Vorbrücke, Propons, indem sie wohl als die Andeutung der queren Brückensaserung genommen werden kam

liegenden Querfasern erscheinen am deutlichsten im Sulcus longitudinalis anterior, und werden auch als obere Pyramidenkreuzung, von
der am unteren Ende der Medulla oblongata stattgehabten unteren Kreuzung unterschieden. Man sieht diese Querfasern, so wie die untere Pyramidenkreuzung, am besten, wenn man eine gehärtete Medulla oblongata
im Sulcus longitudinalis anterior aus einander bricht. (Wahrscheinlich
gehören die im Sinus rhomboideus gesehenen queren Striae medullares
diesem Systeme von tiefen Querfasern an.) Der graue Ueberzug des Sinus
rhomboideus ist, wie oben gesagt wurde, offenbar nur die wegen Divergenz
der hinteren Stränge zu Tage erscheinende graue, ausgebreitete Kernmasse
des Rückenmarks.

- 8. Die Pyramiden- und inneren Hülsenstränge laufen, ohne seitliche Strahlungen abzugeben, in die Schenkel des grossen Gehirns fort. Der äussere Hülsenstrang, der grössere Antheil des Seiten- und Keilstranges, und der kleinere Antheil des zarten Stranges bilden das Corpus restiforme, welches sich zum kleinen Gehirn wie der Pedunculus cerebri um grossen verhält. Die übrigen Stränge und Strangtheile gehen zum Vierhügel, und, unter ihm durch, zur Haube.
- 9. Die Corpora restiformia s. Pedunculi cerebelli senken sich in die Marklager der Hemisphären des kleinen Gehirns. Sie werden durch destliche Querfasern durchsetzt, welche entweder theils mit den hier abtretesden Wurzeln gewisser Gehirnnerven, theils mit den Flockenstielen zusammenhängen. Das Corpus rhomboideum ist in concentrischen Schichte des Marklagers eingekapselt, welche sich abblättern lassen (Valentin). Selbst die den Gyri des kleinen Gehirns zu Grunde liegenden Marklamelles sollen noch deutliche Blätterschichten enthalten. Die Valvula cerebri magna ist eine wahre Fortsetzung des Marklagers des Wurms. Des Marklager des kleinen Gehirns sendet zwei Faserbündel aus, von welchen es nicht entschieden ist, ob sie Fortsetzungen der Pedunculi cerebelli, oder neue Erzeugnisse des Marklagers seien. Letzteres ist wahrscheinlicher, da die Continuität der Pedunculi mit jenen Faserbündeln nicht darzustellen ist. Diese Faserbündel sind: a) die Brückenarme und b) die Bindearme.
 - a) Die Brückenarme beider Hemisphären umfassen, von unten her, den in die Pedunculi cerebri gerade aufsteigenden Faserzug des verlängerten Markes, so wie von obenher das Corpus quadrigeminum sich über denselben wölbt. Das Corpus quadrigeminum heisst dieses Umstandes wegen auch Pons Sylvii. Die Varolsbrücke ist die untere, die Sylvische Brücke der obere Bogen eines Ringes, durch welchen die Stränge der Medulla oblongata zu den Schenkeln des Grosshirns verlaufen. Die Varolsbrücke enthält auch selbstständige Fasern, welche ihr wenigstens nicht durch die Bindearme zugeführt werden. Sie bilden die oberste Schichte des Pons zunächst an den runden Strängen unter dem Aquaeductus Sylvii, und gehen unter diesem bogenförmig von den rechten Hügeln des Corpus quadrigeminum zu den linken herüber.

- b) Die Bindearme steigen zum Corpus quadrigeminum hinauf, bilden es aber nicht, sondern streisen unter ihm weg, um in die Haube einzugehen. Trägt man das Corpus quadrigeminum ab, und dringt man in der Mittellinie in die Tiese, so sindet man leicht, dass die Fasern des rechten und linken Bindearms (so wie des mit ihnen verlausenden runden Stranges) sich partiell durchkreuzen (Haubenkreuzung). Die den Bindearm umgreisende Schleise (Lemniscus) ist eine Faserstrahlung des äusseren Hülsenstranges und Seitenstranges, welche zum Vierhügel aussteigt, um dort theils mit derselben Strahlung der anderen Seite zu anastomosiren, theils umbeugend an den Sehhügel zu gelangen.
- 10. Varolsbrücke und Vierhügel umschliessen dem Gesagten zufolge jene Stränge und Strangzüge des verlängerten Marks, welche zur Bildung des kleinen Gehirns nichts beigetragen haben. Jenseits der Brücke treten diese Stränge so vollkommen aus einander, dass zwischen ihnen die dritte Gehirnkammer klasst, welche, wegen vollendeter Divergenz der Stränge, keinen Markboden haben kann. Den Boden bildet vielmehr die Lamina perforata posterior vielleicht ebenfalls ein Rest des grauen Rückenmarkkernes, weil von ihr der letzte Nachwuchs von Marksasern ausgeht, indem die auf ihrer unteren Fläche aussitzenden Corpora mammillaria (den Oliven vergleichbar) einer neuen Sippe von Markstrahlen den Ursprung geben, welche sich aber nicht den seitlichen Strängen der Pedunculi anschliessen, sondern als Columnae fornicis und endlich als Fornix nach oben und hinten sich über die dritte Kammer wersen, um als Fimbria zum Unterhorn der Seitenkammer zu verlausen.
- 11. Während die Schenkel des grossen Gehirns nach vorn divergiren, theilt sich jeder in zwei übereinander liegende, durch die Substantia nigra Der untere ist der eigentliche Pedunculus cerebri, getrennte Faserzüge. der obere die Haube, Tegmentum caudicis. Der Pedunculus cerebri wird zum Mutterstamm für den Streifenhügel und den Linsenkern, die Haube Die zwischen Streifen- und Sehhügel eingeschobene für den Sehhügel. Strahlung des Pedunculus ist das Hornblatt, dessen freier oberer Rand als Hornstreif in der Seitenkammer gesehen wurde. Die Faserzüge des Pedunculus werden, über den Streifenhügel hinaus, noch durch Einschaltung grauer Lager getheilt, wodurch der Linsenkern und die Vormauer entstehen; schlagen sich dann, nach allen Richtungen divergirend, um die Seitenkammern herum, und kreuzen sich mit den horizontalen Strahlungen des Balkens. Diese divergirenden, in das Marklager der Hemisphäre eindringenden Schenkelradiationen führen den Namen des Stabkranzes, weil die Fasern derselben zu dickeren Bundeln den, welche besonders an den vorderen Strahlunge den Schenkel- und Balkenradiationen tret dere selbstständig auf (accessorische 1 sondere Richtung einschlagen, zuletzt!

kenstrahlungen legen, und an der Bildung der Markblätter der Gyri Antheil nehmen. Sie sind: a) Die Zwinge, Cingulum. Sie deckt den Seitenrand des Corpus callosum, und schlägt sich vor und hinter dem Balken zur Gehirnbasis hinab. b) Der Bogen, Fasciculus arcuatus, umgreist den Stabkranz, und bildet mit seinem mittleren Theile das Mark der Insel. c) Das Hakenbündel, Fasciculus uncinatus, liegt stark gekrümmt neben der Lamina cribrosa anterior nach aussen, und verbindet den Vordermit dem Unterlappen. d) Das untere Längenbündel, Fasciculus longitudinalis inferior, erstreckt sich zwischen b und c durch die untere Gegend aller drei Lappen der Hemisphäre.

- 12. Die Balkenstrahlung ist eine echte Commissur beider Hemisphären. Ihre queren Pasern werden zu senkrecht stehenden Blättern gesammelt, deren Ausdruck an der Obersläche in den Querstreisen liegt. Von dem Wulste des Balkens gehen geschweiste Faserzüge nicht in querer, sondern in geschwungener Richtung, um das Hinter- und Unterhorn herum nach abwärts. Die in den Hinterlappen eindringenden Züge heissen: die Zange; die in der Seitenwand des Unterhorns herabsteigenden: die Tapete.
- 13. Im grossen und kleinen Gehirne sind die Pedunculi cerebri et cerebelli, der Stabkranz und die das Corpus dentatum einschliessenden blätterigen Marklager, die Ganglien der Seitenkammern (Seh-Streisenhügel) und das Corpus dentatum, die dritte Kammer und vierte Kammer, die Seitenkammern und die Nester, der Vierhügel und der Wurm, der Balken und die Varolsbrücke, analoge Gebilde. Die Theik des grossen Gehirns, welchen keine verwandten Gebilde des kleinen Gehirns entsprechen, sind: der Fornix, das Septum pellucidum, und das Ammonshorn.
- 14. Die äussere Oberstäche der Gyri und die innere Oberstäche der Wände der Hirnkammern ist mit einer äusserst dünnen Lage weisser Marksubstanz überzogen, welche an der Oberstäche des Gehirns die graue Rindensubstanz durchscheinen lässt, und deshalb sich lange der Beobachtung entzog. In den Kammern bildet diese Markplatte, welche von Krause sehr tressend als Lamina nervea involvens bezeichnet wurde, Faltungen, welche wie Streisen oder Schnüre aussehen, und als sogenanntes Chordensystem der Gegenstand einer aussührlichen Untersuchung wurden, deren sich grösstentheils auf den Fundort derselben beziehende Resultate in Bergmann's Untersuchungen über die innere Organisation des Gehirns, Hannover, 1831, 8., niedergelegt wurden. Die Wandelbarkeit dieser Chorden, ihr wahrscheinlich durch den Collapsus des Gehirns im Cadaver mitunter bedingter Ursprung, und der durch sie in die Gehirnanatomie eingestührte Wust von neuen Namen lässt sich hier stiglich übergehen.

Ausführlicher handeln über die Faserung des Gehirns die Specialwerke von Burdach, Treviranus, Serres, Rolando, Parchappe, F. Arnold, Förg, Foville, Stilling etc. und die Gewebslehre von Kölliker.

Sehr brauchbar zum Studium sind die von Zeiller in München unter Anleitung von Prof. Förg gearbeiteten plastischen Darstellungen des Gehirns in Wachs, welche bei dem Verfertiger käuflich zu haben sind.

B. Peripherischer Theil des animalen Nervensystems.

Nerven.

I. Gehirnnerven.

§. 292. Erstes Paar.

Das erste Paar, der Riech- oder Geruchsnerv, Nervus olfactorius, entspringt an der unteren Fläche des vorderen Gehirnlappens, aus der Caruncula mammillaris s. Trigonum olfactorium, als ein anfangs breiter, dann sich dreikantig verschmälernder, aus drei Wurzeln zusammengesetzter Streifen (Tractus olfactorius). Er verläust in einer Furche der unteren Fläche des Vorderlappens, mit dem der anderen Seite etwas convergirend nach vorn, und schwillt auf der Lamina cribrosa des Siebbeins zu einem länglich runden, flachen, grauen Kolben (Riechkolben, Bulbus olfactorius) an, von dessen unterer Fläche zwei Reihen dünner und weicher Fäden abgehen, welche, mit scheidenartigen Fortsätzen der harten Hirnhaut umhüllt, durch die Löcher der Lamina cribrosa in die Nasenhöhle treten, durch Spaltung und Vereinigung Netze bilden, welche an der Nasenscheidewand und an der inneren Wand des Siebbeinlabyrinths sich nach abwärts erstrecken, und pinselartig gruppirte, kurze Fädchen in die Nasenschleimhaut schicken, wo ihr peripherisches Ende noch nicht bekannt ist. H. Horn will in der Nasenschleimhaut der Früsche schlingenstrmige Umbeugungen der letzten Enden der Riechnervensasern gesehen haben. -Am mittleren Theile der Nasenscheidewand reichen die Netze des Riechnerven fast bis zum Boden der Nasenhöhle herab; am Siebbeinlabyrinth dagegen nur bis zum unteren Rande der mittleren Nasenmuschel. An der Bildung der Netze des Nervus olfactorius haben die Nasenäste des fünsten Paares keinen Antheil.

Schon im Riechkolben bilden die den Gehirnfasern vollkommen ähnlichen Filamente des Riechnerven Geflechte, deren Zwischenräume mit grauer Gehirnsubstanz ausgefüllt werden. An den Durchschnitten in Weingeist gehärteter Riechkolben trifft man sehr häufig eine kleine Höhle (als Ueberrest der embryonalen röhrenförmigen Bildung des Riechnerven) an, welche bei einigen Säugethieren regelmässig vorkommt. — Der Riechkolben ist ein wahres Gehirnganglion, und der Tractus olfactorius eine wirkliche Fortsetzung der weissem Gehirnsubstanz.

Der Nervus olfactorius ist der einzige Vermittler der Geruse gen. Die Nasenäste des fünsten Paares sind für Gerüche erregen als allgemeine Empfindungsnerven nur besender fühle: als Jucken, Kitzel, Reissen, Stechen u. s. et a. Intensität der Geruchswahrnehmungen deutlicher zum Bewusstsein bringen, aber von den specifischen Gerüchen wohl zu unterscheiden sind. — Zerstörung des Nervus olsactorius, Atrophie, Compression durch naheliegende Geschwülste, hebt den Geruchsinn aus, obwohl die Nasenschleimhaut für Reize anderer Art noch empsindlich bleibt. Magendie's und Desmoulin's Angaben, dass die Nasenäste des sünsten Paares, nach Abschneidung des Olsactorius bei Hunden und Kaninchen, den Geruch vermittelten, sind durch Valentin gründlich widerlegt. — Mir ist ein Fall bekannt, wo eine Exostese der Crista galli den Geruch in der rechten Nasenhöhle verlieren machte. — Permanente Reizungszustände der Riechnerven durch pathologische Processe können Ursache andauernder subjectiver Gerüche werden, wie die von Morgagni, Loder, Rosenmüller beobachteten Fälle beweisen. Die letzte Endigung der Geruchsnerven ist unbekannt.

Die Physiologie des Geruchsinnes hat noch viel Dunkles, wozu die so gut als unbekannte Natur der Riechstoffe das Ihrige beiträgt. Nach den herrschenden Vorstellungen können Riechstoffe nur durch Imbibition auf die in der Schleimhaut der Nasenhöhle eingesenkten Nervenendigungen reizend einwirken, und Feuchtigkeit der Schleimhaut ist deshalb eine nothwendige Bedingung für die Erregung des Geruchsinnes.

Man sieht den Tractus olfactorius ohne alle Präparation an der unteren Fläche der Vorderlappen des Grosshirns frei verlaufen. Die schwer zu präparirenden Verzweigungen des Nervus olfactorius in der Nasenschleimhant lassen sich am oberen Theile der senkrechten Nasenscheidewand am besten darstellen.

D. F. Eschricht, de functionibus primi et quinti paris, etc. Hafniae, 1825. 8. H. Horn, über die Endschlingen der Geruchnerven, in Müller's Archiv, 1850. Eine kurze, aber dennoch vollständige Schilderung der physiologischen Wirkungsweisen aller Kopfnerven giebt Volkmann in R. Wagner's Handwörterbuch. Art. Nervenphysik.

§. 293. Zweites Paar.

Das zweite Paar, der Sehnerv, Nervus opticus, entspringt aus dem Corpus quadrigeminum, dem Thalamus opticus, und dem Corpus geniculatum externum, als ein platter, bandartiger Streif (Tractus opticus), schlingt sich um den Hirnschenkel von aussen nach innen herum, und nähert sich dem der anderen Seite so sehr, dass beide vor dem Trichter zusammesstossen, und durch partiellen Austausch ihrer Fäden die sogenannte Sehnerven als rundliche feste Stränge divergent werden, durch das entsprechende Foramen opticum des Keilbeins in die Augenhöhle treten, und umschlossen von dem Fettlager, welches den pyramidalen Raum zwischen den geraden Augenmuskeln ausfüllt, zum Bulbus laufen, und dessen Sklerotica und Cheroidea durchbohren, um in die Faserschicht der Netzhaut überzugehen. Das durch die Augenhöhle ziehende Stück des Nerven ist etwas nach ausen gekrümmt, und mit einem dicken Neurilemma überzogen, welches was der harten Hirnhaut stammt, und in die Sklerotica übergeht.

Im Chiasma kreuzen sich nur die inneren Fasern beider Sehneren

vorderen und hinteren Rande des Chiasma kommen auch bogenförmige Verbindungen der Fasern beider Sehnerven vor.

Das Neurilemma nervi optici wird von der Arteria centralis durchbohrt. An der Durchschnittssläche des Nervus opticus nahe am Bulbus sieht man die Arteria centralis in der Axe des Nerven lausen, und kann insosern einen Porus opticus, wie ihn Galen nannte, immerhin zulassen. Im frühen Embryoleben ist der Sehnerv, der sich wie der Riechnerv als eine Ausstülpung der Gehirnblase bildet, wie sich von selbst versteht, hohl. Die Höhle wird jedoch später vollkommen durch Nervensubstanz ausgefüllt.

Die Präparation des Sehnerven ist, seiner Dicke und Astlosigkeit wegen, selbst für Ungeübte eine leichte Aufgabe.

Der Sehnerv reagirt als specifischer Sinnesnerv nur durch Licht- und Farbenempfindung auf Reize aller Art, die ihn treffen, und ist kein Leiter für angenehme oder schmerzhafte Empfindungen. Bewegungen veranlasst er, wie der Riechnerv, nur auf dem Wege der Reflexion, in Theilen, zu welchen er selbst nicht geht.

J. Müller, vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes. Leipzig, 1826. 8. — W. Stein, diss. de thalamo optico et origine nervi optici. etc. Hafn., 1834. 4. — Nicolucci, sul chiasma de' nervi ottici (Filiatre Sebezio, 1845. pag. 321). — B. Beck, über die Verbindungen des Sehnerven mit dem Augen- und Nasenknoten. Heidelb., 1847.

§. 294. Drittes, viertes und sechstes Paar.

Diese drei Paare versorgen die in der Augenhühle besindlichen Bewegungsorgane des Augapsels und des oberen Augenlids, und werden der Gleichheit ihrer Tendenzen wegen unter Einem abgehandelt. Das vierte Paar versorgt von den sieben Muskeln in der Orbita nur den Musculus trochlearis, das sechste den Musculus abducens, das dritte Paar sendet seine Aeste zu den übrigen süns Augenmuskeln.

Das dritte Paar, der gemeinschaftliche Augenmuskelnerv, Nervus oculomotorius, entspringt von den inneren Faserbündeln des Pedunculus cerebri, verläust zwischen der Arteria cerebri profunda und Arteria cerebelli superior schief nach vorn und aussen, und wird von der oberen Wand des Sinus cavernosus aufgenommen, wo er mit den die Carotis interna umspinnenden sympathischen Geslechten durch 1-2 Fädchen Longet lässt ihn auch eine Anastomose mit dem sich verbinden soll. ersten Aste des Trigeminus eingehen. Nun betritt er, nachdem er sich in zwei Aeste getheilt, durch die Fissura orbitalis superior die Augenhöhle, und lässt an der äusseren Seite des Nervus opticus seine beiden Aeste Der Ramus superior ist kleiner, und nach oben und unten divergiren. versieht blos den Musculus levator palpebras amarioris und den Rectus superior; der grössere Ramus inferior welche den Rectus internus, Rectus inferior, und "etzterer Zweig, welcher unter allen de 7 welchem er bestimmt ist, nicht-t Rande der vorderen Augenhählt

dicke Wurzel des Ciliarknotens ab (Radix brevis s. motoria ganglii ciliaris), deren Fasern in den Bahnen der Nervi ciliares zu den inneren Bewegungsorganen des Auges (Irismuskeln und Tensor choroideae) gelangen.

Das vierte Paar, der Rollnerv, Nervus trochlearis s. patheticus, entspringt über der grauen Gehirnklappe, und dicht hinter dem Vierhögel, aus der Schleise (Laqueus) des letzteren, und mittelbar durch diese aus den vorderen Strängen des Rückenmarks. Er hat unter allen Gehirnnerven (seines weit nach hinten sallenden Ursprunges wegen) den längsten Verlauf in der Schädelhöhle, schlägt sich um den Processus cerebelli ad corpers quadrigemina, und um den Pedunculus cerebri, nach vorn und innen, wird vom freien Rande des Gezeltes bedeckt, durchbohrt die harte Hirnhaut hinter dem Processus clinoideus posterior, soll hier mit dem ersten Aste des sünsten Paares eine unconstante Verbindung eingehen, und tritt durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, wo er unmittelbar unter der Beinhaut der oberen Wand sich nach innen wendet, um sich im Musculus obliquus superior zu verlieren.

Das sechste Paar, der äussere Augenmuskelnerv, Nervus abdicens, entwickelt seine Fasern aus der Pyramide des verlängerten Markes
am hinteren Rande der Varolsbrücke, und geht zur hinteren Wand des
Sinus cavernosus, welche er durchbohrt. Im Sinus cavernosus liegt er an
der äusseren Seite der Carotis cerebralis, und wird wie diese vom Blate
des Sinus umspült. Wo er auf der Carotis ausliegt, erscheint er etwas briter und dünner, und nimmt Fäden vom Plexus caroticus des Sympathics
auf, welche er später wieder abgiebt. Hat er auch die vordere Wand des
Sinus cavernosus durchbohrt, so geht er durch die Fissura orbitalis ap
perior in die Augenhöhle, wo er unmittelbar unter dem Nervus oculometorius zur inneren Fläche des Rectus externus tritt, um sich nur in dieses
Muskel zu verästeln.

Die Präparation dieser drei Nervenpaare wird unter Einem mit jezer des ersten Astes vom fünsten Paare vorgenommen. Hauptregel bei alle Präparationen der Kopfnerven ist: ihren Verlauf schon gründlich zu verstehen!

Die drei Nerven der Augenmuskeln sind vorzugsweise motorischer Natz. Auf Reizung ihrer Ursprünge folgt keine Schmerzäusserung, welche erst eintritt, wenn diese Nerven an entlegeneren Punkten, jenseits ihrer Anastomosen mit den sensitiven Aesten des fünsten Paares, gereizt werden.

Die fünf Muskeln, welche vom Nervus oculomotorius versorgt werder, haben ausgesprochene Tendenz zur Mitbewegung, d. h. wenn in Einem Auge einer dieser Muskeln thätig wird, erfolgt dieselbe Wirkung des gleichnamige Muskels im anderen Auge. (Ausführliche Erörterung hierüber bei Valentis, de funct. nervorum, pag. 19, 30, 107, und J. Müller, Physiologie. IV. B. 2. Abschnitt. V.) Auch die Bewegungen der Iris, welche nur ausnahmsweise willkürlich vollzogen werden können, hängen von den motorischen Fäden 28, welche der Nervus oculomotorius zum Ganglion ciliare schickt, und welche als motorische Elemente der Nervi ciliares zur Iris treten. Stellt man des Auge nach innen und oben (durch den vom unteren Zweige des Nervi

oculomotorius innervirten Musculus obliquus inserior), so contrahirt sich ebenfalls die Iris. Im Schlase, bei gewissen Krämpsen, und im Todeskampse, wo das Auge ebenfalls nach innen und oben weicht, verengert sich gleichfalls die Pupille. Neuerer Zeit wurden seine Aeste des Oculomotorius zum oberen schiesen und äusseren geraden Augenmuskel, welche bei gewissen Wiederkäuern constant vorkommen, auch beim Menschen durch Faese beck dargestellt (Volkmann, Nervenphysiologie in Wagner's Handbuch). Nach Bidder giebt der Nervus trochlearis Verbindungssäden zu den Nerven des Gezeltes, und nach Sömmerring ist seine Communication mit dem ersten Aste des sünsten Paares in der Augenhöhle eine constante. Auch der Nervus abducens soll nach Valentin in der Augenhöhle mit dem ersten Aste des sünsten Paares eine Verbindung einleiten.

Ob die innere Haut des Sinus cavernosus sich über den Nervus abducens herumschlage, und ihn scheidenartig einhülle, ist eine von Gennari und Valentin bejahend entschiedene Frage. Die sympathischen Fäden, welche im Sinus cavernosus an den Abducens treten, bilden in der Regel 1 oder 2 grössere, graue Stämmchen, welche vor 40 Jahren noch für Ursprünge des Sympathicus aus dem Nervus abducens gehalten wurden.

§. 295. Fünftes Paar.

Das funte Paar, der dreigetheilte Nerv, Nervus trigeminus s. quintus, entspringt, wie ein Rückenmarksnerv, mit zwei getrennten Wurzeln. Die hintere, stärkere Wurzel (Portio s. Radix major) taucht aus einer Furche der vorderen Fläche des Crus cerebelli ad pontem auf. Ihre Fasern lassen sich bis in das Corpus restiforme (nach Arnold bis in die hinteren Stränge des Rückenmarks) verfolgen. Die vordere, kleinere Wurzel (Portio s. Radix minor) schiebt sich zwischen den Querfasern an der Seite des Pons Varoli hervor, und kann bis in die Pyramide des verlän-Beide Wurzeln legen sich, ohne zu vergerten Marks verfolgt werden. schmelzen, an einander, schieben sich in die aussere Wand des Sinus cavernosus ein, wo die hintere Wurzel durch Spaltung und Verstrickung ihrer Fasern ein Geslecht bildet, dessen Zwischenräume mit grauer Ganglienmasse ausgefüllt werden, so dass ein wahrer halbmondförmiger Knoten - Ganglion Gasseri s. semilunare - entsteht, an dessen Bildung die vordere Wurzel einen kleinen, aber doch evidenten Antheil hat, und mit der Mehrzahl ihrer Fäden nur an seiner inneren Fläche tangirend weg-Aus dem nach unten und aussen gekehrten convexen Rande des Ganglion Gasseri entspringen die drei Aeste des Quintus, welche, ihrer Verästlungsbezirke wegen, Ramus ophthalmicus, Ramus supra- et inframaxillaris genannt werden.

A. Brster Ast.

Der erste Ast des Quintus, Ramus ophthalmicus, läuft i der oberen Wand des Sinus cavernosus eingeschlossen, nach Fäden aus dem die Carotis interna umgebenden, symm gestechte auf, und sendet den seinen Nervus restat Lehrbuch der Anstomie. 5. Aus.

warts zum Tentorium cerebelli. Dann geht er durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, wo seine schon vor dem Eintritte sich isolirenden drei Zweige aus einander weichen. Diese sind:

- a) Der Thränennerv, Nervus lacrymalis. Er geht am oberen Rande des Rectus externus zur Thränendrüse, verbindet sich durch einen Nebenast mit dem Joch-Wangennerv, versorgt die Glandula lacrymalis (?), die Conjunctiva, und die Haut in der Umgebung des äusseren Augenwinkels.
- b) Der Stirnnerv, Nervus frontalis. Er liegt gleich unter dem Dache der Orbita, und theilt sich in folgende kleinere Aeste:
 - a) Der Nervus supratrochlearis, geht nach innen und vorn über dem Musculus trochlearis, verbindet sich mit dem Nervus infratrochlearis, und verlässt über der Rolle die Augenhöhle, um die Haut des oberen Augenlids und der Stirne zu versehen.
 - eta) Der Nervus frontalis und γ) der Nervus supraorbitalis, von welchen der erstere sich über das innere Ende des Margo supraorbitalis, der letztere aber durch das Foramen supraorbitale (oder die Incisura supraorbitalis) zur Stirne begiebt, um in der Haut der Stirne bis zum Scheitel und zur Schläfegegend sich zu verbreiten. Das obere Augenlid erhält von ihm seine Nervos palpebrales superiores. α , β , γ , anastomosiren unter einander, und mit den begegnenden Aesten des siebenten Nervenpaares.
- c) Der Nasen-Augennerv, Nervus naso-ciliaris, begleitet die Arteria ophthalmica an der äusseren Seite des Sehnerven, geht mit dem Oculomotorius und Abducens durch den gespaltenen Ursprung des Musculus rectus externus, giebt hierauf die lange Wurzel des Ciliarknoten ab (Radix longa s. sensitiva ganglii ciliaris §. 296), schlägt sich über den Nervus opticus nach innen, schickt hier 1—2 Ciliarnerven ab, und theik sich zwischen Obliquus superior und Rectus internus in den Nervus ethmoidalis und infratrochlearis.
 - a) Der Nervus ethmoidalis dringt durch das Foramen ethmoidale anterius in die Schädelhöhle, und hier gleich wieder durch ein Loch der Lamina cribrosa in die Nasenhöhle, giebt 3—5 Nervos nasales anteriores zur Nasenschleimhaut, und gelangt durch eine Oeffnung zwischen dem Nasenbein und der Cartilago triangularis nasi zur äusseren Seite der Nase.
 - β) Der Nervus infratrochlearis geht an der inneren Augenhöhlenwand mit dem Nervus supratrochlearis anastomosirend, zur Rolle; verlässt, unter dieser hervorkommend, die Augenhöhle über dem Ligamentum palpebrale internum, und verliert sich in der Haut der Nasenwurzel, im oberen Augenlid, und in der Glabella. Thränensack, Thränencarunkel, Bindehaut, werden von ihm noch vor seinem Austritte aus der Orbita versehen.

Präparation des ersten Quintusastes.

Man verbindet diese Präparation mit jener des dritten, vierten, und

sechsten Nervenpaares, und des Ciliarganglions. Man eröffnet an einem Schädel, dessen Gehirn bereits herausgenommen wurde, die Augenhöhle durch zwei in der Fissura orbitalis superior zusammentreffende Sägeschnitte, deren einer senkrecht durch das Dach der Augenhöhle so zu führen ist, dass die Incisura supraorbitalis geschont wird, während der andere durch den Stirnfortsatz des Jochbeins und durch die äussere Wand der Augenhöhle fast horizontal geleitet wird, so dass er den ersten in der Nähe der Fissura orbitalis superior schneidet. Das dreieckige ausgesägte Knochenstück wird von seinen Verbindungen mit der Periorbita sorgfältig gelöst, und von den Rändern der Oeffnung mit der Knochenkneipzange in kleinen Portionen so viel abgetragen, bis man hinlänglich grossen Spielraum gewonnen hat. Nun legt man die in der Fissura supraorbitalis befindlichen Nerven durch behutsame Entfernung ihrer von der harten Hirnhaut gebildeten Umhüllung bloss, und verfolgt sie auf ihrem Wege durch die Orbita nach Regeln, die eine richtige, durch das Studium guter Abbildungen gebildete Vorstellung von ihrem Verlaufe, einem findigen und nicht aller manuellen Dexterität entbehrenden Schu-Ungeschicklichkeit hat nicht das Verlaugen nach solchen Arler eingiebt. beiten, und wird mit den besten Regeln nicht zum Ziele kommen.

B. Zweiter Ast.

Der zweite Ast des Quintus, Ramus supramaxillaris, geht durch das Foramen rotundum des Keilbeins aus der Schädelhöhle in die Flügel-Gaumengrube, nimmt nach Langenbeck Fäden vom Plexus caroticus des Sympathicus auf, und erzeugt, während seines Laufes zur unteren Augengrubenspalte, folgende Aeste:

- a) Der Nervus zygomaticus s. subcutaneus malae, Jochwangennerv, ist der kleinste von allen, tritt durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle, an deren äusserer Wand er verläuft. Er anastomosirt mit dem Thränennerv, geht hierauf in den Canalis zygomaticus, und theilt sich in zwei Zweige, deren einer als zygomaticus facialis durch den Kanal desselben Namens an das Antlitz geht, um in der Haut der Wangengegend sich aufzulösen, der andere als Nervus zygomaticus temporalis durch den gleichlaufenden Kanal in die Schläfengrube eindringt, und, nachdem er den Schläfenmuskel und die Fascia temporalis an ihrem vorderen Theile durchbohrte, in der Haut der Stirn und Schläfe sich verbreitet. Die Anastomosen zwischen Nervus lacrymalis und Nervus zygomaticus malae unterliegen zahlreichen Abweichungen.
- b) Der Nervus alveolaris superior, oberer hinterer Zahnnerv, geht am Tuber maxillare herab, und theilt sich in zwei Zweige. Der erste durchbohrt den Buccinator, und geht zur Mundhöhlenschleimhaut, der zweite tritt durch die Foramina maxillaria superiora in den oberen Alveolarkanal ein, Nervus dentalis superior posterior. Der letztere läust zwischen den beiden Platten der Gesichtswand des Oberkiefers bogenförmig nach vorn, um mit dem gleich anzusührenden, vom Nervus infraorbitalis entstehenden Nervus dentalis superior medius et anterior ein Gesiecht (Plexus dentalis superior) zusammenzusetzen.
 - c) Die Nervi pterygo-palatini s. spheno-palatini, Keilgay

zwischen den inneren und äusseren Flügelmuskel ein, und theilt sich in drei Aeste:

- a) Der oberstächliche Schläsenerv, Nervus temporalis superficialis s. auriculo-temporalis, umsasst mit seinen beiden Ursprungswurzeln die mittlere Arterie der harten Hirnhaut, und schwingt sich hinter dem Gelenksortsatz des Unterkiesers, und von den Acini der Parotis umgeben, zur Schläsegegend auf, wo er hinter der Arteria temporalis superficialis liegt, und mit mehreren oberstächlichen Zweigen sich in der Haut der Schläse verästelt. Seine Verzweigungen erstrecken sich bis zur Stirn und zum Hinterhaupte, wo sie mit den Aesten des Nervus frontalis, communicans seciei, und occipitalis anastomosiren. Während er von der Parotis umschlessen wird, kreuzt er sich mit den Gesichtsästen des Communicans seciei, anastomosirt mit ihnen, und giebt Zweige α) zum äusseren Gehörgang (von welchen einer an der oberen Wand desselben bis zum Trommelsell vordringt, und sich zwischen seine Blätter von oben her einsenkt Nervus membranae tympani), β) zur Haut der Ohrmuschel, und γ) zur Haut der Schläse.
- b) Der Zungennerv, Nervus lingualis, nimmt bald unter seinem Ursprunge die Chorda tympani (§. 297) unter einem spitzigen Winkel auf, und geht mit ihr vereinigt, und sie durch seine Fädchen verstärkend, au der äusseren Seite des Musculus stylo-glossus und hyo-glossus bogenstrmig nach vorn, versieht die Tönsillen, den Arcus palato-glossus, die Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle und die Glandula sublingualis, schickt, während er über die Glandula submaxillaris weggeht, seine Aest zum Ganglion submaxillare, welche theils dem Lingualis, theils der mit ihm vereinigten Chorda tympani angehören, anastomosirt mit den Seiterästen des Zungensleischnerven, und spaltet sich in 8—10 Zweige (eigentliche Zungennerven, Nervi linguales proprii), welche zwischen Hyglossus und Genio-glossus in das Fleisch der Zunge eindringen, und sich in den Papillen (mit Ausnahme der vallatae) verästeln.

Remak entdeckte an den feineren Ramificationen des Nerveus linguelis zahlreiche kleine Ganglien. An den stärkeren Aesten dieses Nerven finden sie sich beim Menschen nicht, wohl aber beim Schafe und beim Kalbe. (Müller's Archiv. 1852. pag. 58).

- c) Der eigentliche Unterkiefernerv, Nervus mandibularis s. maxillaris in ferior, liegt hinter dem Nervus lingualis, mit welchem er durch 1—2 Queräste zusammenhängt, steigt an der äusseren Seite des Musculus pterygoideus internus zur inneren Oeffnung des Unterkieferkansis herab, und theilt sich in drei Aeste:
 - a) Nervus mylo-hyoideus, welcher in dem Sulcus mylo-hyoideus des Unterkiefers, von der Arteria submentalis begleitet, nach vorn zieht, und sich im Musculus mylo-hyoideus, dem vorderen Bauche des Biemter maxillae, und der Haut des Unterkinns verliert.
 - β) Nervus alveolaris s. dentalis inferior, welcher mit dem Nervus

mentalis in den Unterkieserkanal einzieht, und sich zu einem Geslechte auflöst, welches die Arteria alveolaris inferior umstrickt, und in jeden Zahnwurzelkanal eindringt.

y) Der Nervus mentalis trägt zur Bildung dieses Gestechtes bei. durch Abgabe seiner Fädchen, deren Verlust ihn nicht so sehr schwächt, dass er nicht als ansehnlicher Nervenstamm durch die vordere oder Kinnöffnung des Kanals herauskäme, wo er die Haut, Schleimhaut, und Musculatur der Unterlippe und des Kinns besorgt, und mit dem Nervus subcutaneus maxillae inferioris vom Communicans faciei anastomosirt.

Die Praparation des Ramus tertius wird für die sensitiven Aeste desselben an einem halbirten Schädel von innen aus, für die motorischen von aussen vorgenommen. Bei der Präparation von innen wird auch das Ganglion oticum dargestellt. Im Ganzen ist die Bearbeitung des Ramus tertius leichter als jene des secundus.

Es ist durch Vivisectionen und durch pathologische Erfahrungen zur Evidenz bewiesen, dass die hintere Wurzel des Quintus sensitiv, die vordere motorisch ist, - ein Verhältniss, welches bei allen Rückenmarksnerven wiederkehrt. Das Ganglion Gasseri entspricht, wenn auch nicht durch seine Lage, doch gewiss durch seine physiologische Bedeutung, den Intervertebralganglien. Reizungen der vorderen Wurzel, welche an der Bildung des Ganglion Gasseri nur sehr geringen, von Arnold gänzlich in Abrede gestellten Antheil hat, erregen an frisch geschlachteten Thieren hestige Beissbewegungen und Klappern der Zähne; die hintere Wurzel veranlasst, wenn sie an todten Thieren galvanisch oder mechanisch gereizt wird, keine Spur von Muskelcontraction, am lebenden Thiere dagegen folgen auf ihre Reizung die heftigsten Schmerzäusserungen. Die sensitiven Aeste des Ganglion Gasseri (erster und zweiter Ast), vermitteln blos Tastgefühle, so wie der Nervus auriculotemporalis des dritten Astes. Nach Longet ist der Nervus lingualis zugleich Geschmacksnerv, und es scheint mir Panizza's Ansicht, nach welcher dieser Nerv keine specifische Geschmacksempfindung erregen, sondern nur der Tastnerv der Zunge sein soll, um so mehr zweiselhaft, als chirurgische Erfahrungen die Theilnahme des Nervus lingualis am Geschmackssinne bestätigen. Lisfranc sah nach Exstirpation eines Unterkieferstückes, mit welchem zugleich ein Stück des Nervus lingualis herausgenommen wurde, den Geschmack auf der entsprechenden Zungenhälste verschwinden. Es scheint mir überhaupt nicht thunlich, einen specifischen Geschmacksnerven in der Zunge zu statuiren, da man durch sehr einsache Versuche an sich selbst die Ueberzeugung gewinnen kann, dass die verschiedenen Nerven aller den Isthmus faucium umgebenden Schleimhautpartien zur Vermittlung von Geschmacksempfindungen concurriren, und man den Geschmack eines auf die Zunge gelegten Körpers um so deutlicher wahrnimmt, je allseitiger er mit den Mundhöhlenwänden beim Kauen in Contact gebracht wird, und je leichter er im Speichel löslich ist. (Siehe Anmerk. zu §. 299.) - Nach Trennung der hinteren Wurzel des Quintus, oder Aushebung ihrer Leitung durch pathologische Momente, verlieren die Haut der Stirn und Schläse, die Conjunctiva, die Nasen- und Mundschleimhaut, die Lippen und die Zunge ihre Empfindung, während durch Trennung der vorderen Wurzel nur die Ka-1 werden, und Lähmung der Kiefermuskeln eintritt. pfindung in den genannten Flächen wird es mie 4

men lassen, welche sonst auf die Reism

Die Augenlider schliessen sich nicht mehr, wenn die Conjunctiva mechanisch gereizt wird; auf Kitzeln in der Nase entsteht weder Schnauben noch Niesen; die Zunge fühlt den Contact der Nahrungsmittel nicht, obwohl sie (wegen Unverletztheit des Nervus glosso-pharyngeus) noch für gewisse Geschmackseindrücke erregbar bleibt. Ein Thier, welchem die sensitiven Quintuswurzeln an beiden Seiten durchgeschnitten wurden, überlebt diese Operation längere Zeit, und benimmt sich, da es an dem grössten Theile seines Kopfes keine Empfindung hat, so, als wenn der Kopf nicht mehr zu seinem Rumpfe gehörte.

Findet am Menschen die Lähmung der sensitiven Wurzel nur auf einer Seite statt, so ist auch die Empfindungslosigkeit nur eine halbseitige. Glas an die Lippen, oder einen Löffel in den Mund gebracht, werden nur auf der einen Hälfte empfunden werden, und den Eindruck hervorbringen. ab wenn sie gebrochen wären. Kommt der Bissen beim Kauen auf die gelähmte Seite der Mundhöhle, so meint der Kranke, dass er ihm aus den Munde gefallen sei. Er sühlt es nicht, wenn er sich in die Zunge beisst. Die Gesichtsäste des zweiten und dritten Quintusastes sind vorzugsweise der Sitz der als Fothergill'scher Gesichtsschmerz bekannten Neuralgie. — Die Verengerung der Pupille, welche sich nach Zerschneidung des Quintus einzustellen pslegt, ist noch nicht erklärt. - Höchst merkwürdig sind die auf Resection des Quintus sich einstellenden Ernährungsstörungen, welche sich durch Entzündung und Auflockerung der Conjunctiva, vermehrte Schleimabsonderung, Füllung der vorderen und hinteren Augenkammer mit Exsudat. Mattwerden und Erosionen der Hornhaut, acute Erweichung derselben und der übrigen Augenhäute, endlich durch Bersten des Bulbus, und durch Schorfbildungen an Nase, Kinn und Wangen aussprechen. An diesen Erscheinungen müssen die dem Quintus beigemischten sympathischen Fasern entschiedenen Antheil haben.

Aussührlicher hierüber handeln Valentin, de functionibus nervorum, und die physiol. Handbücher, worunter ganz vorzüglich Müller's geniale Nervenphysik (im 3. Buche des Handbuchs der Physiol.).

Specielle Beschreibungen einzelner Quintusäste gaben: J. B. Paletta, de nervis crotaphitico et buccinatorio. Mediol., 1784. 4. — J. G. Haase, de nervo maxillari superiore. Lips., 1793. — L. Fitzau, de tertio ramo quinti paris. Lips., 1811. 4. — G. Schumacher, über die Nerven der Kiefer und des Zahnsleisches. Bern, 1839. 4. — J. A. Hein, über die Nerven des Gaumensegels, in Müller's Archiv. 1844. — V. Bochdalek, neue Untersuchungen der Nerven des Ober- und Unterkiefers, in den medicin. Jahrbüchern Oestert. 1836. XIX. Bd. — Derselbe, über die Nerven des harten Gaumens, ebendaselbst, 1842. 1. Hest.

§. 296. Ganglien am fünften Paare.

Die mit dem Quintus in Verbindung stehenden Ganglien gehören nicht ihm allein, sondern zugleich dem Sympathicus an, da sich in jedes derselben sympathische Nervensäden verfolgen lassen. Sie können jedoch hier am passendsten ihre Erledigung sinden, weil ihre Darstellung innig an jene des fünsten Nervenpaares gebunden ist.

1. Ganglion Gasseri.

Seine Lage und Gestalt ist aus dem früheren Paragraph bekannt. Die

Höhle der Dura mater, welche es birgt, wird zuweilen als Cavum Meckelii bezeichnet. Es hat nicht die Form gewöhnlicher Ganglien. Seine plattgedrückte Gestalt wird durch seinen älteren Namen: Taenia nervosa Halleri, ausgedrückt. Es steht an seinem vorderen, oberen Rande, mit den sympathischen Nervengeslechten, welche die Carotis interna umspinnen, durch Faserausnahme in Verbindung. Sein mikroskopischer Bau stimmt mit jenem der Intervertebralganglien überein (Note zu §. 303).

2. Ganglion ciliare.

Der Blendungsknoten, ist ein rundlich-eckiges Knötchen von 1"
Durchmesser, liegt in der Augenhöhle an der äusseren Seite des Nervus opticus, nimmt am hinteren Umfange drei Wurzeln auf, und giebt am vorderen Rande viele Aeste, die sogenannten Ciliarnerven ab.

- a) Wurzeln des Ciliarknotens sind:
 - a) Die Radix brevis s. motoria vom Nervus oculomotorius.
 - β) Die Radix longa s. sensitiva vom Nervus naso-ciliaris.
- y) Die Radix sympathica (trophica, Romberg). Aus dem Plexus caroticus im Sinus cavernosus entsprungen, geht sie durch die Fissura orbitalis superior zum Ganglion ciliare selbst, oder zu dessen Radix longa.

Diese ausnahmlos vorkommenden Wurzeln, werden durch andere mehr weniger abweichende vermehrt. Sie sind: 1. Die von mir beschriebene Radix inferior longa s. recurrens, aus dem Nervus naso-ciliaris jenseits des Sehnerven, oder aus einem freien Ciliarnerven stammend. Sie liegt unter dem Nervus opticus, und bildet mit dem über ihm liegenden Stücke des Nervus naso-ciliaris einen Nervenring, durch welchen der Nervus opticus durchgesteckt ist. Häufig geht sie nicht direct zum Knoten, sondern zum innersten Nervus ciliaris, an welchem sie zum Ganglion ciliare zurückläust. (Siehe meine Abhandlung: Berichtigungen über das Ciliarsystem des menschlichen Auges, in den med. Jahrb. Oesterr. 28. Bd. 1. Stück.) Sie kommt so häufig vor, dass ihr Fehlen eigentlich Ausnahme ist. Ihr Vorkommen erklärt hinlänglich das beobachtete Fehlen der Radix longa, da beide, als Zweige desselben Nerven, einander vertreten können. 2. Eine Wurzel aus dem Nervus lacrymalis, welche sich zur Radix longa begiebt (Schlemm, Observ. neurol. Berol., 1834. pag. 18). 3. Eine vom Ganglion spheno-palatinum durch die Fissura orbitalis inferior herauskommende Wurzel (Tiedemann), welche ich jedoch, auf mikroskopische Beobachtung ihrer Faserung gestützt, für eine fibrose Trabecula halte, was von Beck neuester Zeit auch für die vom Ganglion spheno-palatinum zum Stamme des Schnerven entsandte Anastomose bestätigt wurde. Valentin jedoch (Sömmerring's Nervenlehre pag. 320) erwähnt wahrer Nervensäden in ihr (zweimal beobachtet). 4. Der von Otto beobachtete Fall, wo die Radix longa aus dem Nervus abducens (zusammt dem Nerrus naso-ciliaris) entsteht, ist eine der seltsamsten Anomalien. Ueber diese Anomalien enthält Weitläufiges Müller's Archiv, 1840, und Svitzer, Bericht von einigen nicht häufig vorkommenden Variationen der Augennerven. Kopenhagen, 1845. 4., so wie Beck, über die Verbindung des Sehme mit dem Augen- und Nasenknoten. Heidelb., 1847. 8.

b) Aeste des Ciliarknotens, oder Ciliarnerven.

Sie laufen, 10-16 an der Zahl, zwischen dem Nervus opticus und dem Rectus externus zur hinteren Peripherie des Bulbus, dessen Sklerotica sie durchbohren, um zwischen ihr und Choroidea nach vorn zum Orbicalus ciliaris zu laufen, in welchem sie sich zu einem Gestechte auslieen, aus welchem 1. die eigentlichen Irisnerven mit ihren Plexibus, 2. die moterischen Nerven des Spanners der Choroidea, und 3. die kaum sichtbaren Hornhautnerven (Bochdalek) entspringen. Ein sehr feiner Ciliarnerv dringt auch nach Hirzel und Tiedemann in den Nervus opticus ein. (Beck konnte durch mikroskopische Untersuchung dieses Fadens nur Zellgewebe und Blutgefässe, aber keine Nervenelemente, in ihm auffinden.) -Da auch aus dem Nervus naso-ciliaris freie Ciliarnerven entstehen (1-2), welche so, wie die Ciliarnerven des Ganglion, verlaufen, so nennt man erstere Nervos ciliares longos, letztere breves. Ein longus und ein brevis vereinigen sich regelmässig zu einem gemeinschaftlichen dicken, unter dem Sehnerven verlaufenden Stämmchen. An der Vereinigungsstelle soll nach Faesebeck ein zweites kleineres Knötchen (Ganglion ciliare internum) vorkommen, was ich noch nicht gesehen habe. — Beck sah vom Genglion ciliare feine Aestchen zum Rectus inferior treten. Sie waren gewiss nur Fortsetzungen der Fasern der Radix brevis.

3. Ganglion spheno-palatinum.

Der Keilgaumen- oder Flügelgaumenknoten, Ganylion pterygepalatinum, s. rhinicum (hiv, Nase), liegt in der Tiese der Fossa pterygepalatina, ist 2—3 Mał grösser als das Ganglion ciliare, wird von schwer
abzupräparirendem Fett umhüllt, und hängt mit dem zweiten Aste des
sunsten Paares durch den kurzen, doppelten Nervus pterygo- s. sphenepalatinus zusammen. Die Aeste, welche von ihm abgesendet werden, sind:

- a) Ramuli orbitales, sein und zart, dringen durch die untere Augengrubenspalte in die Orbita, und verlieren sich in der Periorbita, und in dem Neurilemma nervi optici (Hirzel, Arnold, Longet).
- b) Der Nervus Vidianus. Er wurde früher für einen einfachen Nerven gehalten, zeigt sich jedoch bei näherer Untersuchung aus grauen und weissen Fasern zusammengesetzt, welche zwei dicht über einander liegende Bündel bilden. Beide Bündel laufen durch den Vidiankanal von vor- nach rückwärts, und trennen sich am hinteren Ende des Kanals. Das graue oder untere Bündel geht zu dem, die Carotis cerebralis vor ihrem Eintritte in den Canalis caroticus umstrickenden sympathischen Geslecht (oder kommt eigentlich von diesem zum Ganglion spheno-palatinum hinaus), und heisst Nervus petrosus profundus. Das weisse obere Bündel Nervus petrosus supersicialis major durchbohrt die Faserknorpelmasse, welche die Lücke zwischen Felsenbeinspitze, Basilartheil des Hinterhauptbeins, und Körper des Keilbeins ausstullt (Fibrocartilayo basilaris), gelangt dadurch in die Schädelhöhle, wo es sich in die Furche der oberen Fläche des Fel-

senbeins legt, und durch sie zum Hiatus canalis Fallopiae geführt wird, um sich mit dem Knie des Communicans saciei zu verbinden.

- c) Die 3—4 Rami pharyngei begeben sich nach hinten zum oberen Umfange der Choanae, und verbreiten ihre Zweige in der Schleimhaut der obersten Rachenpartie.
- d) Die 2-3 Nervi septi narium ziehen durch das Foramen sphenopelatinum an der oberen Wand der Choanae zur Nasenscheidewand. Einer von ihnen ist durch Grösse und Länge ausgezeichnet. Er geht längs der Nasenscheidewand nach vorn und unten zum Canalis naso-palatinus, in welchem er sich mit dem der anderen Seite verbindet, und zur vorderen Partie des harten Gaumens, so wie zum Zahnsleisch der Schneidezähne gelangt. Dieses Verlaufes wegen, wird er durch den Namen Nervus nasopalatinus Scarpae vor den übrigen Nasenscheidewandnerven ausgezeichnet. Cloquet hat an der Verbindungsstelle beider Nerven im Canalis nasopalatinus ein Ganglion beschrieben, welches er Ganglion naso-palatinum nannte. Dieses Ganglion existirt nicht. Cloquet wurde dadurch getäuscht, dass er die härtliche und verdickte Wand des häutigen Ductus naso-palatinus, an welcher die Nervi naso-palatini herabsteigen, für ein Ganglion ansah. Ich selbst habe in den früheren Auflagen dieses Buches, auf Cloquet's Autorität hin, das Ganglion angeführt, überzeugte mich jedoch erst kurzlich, dass dieses fragliche Ganglion keine Spur von Ganglienzellen enthält, sondern der häutige, knorpelharte, dickwandige Canalis naso-palatinus selbst ist. (Siehe Note zu §. 198.)
- e) Die Nervi nasales posteriores, 4-6 an der Zahl, sind für das Siebbeinlabyrinth und die äussere Wand der Nasenhöhle bestimmt. Man theilt sie in die oberen (2-3), den mittleren, und unteren ein. Der mittlere geht die oben (§. 295 B. d.) erwähnte Verbindung mit dem Ganglion des Pleaus dentalis superior ein.
- f) Die Nervi palatini descendentes steigen, in eine gemeinschaftliche Scheide mit dem mittleren und unteren Nervus nasalis posterior (welche sie aber bald verlassen) eingeschlossen, durch den Canalis palatinus descendens herab, theilen sich, wie dieser, in drei Zweige, welche, durch die Foramina palatina postica hervorkommend, den weichen Gaumen, seine Bogen, das Zäpschen, und die Muskeln dieser Theile versorgen. (Nebst diesen Gaumennerven erhält der weiche Gaumen noch Zweige vom neunten, zehnten und eilsten Paar, Hein.) Der stärkste von den dreien ist der Nervus palatinus anterior, die eigentliche Fortsetzung der vom zweiten Aste des Quintus stammenden Wurzel des Ganglii spheno-palatini. Er verbreitet sich in der Schleimhaut des harten Gaumens bis zu den Schneidezähnen hin, wo er mit dem Nervus naso-palatinus Scarpae anastomosirt.

4. Ganglion supramaxillare.

Das Ganglion supramaxillare wurde oben (§. 295 B. d.) beschrieben. Zuweilen findet sich noch ein hinteres im Plexus dentalis superior, und Bochdalek hat noch kleinere Ganglien abgehildet, welche in der Mitte der Septa alveolaria in die sie durchziehenden Nervengeslechte eingesenkt sind. Auch nach Verlust der Zähne erhält sich das Ganglion supramaxillare. Oesters hat es das Ansehen eines seingenetzten Plexus (wie an einem von Bochdalek dem Wiener anatomischen Museum geschenkten, überaus schönen Präparate zu sehen ist).

Arnold bestreitet mit scharfen Waffen die Existenz dieses Ganglions, und erklärt es für ein Geslecht, ohne Beimischung von Ganglienzellen (Handbuch der Anat. 2. Bd. pag. 892).

5. Ganglion oticum s. Arnoldi.

Der Ohrknoten liegt knapp unter dem Foramen ovale an der inneren Seite des Quintusastes, mit welchem er durch kurze Fädchen (Radis brevis, Arnold) vereinigt ist, hinter der Arteria meningea media, und an der äusseren Seite des Musculus tensor palati mollis. Er ist länglichoval, 2" lang, sehr platt, gelblich-grau, und von weicher Consistenz. Er wird öfters vom Nervus pterygoideus internus durchbohrt. Seine grösseren Aeste sind:

- a) Der Nervus ad tensorem tympani geht über der knöchernen Ohrtrompete zum Musculus tensor tympani. Ist zuweilen mit einem Faden vom Nervus pterygoideus internus verbunden.
- b) Der Nervus petrosus superficialis minor geht durch ein eigenes Kanälchen des grossen Keilbeinstügels neben dem Foramen spinosum in die Schädelhöhle, und mit dem Nervus petrosus superficialis major in Einer Scheide liegend, zum Knie des Fallopischen Kanals, wo er sich in zwei Zweigchen theilt, deren eines sich mit dem Nervus communicans faciei verbindet (am Ganglion geniculi), deren zweites unter dem Semicanslis tensoris tympani in die Paukenhöhle herabsteigt, um sich mit dem Nervus Jacobsonii (§. 299) zu verbinden. Arnold lässt den Petrosus superficialis minor nicht vom, sondern zum Ganglion oticum, als Radiz longa desselben, kommen.
- c) Ein Verstärkungszweig zu dem das Ganglion oticum durchsetzenden Nervus ad tensorem palati mollis (§. 295 C. I. c. d.).
- d) Verbindungszweige zum Ohrmuschelast des Nervus auriculo-temporalis.

Mehr weniger abweichende, selbst nicht ganz sicher gestellte Aeste des Ganglion oticum gehen a) zu den Nervengeslechten um die Arteria maxillaris interna und Arteria spinosa, β) zur Chorda tympani, γ) zum Nervus petrosus profundus, δ) zum Ganglion Gasseri, als ein Faden, welcher durch den Canaliculus sphenoidalis externus an den genannten Knoten treten soll (Faesebeck).

Die Beziehung des Ganglii olici zum Musculus tensor tympani, und die von dem Entdecker des Knotens ausgesprochene Ansicht, dass der Nervus ad tensorem tympani unwillkürliche Contractionen dieses Muskels, und dadurch vermehrte Spannung des Trommelsells bedingt (wodurch die Grösse seiner Excursionen bei intensiven Schallschwingungen verringert werden soll), veranlassten die Benennung "Ohrknoten". R. Wagner, über einige neuere Entdeckungen (Ganglion oticum), in Heusinger's Zeitschrist. Bd. 3. Hit. 3.—
F. Schlemm, in Froriep's Notizen. 1831. N. 660. — J. Müller, über den Ohrknoten, in Meckel's Archiv. 1832.

6. Ganglion submaxillare s. linguale.

Dieses Ganglion hat häufig nur die Form eines Plexus gangliosus, und liegt am Stamme des Nervus linqualis, oberhalb der Glandula sub-maxillaris.

Es ist kleiner, als das Ganglion ciliare, verhält sich aber, hinsichtlich seiner Wurzeln, jenem analog, indem es 1. von den sensitiven Fasern des Nervus lingualis, 2. von den motorischen der Chorda tympani, und 3. von den die Arteria maxillaris externa umspannenden sympathischen Geslechten seine Wurzeln bezieht. Die Aeste des Knotens versorgen die Acini der Glandula submaxillaris, umstricken und begleiten den Ductus Whartonianus bis zur Mundschleimhaut, oder gesellen sich zum Nervus lingualis, um mit diesem zur Zunge zu gehen. Der copiösere Speichelzususs auf Reizung der Mundschleimhaut durch scharse oder gewürzte Speisen, ist als Reslexwirkung anzusehen, durch welche der chemische Reiz diluirt werden soll, und das Ganglion steht somit zum Geschmacksinn in demselben Bezuge, wie das Ganglion ciliare und oticum zu ihren betreffenden Sinneswerkzeugen.

Die 3 Hauptäste des Quintus erscheinen als gröbere Verstrickungen von Nervenbündeln, und haben somit eigentlich die Structur dichter Plexus, welche auch schon von älteren Anatomen bemerkt, und am dritten Aste als Plexus retiformis von Santorini erwähnt wurde. Am zweiten Ast setzt sich diese Plexusbildung bis in den Nervus infraorbitulis fort. Ich habe mehrmals an einem am inneren Rande des Nervus infraorbitulis liegenden Nervenbündel desselben, eine schöne, 1/2" mächtige gangliöse Anschwellung beobachtet, und als Ganglion aberrans beschrieben. (Med. Jahrb. Oest. 1836.)

Von den älteren Schristen über das sünste Paar verdienen genannt zu werden: J. F. Meckel, de quinto pare nervorum. Gotting., 1748. Ein noch immer classisches Werk. — R. B. Hirsch, disquisitio anat. paris quinti. Vindob., 1765. 4., sührte den Namen des Ganglion Gasseri ein, zu Ehren seines sonst nicht weiter bekannten Lehrers.

Die neuere Literatur ist durch Arnold's Leistungen über den Ohrknoten, Heidelb., 1828. 4., und durch Bochdalek's schöne Entdeckungen der Ganglien im Oberkieserknochen (Oesterr. med. Jahrb. 19. Bd.) besonders ausgezeichnet. Ueber einzelne Ganglien am Quintus handeln noch insbesondere: L. Hirzel, diss. sistens nexum nervi sympath. cum nervis cerebralibus. Heidelb., 1824. 4. — F. Tiedemann, über den Antheil des sympathischen Nerven an den Verrichtungen der Sinne. — J. G. Verrente de parte cephalica nervi sympathici. Francos., 1832. 4.

sonii et ganglio Arnoldi. Hafniae, 1833. — H. Horn, gangliorum capitis glandulas ornantium expositio. Wirceb., 1840. 4. — Valentin in Müller's Arch. 1840. — Gros, description nouvelle du Ganglion spheno-palatin. Gaz. méd. de Paris. 1848. N. 12. 23. (Die neue Beschreibung enthält Altes.)

§. 297. Siebentes Paar.

Das siebente Paar, der Antlitznerv, Nervus facialis s. communicans faciei, tritt am hinteren Rande des Pons Varoli, auswärts der Oliven, vom Stamme des verlängerten Markes ab, mit zwei Wurzeln, von denen die vordere, grössere aus dem Corpus restiforme, die hintere, kleinere, mit dem Gehörnerv zusammenhängende, als Portio intermedia Wrisbergii am dem Boden der vierten Gehirnkammer entspringt. (Da man nämlich ver Sommerring den Nervus facialis und Nervus acusticus als siebentes Paar zusammensaste, indem sie beide in den Meatus auditorius internus treten, so musste die Wrisbergische Wurzel als Portio intermedia dieses Paares angesehen werden.) Beide Wurzeln legen sich in eine Rinne des Nervus acusticus, scheinen mit diesem nur Einen Nerven auszumachen. und wurden auch früher als Portio dura, - der Nervus acusticus dagegen als Portio mollis paris septimi allgemein benannt. Im inneren Gehörgange anastomosirt die Portio Wrisbergii durch zwei seine Reiserchen mit dem Nervus acusticus. Am Grunde des Gehörgangs trennt sich der Communicans vom Acusticus, betritt den Canalis Fallopiae, schwillt an Knie desselben zum Ganglion geniculi an, nimmt daselbst den Nervus petrosus superficialis major, und einen Theil des minor auf, und geht, nachdem er die ganze Länge des Canalis Fallopiae durchlausen, und eines Verbindungszweig vom Ramus auricularis nervi vagi erhalten hat, am Foramen stylomastoideum hervor.

Ueber die Anastomosen des Acusticus mit dem Communicans handelt weitläufig Arnold und besonders Beck (s. Literatur). - Das Ganglion geniculi nimmt den Nervus petrosus superficialis major und einen Ast des minor auf, welche durch den Hiatus canalis Fallopiae zu ihm gelangten, und giebt 2 Aeste ab. Beide verlaufen in der Scheide des Communicans noch eine Strecke weit. Vis-à-vis der Eminentia pyramidalis der Trommelhöhle trennt sich der kleinere derselben von ihm, und geht zum Musculus stapedius. Ueber dem Foramen stylo-mastoideum verlässt ihn auch der zweite, und geht als Chorda tympani durch den Canaliculus chordas in die Paukenhohle, schiebt sich zwischen Manubrium mallei und Crus longum incudis durch, verlässt die Pauke durch die Glaserspalte, und krümmt sich zum Nervus lingualis herab, in dessen Scheide er weiter zieht, um theils bei ihm zu bleiben, theils als motorisches Element in das Ganglion submaxillare überzusetzen. - Nach Beck und Arnold besteht der Nervus petrosus superficialis major nicht blos aus Fasern, die vom Ganglion spheno-palatique zum Ganglion geniculi, sondern auch von letzterem zu ersterem gehen. Der Ast des Nervus petrosus superficialis minor, welcher zum Ganglion genicali geht, ist nach Beck eine Arterie, - kein Nerv.

Unter dem Foramen stylo-mastoideum giebt er folgende Aeste ab:

- a) Den Nervus auricularis posterior profundus, welcher mit dem Ramus auricularis nervi vagi, und mit den von den Halsnerven stammenden Nervus auricularis magnus und occipitalis minor anastomosirt, und die hinteren Muskeln des Ohres sammt dem Musculus occipitalis betheilt.
- b) Den Nervus stylo-hyoideus und digastricus posterior für die gleichlautenden Muskeln.
- c) Die Rami communicantes zum Nervus auriculo-temporalis vom dritten Aste des Quintus.

Um zu den Antlitzmuskeln zu kommen, durchbohrt er, in einen oberen und unteren Ast gespalten, die Parotis, und zerfährt in 8—10 Aeste, welche durch bogenförmige oder spitzige Anastomosen den grossen Gänsefuss, Pes anserinus major, auf dem Masseter bilden, und in folgende Strahlungen zerfallen:

- a) Rami temporales, 2 3 über den Jochbogen aufsteigende Aeste, welche mit dem Nervus auriculo-temporalis, den Nervis temporalibus profundis, dem Stirn- und Thränennerven anastomosiren, und den vorderen Ohrmuskeln, dem Levator auriculae, Temporalis, Orbicularis palpebrarum, und Corrugator supercilii Bewegungsfasern einweben.
- b) Rami zygomatici, welche parallel mit der Arteria transversa faciei zur Jochbeingegend ziehen, um mit dem Nervus zygomaticus malae, lacry-malis, und infraorbitalis sich zu verbinden, und den Musculus zygomaticus, orbicularis, levator labii superioris et alae nasi zu versehen.
- c) Rami buccales, welche mit dem Nervus infraorbitalis und buccinatorius die oberen Muskeln der Mundspalte und der Nase betheilen.
- d) Rami subcutanei maxillae inferioris, zwei mit dem Nervus buccinatorius und mentalis anastomosirende Aeste, für die unteren Muskeln der Mundspalte.
- e) Rami subcutanei colli superiores, welche mit den Zweigen der oberen Halsnerven im Trigonum colli superius anastomosiren, und sich im Platysma myoides und dem vorderen Bauche des Biventer maxillae auflösen.

Die Präparation des Communicans innerhalb des Canalis Fallopias ist eine sehr delicate Arbeit, und wird an einem im Schraubstock festgeklemmten, frischen Felsenbein, mit feinem Meissel und Hammer vorgenommen. Seine Verästlung im Gesichte erfordert zur Darstellung mehr Geduld als Kunst. Die leichte Präparation des achten Paares (Acusticus) wird unter Einem vorgenommen.

Die Anastomosen des Facialis sind nicht blos auf seine grösseren Zweige beschränkt. Auch die zartesten Ramificationen seiner Aeste und Aestchen bilden unter einander, oder mit den Verästlungen des Quintus, schlingenförmige Verbindungen, welche nicht nur die Muskelbundel, sondern die grösseren Blutgefässe des Antlitzes umgreifen, und ihre convexe Seite der Medianlinie des Gesichtes zukehren.

Der Communicans faciel Fäden, die er enthält, weg Nerv. Die sensiblen mit dem Quintus

und Vagus zugeführt (Longet, Arnold, Volkmann). Seine Zerschneidung im Thiere, oder seine Unthätigkeit durch pathologische Bedingungen im Menschen, erzeugt Lähmung sämmtlicher Antlitzmuskeln — Prosopoplegie. Nur die Kaumuskeln (welche vom 3. Aste des Quintus innervirt werden) stellen ihre Bewegungen nicht ein. — Da das Spiel der Gesichtsmuskeln der Physionomie einen veränderlichen Ausdruck verleiht, so wird der Communicans auch als mimischer Nerv des Gesichtes aufgeführt, und da die Muskeln der Nase und der Mundspalte bei leidenschaftlicher Aufregung des Nervensystems in convulsivische Bewegungen gerathen, und bei den verschiedenen Formen von Athmungsbeschwerden in angestrengteste Thätigkeit versetzt werden, führt er seit Ch. Bell's hierauf gerichteten Untersuchungen den treffenden Names: Athmungsnerv des Gesichtes. Wie sehr er diese Benennung verdient, können die unordentlichen, passiven, nicht mehr durch den Willen zu reglirenden Bewegungen der Nasenstügel, der Backen und Lippen bei Gesichtlähmungen und Apoplexien beweisen, wo sie wie schlaffe Lappen durch de aus- und einströmenden Lustzug mechanisch hin und her getrieben werden.

J. F. Meckel, von einer ungewöhnlichen Erweiterung des Herzens und den Spannadern (alter Name für Nerven) des Angesichtes. Berlin, 1775. 4.

— D. F. Eschricht, de functionibus septimi et quinti paris. Hafn., 1825. 8.

— G. Morganti, anatomia del ganglio genicolato, in den Annali di Omodei. 1845. pag. 449. — B. Beck, anat. Untersuchungen über das 7. und 9. Gehirnnervenpaar. Heidelb., 1847. 4. — L. Calori, sulla corda del timpam in Mem. della Acad. di Bologna. T. IV.

§. 298. Achtes Paar.

Das achte Paar, der Gehörnerv, Nervus acusticus, entspringt as den Markstreisen des Bodens der Rautengrube. Seine seinen, dunkelrandgen Ursprungssasern sammeln sich zu einem weichen, von der Arachneide locker eingewickelten Stamm, der zwischen der Flocke und dem Bruckesarm nach aussen tritt, mit einer Furche zur Ausnahme des Communicass versehen ist, und mit ihm in den Meatus auditorius internus eintritt, we seine Spaltung in den Schnecken- und Vorhofsnerven stattsindet.

Der Schneckennery, Nervus cochleae, wendet sich nach vorn mit unten zum Tractus foraminulentus, dreht seine Fasern etwas schrauberformig zusammen, und schickt sie durch die Löcherchen des Tractus me Lamina spiralis, wo sie nach Corti ein dichtes Geslecht bilden, in welchem ovale, bipolare Ganglienzellen vorkommen. Wahrscheinlich treten die Primitivsasern des Schneckennerven durch diese Ganglienzellen hindurch, und werden jenseits derselben neuerdings zu einem Geslechte vereinigt, dessen austretende, blasse und seine Fasern, nach Corti auf der Lamina spiralis membranacea frei auslausen sollen. Endschlingen existiren ganz gewiss nicht. — Bevor der Schneckennerv zum Tractus foraminulentus gelangt, giebt er den Nervus sacculi hemisphaerici ab, welcher durch die Maculs cribrosa des Recessus hemisphaericus in den Vorhos und zum runden Säckchen geht.

Der Vorhofsnerv, Nervus vestibuli, ist kleiner, und hinter dem vorigen gelegen. Er zerfällt in vier Aeste, von welchen der stärkste imm Sacculus hemiellipticus, die drei tibrigen zu den Ampullen der drei Canales semicirculares, durch die betreffenden Maculae cribrosae, gelangen. Das eigentliche Ende der Primitivsasern des Vorhosnerven ist unbekannt. Leydig und Czermak haben bei Fischen Theilungen derselben ausgefunden.

Scarpa beschrieb an der Theilungsstelle des Nervus vestibuli eine Intumescentia gangliiformis. — Die Verbindungszweige mit dem Communicans faciei sind ein oberer und unterer (Arnold, Swan). Ersterer kommt aus der Portio Wrisbergii, letzterer aus dem Ganglion geniculi. Wo sie in den Gehörnerv eintreten, soll dieser eine gangliöse Intumescenz bilden (Arnold). Die ganze Masse des Gehörnerven am Grunde des Meatus auditorius internus, welche sich durch grauröthliche Färbung von dem Stücke desselben extra meatum unterscheidet, enthält insulare und bipolare Ganglienkugeln, welche Corti auch an den Verästlungen des Vorhofsnerven beobachtete. — Delmas, recherches sur les ners de l'oreille. Paris, 1834. 8., und die Gehörwerke von Scarpa, Sömmerring, und Breschet.

§. 299: Neuntes Paar.

Das neunte Paar, der Zungen-Schlundkopfnerv, Nervus glossopharyngeus, entspringt mit 5-9 Faden, vor dem Ursprunge des Vagus und hinter der Olive, aus dem Corpus restiforme des verlängerten Marks, zieht vor der Flocke des kleinen Gehirns zum oberen Umfange des Foramen jugulare, wird hier von einer besonderen Scheide der Dura mater umgeben, und durch sie von dem dicht hinter ihm liegenden Vagus (als dessen Ast er lange Zeit galt) getrennt. Im Foramen jugulare bilden seine hinteren Fasern einen kleinen, nicht constanten, graurothen Knoten, und nach dem Austritte aus dem Loche einen zweiten, grösseren - das Ganglion petrosum, — welches sich in die Fossula petrosa des Felsenbeins einbettet, und mit dem Ganglion cervicale primum des Sympathicus, so wie mit dem Ramus auricularis vagi durch eine hinter dem Bulbus der Vena jugularis nach aussen laufende Anastomose zusammenhängt. Der wichtigste Ast des Ganglion petrosum ist der Nervus Jacobsonii. Dieser geht durch ein seines Kanälchen senkrecht nach auswärts in die Paukenhöhle, wo er in einer Rinne des Promontorium verläuft, sendet ein Aestchen zur Tuba Eustachii, ein zweites zur Schleimhaut der Paukenhöhle. und zu den carotischen Geslechten zwei seine Nervi carotico-tympanici, und verbindet sich zuletzt mit jenem Antheile des Nervus petrosus superficialis minor, welcher nicht an das Ganglion geniculi tritt.

Nun legt sich der Nerv am Halse zwischen die Carotis interna et externa, steigt an der inneren Seite des Musculus stylo-pharyngeus herab, und erzeugt:

- a) Verbindungszweige für den Vagus,
- b) Verbindungszweige filt die carotischen Geslechte,
- c) Muskelzweige für den Musculus stylo-pharm
- d) den Ramus pharyngo-basilaris für den ebe Lehrbuch der Anstomie. 5. Auf.

e) vier bis sechs Rami pharyngei für die Rachenmuskeln.

Die Fortsetsung seines Stammes — der Zungenast, Ramus linguslis, geht unter der Tonsilla zum Seitenrande der Zungenwurzel, versicht die Schleimhaut des Arcus glosso-palatinus, der Tonsilla, des Kehldeckels (vordere Seite), und der Zungenwurzel, und verliert sich in den Papillis vallatis. Seine Aeste in der Zungensubstanz besitzen, nach Remak's Entdeckung, zahlreiche kleine Ganglien.

Das einfache Knötchen des Glosso-pharyngeus wurde von einem Wiener Anatomen, Ehrenritter (Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. 4. Bd. pag. 320), zuerst beobachtet. Die Präparate verfertigte er selbst für das Wiener anatomische Museum, wo sie zur Zeit meines Prosectorats noch vorhanden waren. Es wurde von den Zeitgenossen nicht beachtet, und erst nealich durch Joh. Müller der Vergessenheit entrissen (Med. Vereinszeitung. Berin, 1833.). — Das Ganglion petrosum wurde von C. S. Andersch (De newshum. corp. aliquibus. P. I. pag. 6.) beschrieben, und führt auch seinen Namen. —

Nach Panizza (Ricerche sperimentali sopra i nervi. Pavia, 1834.) uni Valentin (De funct. nervorum. pag. 39 und 116.) ist der Glosso-pharyngen der wahre Geschmacksnerv der Zunge. Die Versuche von Mayo, Alcock, J. Reid, Müller, Longet, sprechen aber dem Nervus lingualis vom Quitus specifische Geschmacksenergien, und dem Glosso-pharyngeus nur Taiempfindung zu. Auch Volkmann's Erfahrungen sprechen gegen Panizzai Behauptung, welche in neuester Zeit durch Stannius wieder eine State fand (nach Versuchen an jungen Katzen, welche nach Durchschneidung beite Glosso-pharyngei, Milch, die mit schweselsaurem Chinin ganz bitter gemach wurde, so gierig, wie gewöhnliche, susse Milch frassen). Siehe Müller's Archiv. 1848. pag. 132., und F. Uterhardt, de functionibus nervi hypoglem lingualis, et glosso-pharyngei. Rostochii, 1847. Müller hält auch die Gamenäste des Quintus für Geschmackserregung empfänglich. Die ganze Sache ist also noch sehr in Frage gestellt. Biffi und Morganti fanden durch Vivisectionen, dass die Durchschneidung des Glosso-pharyngeus nur die Geschmacksempfindung am hinteren Theile der Zunge aufhebt, dass sie aber a der Zungenspitze verbleibt (Su i nervi della lingua. Annali di Omodei. 1846. Agosto e Settembre). Maisonneuve (Thèse inaug. Paris, 1835.) und Magistel (Considérations sur l'anat. et la physiol. de la langue. Paris, 1828) haben durch ihre Versuche nichts zur Entscheidung der Frage beigetragen, und die pathologischen Data sind zu wenig übereinstimmend, um Schlässe darauf zu basiren. Nach Rapp (über das fünste Nervenpaar, pag. 10) estspringt in der Klasse der Vögel der Geschmacksnerv aus dem Glosso-phersegeus, und zuweilen aus dem Vagus.

Auch der Glosso-pharyngeus ähnelt insofern einem Rückenmarksnerven. als nur ein Theil seiner Fasern das Ganglion Ehrenritteri bildet, das vordere Bündel derselben am Ganglion blos vorbeigeht.

Die Praparation des Glosso-pharyngeus wird mit jener des Vagus und Recurrens Willisii verbunden.

H. F. Kilian, anat. Untersuchungen über das neunte Hirnnervenpar. Pesth, 1822. 4. — F. Kornfeld, de functionibus nervorum linguae. Barel, 1836. 4. — C. Vogt, über die Function des Nervus lingualis und pharyngeus. Müller's Archiv. 1840. pag. 72. — John Reid in Zodd's paedia of Anatomy and Physiology. Vol. II. — B. Beck, lib. cit.

§. 300. Zehntes Paar.

Das zehnte Paar, der herumschweifende oder Lungen-Magennerv, Nervus vagus s. pneumo-gastricus, tritt mit 10 – 15 feinen Wurzelstämmehen in der Furche hinter der Olive vom verlängerten Marke ab.
Er geht zwischen dem Nervus glosso-pharyngens und recurrens Willisii
(durch eine besondere Brücke der harten Hirohaut von ihnen getrennt)
durch das Foramen jugulare aus der Schädelhöhle, und hat einen so weit
verbreiteten Verästlungsspielraum, dass er zur leichteren Uebersicht in einen
Hals-, Brust- und Bauchtheil geschieden wird.

A. Der Halstheil bildet schon im Foramen jugulare einen rundlichen, 2" breiten Knoten (Wurzelknoten), an welchem alle Fäden des Vagus Theil nehmen, und welcher von seiner Lage Ganglion jugulare heisst. Sein Bau stimmt mit jenem der Spinalganglien überein, d. h. die Fasern des Vagus treten zwischen den Ganglienzellen durch, und werden durch neue, aus den meist unipolaren Ganglienzellen entspringende Fasern vermehrt. Unter dem Knoten liegt der Vagus anfangs an der vorderen Seite der Vena jugularis interna, wendet sich aber gleich vor dem Querfortsatze des Atlas zu ihrer inneren Seite, steigt nun zwischen ihr und der Carotis interna herab, und schwillt durch Aufnahme von Verbindungsästen von benachbarten Nerven des Halses zu dem ungefähr 1/2" langen, und 2" dicken, spindelformigen, mit grauer Substanz infiltrirten Knotengeflecht, Plexus nodosus s. gangliiformis Meckelii, an, unter welchem er wieder dunner wird, und in der Furche zwischen Carotis communis und Jugularis interna zur oberen Brustapertur senkrecht herabläuft. Er giebt und erhält folgende Zweige:

- a) Ramus auricularis vagi. Er entspringt aus dem Ganglion jugulare, verstärkt sich durch einen Verbindungszweig vom Ganglion petrosum, geht in der Fossa jugularis des Schläsebeins um die hintere Peripherie des Bulbus der Drosselader herum, tritt durch eine besondere Oessnung in der hinteren Wand der Fossa jugularis in den untersten Theil des Fullopischen Kanals, kreuzt sich daselbst mit dem Communicans, und verbindet sich mit ihm durch 2 Fäden, dringt dann durch den Canaliculus mastoideus, wird hinter dem äusseren Ohre frei, und endet in zwei Zweige getheilt, deren einer mit dem Nervus auricularis profundus vom Communicans sich verbindet, der andere sich in der Auskleidungshaut des Meatus auditorius externus (hinterer Umsang) verliert.
- b) Verbindungsäste vom Nervus recurrens Willisii und Hypoglossus, welche beide durch kurzen straffen Zellstoff an den Vagus angeschlossen sind. Durch sie erhält der Vagus, der vorzugsweise als sensitiver Nerv entsprang, motorische Fasern, die er später wieder abgiebt, wodurch die Stelle des Vagus, welche ne und Abgabe der motorischen Fasern liegt, dicker) als der übrige Stamm.

c) Verbindur

us, zum Ganglion cer-

vicale primum des Sympathicus, und zum Plexus nervorum cervicalium. Sie kommen aus dem Plexus nodosus, so wie d) und e).

- d) Nervus pharyngeus superior et inferior. Zwei vor der Carotis cerebralis zur Seitengegend des Pharynx laufende Aeste, welche sich mit den Ramis pharyngeis des Glosso-pharyngeus zu einem die Arteria pharyngea ascendens umgebenden Geslecht (Plexus pharyngeus) verbinden, dessen Aeste die Muskeln und die Schleimhaut des Rachens versorgen.
- e) Nervus laryngeus superior. Er entsteht am unteren Ende des Knotengeslechtes, geht hinter der Carotis cerebralis zum Kehlkopf herab, und theilt sich in einen Ramus externus, welcher zuweilen einen Nervus cardiacus zum Herzen sendet, gewöhnlich aber den Musculus constrictor pharyngis inferior und crico-thyreoideus versieht, und in einen Ramus internus, welcher complicirter ist. Er geht mit der Arteria thyreoides superior und später mit deren Zweige: Arteria laryngea, durch die Menbrana hyo-thyreoidea, und theilt sich in vier Zweige, welche die hintere Fläche des Kehldeckels (die vordere ist schon vom Glosso-pharyngeus verpflegt) sämmtliche Muskeln und die Schleimhaut des Kehlkopfes bis zur Stimmritze herab versorgen. Er anastomosirt durch einen zwischen Schildund Ringknorpel nach unten ziehenden Faden mit dem Nervus laryngens recurrens, so wie (obwohl unconstant) mit dem Ramus externus des Nervus laryngeus superior, durch einen seinen Zweig, der durch ein unverhältnissmässig grosses Loch in der Nähe des oberen Schildknorpelrandes zieht.
- f) Ein constanter Verbindungsfaden zum Ramus descendens hypoglossi, und mehrere unconstante, zum Plexus caroticus internus.
- g) Zwei oder drei Rami cardiaci, welche an der Carotis zum Plexus cardiacus herablaufen.
- B. Der Brusttheil des Vagus. Er liegt in der oberen Brustapertur, beiderseits hinter der Vena anonyma, und an der äusseren Seite der Carotis communis. Der rechte Vagus geht vor der Arteria subclavia dextra, der linke vor dem absteigenden Stück des Aortenbogens herab. Jeder tritt dann an die hintere Wand des Bronchus, an welche er durch kurzes Zellgewebe angehestet wird. Unter dem Bronchus geht der rechte Vagus zur hinteren, der linke zur vorderen Seite des Oesophagus (als Chordae oesephageae der Alten), und dringen mit ihm in die Bauchhöhle ein. Die Aeste des Brusttheils sind:
- a) Der Nervus laryngeus recurrens. Der rechte ist kürzer, und schlingt sich um die Arteria subclavia dextra nach hinten herum; der linke umgreist den concaven Rand des Aortenbogens. Beide Recurrentes lausen in den Furchen zwischen Lust- und Speiseröhre zum Kehlkopf hinauf, und erzeugen:
- α) Verbindungsäste zum Ganglion cervicale inferius, β) feine Aestchen zum Herzbeutel (nach Luschka nur vom rechten Recurrens),
 γ) feine Aestchen für die Trachea und den Oesophagus (Rami tracheales

et oesophagei superiores). — Nach Absendung dieser Zweige geht jeder Recurrens, hinter dem unteren Horne der Cartilago thyreoidea, an die hintere Kehlkopfwand, und zerfällt in einen Ramus externus et internus. Der externus versorgt den Thyreo-arytaenoideus und Crico-arytaenoideus lateralis (zuweilen auch den Crico-thyreoideus); der internus anastomosirt mit dem Ramus internus des Laryngeus superior, und verliert sich blos im Musculus crico-arytaenoideus posticus und arytaenoideus obliquus.

Da der Crico-arytaenoideus posticus die Stimmritze erweitert — eine Bewegung, die mit jedem Einathmen eintritt — so wird die Durchschneidung beider Recurrentes diese Erweiterung ausheben. Der Luststrom, der durch den Inspirationsact in den Kehlkopf eindringt, kann deshalb die Ränder der Stimmritze (wenn diese schmal ist, wie bei allen jungen Thieren) aneinander drücken, und Erstickungstod verursachen, welcher bei alten Thieren, deren Stimmritze weiter ist, nicht so leicht eintreten wird.

- b) Die Nervi bronchiales anteriores, 4-5 kleine Zweigchen, welche sich zu einem Geslechte verketten, welches an der vorderen Wand des Bronchus, als Plexus bronchialis anterior, zur Lunge geht.
- c) Der *Plexus bronchialis posterior* an der hinteren Bronchuswand, stärker als der vordere, und sich mit diesem und den später anzusührenden Zweigen des Sympathicus im Lungenparenchym zum *Plexus pulmonalis* verwebend, welcher Plexus die Ramisicationen des Bronchus begleitet.
- d) Der *Plexus oesophageus*, durch die Verstrickung der grösstentheils longitudinalen Aeste des linken und rechten Vagus entstanden, läust an der vorderen und hinteren Seite der Speiseröhre herab.
- C. Der Bauchtheil des Vagus enthält den auf der vorderen und hinteren Wand des Magens (unter der Bauchfellhaut) befindlichen Plexus gastricus anterior et posterior als Endigungen des Plexus oesophageus, welcher mit der Speiseröhre durch das Foramen oesophageum des Zwerchfells in die Bauchhöhle gelangte. Der Plexus gastricus posterior sendet an der Arteria coronaria superior sinistra Strahlungen zum Plexus coeliacus, und sofort zum Plexus hepaticus.

Präparation. Nur die Darstellung des Durchganges des Vagus durch das Foramen jugulare ist schwierig, — der übrige Verlauf nicht. Man sägt an einem geöffneten Schädel das Hinterhaupt bis in das Foramen occipitale magnum auf, und verfolgt die leicht zu findenden drei Nerven (Glossopharyngeus, Vagus, und Recurrens) auf ihrem Wege zum Foramen jugulare, welches durch Abzwicken der Reste des Hinterhauptbeins eröffnet wird, worauf sich die drei genannten Nerven durch vorsichtige Ablösung ihrer von der harten Hirnhaut gebildeten Scheiden bequemer darlegen lassen.

Die von Arnold (Tiedemann und Treviranus, Zeitschrift für Physiol. Bd. III. pag. 148.) zuerst ausgesprochene Ansicht, dass der Vagus, seinem Wurzelverhalte nach, ein rein sensitiver Nerv sei, und dass er seine motorischen Aeste nur der Anastomose mit dem Recurrens Willisii zu verdanken habe, welcher sich zu ihm, wie die vordere (ganglienlose) Wurzel des Quintus zur hinteren verhalt, wurde von Scarpa, Bischoff, Valentin, Bendz durch Versuche am lebenden Thiere, und durch comparativ anatomische Ersfahrungen in Schutz genommen, und weiter ausgeführt. Nach Remak's,

Müller's und Volkmann's Beobachtungen dagegen, soll der Vagus ursprunglich schon (wenigstens bei Thieren) motorische Elemente einschliessen, welche an dem Ganglion jugulare nur vorbeigehen, ohne an seiner Bildung zu participiren. Ich schliesse mich der Ansicht über die gemischte Natur der Ursprungsfasern des Vagus an, da die motorischen, oder doch theilweise motorischen Aeste des Vagus (Rami pharyngei, laryngew superior et inferior, Plesons ocsophageus, welcher letztere nach Stilling's Versuchen ebenfalls motorisch wirkt), zu zahlreich sind, um allein von der verhältnissmässig schwachen Anastomose mit dem Recurrens Willisii abgeleitet werden zu können. Die sensitiven Qualitäten des Vagus äussern sich in Hunger und Durst. Sättigungsgefühl, Athmungsbedürfniss, Beklemmung, Schmerz etc., Trennung des Vagus auf beiden Seiten unter der Anastomose mit dem Recurrens Willisti ist absolut tödtlich. Die Erscheinungen, die man hiebei beobachtet, erklären die physiologischen Thätigkeiten der einzelnen Vagusäste. Sie sind: Unempfindlichkeit der Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut, und deshalb Schweigen der Reflexbewegung, z. B. Husten, - heisere, matte Stimme, oder complete Aphonie wegen Glottislähmung, - Athemnoth bei jungeren Thieren bis zur Erstickung - Hyperamie, Apoplexie der Lungen, und Infiltration mit wässerigem Fluidum (welche nach Traube dadurch entsteht, dass, der Lähmung der Glottis wegen, Speichel und Schleim vom Pharynx in die Lustwege gelangt, und der ausgehobenen Reslexbewegung wegen nicht mehr ausgehustet werden kann), - Lähmung des unteren Theiles der Speiseröhre, daher Unvermögen zu schlingen, indem das Verschlungene auf halbem Weg stecken bleibt, und durch Erbrechen wieder ausgeworfen wird (hieraus grosse Gefrässigkeit selbst für das mehrmals erbrochene Futter). - träge Bewegung des Magens, und dadurch bedingte unvollkommene Durchtränkung der Nahrungsmittel mit Magensast (dessen chemische Beschaffenheit durch die Trennung des Vagus nicht verändert werden soll). Die Bewegungen des Magens können übrigens nicht allein vom Vagus abhängig sein, da Reizungen des Ganglii coeliaci mit caustischem Kali einen entschiedenen Einfluss auf ihre Steigerung äussern. — Höchst merkwürdig ist der Einfluss des Vagus auf die Herzthätigkeit. Reizung des Vagus vermindert absolut die Zahl der Herzschläge, und kann selbst Stillstand des Herzens bewirken (Weber, Budge). Henle hat an der Leiche eines geköpsten Mörders, 15 Minuten nach dem tödtlichen Streiche, mittelst Durchführung eines Stromes des Retationsapparates durch den linken Vagus, das Herzatrium, welches 60-70 Contractionen in der Minute zeigte, plötzlich im Expansionszustande stille stehen gemacht. Stromleitung durch den Sympathicus rief die Bewegung des Atrium wieder hervor. Der Vagus scheint sonach eine regulatorische Wirkung auf die Herzbewegung, welche vom Sympathicus abhängig ist, zu äussern.

F. G. Theile, de musculis nervisque laryngeis. Jenae, 1825. 4. — A. Solinville, anat. disquisitio et descriptio nervi pneumogastrici. Turici, 1838. 4. — E. Traube, Beiträge zur experimentellen Pathologie. Berlin, 1846. — Schiff, die Ursache der Lungenveränderung nach Durchschneidung der Vagi, in Griesinger's Sechswochenschrift, 7. und 8. Hest.

§. 301. Eilstes Paar.

Das eilste Paar, der Beinerv, Nervus recurrens s. accessorius Willism, hat einen sehr veränderlichen, und selbst auf beiden Seiten selten symmetrischen Ursprung. Er entspringt vom Seitenstrange der Medulla

et oesophagei superiores). — Nach Absendung dieser Zweige geht jeder Recurrens, hinter dem unteren Horne der Cartilago thyreoidea, an die hintere Kehlkopfwand, und zerfällt in einen Ramus externus et internus. Der externus versorgt den Thyreo-arytaenoideus und Crico-arytaenoideus lateralis (zuweilen auch den Crico-thyreoideus); der internus anastomosirt mit dem Ramus internus des Laryngeus superior, und verliert sich blos im Musculus crico-arytaenoideus posticus und arytaenoideus obliquus.

Da der Crico-arytaenoideus posticus die Stimmritze erweitert — eine Bewegung, die mit jedem Einathmen eintritt — so wird die Durchschneidung beider Recurrentes diese Erweiterung ausheben. Der Luststrom, der durch den Inspirationsact in den Kehlkopf eindringt, kann deshalb die Ränder der Stimmritze (wenn diese schmal ist, wie bei allen jungen Thieren) aneinander drücken, und Erstickungstod verursachen, welcher bei alten Thieren, deren Stimmritze weiter ist, nicht so leicht eintreten wird.

- b) Die Nervi bronchiales anteriores, 4-5 kleine Zweigchen, welche sich zu einem Geslechte verketten, welches an der vorderen Wand des Bronchus, als Plexus bronchialis anterior, zur Lunge geht.
- c) Der *Plexus bronchialis posterior* an der hinteren Bronchuswand, stärker als der vordere, und sich mit diesem und den später anzusührenden Zweigen des Sympathicus im Lungenparenchym zum *Plexus pulmonalis* verwebend, welcher Plexus die Ramisscationen des Bronchus begleitet.
- d) Der *Plexus oesophageus*, durch die Verstrickung der grösstentheils longitudinalen Aeste des linken und rechten Vagus entstanden, läust an der vorderen und hinteren Seite der Speiseröhre herab.
- C. Der Bauchtheil des Vagus enthält den auf der vorderen und hinteren Wand des Magens (unter der Bauchfellhaut) befindlichen Plexus gastricus anterior et posterior als Endigungen des Plexus oesophageus, welcher mit der Speiseröhre durch das Foramen oesophageum des Zwerchfells in die Bauchhöhle gelangte. Der Plexus gastricus posterior sendet an der Arteria coronaria superior sinistra Strahlungen zum Plexus coeliacus, und sofort zum Plexus hepaticus.

Präparation. Nur die Darstellung des Durchganges des Vagus durch das Foramen jugulare ist schwierig, — der übrige Verlauf nicht. Man sägt an einem geöffneten Schädel das Hinterhaupt bis in das Foramen occipitale magnum auf, und verfolgt die leicht zu findenden drei Nerven (Glossopharyngeus, Vagus, und Recurrens) auf ihrem Wege zum Foramen jugulare, welches durch Abzwicken der Reste des Hinterhauptbeins eröffnet wird, worauf sich die drei genannten Nerven durch vorsichtige Ablösung ihrer von der harten Hirnhaut gebildeten Scheiden bequemer darlegen lassen.

Die von Arnold (*Tiedemann* und *Treviranus*, Zeitschrift sür Physiol. Bd. III. pag. 148.) zuerst ausgesprochene Ansicht, dass der Vagus, seinem Wurzelverhalte nach, ein rein sensitiver Nerv sei, und dass er seine motorischen Aeste nur der Anastomose mit dem *Recurrens Willisii* zu verdanken habe, welcher sich zu ihm, wie die vordere (ganglienlose) WE

zur hinteren verhält, wurde von Scarpa, Bischoff. *durch Versuche am lebenden Thiere, und durch ***

: fahrungen in Schutz genommen, und weiter i

comment. de nervi assessorii Willisii anatomia et physiologia. Darmst., 1832. 4. — C. B. Bendz, tractatus de connexu inter nervum vagum et accessorium. Hafn., 1836. 4.

§. 302. Zwölftes Paar.

Das zwölfte Paar, der Zungenfleischnerv, Nervus hypoglossus s. loquens, entspringt zwischen der Olive und Pyramide des verlängerten Marks. Die Wurzelfäden vereinigen sich zu 4-9 Bündel, welche hinter der Wirbelarterie zum Foramen condyloideum anterius quer nach aussen ziehen, zuweilen sich durch einen Faden von der hinteren Wurzel des ersten Cervicalnerven verstärken, und nachdem sie sich zu einem 1" dicken Stamm vereinigt haben, durch das genannte Loch die Schädelhöhle verlassen. Am Halse liegt der Nerv anfangs hinter dem Vagus und der Vena jugularis interna, windet sich um sie nach vorn und innen, bildet im Trigonum cervicale superius einen vom hinteren Bauche des Biventer maxillae bedeckten Bogen mit nach unten sehender Convexität, welcher bis zum Zungenbeinhorn herabsteigt, dann sich an dem Musculus hyoglossus nach aufwärts schwingt, und zwischen dem Stylo-glossus und Genio-glossus in das Fleisch der Zunge eintritt, wo seine Endäste theils unter einander, theils mit den Zweigen des Nervus lingualis anastomosiren, und sämmtliche zur Zunge gehörende Bewegungsorgane versehen.

Gleich nach seinem Freiwerden unter dem Foramen condyloideum anterius, geht er mit dem Ganglion cervicale primum des Sympathicus, mit dem Plexus nodosus des Vagus, und mit den ersten beiden Cervicalnerven Verbindungen ein, und schickt etwas tiefer seinen Ramus cervicalis descendens ab, welcher mit Aesten des zweiten und dritten Cervicalnerven die Halsnervenschlinge, Ansa hypoglossi, bildet, welche sehr oft als Gestecht erscheint, und aus welcher die untere Musculatur des Zungenbeins mit Zweigen versorgt wird.

Der Hypoglossus wird am passendsten vom Halse aus präparirt, wo sein dicker, rundlicher, vom Biventer bedeckter Stamm leicht zu finden, und nach gemachter Exarticulation des Unterkiefers ohne Mühe einerseits bis zu seinem Austrittsloche, andererseits gegen die Zunge hin verfolgt werden kann.

Sehr selten, und bisher nur von Mayer beobachtet (Neue Verhandl. der Leop. Carol. Acad. Bd. XVI. pag. 744.), ist ein Knötchen an einem hinteren Wurzelfaden des Hypoglossus, welches bei mehreren Säugethieren normal zu sein scheint. — Ueber die motorische Wirkung dieses Nerven herrscht kein Bedenken. Seine Durchschneidung an Thieren, und seine Lähmung beim Menschen, erzeugt jedesmal Zungenlähmung (Glossoplegie), ohne Beeinträchtigung des Geschmacks und der allgemeinen Sensibilität der Zunge. Die für den Omo- und Sternohyoideus, so wie den Sternothyreoideus aus der Ansahypoglossi entspringenden Filamente, scheinen dem Hypoglossus nicht ab origine eigen zu sein, sondern ihm durch die Anastomosen mit den Cervicalnerven eingestreut zu werden, da Volkmann durch Reizung des Ursprungs des Hypoglossus nie Bewegungen dieser Muskeln erzielen konnte.

Zagorski, Nusser, und Swan beobachteten Knötchen an den Ver-

astlungen des Hypoglossus. — Da die Ursprungswurzeln des Hypoglossus durch Richtung, Lagerung, und Ansehen, mit den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven übereinstimmen, und da er zuweilen eine hintere Wurzel mit einem Knötchen besitzt, so bildet der Hypoglossus den schönsten Uebergang der Hirn- zu den Rückenmarksnerven, und erscheint, den comparativen Beobachtungen von Weber, Bischoff und Büchner zufolge, eher in die Kategorie der Nervi spinales als der Nervi cerebrales gehörig, ebenso wie der Accessorius, welcher sich gewiss nur aus losgerissenen Antheilen der Cervicalnerven innerhalb des Rückenmarks construirt. Bei den Fischen ist der Hypoglossus entschieden ein Spinalnerv.

C. E. Bach, annot. anat. de nervis hypoglosso et laryngeis. Turici,

1835. 4.

II. Bückenmarksnerven.

§. 303. Allgemeiner Charakter der Rückenmarksnerven.

Die Rückenmarks- oder Spinalnerven, deren 31 Paare vorkommen, sind nach Verlauf und Vertheilung symmetrisch geordnet. Nur selten finden sich 32 Paare. Sie werden in 8 Halsnerven, 12 Brustnerven, 5 Lendennerven, 5 Kreuzbeinnerven, und 1 oder 2 Steissbeinnerven eingetheilt. Jeder Spinalnerv entspringt mit einer vorderen und hinteren Wurzel. Die hintere ist (mit Ausnahme der zwei oberen Halsnerven) stärker als die vordere. Die Wurzeln bestehen aus mehreren platten Faserbündeln, welche aus den Sulcis lateralibus des Rückenmarks austauchen, den Seitenstrang des Rückenmarks und das Ligamentum denticulatum zwischen sich fassen, von der Arachnoidea lose umfasst werden, gegen das betreffende Foramen intervertebrale, durch welches sie aus dem Rückgratskanal heraustreten, convergiren, und nach ihrem Austritte zu einfachen, rundlichen Stämmen sich vereinigen. Der hintere Wurzelstamm schwillt im Foramen intervertebrale zu einem Knoten an (Ganglion intervertebrale), an dessen vorderer Fläche die vordere Wurzel blos anliegt, ohne Fäden zur Bildung desselben beizusteuern. Der Bau aller Intervertebralknoten stimmt darin überein, dass die Fasern der hinteren Wurzel zwischen den Ganglienzellen durchgehen, ohne mit ihnen sich zu verbinden; aus den Ganglienzellen aber neue Fasern entstehen, einfach oder mehrfach, welche sich zu den durchgehenden hinzugesellen, und somit die Summe der austretenden Fasern eines Ganglions, grösser als jene der eintretenden ist. Jenseits des Knotens mischen sich die Fasern der vorderen und hinteren Wurzel dergestalt, dass die ferneren Ramisicationen Fibrillen aus beiden Wurzeln enthalten. Die vordere ganglienlose Wurzel ist, zufolge des Bell'schen Gesetzes, rein motorisch, die hintere sensitiv. Erstere besteht aus dickeren Primitivfasern, als letztere. Haben sich beide Wurzeln jenseits des Ganglion zu einem kurzen Stamme vereinigt und ihre Fasern ausgetauscht, so zerfällt jeder Rückenmarksnerv regelmässig in einen vorderen und hinteren Zweig. Die Ramificationen eines Rückenmarksnerven werden somit gemischten Charakters sein. Der vordere ist (mit Ausnahme der zwei oberen Halsnerven) stärker als der hintere, steht durch einen oder zwei graue Fäden mit dem nächsten Ganglion des Sympathicus in Verbindung, anastomosirt einfach oder mehrfach mit dem zunächst über und unter ihm liegenden vorderen Spinalnervenzweig, und bildet mit diesem Schlingen (Ansae), welche an den Hals-, Lenden-, Kreuz- und Steissbeinnerven constant, an den Brustnerven dagegen unbeständig sind. Die Summe mehrfacher Schlingen an einem bestimmten Segmente der Wirbelsäule wird als Plexus bezeichnet, und es wird somit ein Plexus cervicalis, lumbalis, und sacralis existiren, welche vor den Querfortsätzen der gleichnamigen Wirbel oder der vorderen Fläche des Kreuzbeins liegen. Der hintere Zweig ist (mit Ausnahme der zwei ersten Halsnerven) bedeutend schwächer als der vordere, geht zwischen den Querfortsätzen der Wirbel (am Kreuzbein durch die Foramina sacralia posteriora) nach hinten, anastomosirt weit unregelmässiger mit seinem oberen und unteren Nachbar, und verliert sich in den Muskeln und der Haut des Nackens und Rückens.

Da das eigentliche Rückenmark nur bis zum ersten oder zweiten Lendenwirbel herabreicht, wo es mit dem Markkegel aufhört, so werden nur die Wurzeln der Hals- und Brustnerven nach kurzem Verlaufe (welcher für die Halsnerven quer, für die Brustnerven aber schief abwärts gerichtet ist) ihre Foramina intervertebralia erreichen; die Nervi lumbales, sacrales, und coccygei dagegen, deren Austrittslöcher sich immer mehr vom Ende des Rückenmarks (Markkegel) entfernen, müssen einen entsprechend langen Verlauf im Rückgratskanal nach abwärts nehmen, um an ihre Austrittslöcher zu gelangen. So geschieht es, dass vom 1. oder 2. Lendenwirbel an, der Rest des Rückgratskanals nur von den nach abwärts eilenden Lenden- und Kreuznerven eingenommen wird, welche, ihres parallelen und wellenförmigen Verlaufes wegen, schon in den Büchern des alten Testaments mit einem Pferdeschweif verglichen wurden, welche Benennung ihnen fortan beigelegt wird (cauda equina).

Da am Conus medullaris das Rückenmark sich zuspitzt, so müssen die vorderen und hinteren Wurzeln der zwei letzten Spinalnerven sehr nahe an einander liegen, und scheinbar zu einem einstämmigen Ursprung verschmelzen.

Die harte Hirnhaut schliesst sich nicht in gleicher Höhe mit dem Markkegel der Medulla spinalis ab, sondern erstreckt sich als Blindsack bis zum 2. oder 3. falschen Kreuzwirbel. Die Nervi lumbales und coccygei werden deshalb eine längere Strecke im Sacke der harten Hirnhaut verlausen, als die übrigen Spinalnerven.

Die Ganglia der Hals-, Brust- und Lendennerven liegen in ihren Zwischenwirbellöchern, die der Kreuznerven aber noch im Wirkelkanale, dicht unter dem Blindsack der harten Hirnhaut; das Knötchen der Nervi coccygei sogar noch innerhalb der Dura mater.

Die Stärke der Nervi spinales richtet sich nach der Menge der Theile, welche sie versorgen. Die unteren Cervicalnerven, welche die oberen Extremitäten, — und die Nervi sacrales, welche die unteren versehen, werden deshalb markiger als die oberen Halsnerven, die Brust- und Lendennerven sein. Die Nervi sacrales sind absolut die kräftigsten, die Nervi thorneles die schwächsten. — Sehr oft sind die hinteren Wurzeln der Halsnerven wieß beiden Seiten nicht congruent; — ein Wurzelfaden spaltet sich zuweiß

zwei Fädchen, von welchen eines sich an die hintere Wurzel des nächstfolgenden Nerven begiebt. — Die an den hinteren Wurzeln ausnahmsweise vorkommenden kleinen Knötchen sind von mir als Ganglia aberrantia beschrieben worden.

Ueber das Verhältniss der Fasern der sensitiven und motorischen Wurzel eines Rückenmarksnerven zur weissen und grauen Masse des Rückenmarks lehrt das Mikroskop:

- Die Fasern der vorderen, motorischen Wurzeln durchbrechen die longitudinalen Fasern der weissen Substanz in querer Richtung, und treten in die vorderen Hörner der grauen Substanz. In diesen verfolgen sie einen zweifachen Verlauf.
- a) Die innersten derselben gehen, zwischen den Ganglienzellen der Vorderhörner durch, in jene longitudinalen Fasern der Vorderstränge über, welche sich an der sogenannten weissen Commissur mit den entgegengesetzten kreuzen. Der rechte Vorderstrang z. B. wird somit einen Theil der Fasern der linken motorischen Nervenwurzeln aufnehmen.
 - β) Die äusseren Fasern der motorischen Wurzeln gehen, ohne Kreuzungen einzuleiten, in die longitudinalen Fasern der vorderen Bündel der Seitenstränge über.
- 2. Die Fasern der hinteren sensitiven Wurzeln, treten in die graue Substanz der hinteren Hörner, und krümmen sich daselbst theils bogenförmig nach aufwärts, um in die longitudinalen Fasern der Hinterstränge und der hinteren Bündel der Seitenstränge überzugehen, theils treten sie gerade in die graue Centralmasse des Kernstranges ein, wo sie wahrscheinlich sich mit den Aesten der Ganglienzellen in Verbindung setzen.

§. 304. Die vier oberen Halsnerven.

Die acht Halsnerven, von welchen der erste zwischen Atlas und Hinterhauptbein, der achte zwischen dem siebenten Halswirbel und ersten Brustwirbel austritt, bilden mit ihren vorderen Aesten die im vorigen Paragraphe erwähnten Schlingen unter sich und mit dem ersten Brustnerven. Die vier oberen Schlingen setzen den Plexus cervicalis, die vier unteren den Plexus brachialis zusammen. Die vier oberen Halsnerven (von welchen der erste, seines Austrittes zwischen Atlas und Hinterhauptbein wegen, auch Nervus suboccipitalis genannt wird) richten sich, hinsichtlich ihres Ursprunges und Verlaufes, nach dem allgemeinen Typus der Spinalnerven. Nur der erste und zweite weichen darin von ihm ab, dass die hinteren Wurzeln derselben schwächer als die vorderen sind, und ihre hinteren Zweige bei weitem mächtiger, als ihre vorderen erscheinen. Der hintere Zweig des ersten Halsnerven geht über den hinteren Halbring des Atlas zu dem dreieckigen Raum, welcher vom Rectus capitis posticus major, Obliquus superior et inferior begrenzt wird versorgt, nebst der tiefen Schicht der Nackenmuskeln, auch den und Complexus.

Er wird Nervus infraoccipitalis genannt. Der hintere Zweig des zweiten Halsnerven geht am unteren Rande des Obliquus inferior zu allen Nackenmuskeln, mit Ausnahme des Cucullaris, und steigt, nachdem er letzteren durchbohrte, mit der Arteria occipitalis zum Hinterhaupt empor, wo er sich bis zum Scheitel hinauf als Nervus occipitalis magnus in der Haut verästelt. Die hinteren Aeste der übrigen sechs Halsnerven erhalten keine besonderen Namen, und vertheilen ihre Zweige in sämmtlichen Muskeln und der Haut des Nackens.

Die vorderen Zweige der acht Halsnerven (von welchen der erste zwischen Rectus capitis anticus minor und lateralis, die sieben übrigen zwischen dem vorderen und hinteren Intertransversarius austreten) wenden sich vor oder zwischen den Fascikeln des Scalenus medius und Levater scapulae nach vorn und aussen, und setzen, wie oben gesagt wurde, durch ihre auf- und absteigenden Verbindungsschlingen, die vier oberen den Plezus cervicalis, die vier unteren den Plezus brachialis zusammen.

Der Plexus cervicalis giebt folgende Aeste ab:

- a) Verbindungsnerven zum Ganglion cervicale primum des Sympathicus, drei bis vier an der Zahl.
- b) Aehnliche zum Plexus nodosus nervi vagi, zum Accessorius Willisii, zum Stamme des Nervus hypoglossus, und zu seinem Ramus descendens. Letztere stammen aus der zweiten und dritten Schlinge, und bilden mit dem Ramus descendens hypoglossi die Halsnervenschlinge Ansa cervicalis.
- c) Muskeläste für die Scaleni, den Longus colli, Rectus capitis anticus major, und Levator scapulae.
- d) Den Nervus occipitalis minor, welcher am hinteren Rande der Insertionsstelle des Sternocleidomastoideus zum Hinterhaupte geht, um sich mit dem Nervus occipitalis major und auricularis posterior zu verbinden.
- e) Den Nervus auricularis magnus, welcher über die aussere Seite des Kopfnickers bogenförmig zur Parotis aufsteigt, wo er durch seinen vorderen Ast mit dem Communicans faciei, durch seinen hinteren mit dem Nervus occipitalis minor und auricularis profundus anastomosirt, und in der Haut und in den Muskeln des Ohres sich auflöst.
- f) Die Nervi cervicales cutanei, 5—6, von welchen die oberen zwei sich mit dem Subcutaneus colli vom Communicans verslechten, und, über den Kopsnicker nach oben und unten laufend, in der Haut der vorderen und seitlichen Halsgegend ihre Enden sinden; die unteren 3—4 am hinteren Rande des Kopsnickers zur Schulter herablausen, und sich in der Haut der vorderen seitlichen Brustgegend, so wie in der Schulterblattgegend vertheilen. Die zum Schulterblatt ziehenden Zweige versorgen auch den Cueullaris, Levator scapulae, und den Ursprungsbauch des Omohvoideus.
- g) Den Nervus phrenicus, Zwerchfellsnerv, welcher aus der vierten, zuweilen auch aus der dritten Ansa sich construirt, vor dem Scalenus anticus schräg nach innen zur oberen Brustapertur geht, auf diesem Wege-

durch wandelbare Anastomosen mit dem Plexus brachialis, Ganglion cervicale medium et infimum verstärkt wird, an der äusseren Seite der Arteria mammaria interna, zwischen Vena anonyma und Arteria subclavia in den Thorax gelangt, wo er zwischen Pericardium und Pleura zum Zwerchfelle, ohne fernere Astbildung, herabsteigt, und sich in dessen Pars costalis, und mittelst durchbohrender Zweige auch in der Pars lumbalis verästelt. Seine Endäste verbinden sich an vielen Stellen mit dem Zwerchfellgeslecht des Sympathicus, und bilden in der Substanz des Zwerchfells den Plexus phrenicus, in welchem ein grösseres, hinter dem Foramen pro vena cava liegendes, und mehrere kleinere Ganglien vorkommen. Er wurde von Ch. Bell innerer Rumpfathmungsnerv, Nervus respiratorius thoracis internus, genannt.

Luschka hat in seiner Monographie des Phrenicus, Tübingen, 1853, Aeste des Phrenicus zur Thymus, zur Pleura, zur Vena cava ascendens, zum Peritoneum, so wie Verbindungen des Plexus phrenicus mit dem Plexus solaris, hepaticus, und suprarenalis nachgewiesen.

Ueber einzelne Halsnerven handeln: J. Bang, nervorum cervicalium anatome, in Ludwig, scriptores neurol. Tom. I. — Th. Asch, de primo pare nervorum med. spin. Gött., 1750. 4. — G. F. Peipers, tertii et quarti nervorum cervicalium descriptio. Halae, 1793. 4. — W. Volkmann, über die motorischen Wirkungen der Halsnerven. Müller's Archiv. 1840, pag. 475.

§. 305. Die vier unteren Halsnerven.

Die vier unteren Halsnerven bilden, nachdem sie zwischen dem vorderen und mittleren Scalenus oberhalb der Arteria subclavia in die Fosse supraclavicularis gekommen sind, durch die schlingenformige Vereinigung ihrer vorderen Zweige untereinander und mit den ersten Brustnerven, den Plexus brachialis, Armnervengeflecht, welches in ein kleineres, über dem Schlüsselbeine — und ein grösseres, unter dem Schlüsselbeine gelegenes Stück abgetheilt wird.

- A. Aus der Pars supraclavicularis, welche im Grunde der Fossa supraclavicularis liegt, und vom Platysma myoides, der tiefen Fascia colli, und dem Clavicularbauch des Kopfnickers bedeckt wird, entspringen:
- a) Muskeläste sur den Musculus subclavius und den Musculus supra- et infraspinatus. Letztere gehen durch die Incisura scapulae am oberen Schulterblattrande.
- b) Die Nervi thoracici anteriores et posteriores. Die zwei anteriores gehen unter der Clavicula zum Musculus pectoralis major, minor, und deltoides; die 2—3 posteriores durchbohren nach hinten gehend den Scalenus medius, und suchen den Musculus levator scapulae, rhomboideus und serratus posticus superior auf. Einer von ihnen ist durch Grösse und Länge ausgezeichnet (Nervus thoracicus longus), geht zwischen Musculus subscapularis und serratus anticus major an der Seitenwand des Thorax herab, um sich in letzterem Muskel zu verästeln. Er wurde von Ch. Bell Nervus respiratorius thoracis externus inferior genannt.

- c) Die drei Nervi subscapulares zum Muskel desselben Namens, sum Latissimus dorsi, und Serratus posticus inferior.
- B. Die Pars infraclavicularis des Armnervengeslechts umstrickt die Arteria swilleris mit drei gröberen Nervenbündeln, welche der äusseren, inneren und hinteren Seite des Gestisses anliegen, und durch einen vor der Arterie schräg weggebenden Verbindungsast zusammenhängen. Folgende Aeste entspringen aus ihr:
- a) Der Nervus cutaneus brachii internus. Er stammt gewöhnlich aus dem ersten Brustnerv, geht hinter der Achselvene herab, verbindet sich in der Regel mit einem Aste des zweiten (östers auch des dritten) Brustnerven, durchbohrt die Fascia brachii in der Mitte der inneren Oberarmseite, und verliert sich als Hautnerv bis zum Ellbogengelenk herab.
- b) Der Nervus cutaneus brackii medius. Er entspringt vorzugsweise aus dem ersten Brustnerven, liegt in der Achsel an der inneren Seite der Vena axillaris, und weiter unten an derselben Seite der Vena basilica, mit welcher er die Fascia brackii durchbohrt, und sich hierauf in den Ramus cutaneus palmaris und ulnaris theilt. Ersterer geht über oder unter der Vena mediana zum Vorderarm, und in dessen Mitte bis zur Handwurzel herab; letzterer begleitet die Vena basilica an der Ulnarseite des Vorderarms bis über den Carpus.
- c) Der Nervus cutaneus brachii externus s. musculo-cutaneus. Er is stärker, als die beiden anderen Cutanei, durchbohrt den Musculus coracebrachialis von innen nach aussen, theilt diesem Muskel, dem Biceps und Brachialis internus motorische Zweige mit, läuft im Sulcus bicipitalis externus gegen die Plica cubiti, durchbohrt die Fascia brachii zwischen Biceps und Ursprung des Supinator longus, und begleitet die Vena cephelica bis zum Handrücken, wo er mit dem Nervus radialis superficishi anastomosirt. Ein feiner Zweig dringt in die Markhöhle des Oberarmbeins ein (Beck).
- d) Der Nervus axillaris s. circumflexus, welcher mit der Arteris circumflexa posterior den Oberarmknochen unter dem Caput humeri ungreift, einen Hautast zur hinteren Seite des Oberarms, und Muskelzweige zum Teres minor und Subscapularis sendet, und in das Fleisch des Deltamuskels von innen her eindringt.
- e) Der Nervus medianus, Mittelarmnerv. Er setzt sich aus Bündeln des 6., 7. und 8. Halsnerven zusammen, welche, bevor sie sich vereinigen, die Arteria axillaris umgreisen. Im Sulcus bicipitalis internus herablausend, liegt er an der vorderen Seite der Arteria brachialis, geht aber ober dem Ellbogen über die Arterie weg an ihre innere Seite, wird in der Plica cubiti von der Aponeurose des Biceps bedeckt, geht unter dem Pronator teres und Radialis internus (die Muskeln der ersten Vorderarmschicht ohne den Ulnaris internus mit Zweigen versorgend) zur Medianlinie des Vorderarms, und zieht zwischen dem hoch- und tiesliegenden Fingerbeuger unter dem Ligamentum carpi transversum zur Hohlhand, wo

er sich in vier Hohlhandnerven der Finger, Nervi digitorum volares, spaltet. Der erste ist nur für die kleinen Muskeln und die Radialseite des Daumens, die folgenden drei für zwei einander zusehende Seiten des Daumens und der drei nächsten Finger bestimmt. Auf seinem Laufe erzeugt er:

- a) Einen Verbindungsset für den Nervus cutaneus externus. Fehlt zuweilen oder wird doppelt.
- β) Den Nervus interesseus internus, welcher in der Tiefe zwischen Flexor digitorum profundus und Flexor pollicis longus, beiden Aeste zusendend, auf dem Ligamentum interesseum zum Pronator quadratus herabzieht.
- γ) Den Nervus cutaneus antibrachii palmaris, welcher in der Mitte des Vorderarmes die Fascia antibrachii perforirt, um neben der Sehne des Palmaris longus als Hautnerv zur Hohlhand zu verlaufen.
- f) Der Nervus ulnaris, Ellbogennerv. Er construirt sich aus allen Nerven des Plexus brachialis, und vorzugsweise aus dessen innerem Bündel, liegt anfangs hinter der Arteria und Vena axillaris, und später hinter dem Ligamentum intermusculare internum, und am Ellbogen zwischen Condylus internus und Olekranon, durchbohrt nun den Ursprung des Ulnaris internus, lagert sich zwischen diesem Muskel und dem tiefen Fingerbeuger, theilt beiden Aeste mit, und zieht mit der Arteria ulnaris, an deren innerer Seite er liegt, zum Carpus. Auf diesem Wege versorgt er auch durch einen die Fascia antibrachii perforirenden Hautast die innere Seite des Vorderarms.

Ueber dem Carpus spaltet er sich in den Rücken- und Hohlhandast.

- a) Der Rückenast ist schwächer, drängt sich zwischen der Sehne des Ulnaris internus und dem Capitulum ulnae auf die Dorsalseite der Hand, wo er die Fascia durchbohrt, die Haut mit unbeständigen Zweigen versieht, und sich in der Regel in fünf Rückennerven der Finger Nervi digitorum dorsales theilt, welche an beide Seiten des kleinen und Ringfingers, und an die Radialseite des Mittelfingers treten.
- b) Der Hohlhandast geht zwischen Os pisiforme und Arteria ulnaris über dem Ligamentum carpi transversum, vom Palmaris brevis bedeckt, zur Vola manus, wo er in einen oberflächlichen und tiefen Zweig gespalten wird. Ersterer geht mit drei Aesten zu jenen Fingern, welche vom Nervus medianus nicht versehen wurden (beide Seiten des kleinen Fingers, und Ulnarseite des Ringfingers), und anastomosirt mit dem vierten Ramus volaris des Medianus über den Beugesehnen; letzterer senkt sich zwischen den Ursprüngen des Abductor und Flexor digiti minimi in die Tiefe der Hohlhand, und versorgt, bogenförmig unter den Beugesehnen gegen den Radialrand der Hand gerichtet, die Musculatur des kleinen Fingers, die Musculi interossei, lumbricales, und den Adductor pollicis.
 - g) Der Nervus radialis, Armspindelnerv. Er sammelt seine Fä-

den aus den drei unteren Halsnerven, liegt unter allen Aesten des Plexus brachielis am meisten nach hinten, und ist der stärkste von ihnen. Er geht zwischen dem äusseren und inneren Kopfe des Triceps um die hintere Seite des Oberarmknochens herum nach aussen (daher the spiral nerv der Engländer), und liegt hierauf zwischen dem Brachialis internus und dem Ursprunge des Supinator longus. Auf diesem Laufe giebt er dem Triceps, Brachialis internus und Supinator longus Zweige, und sendet zwischen Condylus externus humeri und Olekranon, den Nervus cutaneus antibrachii externus ab. — Vor dem Condylus externus theilt sich der Stamm des Nervus radialis in zwei Zweige:

- α) Der tiefe Speichennerv durchbohrt den Supinator brevis, gelangt dadurch an die äussere Seite des Vorderarms, und verliert sich als reiner Muskelnerv in sämmtlichen hier untergebrachten Muskeln. Sein längster und tiefster Ast ist der Nervus interosseus externus, welcher bis zu den Weichtheilen des Handgelenks herabsteigt.
- β) Der hochliegende Speichennerv ist schwächer als der tiefe, legt sich an die äussere Seite der Arteria radialis, mit welcher er xwischen Supinator longus und Radialis internus herabläuft. Im unteren Drittel des Vorderarms geht er, zwischen der Sehne des Supinator longus und der Armspindel, an die Dorsalseite des Carpus, wo er sich in zwei Aeste theilt, von welchen der vordere mit den Endzweigen des Nervus cutaneus externus anastomosirt, und als Rückennerv des Daumens (für die Radialseite desselben) endigt. Der hintere versorgt die übrigen Finger, welche vom Rückenast des Nervus ulnaris unbetheilt blieben. Er anastomosirt mit letzterem durch eine oder mehrere Schlingen, so dass die Rückennerven des Mittel- und Ringfingers bald mehr vom Radialis, bald mehr vom Ulnaris abstammen.
- A. Murray, nervorum cervicalium cum plexu brach. descriptio. Upsal., 1794. 4. F. Krüger, diss. de nervo phrenico. Lips., 1758. 4. H. Kronenberg, plexuum nervorum structura et virtutes. Berol., 1836. 8. J. J. Klint, de nervis brachii, in Ludwig scriptores neurol. T. III. Camus, sur la distribution des nerfs dans la main. Arch. gén. de méd. 1845.

§. 306. Brust- oder Rückennerven.

Die zwölf Brust- oder Rückennerven (Nervi thoracici s. dorseles), von welchen der erste zwischen dem ersten und zweiten Brustwirbel, der zwölfte zwischen dem letzten Brustwirbel und ersten Lendenwirbel hervortritt, richten sich nach den allgemeinen Ursprungs- und Verästlungsgesetzen der Rückenmarksnerven. Der erste Brustnerv ist der stärkste von allen; die folgenden nehmen bis zum neunten an Stärke, obwohl nicht gleichsormig ab, und gewinnen vom neunten bis zum zwölften neuerdings an Dicke. Der auf das Ganglion intervertebrale folgende Stamm jedes Brustnerven ist kurz, und theilt sich schon am Ausgange des Foramen inter-

vertebrale in einen stärkeren vorderen, und schwächeren hinteren Ast. Die Verbindungsfäden zum nächstliegenden Ganglion des Sympathicus sind an den oberen und unteren Brustnerven häufig doppelt.

Die hinteren Aeste treten zwischen dem inneren und äusseren Rippenhalsband nach hinten, und zerfallen regelmässig in einen inneren und äusseren Zweig. Der innere liegt dem entsprechenden Wirbeldorne näher, und versieht die tiesen Muskeln des Rückens. Einzelne Zweige desselben durchbohren den Cucullaris und Latissimus dorsi, um sich in der Haut des Rückens zu verlieren. Der äussere dringt zwischen dem Longissimus dorsi und Sacrolumbalis durch, versorgt diese und die Levatores costarum, sendet dünne Zweige zur Haut des Rückens, welche vom achten bis zwölsten Brustnerv ziemlich mächtig sind, und nachdem sie den Latissimus dorsi, Cucullaris und Serratus posticus inferior persoriten, sich in der Haut des Rückens und der Lendengegend, bis zur Darmbeincrista herab, verästeln.

Die vorderen Aeste der zwölf Brustnerven begeben sich vor dem inneren Rippenhalsbande zu ihren entsprechenden Zwischenrippenräumen der letzte zum unteren Rande der zwölsten Rippe. Sie liegen mit der Arteria intercostalis zwischen den inneren und äusseren Zwischenrippenmuskeln, und werden allgemein als Zwischenrippennerven (Nervi intercostales) bezeichnet. Sie verbinden sich nicht wie die übrigen Rückenmarknerven durch auf- und absteigende Schlingen zu Plexus; - nur die drei bis vier oberen Intercostalnerven schicken einander zuweilen Verbindungsfäden zu. Im hintersten Theile des Zwischenrippenraums theilt sich jeder Intercostalnery in einen hoch- und tiefliegenden Zweig. Der hochliegende Zweig des ersten wird, wie oben angegeben, ein Theilnehmer am Plexus brachialis; die folgenden eilf durchbohren den Musculus intercostalis externus und die Muskeln an der Seitenwand der Brust (Serratus anticus major und Obliquus abdominis externus), und verlieren sich als Hautnerven (Nervi cutanei pectorales et abdominales). Der tiefliegen de Zweig setzt als Verlängerung des vorderen Astes seinen Lauf durch den Intercostalraum (wo er an dem unteren Rande der oberen Rippe hinzieht) fort, versieht die Musculi intercostales und den Triangularis sterni, und geht am Rande des Brustbeins durch den Pectoralis major zur Haut der vorderen Brustgegend. Da die Ursprünge der Brustmuskeln nur bis zur siebenten Rippe herablangen, jene der Bauchmuskeln die übrigen Rippen einnehmen, so werden die fünf unteren Intercostalnerven, welche, nachdem sie ihre Zwischenrippenräume durchlaufen haben, in die Bauchmuskeln und zuletzt in die Haut des Bauches übergehen, auch Nervi musculares abdominales genannt.

Die Nervi cutanei pectorales umgreisen mit ihren vorderen Aesten den unteren Rand des Pectoralis major, um zur Haut der Brustdrüsengegend und zur Brustdrüse selbst zu gelangen; die hinteren gehen an der inneren Wand der Achselhöhle nach hinten zur Haut der Schulterblatt- und Rücken-Lehrbuch der Anatomie. 5. Aus.

gegend. Der hintere Ast des zweiten und häufig auch des dritten Nervus cutaneus pectoralis, hilft den Nervus cutaneus brachis internus zusammensetzen.

C. G. Baur, de nervis anterioris superficiei trunci hum. Tub., 1818. 4.

— A. Murray, descriptio nervorum dorsalium, lumbalium et sacralium, cum plexu ischiadico. Upsal., 1796. 4.

§. 307. Lendennerven.

Die fünf Lendennerven (Nervi lumbales), von welchen der erste zwischen dem ersten und zweiten Lendenwirbel, der letzte zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem Kreuzbein auftaucht, nehmen von oben nach unten an Stärke zu. Ihre hinteren Aeste sind im Verhältnisse zu den vorderen schwach, und verlieren sich, wie die hinteren Aeste der Brustnerven, in äussere und innere Zweige gespalten, in den Rückenmuskeln und der Haut der Lenden- und Gesässgegend. Die 2""—3" starken vorderen Aeste hängen jeder mit einem Ganglion lumbale des Sympathicus zusammen, und vereinigen sich durch ab- und aufsteigende Schlingen zum Plexus lumbalis, dessen oberer Theil hinter dem Psoas magnus liegt, während dessen unterer kleinerer Abschnitt zwischen den Bündeln des genannten Muskels steckt. Der Plexus lumbalis erzeugt, nebst unbeständige Zweigen für den Psoas major, minor, und Quadratus lumborum, für gende Aeste:

- 1. Den Hüftbeckennerv Nervus ileo-hypogastricus. Er stammt vom ersten Nervus lumbalis, durchbohrt den Psoas major, streist über des Quadratus lumborum weg, persorirt den Transversus abdominis dicht über der Crista ossis ilei, und geht zwischen diesem und dem Obliquus internus bis über den Canalis inguinalis nach vorn, wo er entweder die Aponeurose des Obliquus externus durchbohrt, oder durch den Leistenschlitt derselben zur Haut des Schamberges gelangt. Er anastomosirt in der Regel, aber an wandelbaren Stellen, mit dem letzten Intercostalnerv (Nervus muscularis abdominis) und mit dem zweiten Aste des Plexus lumbalis.
- 2. Den Hüftleistennerv Nervus ileo-inguinalis. Er hat mit den früheren gleichen Ursprung, wird auch zuweilen von ihm abgegeben. Er steigt, nachdem er den Psoas major durchbohrte, auf der Fascia des Iliacus internus zum Poupart'schen Bande herab, über welchem er die Fascia transversa und den Musculus transversus durchbricht, um in den Leistenkanal einzudringen, und nachdem er ihn durchlausen, bei Mannern in der Haut des Gliedes und des Hodensackes, bei Weibern in der Haut der grossen Schamlippen zu endigen (Nervi scrotales et labiales anteriores).
- 3. Den Schamschenkelnerv, Nervus genito-cruralis. Er entsteht aus dem zweiten Lendennerv, und durchbohrt den Psoas major, auf dessen vorderer Fläche er herabsteigt. Er theilt sich bald höher bald tiefer in zwei Zweige: den Nervus spermaticus externus und den Nervus lumbo-

inguinalis, welche auch gesondert aus dem Plexus lumbalis entspringen können.

Der Nervus spermaticus externus, auch Nervus pudendus externus, sendet ein Aestchen mit der Vena cruralis an die Haut der inneren oberen Gegend des Oberschenkels, worauf er die hintere Wand des Leistenkanals durchbohrt, den Cremaster und die Dartos versieht, bis in den Fundus scroti mit dem Samenstrange herabgelangt, und in der Tunica vaginalis propria, dem Hoden und Nebenhoden endigt, wo er den Plexus spermaticus internus bilden hilft. Beim Weibe folgt er dem runden Mutterbande zum Schamhügel.

Der Nereus lumbo-inguinalis geht unter dem Poupart'schen Bande, dessen Verbindung mit dem tiefen Blatte der Fascia lata durchbohrend, an die Haut des Oberschenkels und der Leistenbeuge. Er ist im Manne bedeutender als im Weibe, und kreuzt sich in beiden Geschlechtern mit der Arteria circumflexa ilei.

- 4. Den vorderen äusseren Hautnerv des Oberschenkels, Nervus cutaneus femeris anterior externus. Er verläust, wie der Nervus genito-cruralis, zum Poupart'schen Bande herab, wo er dicht an dem oberen Darmbeinstachel die Verbindungsstelle des tiesen Blattes der Fascia late mit dem genannten Bande durchbricht, über den Kops des Sartorius sich nach aussen wendet, und nachdem er auch das hochliegende Blatt der breiten Schenkelbinde durchbohrte, an der äusseren Seite des Oberschenkels (vor dem Vestus externus) als Hautnerv bis zur Kniescheibe herab sich verästelt.
- 5. Den Verstopfungsnerv (besser Hüftlochnerv), Nervus obturatorius. Er wird aus Fasern des zweiten, dritten und vierten Lendennerven zusammengesetzt, geht hinter dem Psoas major zum kleinen Becken herab, an dessen Eingang er sich mit der Arteria und Vena iliaca communis (hinter welchen er niedersteigt) kreuzt; zieht hierauf an der Seitenwand der kleinen Beckenhöhle unter der Linea innominata, und von der Arteria und Vona obturatoria begleitet, nach vorn zum Canalis obturatorius, welchen er durchläuft, und dem Musculus obturator externus und internus Zweige mittheilt, worauf er sich in einen vorderen und hinteren Ast theilt, welche zwischen dem Adductor femoris magnus und brevis am Schenkel herabsteigen. Der hintere giebt einen Zweig zum Huftgelenk, und verliert sich als motorischer Nerv im Musculus obturator externus und adductor magnus; der vordere, stärkere versorgt den Pectineus, Gracilis, Adductor longus und brevis, durchbohrt zuletzt die Fascie lata, und verliert sich als Hautnerv an der inneren Seite des Oberschenkels bis zum Kniegelenk herab.
- 6. Den Schenkelnerv, Nervus cruralis s. femoralis. Er entwickelt sich durch Sammlung der Fasern der ersten bis dritten Lendenschlinge, und übertrifft an Stärke die übrigen Zweige des Plexus lumbalis. Anfänglich hinter dem Psoas major gelegen, lagert er sich weiter unten zwi-

schen Psoas und Iliacus internus, geht mit diesen durch die Lacuna muscularis aus dem Becken zum Oberschenkel, und theilt sich in der Fossa ilso-pectinea in Haut- und Muskeläste. Beide variiren an Zahl und Verlaussweise, besonders erstere.

Die Hautäste sind:

- a) Der Nervus perforans (Nervus cutaneus femoris medius), welcher den Sartorius und die Fascia lata im oberen Drittel des Oberschenkels durchbohrt, und häufig, in zwei Zweige gespalten, in der Mitte der Vordersläche des Oberschenkels herabsteigt.
- b) Der Nervus saphenus minor (Nervus cutaneus femoris internus), zieht auf der Scheide der Schenkelgestässe herab, durchbohrt die Fascis lata etwas über der Mitte des Oberschenkels, verbindet sich gewöhnlich mit dem vorderen Aste des Nervus obturatorius, und entsendet seine Zweige zur Haut der inneren Seite des Oberschenkels.
- c) Der Nervus saphenus major begleitet die Arteria cruralis (über deren vordere Peripherie er schräg nach innen herabsteigt, bis zur Durchbohrung der Sehne des Adductor magnus); legt sich dann in die Furche zwischen Vastus internus und Adductor magnus, in welcher er bis zur inneren Seite des Kniegelenks herabsteigt. Er ist während seines Laufes am Oberschenkel vom Sartorius und der Fascia lata bedeckt, und schickt zwei Zweige ab (den einen beiläufig in der Mitte des Oberschenkels, de anderen über dem Condylus internus femoris), welche durch die Fascis lata zur Haut treten, und, mit den übrigen Hautnerven des Schenkels anastomosirend, sich bis unter das Knie verbreiten. Hinter der Sehne des Sartorius durchbohrt nun der Stamm des Nervus saphenus selbst die breite Schenkelbinde, und steigt mit der Vena saphena interna zum Fusse herab. Auf diesem Laufe giebt er Hautäste an die innere Seite des Unterschenkels (Nervi cutanei cruris interni), und einen stärkeren Zweig zur inneren Seite der Wade (Nervus cutaneus surae internus), tritt vor dem inneren Knöchel zum inneren Fussrande, versorgt die Haut mit sensitiven Zweigen, und anastomosirt fast regelmässig mit dem inneren Aste des Nervus peroneus superficialis (§. 308), mit welchem er den inneren Rückennerv der grossen Zehe bildet.

Die Muskeläste, 6—8 an der Zahl, versorgen die Bewegungsorgane an der vorderen Peripherie des Oberschenkels, mit Ausnahme der Adductoren und des Gracilis, welche vom Nervus obturatorius betheilt wurden. Der längste derselben geht auf der Vagina vasorum cruralius zum Vastus internus herunter, und schickt auch einen Ast zur Kapsel des Kniegelenks.

Die Ursprünge der 6 Aeste des *Plexus lumbalis* werden, dem eben Gesagten zu Folge, aus dem 1., 2., 3. und theilweise dem 4. Nervus lumbalis abgeleitet. Der grössere Theil der Fasern des 4. und der ganze 5. Lendennerv werden in den sich an den *Plexus lumbalis* anschliessenden *Plexus saeralis* einbezogen, und zur Bildung der Aeste des letzteren in Anspruch genommen.

J. A. Schmidt, comment. de nervis lumbalibus eorumque plexu. Vindob., 1794. 4. — L. Fischer, descriptio anat. nervorum lumbalium, sacralium, et extremitatum inf. Lips., 1791. fol. — E. Styx, descriptio anat. nervi cruralis et obturatorii. Jenae, 1782. 4. — C. Rosenmüller, nervi obturatorii monographia. Lips., 1814. 4.

§. 308. Kreuznerven und Steissnerven.

Die fünf Kreuznerven — Nervi sacrales — und der Steissnerv - Nervus coccygeus — (ausnahmsweise die beiden Steissnerven). welche von oben nach unten an Stärke abnehmen, unterscheiden sich von allen übrigen Rückenmarksnerven dadurch, dass ihre Theilung in vordere und hintere Aeste, schon im Rückgratskanal stattfindet, und beide durch verschiedene Oeffnungen den Rückgratskanal verlassen. Die schwachen hinteren Aeste des ersten bis vierten Kreuznerven treten nämlich durch die Foramina sacralia postica, der sunste Kreuznerv und der Steissnerv durch den Hiatus sacro-coccygeus nach rückwärts aus, und verbinden sich durch zarte, auf- und absteigende, einfache oder mehrfache Anastomosen, zum schmalen und unanschnlichen Plexus sacralis posterior, aus welchem die den Ursprung des Glutaeus magnus durchbohrenden Hautnerven der Kreuz- und Steissgegend entspringen. Die ungleich stärkeren vor der en Aeste treten durch die Foramina sacralia anteriora und das Foramen sacro-coccygeum nach vorn in die kleine Beckenhöhle, und bilden durch auf- und absteigende Schlingen (Ansae sacrales) den Plexus sacro-coccygeus, welcher zwischen den Bündeln des Musculus pyriformis und coccugeus durchdringt, mit den vier Gangliis sacralibus und dem Ganglion coccygeum des Sympathicus zusammenhängt, den grössten Theil des vierten und den ganzen fünsten Nervus lumbalis in sich ausnimmt, und sich in drei untergeordnete Plexus theilt, welche, von oben nach unten gezählt, als Plexus ischiadicus, pudendalis, und coccygeus auf einander folgen.

- A. Der Plexus ischiadicus, Hüftgeslecht, liegt vor dem Musculus pyriformis, schräg von der vorderen Kreuzbeinsläche gegen das Foramen ischiadicum majus gerichtet. Er besteht aus dem, dem Plexus sacrococcygeus einverleibten Antheile des Plexus lumbalis, und den zwei oberen Ansae sacrales. Seine Aeste sind nur für die hintere Seite der unteren Extremität bestimmt, und sind folgende:
- a) Der obere Gesässnerv, Nervus glutaeus superior. Er geht in Begleitung der gleichnamigen Blutgefässe am oberen Rande des Musculus pyriformis durch das Foramen ischiadicum majus zum Gesässe, wo er sich in dem Musculus glutaeus medius, tertius, und Tensor fasciae verliert.
- h) Der untere Gesässnerv, Nervus glutaeus inferior, geht unter dem Musculus pyriformis mit der Arteria ischiadica durch das grosse Hüstloch zum Musculus glutaeus magnus.

- c) Der hintere Hautnerv des Oberschenkels, Nervus entaneus femoris posterior, welcher ebenfalls unter dem Musculus pyriformis zum Gesäss tritt, mit dem Nervus perinealis und glutaeus inferior anastomosirt, und seine Endzweige theils über den unteren Rand des Musculus glutaeus magnus zur Haut der Hinterbacke hinausschickt, theils selbe an der hinteren Seite des Oberschenkels herabgleiten lässt.
- d) Der Hüftnerv, Nervus ischiadicus, ist die eigentliche Fortsetzung des Plexus ischiadicus, und zugleich der stärkste Nerv des menschlichen Körpers. Seine Breite verhält sich zu seiner Dicke wie 5": 2". Er geht ebenfalls unter dem Musculus pyriformis (oder ihn durchbohrend) durch das grosse Hüftloch zum Gesäss, und steigt über die Auswärtsroller des Schenkels (Gemelli, Obturator internus, Quadratus femeris) zwischen Trechanter major und Tuberositas ossis ischii herab. Die vom Sitzknorren entspringenden Beuger des Unterschenkels bedecken ihn anfangs, bis er, ihrer Divergenz wegen, zwischen ihnen Platz greifen kann, wo er höher oder tiefer sich in zwei Zweige theilt, welche in der Kniekehle auseinander weichen, und ihres weiteren Verlaufes wegen, als Wadenbein- und Schienbeinner v unterschieden werden.
- a) Der Wadenbeinnerv, Nervus pereneus, zieht sich am inneren Rande der Sehne des Biceps femoris zum Köpschen des Wadenbeins herak und gieht zwei Hautnerven ab, welche als Nervus cutaneus surae externus et medius (der internus war ein Ast des Nervus saphenus major) die Fascia poplitea durchbohren, und in der Haut der Wade bis zur Achillessehne herab sich verbreiten. Hinter dem Köpschen des Wadenbeins theik sich der Nervus peroneus in einen oberstächlichen und tiesliegenden Ast, welche den Hals des Wadenbeins umgeben, und an die vordere Seite des Unterschenkels gelangen.

Der oberflächliche Ast, Nervus peroneus superficialis, durchbohrt, während er den Hals des Wadenbeins umgreist, den Musculus peroneus longus, welchem er, so wie dem brevis, einen Zweig mittheik. Etwas unter der Mitte des Unterschenkels durchbricht er auch die Fascia cruris, und theilt sich bald darauf in zwei Zweige, welche über die vordere Seite des Sprunggelenks zum Fussrücken herablaufen, wo sie als Nervus cutaneus pedis dorsalis medius et internus bezeichnet werden. Der medius verbindet sich mit dem aus dem Schienbeinsnerven entsprungenen Nervus suralis, — der internus mit dem Ende des Nervus saphenus major, und einem Endaste des Nervus peroneus profundus. Beide senden Zweige zur Haut des Fussrückens, und bilden zuletzt, durch gabelstrmige Spaltungen, sieben Zehenrückennerven — Nervi digitales dorsales — welche die innere Seite der grossen Zehe, die äussere der zweiten, beide Seiten der dritten und vierten, und die innere Seite der fünsten Zehe versorgen.

Der tiefliegende Ast, Nervus peroneus profundus, geht, nachdem er den Kopf des Musculus peroneus longus und extensor digiterum longus durchbohrte, in die Tiese auf das Zwischenknorpelband, gesellt sich zur Arteris tibialis antica (weshalb er auch Nervus tibialis anticus benannt wird), an deren äusseren Seite er liegt, dann aber, über sie weg, zu ihrer inneren Seite gelangt, und mit ihr zwischen Extensor digitorum longus und Tibialis anticus (weiter unten zwischen Extensor longus hallucis und Tibialis anticus) zum Sprunggelenk herabzieht. Hier geht er durch das mittlere Fach des Ligamentum cruciatum (noch immer von der Arteria tibialis antica, welche nun Arteria dorsalis pedis heisst, begleitet) zum Fussrücken, und zerfällt in zwei Endäste, den äusseren, und inneren. Ersterer ist sür den Extensor digitorum brevis bestimmt; letzterer verbindet sich mit dem aus dem Nervus peroneus supersicialis stammenden Nervus cutaneus pedis dorsalis internus, und versorgt mit zwei Zweigen die einander zugekehrten Seiten der grossen und der zweiten Zehe, welche vom Nervus peroneus supersicialis nicht berücksichtigt wurden.

Es hätten nun beide Seiten der fünf Zehen — nur die äussere Seite der kleinen Zehe nicht — ihre inneren und äusseren Rückennerven erhalten. Letztere wird nicht vom Nervus peroneus, sondern von einem Aste des Nervus tibialis, dessen Beschreibung folgt, mit einem äusseren Rücken-Zehennerv versorgt.

- β) Der Schienbeinnerv, Nervus tibialis, steigt in der Mittellinie der Fossa poplitea unmittelbar unter der Fascia poplitea herab, und kann bei mageren Individuen bei gestrecktem Knie nicht nur leicht gefühlt, sondern auch gesehen werden. Er dringt zwischen den beiden Köpfen des Gastrocnemius zur tiefen Schicht der Wadenmusculatur ein, wo er mit der Arteria tibialis postica, hinter dem Musculus tibialis posticus nach abwärts läuft, um unter dem inneren Knöchel bogenförmig zum Plattfuss zu gelangen, wo er sich (unter dem Sustentaculum cervicis tali) in den Ramus plantaris externus et internus theilt. Während dieses Laufes schickt er folgende Aeste ab:
 - 1. Den Nervus suralis. Dieser entspringt noch in der Kniekehle, zieht in der Furche zwischen beiden Köpfen des Gastrochemius herab, durchbohrt das hochliegende Blatt der Fascia surae, über oder unter dem Ursprunge der Achillessehne, gesellt sich zur Vena saphena posterior s. minor an der äusseren Seite der Achillessehne, verbindet sich mit dem Nervus cutaneus surae externus vom Nervus peroneus, geht unter dem äusseren Knöchel auf den Fussrücken, nimmt hier den Namen Nervus cutaneus pedis dorsalis externus an (der medius und internus waren Erzeugnisse des Nervus peroneus superficialis), vereinigt sich mit dem medius, und endigt, nachdem er die Haut der Ferse und des Fussrückens mit Zweigen versah, als letzter Nervus digitalis dorsalis an der äusseren Seite der kleinen Zehe.
 - 2. Unbeständige Zweige zur Kniegelenkkapsel und zu sämmtlichen Muskeln an der hinteren Seite des Unterschenkels.

- 3. Drei oder vier Hautnerven der Sohle.
- 4. Den Nervus plantaris internus, welcher zwischen dem Abductor pollicis und Flexor digitorum brevis nach vorn geht, diese Muskeln, so wie den ersten und zweiten Lumbricalis, versieht, und sich durch wiederholte Theilung in sieben Nervos digitales plantares auflöst, welche die Fascia plantaris durchbohren, und an beiden Seiten der drei ersten Zehen und an der inneren Seite der vierten Zehe sich verlieren. Er hat somit dasselbe Verhältniss zu den Zehen, wie der Nervus medianus zu den Fingern.
- 5. Den Nervus plantaris externus, welcher zwischen Flexor brevis digitorum und Portio quadrata Sylvii nach vorn zieht, und durch seine Verästlung dem Nervus ulnaris gleicht. Er theilt sich nämlich in einen hoch- und tiefliegenden Zweig. Ersterer giebt dem dritten und vierten Lumbricalis Aestchen, und zerfällt in drei Nervos digitales plantares für beide Seiten der kleinen Zehe und die äussere Seite der vierten. Letzterer begleitet den Arcus plantaris profundus, und verliert sich in den kleinen Muskeln der Sohle, und den inneren und äusseren Zwischenknochenmuskeln.
- B. Der Plexus pudendalis, Schamgeslecht, folgt auf den Plexu ischiadicus, dessen Anhang er vorstellt. Er liegt am unteren Rande & Musculus pyriformis, und löst sich in folgende Aeste aus:
- a) Der mittlere und untere Mastdarmnerv, Nervus haemerrhoidalis medius et inserior. Beide haben statt der den Nerven gewöhnlichen Walzensorm, das Ansehen gesiechtartiger Verkettung ihrer Faserbundel, und zerfallen, nachdem sie mit dem Beckengesiechte des Sympathicus zahreiche Verbindungen eingegangen haben, in einsache Zweige, welche des Levator ani, den Fundus vesicae urinariae, die Vagina, den Sphincter ani externus et internus, und die Haut der Astergegend versehen.
- b) Der Schamnerv, Nervus pudendus. Er geht durch das grosse Hustloch aus der Beckenhöhle heraus, und durch das kleine wieder in sie zurück, begleitet die Arteria pudenda communis an der inneren Fläche des aussteigenden Sitzbeinastes, und theilt sich in zwei Zweige: α) Der Mittelsleisch nerv, Nervus perinealis, zieht mit der Arteria perinei nach vom durch das Mittelsleisch, und schickt seine oberstächlichen Aeste zur Haut des Dammes, seine tieseren zu den Musculi transversi perinei, bulbocavernosus, sphincter ani externus (vorderer Theil desselben), und zuletzt zur hinteren Wand des Hodensacks (Nervi scrotales posteriores); im weiblichen Geschlechte zu den grossen und kleinen Schamlippen, und dem Vorhof der Scheide (Nervi labiales posteriores). β) Der Ruthennerv, Nervus penis dorsalis, steigt mit der Arteria penis dorsalis in der Furche zwischen dem Musculus bulbo- et ischio-cavernosus, letzterem einen Zweig mittheilend, bis unter die Schamsuge hinaus, legt sich in die Furche an der oberen Seite des Gliedes neben der Arteria penis dorsalis, sendet mehrere Remi

cavernosi in das Parenchym der Schwellkörper, welche die Plexus cavernosi verstärken, theilt der Haut des Gliedes und der Vorhaut Aeste mit, und verliert sich endlich in der Haut der Glans und im vorderen Ende der Harnröhre. Beim Weibe ist er ungleich schwächer, und für die Clitoris und das obere Ende der kleinen Schamlippen bestimmt.

- C. Der Plexus coccygeus, Steissgeslecht, hiegt vor dem Musculus coccygeus, und sendet 4-5 dünne Zweige zum Ursprunge des Sphincter ani externus, Levator ani, und zur Haut der Astergegend.
 - J. H. Jördens, descriptio nervi ischiadici. Erlangae, 1788. fol. F. Schlemm, observ. neurol. Berol., 1834. 4. (Ueber die Ganglien der Kreuzund Steissbeinnerven.) J. Halbertsma, über einen in der Membrana interossea des Unterschenkels verlaufenden Nerven. Müller's Archiv. 1847.

C. Vegetatives Nervensystem.

§. 309. Halstheil des Sympathicus.

Der Halstheil des Sympathicus, Pars cervicalis n. sympathici, wird von drei Ganglien (Ganglia cervicalia) und deren Verbindungssträngen zusammengesetzt. Der Hals-, Brust-, Bauch- und Beckentheil des Sympathicus werden zusammen als Grenzstrang bezeichnet.

- 1. Das obere Halsganglion, das grösste im Knotenstrange des Sympathicus, hat in der Regel eine länglich-ovale oder spindelförmige Gestalt, ist meistens etwas platt gedrückt, und variirt in seiner Grösse und Configuration so häufig, dass es die mannigfaltigsten Formen, von der einfach-cylindrischen bis zur eckig-verzogenen Anschwellung, annehmen kann. Seine Länge steht zwischen 8"—16", seine Breite zwischen 2"—3", seine Dicke nicht über 1½". Es liegt auf dem Musculus rectus capitis anticus major, vor den Querfortsätzen des zweiten bis vierten Halswirbels, hinter der Carotis interna, an der inneren Seite des Nervus vagus und hypoglossus, an deren Scheiden es durch kurzen Zellstoff innig angeschmiegt ist. Die Aeste, die es ausnimmt oder abgiebt, sind:
 - a) Communicationszweige zu den drei oder vier oberen Halsnerven (sie gehen von der hinteren Fläche des Knotens ab), zum Nervus hypoglossus, Ganglion jugulare, und Plexus nodosus des Vagus, und zum Ganglion petrosum des Nervus glosso-pharyngeus.
 - b) Gefässäste zur Carotis interna und externa, welche vom oberen Ende des Knotens aufsteigen, und im weiteren Verlaufe den Plexus caroticus internus bilden. Ihre Zahl steigt nie über zwei.
 - c) Zwei bis acht zarte Nervi molles, welche an der Carotis interna bis zur Theilungsstelle der Carotis communis herabsteigen, um in den Plexus caroticus externus überzugehen.
 - d) Zwei bis vier Rami pharyngo-laryngei. Sie lösen sich von der

inneren Peripherie des Knotens ab, und helfen mit den Ramis pharyngeis des Glossopharyngeus und Vagus, den Plexus pharyngeus bilden. Einer von ihnen geht eine Verbindung mit dem ausseren Aste des Laryngeus superior ein.

- e) Der Nervus cardiacus superior s. longus, langer Herznerv, welcher vom unteren Ende des Knotens entspringt, und an der inneren Seite des Stammes des Sympathicus zum Herznervengeslecht herabsteigt. Zuweilen leitet er mit den Herzästen des Vagus Verbindungen ein. Er entspringt zuweilen nicht aus dem Knoten, sondern aus dem Stamme des Sympathicus, verbindet sich unstät mit Reiserchen der Nervi laryngei, der Ansa cervicalis hypoglossi, und der beiden anderen Halsknoten, bietet eine plexusartige Verslechtung seiner Fasern mit mehr weniger zahlreich eingestreuten kleineren Knötchen dar, und ist selten auf beiden Seiten gleichmässig angeordnet.
- 1) Der Verbindungsstrang zum zweiten Halsknoten geht, als die Fortsetzung des unteren Knotenendes, auf dem Musculus rectus capitis anticus major bis zur Arteria thyreoidea inferior herab, liegt an der inneren und hinteren Seite des Vagus und der Carotis communis, und theilt sich ausnahmsweise, bevor er sich in das mittlere Halsganglion einsenkt, in zwei Zweige, welche die Arteria thyreoidea inferior gabelformig umgeben, und in das mittlere Halsganglion eintreten.
- 2. Das mittlere Halsganglion ist immer kleiner als das obere, liegt an der inneren Seite der Arteria thyreoidea inferior, und variirt in seiner Ausbildung noch weit mehr als das obere. Es geht Verbindungen mit dem fünten und sechsten Halsnerv, seltener mit dem Vagus und Phrenicus ein, sendet graue Fäden zum Plexus thyreoideus inferior, und den Nervus cardiacus magnus s. medius, grosser Herznerv (rechts hinter der Arteria anonyma, links hinter der Arteria subclavia), zum Herznervengeslecht. Sein Verbindungsstrang zum dicht unter ihm liegenden unteren Halsganglion ist regelmässig doppelt. Zwischen beiden geht die Arteria subclavia durch, welche vom vorderen Verbindungsstrange (der länger als der hintere ist), umgrissen wird, wodurch sie gleichsam in eine Schlinge (Ansa Vieussenii) zu liegen kommt. Zuweilen sehlt das mittlere Halsganglion.
- 3. Das untere Halsganglion liegt hinter der Arteria subclavia, zwischen dem Processus transversus des siebenten Halswirbels, und dem Halse der ersten Rippe. Es ist von unregelmässig-eckiger Gestalt (Ganglion stellatum), gewöhnlich grösser als das mittlere, liegt aber etwas auswärts von ihm, da der weitere Verlauf des Sympathicus durch die Brust, der Mittellinie der Wirbelsäule nicht mehr so nahe liegt, wie am Halse. Es giebt Aeste zur Arteria vertebralis und thyreoidea inferior, constante Verbindungszweige zu dem siebenten und achten Halsnerv und ersten Brustnerv, und wandelbare zum Vagus, Phrenicus und Laryngeus recurrens. Da es mit der Arteria subclavia in so innige Berührung kommt, schickt

es an alle aus diesem Gestsse entspringende Aeste graue Umspinnungssäden, welche Gestechte bilden. Sein wichtigster Ast ist der Nervus cardiacus parvus s. inferior zum Herznervengeslechte, welcher sich häusig mit dem Nervus cardiacus medius zu Einem Stamme — dem Nervus cardiacus crassus — vereinigt. Sein Verbindungsstrang mit dem ersten Brustknoten ist sehr kurz, oder sehlt auch wohl, indem beide Ganglien in eine einzige gangliöse Masse verschmelzen.

Der Bau der Ganglien des vegetativen Nervensystems stimmt mit jenem der Ganglien der Rückenmarksnerven überein. Sie bestehen, wie diese, aus Ganglienzellen, welche jedoch kleiner, gerundeter, und blasser sind, als in den Spinalganglien. Zwischen den Ganglienzellen laufen die eintretenden Aeste ununterbrochen in die austretenden fort, und es gesellen sich zu letzteren neue, aus den Ganglienzellen selbst entsprungene Fasern. Die Verbindungszweige (Rami communicantes), welche die sympathischen Ganglien von dem vorderen Aste der Rückenmarksnerven erhalten, sind theils Wurzeln der Ganglien, d. h. von den Rückenmarksnerven zu den Ganglien ziehend, theils Aeste derselben, d. h. von den Ganglien zu den Rückenmarksnerven gehend. Der Wurzelantheil der Rami communicantes schlägt in dem betreffenden Ganglion des Sympathicus eine doppelte Richtung ein — nach oben und unten, und geht in die Längenfasern des Grenzstranges über, in welchen er jedoch nicht verbleibt, sondern in die peripherischen Astbildungen desselben ausstrahlt.

Das für die Ganglien des Brust-, Bauch- und Beckentheils des Sympathicus aufgestellte Gesetz, dass jedem Foramen intervertebrale ein sympathischer Knoten entspricht, ist für den Halstheil, wo auf 8 Zwischenwirbellöcher nur drei Ganglia kommen, nicht anwendbar. Die Gültigkeit des Gesetzes wird nur dadurch einigermassen aufrecht erhalten, dass das Ganglion cervicale primum als eine Verschmelzung von vier, das medium et infimum als eine Verschmelzung von zwei Gangliis cervicalibus betrachtet werden kann. weilen werden zwischen den drei constanten Halsknoten noch Zwischenknötchen eingeschoben (Ganglia intermedia s. intercalaria), welche durch das Zerfallen eines normalen Halsknotens entstehen, und ein Annäherungsversuch zur Vermehrung der Ganglien auf die erforderliche Zahl sind. Die am ersten Halsknoten östers vorkommenden Einschnütrungen, und die dadurch bedingte tuberose Form desselben, haben dieselbe Bedeutung. Da jeder Rückenmarksnerv mit dem correspondirenden Ganglion des Sympathicus eine Verbindung eingehen muss, so muss der erste Halsknoten, der als Verschmelzung von mehreren Halsganglien erscheint (wodurch seine absolute und relative Grösse erklärlich wird) mit den 4 oberen Nervis cervicalibus, der mittlere mit dem 5. und 6., und der untere mit dem 7. und 8. Nervus cervicalis anastomosiren. Sind Ganglia intermedia vorhanden, so verbinden sie sich jedesmal mit dem nächsten Nervus cervicalis, wodurch auf die normalen Halsganglien weniger Anastomosen mit den Rückenmarksnerven kommen werden.

J. C. Neubauer, descriptio anat. nervorum cardiacorum. Francof., 1772. 4. — H. A. Wrisberg, de nervis arterias venasque comitantibus, in Comment. Gott., 1800. — A. Scarpa, tab. neurol. Ticini, 1794. fol.

§. 310. Brusttheil des Sympathicus.

Der Brusttheil des Sympathicus, Pars thoracica n. sympathici, liegt vor den Querfortsätzen der Brustwirbel und den Rippenhälsen, und besteht aus eilf Ganglien (Ganglia thoracica), welche an den oberen Rippen zwischen den Capitulis costarum, an den unteren nach aussen von diesen liegen, vom ersten bis zum sechsten an Grösse ab-, dann bis zum eilsten wieder zunehmen, eine flache, eckige, häufig dreiseitige Gestalt haben, durchwegs kleiner als die Halsknoten sind, und durch einfache oder (besonders an den oberen Knoten) doppelte Verbindungsstränge unter sich und mit den betreffenden Nervis intercostalibus zusammenhängen. ganze Ganglienkette des Bruststranges ist von der Pleura costalis bedeckt, und liegt somit ausserhalb des hinteren Mittelfellraums. Vom letzten Brustknoten wendet sich der Stamm des Sympathicus, nachdem er den ausseren Schenkel des Lendentheils des Zwerchfells durchbrochen (oder zwischen dem äusseren und mittleren Schenkel desselben durchgegangen ist), etwas nach einwärts, nähert sich in der Pars lumbalis der Mittellinie der Wirbelsäule wieder (wie am Halstheile), wodurch der Brusttheil des Sympathicus als eine nach aussen gerichtete Ausbeugung des ganzen Sympathicusstranges erscheint.

Aus den 5-6 oberen Brustganglien entstehen: 1. peripherische Nervenstrahlungen, welche die in der Brusthöhle vorkommenden Geflechte (Plexus cardiacus, aorticus, bronchialis, pulmonalis, oesophageus) versterken, 2. aus dem ersten Brustknoten ein durch seine Stärke ausgezeichneter Nervus cardiacus imus. - Die unteren Brustknoten schicken ihre peripherischen Zweige (Nervi splanchnici) nicht zu den Geslechten der Brusthöhle, sondern zu jenen der Bauchhöhle. Der Nervus splanchnicus major bezieht seine Fasern aus dem sechsten bis neunten Brustknoten (sehr oft auch aus dem fünsten). Sein Stamm geht nach ein- und abwärts, läuft vor den Vasis intercostalibus im hinteren Mittelfellraume herab, dringt zwischen dem mittleren und inneren Schenkel der Pars lumbalis diaphragmatis (selten durch den Hiatus aorticus) in die Bauchhöhle, und verliert sich im Plexus coeliacus. Der Nervus splanchnicus minor sammelt seine Elemente aus dem zehnten und eilsten Brustknoten, verläust wie der major, und senkt sich mit einem kleineren Faserzuge in den Plexus coeliacus. mit einem ansehnlicheren (Nervus renalis posterior s. superior) in das Nierennervengeflecht ein.

Nach Ludwig (Scriptores neurol. min. Vol. III. pag. 10.) und Wrisberg (Comment. Vol. I. pag. 261.) schickt das Herznervengesiecht in seltenen Fällen einen Faserantheil als Nervus splanchnicus supremus zum Plexus coeliacus, welcher durch Fäden des Vagus und einiger oberer Brustknoten verstärkt wird. — Das Ganglion thoracicum primum geht zuweilen mit dem secundum eine mehr weniger complete Verschmelzung ein. — H. Retzius, über den Zusammenhang der Pars thoracica nervi sympath. mit den Wurzeln der

Spinalnerven, in Meckel's Archiv. 1832. - J. J. Huber, de nervo intercost. etc. Gott., 1744. 4.

Lendentheil und Kreuzbeintheil des Sympathicus.

Der Lenden-Kreuzbeintheil des Sympathicus, Pars lumbo-sacralis n. sympathici, besteht aus fünf, zuweilen nur aus vier Lendenknoten (Ganglia lumbalia), eben so vielen Kreuzbeinknoten (Ganglia sacralia), und den sie zu einer continuirlichen Kette vereinigenden Zwischensträngen.

Die Lendenknoten liegen rechts hinter der Vena cava, links hinter und neben der Aorta abdominalis, am inneren Rande des Psoas major, sind kleiner als die Brustknoten, und hängen mit den Nervis lumbalibus durch lange, oft doppelte Verbindungsfäden zusammen, welche die Ursprunge des Psoas major durchbohren. Sie schicken peripherische Strahlungen zu den Geslechten der Bauchhöhle (Plexus renalis, spermaticus, aorticus und hypogastricus superior, — ausnahmsweise der erste und zweite Lendenknoten, auch zum Plexus mesentericus superior). Nach Arnold und Krause verbinden sich die rechten und linken Lendenknoten durch quer über die vordere Fläche der Wirbelsäule ziehende Fäden.

Die Kreuzbeinknoten nehmen nach unten an Grösse zusehends ab. und bilden, durch ihre Verbindungsstränge unter einander, eine am inneren Umfange der Foramina sacralia herablaufende Reihe, welche mit jener der anderen Seite an der concaven Fläche des Kreuzbeins nach unten convergirt, bis beide am Steissbein in einen unpaaren kleinen Knoten — Ganglion coccygeum impar s. Walteri, — übergehen. Die Kreuzbeinknoten senden, nebst den Verbindungszweigen zu den Nervis sacralibus, und den Communicationssaden der rechten und linken Ganglienreihe, noch Aeste zum Plexus hypogastricus inferior, — der Steissbeinknoten auch zum Plexus coccygeus.

Es ereignet sich nicht selten, dass das Ganglion coccygeum sehlt. und durch eine plexusartige oder einfach schlingenformige Verbindung der unteren Enden des Sympathicus (Arcus nervosus sacralis) ersetzt wird. — Die Verbindungsfäden zu den Rückenmarksnerven sind am Lenden-Kreuzbeintheil des Sympathicus häufig doppelt, treten nicht immer von den Knoten, sondern auch vom Stamme ab, an welchem zuweilen accessorische Ganglien beobachtet werden. Verschmelzung einzelner Ganglien zu einer länglichen Intumescenz kommt nicht selten, und zwar öster einseitig als symmetrisch vor. Am Kreuzbeintheile liegen die Ganglia sacralia dicht an den Stämmen der durch die Foramina sacralia anteriora hervorkommenden Kreuznerven an. Die Verbindungssäden der Kreuzknoten einer Seite sind zarter, als an irgend einem anderen Segmente des Sympathicus.

§. 312. Geslechte des Sympathicus.

Die im Hals-, Brust- und Bauchtheil des sympathischen Nervenstranges beschriebenen Knoten, welche deshalb auch Strangknoten des Sympathicus genannt werden, senden, wie schon im Vorausgegangenen bemerkt wurde, Strahlungen zu den die grossen Gefässe umstrickenden Nervengeflechten, Plexus, welche wieder aus Ganglien und deren peripherisch-verlaufenden Ramificationen bestehen. Die Plexus sind keine einfachen Erzeugnisse der Strahlungen der Strangknoten, indem an der Bildung mehrerer derselben (wahrscheinlich aller) die Gehirn- und Rückenmarksnerven entschiedenen Antheil haben. Die in den Plexus vorkommenden Knoten sind selbst wieder als Centra anzunehmen, in welchen neue Fasern entstehen, welche sich den von den Strangknoten herbeikommenden Fasen associiren. Diese Multiplication der Fasern in den Knoten der Geflechte ist um so nothwendiger, als die peripherischen Verästlungen der Plexus zu zahlreich sind, um sich auf die Wurzeln des Sympathicus aus den Rückenmarksnerven, oder auf die Strahlungen der Strangknoten zu den Gangtien der Geslechte reduciren zu lassen. Es muss in dieser Beziehung jedes Ganglion sich wie ein untergeordnetes Gehirn verhalten, welches neue Nervenelemente entwickelt, und den von anderen Entwicklungsstellen abstammenden coordinirt.

Die vom ersten Halsknoten entspringenden, mit der Carotis interna in die Schädelhöhle eindringenden grauen Nerven, so wie deren weitere Ramificationen und Verbindungen mit den Ganglien, welche an den Stämmen oder Aesten der Gehirnnerven vorkommen, werden auch als Kopftheil des Nerves sympathicus zusammengefasst. Da jedoch der Hals-, Brust- und Lenden-Kreuztheil des Sympathicus eine gewisse Uebereinstimmung in der Lagerung und Verbindung ihrer Ganglien darbieten, welche für den Kopftheil schwieriger nachzuweisen ist, so glaubte ich dem Bedürfnisse des Ansängers besser zu entsprechen, wenn ich die den Kopftheil des Sympathicus bildenden Ganglien und Verästlungen derselben in die Kategorie der Geslechte stelle.

§. 313. Kopfgeslechte des Sympathicus.

Sie sind der Plexus caroticus externus et internus.

1. Plexus caroticus internus.

Das obere spitzige Ende des ersten Halsknotens verlängert sich in einen ziemlich ansehnlichen, grauen, etwas platten Strang, welcher mit der Carotis interna in den Canalis caroticus eindringt, und sich im Kanale in zwei Aeste theilt, welche durch fortgesetzte Theilung und wiederholte Vereinigung ein Geslecht um diese Schlagader bilden (Plexus caroticus internus), welches sie sortan begleitet, und im Sinus cavernosus, durch welchen die Carotis interna passirt, Plexus cavernosus genannt wird, dessen Fäden sich über die Theilung der Carotis interna hinaus bis zur Arteria sossae Sylvii und Arteria corporis callosi versolgen lassen, wo sie, ihrer Feinheit wegen, aushören ein Gegenstand anatomischer Präparation zu sein. Im Plexus cavernosus sindet sich nicht ganz selten an der äusseren Seite der Carotis ein sternsürmiges, zuweilen durch ein engmaschiges Geslecht ersetztes Knötchen, welches Ganglion cavernosum s. caroticum genannt wird.

Aus dem Plexus caroticus internus treten von unten nach oben folgende Aeste hervor.

- a) Die Nervi carotico-tympanici, zwei an der Zahl, ein superior und inferior, beide sehr dünn. Der inferior geht durch ein Löchelchen in der hinteren Wand des Canalis caroticus; der superior geht an der inneren Mündung des Canalis caroticus durch ein zwischen diesem und der Pars ossea tubae Eustachii ausgegrabenes Kanälchen in die Paukenböhle zum Nervus Jacobsonii. (Er wird auch als Nervus petrosus profundus minor beschrieben.)
- b) Ein Verbindungsast zum Ganglion spheno-palatinum. Er wurde bei der Beschreibung dieses Knotens als Nervus petrosus profundus (im weiteren Verlaufe als unteres graues Bündel des Vidiannerv) bereits abgehandelt. Bezeichnet man den Nervus carotico-tympanicus superior als Nervus petrosus profundus minor, so muss b) als major gelten.

Aus dem Plexus cavernosus entspringen:

- a) Feine Verbindungssäden zum Ganglion Gasseri, zum Oculomotorius und Ramus primus trigemini, welche die äussere Wand des Sinus cavernosus durchbohren, um zu diesen Nerven zu gelangen.
- b) Zwei Fäden zum Nervus abducens, wo er die Carotis interna im Sinus cavernosus kreuzt. Einer von ihnen ist besonders stark, und galt früher, als man nur zwei Wurzeln des Sympathicus aus den Gehirnnerven ableitete, als Eine derselben. (Die andere war der Nervus petrosus profundus.)
 - c) Die Radix sympathica des Ciliarknotens, bereits erwähnt, §. 296.
 - d) 1-3 Verbindungsfäden zum Ganglion spheno-palatinum (Arnold).
- e) Verbindungszweige zum Gehirnanbang, welcher, da er unpaar ist, sich zum Kopstheil des Sympathicus wie das Ganglion coccygeum zum Lenden-Kreuztheil verhält, und die obere Vereinigungsstelle beider Sympathici repräsentirt. (Neuestens von Arnold bezweifelt.)
- f) Gefässnerven für die aus der Carotis interna entsprungene Arteria ophthalmica, welche mit haarfeinen Zweigen des Nervus naso-ciliaris und den inneren Nervis ciliaribus, den Plexus ophthalmicus zusammensetzen, aus welchem, wie allgemein angenommen wird, ein winziges Fädchen mit der Arteria centralis retinae in den Sehnerven eintreten soll. Es ist jedoch weder durch wirkliche Darlegung, noch durch mikroskopische Untersuchung bewiesen, dass es zur Faserschicht der Retina gelange, und scheint überhaupt mehr apriorisch zugelassen, als factisch erwiesen zu sein, indem man leicht der Annahme sich hingiebt, dass ein die Arteria ophthalmica umstrickendes Geflecht jedem Aste und Aestchen derselben, somit auch der Arteria centralis, einen Faden mitgebe.

Da die von dem *Plexus caroticus internus* und *cavernosus* abgegebenen Aeste, in verschiedenen Individuen einen verschiedenen Entwicklungsgrad zeigen, und ihrer absoluten Feinheit, so wie ihrer versteckten Lage wegen, zu den schwierigen Objecten der Neurotomie gehören, so wurden hier nur die constanten Aeste aufgeführt.

Mit Hilfe des Mikroskops lassen sich an den kleineren Verzweigungen der Arteria carotis interna sympathische Nervensäden erkennen. Ich besitze ein Präparat, wo der die Arteria corporis callosi begleitende Zug sympathischer Fasern, mit kleinen, sast mikroskopischen Knötchen eingesprengt erscheint, und ein an der Anastomose beider Balkenarterien querlausender Faden, die recht- und linkseitigen Gestechte in Verbindung bringt.

2. Plexus caroticus externus.

Dieses Geflecht kommt durch die Verkettung der vom ersten Halsknoten des Sympathicus entsprungenen Nervi molles zu Stande, welche theils an der Carotis interna bis zur Theilungsstelle der communis herabsteigen. theils direct zwischen der Carotis interna und externa zur letzteren gelangen. In der Gabel der Theilung der Carotis communis liegt östers das kleine Ganglion intercaroticum. Ist die Succession der Zweige der Carotis externa bekannt (siehe die Verästlungen der Carotis, §. 325), so bedürfen die Strahlungen des Plexus caroticus externus nur nominelle Erwähnung. Sie sind: der Plexus thyreoideus superior, lingualis, maxilleris externus, pharyngeus, occipitalis, auricularis posterior, maxillaris internus, und temporalis. Die Gehirnnerven, welche in der Nachbarschaft dieser Gestechte verlausen, verstärken sie durch Hilsszweige. - In den Fortsetzungen des Plexus caroticus externus kommen wandelbare Knötchen (Schaltknoten, Ganglia intercalaria) vor, welche, nach der Gegend, wo sie liegen, oder dem Organe, welchem sie angehören, verschiedene Namen erhalten: Ganglion pharyngeum (Mayer) — temporale (Faesebeck) — intercaroticum, etc.

Treffen diese Geslechte auf Ganglien, welche den Gehirnnerven angehören (Ganglion submaxillare, oticum, etc.), so verbinden sie sich mit ihnen durch Fäden, so dass jedes Kopfganglion auf diese Weise mit dem Sympathicus mittelbar verbrüdert wird.

Das Verfolgen der Gestässgeslechte und Aussinden der Ganglien wird wesentlich erleichtert, wenn eine Injection der Gestässe mit erstarrenden Massen vorausgeschickt wird. Unter den älteren Nervenpräparaten der Prage Sammlung (von Pros. Bochdalek und Prosector Gruber) finden sich zweischöne Fälle von Schaltknoten, der eine am Ursprunge der Arteria laryngen, der zweite an jenem der Arteria maxillaris interna. — Siehe serner B. Horn, reperta quaedam circa nervi sympath. anatomiam. Wirceb., 1840. 4.

§. 314. Halsgestechte des Sympathicus.

Die Halsgesiechte umgeben die in den Weichtheilen des Halses sich verzweigenden Arterien. Nebst dem Plexus pharyngeus und thyreoideus superior, welche aus dem Plexus caroticus externus und somit aus dem Ganglion cervicale primum stammten, gehören hieher:

a) Der schwache *Plexus laryngeus*, theils durch eine Fortsetzung des *Plexus thyreoideus superior*, theils durch Zweige der Laryngealäste des Vagus gebildet.

- b) Der *Plexus thyreoideus inferior*, durch Aeste des mittleren und unteren Halsknotens zusammengesetzt. Wandelbare Knötchen (von Andersch zuerst beobachtet) kommen nicht selten in ihm vor.
- c) Der *Plexus vertebralis* dringt mit der *Arteria vertebralis* in den Wirbelschlagaderkanal ein. Er bildet sich aus aufsteigenden Aesten des letzten Hals- und ersten Brustknotens, und ist viel zu stark, als dass er blos die Bedeutung eines Gesässgeslechtes trüge. Die zahlreichen und starken Anastomosen, welche er mit 4—6 unteren Halsnerven eingeht, lassen ihn vielmehr als eine Nervenbahn betrachten, durch welche Spinalnervenfasern dem Brusttheil des Sympathicus zugessührt werden.

Gangliose Anschwellungen kommen an der Verbindungsstelle des Plexus vertebralis mit dem 7. und 8. Halsnerven vor. — Die Stärke des Plexus vertebralis, seine regelmässige Verbindung mit den Halsnerven, und der Umstand, dass bei gewissen Thieren der freie Halstheil des Sympathicus fehlt, während der Plexus vertebralis in namhaster Entwicklung vorhanden ist, lassen ihn als tiefen Halstheil des Sympathicus bezeichnen.

§. 315. Brustgeslechte des Sympathicus.

Die Brustgeslechte gehören theils dem Gesassystem als Plexus cardiacus und aorticus, theils den Lungen und der Speiseröhre als Plexus pulmonalis und oesophageus an.

Der Plexus cardiacus erstreckt sich vom oberen Rande des Aortenbogens bis zur Basis des Herzens herab, und wird aus dem Nervus cardiacus superior, medius et inferior, so wie aus den Rami cardiaci des Nervus hypoglossus, vagus, und der obersten Brustknoten gebildet. Er umgiebt die Wurzel und einen Theil des Bogens der Aorta, und enthält am concaven Rande des Aortenbogens, über der Theilungsstelle der Arteria pulmonalis, ein einfaches oder doppeltes Ganglion (im letzteren Falle ist das rechte bedeutend grösser als das linke, was mit dem Vorkommen der Arteria innominata auf der rechten Seite zusammenzuhängen scheint), welches sehr weich, unregelmässig eckig, oder oblong, und 1"-2" lang ist, und gewöhnlich Ganglion cardiacum Wrisbergii s. magnum genannt wird, da ausnahmsweise auch kleinere nebenbei vorkommen. Das Herznervengeslecht sendet Zweige an die primitiven Aeste des Aortenbogens, an die Arteria pulmonalis, die Hohl- und Lungenvenen, und schickt mit den Arteriis coronariis des Herzens Verlängerungen in das Herzsleisch (Plexus coronarius cordis anterior et posterior), welche, nach Remak's Entdeckung, zahlreiche kleine, fast mikroskopische Knötchen enthalten.

Der Plexus aorticus geht theils aus dem cardiacus, theils aus den Strahlungen der obersten Brustknoten hervor, und begleitet die Aorta bis in die Bauchhöhle.

Der Plexus oesophageus und pulmonalis gehören vorzugsweise dem Brusttheile des Vagus an, und erhalten nur wenige sympathische Fäden aus den Herz- und Aortengeslechten, und den oberen Brustganglien.

§. 316. Bauch- und Beckengeslechte des Sympathicus.

Die Geslechte der Bauch- und Beckenhöhle gehören dem Stamme und den Verzweigungen der Bauchaorta an. Kein Gehirnnerv wird zu ihrer Bildung verwendet, wenigstens ist der Antheil des Vagus am Plexus coeliacus ein sehr untergeordneter. Sie sind im Allgemeinen dicht genetzt, und schliessen zahlreiche Ganglien ein. Man unterscheidet folgende:

a) Plexus coeliacus. Er ist das grösste und reichste Geflecht des Sympathicus, und wird durch beide Nervi splanchnici, durch die Fortsetzung des Plexus aorticus thoracicus, einen kleinen Antheil des Plexus gastricus posterior (vom Vagus), und von Fäden der zwei oberen Lendenknoten des Sympathicus gebildet. Er liegt auf der vorderen Aortenwand. dicht unter und vor dem Hiatus aorticus, umgiebt die Arteria coeliacs. ist somit unpaar, liegt jedoch nicht ganz symmetrisch, indem seine Ausdehnung nach rechts, jene nach links überwiegt. Die vielfache Kreuzung und Verkettung seiner Elemente, und die strahlige Richtung seiner Ausläuser rechtsertigt die ältere Benennung: Plexus solaris, Sonnengeflecht. Unter den gangliösen Anschwellungen, die er enthält, und deren Grösse vom Centrum des Geslechtes gegen die Peripherie desselben abnimmt, zeichnen sich zwei Anhäufungen von Ganglienmasse aus, welche an der Vordersläche der Lendenschenkel des Zwerchsells liegen, eine halbmondförmige, mit vielen Höckern und geschwänzten Anhängseln versehene Gestalt besitzen, ihre Concavitäten einander zukehren, und wohl auch durch einseitige oder beiderseitige Verschmelzung ihrer Hörner, eine Hufeisen- oder Ringgestalt annehmen. Sie sind, wenn sie getrennt bleiben, als Ganglie coeliaca, semilunaria, abdominalia maxima, wenn sie zu einer Masse verschmelzen, als Ganglion solare, Cerebrum abdominale s. Centrum nervesum Willisii bekannt.

Der Plexus coeliacus sendet folgende Strahlungen aus:

- α) den unpaarigen Plexus diaphraymaticus, welcher mit den Arteriis phrenicis inferioribus zum Zwerchfell geht,
- β) den Plexus coronarius ventriculi superior, welcher mit der Arteria coronaria ventriculi sinistra zum kleinen Magenbogen hinzieht,
- γ) den Plexus hepaticus, welcher, die Arteria hepatica umgebend, zur Leber und deren Zugehör tritt, zum Pankreas und Duodenum Zweige giebt, und zur unteren Kranzschlagader des Magens den Plexus coronstius ventriculi inferior ausschickt,
 - d) den Plexus lienalis, für die Milz und den Fundus ventriculi,
 - ε) den Plexus suprarenalis.
- b) Plexus mesentericus superior. Er ist unpaar, und theils eine Fortsetzung des Plexus coeliacus, theils des Plexus aorticus abdominalis, enthält weit weniger und kleinere Knötchen, als der Plexus coeliacus, und verbreitet sich mit der Arteria mesenterica superior, an deren Verlauf er gebunden ist, am Dünndarm und Dickdarm (mit Ausnahme des Rectum und Colon descendens).

- c) Plexus renales. Sie sind paarig, ganglienarm, aus Contingenten des Plexus mesentericus superior und aorticus zusammengesetzt, umspinnen die Arterias renales, und schicken einen Antheil zur Nebenniere (Plexus suprarenalis), welcher mit dem Plexus phrenicus und coeliacus anastomosirt.
- d) Plexus spermatici. Sie begleiten die Arteria spermatica interna auf ihrem langen Lause zum Hoden (Eierstock bei Weibern), entspringen aus dem Plexus aorticus und renalis, und enthalten Fäden vom Nervus spermaticus externus (aus dem Nervus genito-cruralis vom Plexus lumbalis) eingestreut.
- e) Plexus mesentericus inferior. Unpaar, versieht das Colon descendens und das Rectum, letzteres mit den sogenannten Nervis haemorrhoidalibus superioribus (der medius und inferior wurden vom Plexus pudendalis abgegeben).
- f) Plexus aorticus abdominalis. Er zieht mit weiten Maschen und Schlingen an der Bauchaorta herab, hängt mit allen vorausgegangenen Geflechten zusammen, bezieht seine Elemente vorzugsweise aus den Gangliis lumbalibus des Sympathicus, und geht in den Plexus hypogastricus superior über, welcher in der Gabel der Aortentheilung liegt, und die Vasa iliaca communia mit Zweigen betheilt. In der kleinen Beckenhöhle zerfällt er in die beiden
- g) Plexus hypogastrici inferiores, welche an den Seiten des Mastdarms liegen, durch Fäden der Ganglia sacralia und des Plexus pudendalis verstärkt werden, grössere und kleinere Knötchen in variabler Menge enthalten (Müller, Tiedemann), und folgende Nebengesiechte entsenden:
 - a) Plexus uterinus anterior et posterior. Sie liegen zwischen den Blättern des Ligamentum latum uteri. Die in das Gewebe des Uterus selbst eindringenden Fortsetzungen dieser Geslechte, sind mit kleinen Ganglien ausgestattet (Lee), welche, so wie die Geslechte, während der Schwangerschast an Grüsse zunehmen, und nach der Geburt wieder auf normale Dimensionen zurückkehren.
 - β) Plexus vesico-vaginalis zur Harnblase, Samenbläschen, Vas deferens, Prostata, (im Weibe zur Vagina).
 - γ) Plexus cavernosus. Er ist eine Fortsetzung des Plexus vesicalis, durchbohrt das Ligamentum pubo-prostaticum, gelangt dadurch an die Wurzel des Penis, und theilt sich in Zweige, von welchen die meisten den Anfangstheil der Schwellkörper durchbohren, um zu ihrem Parenchym zu gelangen, während die übrigen ein auf dem Rücken des Penis fortlaufendes Geflecht bilden, welches mit dem Nervus penis dorselis anastomosirt, und in seine letzten Filamente sich auflösend, vor der Mitte des Penis ebenfalls die Faserhaut des Schwellkörpers durchbohrt, um im Parenchym desselben unterzugehen. Im Weibe ist dieses Geflecht viel schwächer und für die Clitoris bestimmt. Es erscheint hier nur als Anhang des Plexus vesico-vaginalis.

Bei weitem die meisten der angeführten Geslechte enthalten hin und wieder kleine Ganglien.

Es leuchtet von selbst ein, dass, wenn man alle Geslechte aussuhrlich schildern wollte, welche zu den verschiedenen Organen des Körpers auslaufen, die engen Grenzen eines Lehrbuches bald überschritten sein würden. Dieses ist hier weder thunlich, noch überhaupt nöthig. Auch häusen sich die Varietäten so sehr, dass durch ihre Zusammenstellung wahrscheinlich mehr Verwirrung als Licht in den Gegenstand gebracht würde. Der Umstand, dass die Geslechte grösstentheils den Schlagaderverzweigungen solgen, giebt dem Schüler ein leichtes Mittel an die Hand, die Quellen anzugeben, aus welchen die Organe ihre sympathischen Geslechte ableiten.

G. C. Ludwig, de plexibus nervorum abdom. Lips., 1772. 4. — A. Wrisberg, de nervis viscerum abdom., in Comment. Vol. II. — J. G. Walter, tab. nervorum thoracis et abdom. Berol., 1784. fol. — Tiedemann, tabulae nervorum uteri. Heidelberg, 1822. fol. — J. Müller, über die organischen Nerven der Geschlechtsorgane etc. Berlin, 1836. 4. — A. Götz, neurologiae partium genitalium masculinarum prodromus. Erlangae, 1823. 4. — Beck and Lee, On the Nerves of the Uterus. Phil. Transact. Vol. 41 und 42. — R. Remak, über ein selbstständiges Darmnervensystem. Berlin, 1847.

§. 317. Literatur des gesammten Nervensystems.

Die neueste Literatur über die einzelnen Nerven ist in den betreffenden §§. der Nervenlehre angegeben.

Gesammte beschreibende Nervenlehre:

- C. F. Ludwig sammelte unter dem Titel Scriptores neurologici minores. IV Vol. Lips., 1791—1795, die besten Monographien einzelner Gehiraund Rückenmarksnerven.
- M. J. Langenbeck, Nervenlehre. Göttingen, 1831. Mit Hinweisung auf dessen Icones neurologicae. Fasc. I—III.
- J. Quain and W. E. Wilson, The Nerves, including the Brain and Spinal Marrow, and Organs of Sense. Lond., 1837. fol.
- J. B. F. Froment, traité d'anatomie humaine. Nevrologie. T. I. et II. Paris, 1846. 8. (Compilatorisch.)
- L. Hirschfeld und B. Léveillé, Nevrologie. Paris. Giebt Beschreibungen und Abbildungen des Nervensystems und der Sinnesorgane, mit Angabe der Praparationsmethode. Erscheint in Lieferungen. Bis jetzt 10.
- Der Icon nervorum von R. Froriep, Weimar, 1850, enthält auf Einer Tasel das gesammte Nervensystem dargestellt.

Eine vollständige Zusammenstellung älterer und neuerer Literatur bis zum Jahre 1841 findet sich in Sömmerring's Hirn- und Nervenlehre, umgearbeitet von G. Valentin.

Ueber die physiologischen Eigenschasten des Nervensystems siehe, nebst Valentin's und Müller's physiologischen Handbüchern, die Specialwerke von Ch. Bell, Magendie, Flourens, Marshall-Hall, und ganz besonders:

G. Valentin, de functionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici. Bera, 1839. 4. Longet, anatomie et physiologie du système nerveux. Paris, 1842. 2 Vol. Neue Aufl. 1845 (übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Hein), so wie die Meisterarbeit Volkmann's im Handwörterbuche der Physiologie, und Eckhard, Grundzüge der Physiologie des Nervensystems. Giessen, 1854.

Gehirn- und Rückenmark.

- F. J. Gall et G. Spurzheim, recherches sur le système nerveux en général et sur celui du cerveau en particulier. Paris, 1809—1819. 4 Vol. 4. 100 planches. fol.
- K. F. Burdach, vom Bau und vom Leben des Gehirns. Leipzig, 1819-1826. 4.
- S. Th. Sömmerring, de basi encephali et originibus nervorum. Gött., 1778.
- Ejusdem, quatuor hominis adulti encephalum describentes tabulas commentario illustravit E. d'Alton. Berol., 1830. 4.
- J. C. Wenzel, de penitiori structura cerebri et med. spin. Tubing., 1816. fol.
- F. Arnold, Tabulae anat. Fasc. I. Icones cerebri et med. spin. Turici, 1838. fol.
- F. Tiedemann, das Hirn des Negers mit dem des Europäers und Orang-Utangs verglichen. Heidelberg, 1837. 4.
- Stilling und Wallach, Untersuchungen über die Textur des Rückenmarks. Leipzig, 1842.
- Stilling, über die Medulla oblongata. Erlangen, 1853.
- Desselben, Untersuchungen über Bau und Verrichtungen des Gehirns. I. Jena, 1846.
- A. Förg, Beiträge zur Kenntniss vom inneren Baue des menschlichen Gehirns. Stuttgart, 1844. 8.
- R. B. Todd, The Descriptive and Physiol. Anatomy of the Brain, Spinal Cord etc. London, 1845.
- Freih. v. Bibra, vergl. Untersuchungen über das Gehirn des Menschen. Mannheim, 1853.
- P. Gratiolet, memoire sur les plis cérébraux de l'homme et des primatès.

 Paris, 1854, avec 13 planches.
- E. Huschke, Schädel, Gehirn, und Seele des Menschen. Jena, 1855. Mit 8 Tafeln Fol.
- H. Luschka, die Adergesiechte des menschlichen Gehirns. Berlin, 1855. Mit 4 Tafeln.

Ueber die Entwicklungsgeschichte des Gehirns handelt (ausser den in der allgemeinen Literatur angeführten Entwicklungsschriften) das noch immer classische Werk:

F. Tiedemann, Anatomie des Gehirns im Fötus des Menschen. 1816. 4.

Ueber die Functionen der Centralorgane des Nervensystems handeln:

- Marshall-Hall, Abhandlung über das Nervensystem. A. d. Engl. mit Erläuterungen und Zusätzen von Kürschner. Marburg, 1840.
- Stilling, Fragmente zur Lehre von der Verrichtung des Nervensystems, in Roser's und Wunderlich's med. Vierteljahrschrift. 1849. S. 9 seqq.
- Desselben Untersuchungen über die Functionen des Rückenmarks und der Nerven. Leipzig, 1842.
- Van Deen, traités et découvertes sur la physiologie de la moëlle épinière. Leide, 1842.
- Longet, recherches expérimentales et pathologiques sur les propriétés et les fonctions des faisceaux de la moëlle épinière et des racines des nerfs rachidiens. Paris, 1841.

Budge und Walter, neue Untersuchungen über das Nervensystem. Weimar, 1851.

Eckhard, Grundzüge der Physiologie des Nervensystems. Giessen, 1853.

Hirnnerven.

F. Arnold, icones nervorum capitis. Heidelberg, 1834. fol. Das beste und vollständigste Kupferwerk, da es durchaus nach eigenen Untersuchungen des Verfassers ausgeführt wurde.

Bidder, neurologische Beobachtungen. Dorpat, 1836. 4.

- G. F. Faesebeck, die Nerven des menschlichen Kopfes. Braunschweig. 2. Auflage. 1848. 4. mit 6 Tafeln.
- Aussätze von Valentin und Faesebeck in Müller's Archiv, 1837, 1839 und 1840. Sympathicus.
- C. G. Wutzer, de corp. hum. gangliorum fabrica atque usu. Ber., 1817. 4.

F. Arnold, Kopstheil des veget. Nervensystems. Heidelberg, 1830. 4.

- A. Scarpa, de nervorum gangliis et plexibus, in ejusd. Annot. anat. Lib. II.
- J. F. Lobatein, comment. de nervi sympathetici hum. fabrica, usu et morbis. Paris, 1834. 4.
- Th. Krause, synopsis icone illustrata nervorum systematis gangliosi in capite hominis. Hannoverae, 1839. fol.
- C. W. Wutzer, über die Verbindung der Intervertebralganglien und des Rückenmarks mit dem vegetativen Nervensystem, in Müller's Archiv. 1842. p. 424. Bidder und Volkmann, die Selbstständigkeit des sympathischen Nervensystems.

durch anatom. Untersuchungen nachgewiesen. 1842. 4. Leipzig.

C. A. Pieschel, de parte cephalica nervi sympathici. Lips., 1844. 8. (vom Pferde).

Ungeachtet des Umfangs der neurologischen Literatur, und der dankenswerthen Bereicherungen, welche der Fleiss der neuen Zergliederer diesem Zweige der anatomischen Wissenschaft zuwege brachte, ist die Physiologie des Nervensystems noch lange nicht zu jenem Grade von Exactheit gelangt, dessen sich so viele Argumente der Physiologie erfreuen, und welchen wir gerade bei diesem System so ungern vermissen. wenig Jahren hat sich eine Physiologie der Nervenwirkungen zu bilden begonnen, und man hat die Kunst erlernt, die Räthsel des Nervenlebens durch das Experiment zu lösen. Wo so viele Gelehrte, und auf so verschiedenen Wegen dem Einen Ziele nachstreben, kann es au Verschiedenheiten der Auslegungen und Ansichten nicht fehlen. Der schwächste Theil des Ganzen ist die Gehirn- und Rückenmarksanatomie, und so lange die Sammlungs- und Vereinigungsweise der Nerven in den Centralorganen nicht besser bekannt sein wird, als gegenwärtig, werden die Hypothesen nicht so leicht von ihrem Throne zu stossen sein. Wenn sich irgendwo der Nutzen und das Bedürfniss der vergleichenden Anatomie fühlbar macht, so ist es ganz vorzüglich in der Neurophysiologie, deren wissenschastliche Behandlung, selbst bei den beschränktesten und nur für die Schule wirkenden Tendenzen, ohne den Beistand dieser machtigen Verbundeten, eine reine Unmöglichkeit ist. -

SIEBENTES BUCH.

Gefässlehre.

•		
	•	

A. Herz.

§. 318. Allgemeine Beschreibung des Herzens.

Die Gesässlehre, Angiologia (àyyelov, Gesäss), umsasst die specielle Beschreibung sämmtlicher Theile des Gesässsystems: Herz, Arterien, Venen, und Lymphgesässe.

Das Herz, Cor, das Centralorgan des Gefässsystems, ist ein hohler, halbkegelformiger, an seiner hinteren (unteren) Seite abgeslachter, musculöser Körper, welcher in der Brusthöhle zwischen den concaven Flächen beider Lungen liegt, seine Basis nach oben, seine Spitze (Apex s. Mucro) nach links und unten richtet, eine vordere (obere) convexe, und eine hintere (untere) platte Fläche nebst zwei Seitenrändern besitzt. An der vorderen Fläche läuft eine Furche herab, welche nicht über die Spitze, sondern etwas rechts von ihr zur hinteren Fläche sich umbiegt, und an ihr bis zur Basis zurückläust - die Längenfurche des Herzens, Sulcus longitudinalis. Sie theilt ausserlich das Herz in eine rechte und linke Hälfte, und entspricht der in der Höhle des Herzens angebrachten longitudinalen Scheidewand. Sie wird durch die Ring-oder Querfurche (Sulcus circularis s. coronalis) rechtwinkelig geschnitten, welche an der hinteren Herzsläche besonders ausgeprägt ist, an der vorderen durch die Ursprünge der Arteria aorta und pulmonalis verdeckt wird. Die absolute Grösse des Herzens stimmt gewöhnlich mit der Grösse der Faust überein. Sein Gewicht beträgt im Mittel 20 Loth, seine grösste Länge verhält sich zur grössten Breite wie 5:4. Im weiblichen Geschlechte nehmen Gewicht und Grösse beiläusig um ein Sechstheil ab. Seine Lage ist schief von oben, rechts, und hinten, nach unten, links, und vorn. Der lange Durchmesser des Herzens bildet mit dem verticalen Brustdurchmesser einen Winkel von circa 50°. Ersterer wird von letzterem nicht in seiner Mitte, sondern 1" über derselben geschnitten, wodurch der grössere, untere Theil des Herzens der linken, der kleine, obere, der rechten Thoraxhälste angehört. Die Basis des Herzens liegt hinter dem Corpus sterni, in gleicher Höhe mit dem sechsten Brustwirbel (oder dem Zwischenraume des vierten und stunsten rechten Rippenknorpels), die Spitze hinter den vorderen Enden d

sechsten und siebenten linken Rippe. Zwischen der Basis des Herzens und der Wirbelsäule liegen die Contenta des hinteren Mittelfellraums.

Die Herzhöhle wird durch eine dem Sulcus longitudinalis entsprechende Scheidewand in eine rechte und linke Halfte abgetheilt, welche auch als vordere und hintere bezeichnet werden können, indem man sich das Herz so viel um seine Längenaxe gedreht denken muss, dass der rechte Rand mehr nach vorn, der linke nach hinten zu stehen kommt. Jede Herzhälste besteht aus einer Kammer, Ventriculus, und einer Vorkammer, Atrium. - Jede Vorkammer (auch Vorhof) hat ein nach vom und innen gekrümmtes Anhängsel - Herzrohr, Auricula cordis. Beide Vorkammern werden durch den oberen Theil der Herzscheidewand (Setum atriorum) von einander, und durch den Sulcus circularis von den Kammern getrennt, welche unter und vor ihnen liegen, durch das Septum ventriculorum von einander geschieden werden, den grösseren Theil des Herzens bilden, und bedeutend stärkere Wandungen besitzen als die Vorkammern, weshalb man früher die Kammern als musculöses, die Vorkammern als hautiges Herz unterschied (Cor musculosum, Cor menbranaceum).

Jede Kammer hat, der Kegelform des Herzens wegen, eine dreieckie Gestalt, mit unterer Spitze, welche Herzwinkel genannt wird. Die recht Kammer ist dünnwandiger als die linke, die Höhlen beider sind unter eit ander und mit jenen der Vorkammern gleich (wenn nicht krankhafte Differenzen obwalten). Die innere Oberstäche der Kammern, Vorkammern und Herzohren, ist nicht glatt und eben. Die Muskelbündel, welche der bei weitem grössten Antheil an der Bildung der Herzwände haben, springen gegen die Höhle zu mehr weniger vor, ragen auch srei in sie hinein oder lausen (wie in den Herzohren, und in der Nähe der Spitzen der Kammern) quer von einer Wand zur anderen. Sie heissen Fleischbalkes des Herzens — Trabeculae carneae atriorum et ventriculorum.

Die Vorkammern hängen mit den grossen Venenstämmen zusammen, die rechte mit den beiden Hohlvenen und den Herzvenen, die linke mit den vier Lungenvenen. Aus den Vorkammern führt eine geräumige Oefnung in die entsprechende Kammer (Ostium ventriculi venosum s. atrivventriculare), und aus der Kammer eine ähnliche in die aus ihr entsprisgende Arterie — Ostium ventriculi arteriosum. Beide Ostia einer Kammer befinden sich an der breiten nach oben gekehrten Basis derselben. Das Ostium arteriosum der rechten Kammer führt in die Lungenschlagader, jenes der linken in die Aorta.

Das Ostium arteriosum und venosum jeder Kammer ist mit einem Klappenapparat, der mit dem Mechanismus der Herzthätigkeit in nothwendigem Zusammenhange steht, versehen, und dessen sinnreiche Einrichtung an jene der Pumpenventile erinnert. Die innere Haut des Herzens (Badecardium), geht am Rande des Ostii venosi nicht einfach aus der Verkammer in die Kammer über, sondern stülpt sich (wie die Schleimhaut des

Krummdarms in den Blinddarm) in die Höhle der Kammer ein, und erzeugt dadurch eine Falte, welche eine blattförmige Verlängerung des im nuchsten §. zu beschreibenden Annulus fibro-cartilagineus enthält. Diese nach abwärts gerichtete Einstülpung, welche aber nicht die Ringform hat (wie die ältere Benennung Annulus valvulosus vermuthen liesse), ist vielmehr nach unten ausgezackt, oder in Zipfel zugeschnitten, welche Klappen (Valvulae) genannt werden, und deren im Ostium venosum der rechten Kammer drei, in jenem der linken Kammer nur zwei vorkommen. Man bezeichnet deshalb die ersteren als Valvula tricuspidalis s. triglochis, die letzteren als Valvula bicuspidalis s. mitralis. Der freie Rand, und zum Theil die der inneren Wand der Kammer zusehende Fläche der Klappen. hängt mit sehnigen Fäden zusammen (Chordae tendineae), welche grösstentheils an isolirt hervorragende, abgerundete, derbe Muskelbündel der Kammerwand (Musculi papillares, Warzenmuskeln), deren Richtung von unten nach oben geht, besestigt sind. - In den Orificiis arteriosis beider Kammera faltet sich das Endocardium neuerdings, um in jedem derselben drei halbmondförmige Klappen (Valvulae semilunares s. sigmoideae) zu bilden, welche so gestellt sind, dass sie mit ihren freien concaven Rändern, von der Kammer weg, gegen den weiteren Verlauf der am Ostium arteriosum entspringenden Arterie gerichtet sind, ihren befestigten convexen Rand aber in der Peripherie des Ostii arteriosi einpflanzen. In der Mitte des freien Randes jeder Klappe findet sich eine knotige Verdickung (Nodulus Arantii s. Morgagni), welche in den Semilunarklappen der Aorta gewöhnlich stärker als in jenen der Arteria pulmonalis ist. - Die Stellung der Klappen und ihr Verhältniss zur Kammer lässt ihre physiologische Bedeutung richtig beurtheilen. Da die Herzkammern (wie im folgenden Paragraph gezeigt wird) in einem ununterbrochenen Wechsel von Ausdehnung und Zusammenziehung begriffen sind, und dadurch das Blut bald aus den Vorkammern in sich aufnehmen, bald in die Arterien hinaustreiben, so müssen die Klappen so angebracht sein, dass sie dem Eintritte des Blutes durch das Orificium venosum, und dem Austritte durch das Orificium arteriosum, kein Hinderniss entgegenstellen. Es sind deshalb die freien Ränder der Valvula tricuspidalis et mitralis gegen die Höhle der Kammer gekehrt, jene der Valvulae semilunares aber von ihr abgewendet. Dehnen sich die Kammern aus, so strömt das Blut durch die geöffnete Schleuse der Valvula tricuspidalis et mitralis ungehindert in sie ein. Folgt im nächsten Moment die Zusammenziehung der Kammer, so würde das Blut theilweise den Weg wieder zurücknehmen, auf welchem es in die Kammer gelangte. Um dieses zu verhüten, stellen sich die Zipfe der Valvula tricuspidalis et mitralis so, dass sie das Ostium atrio-ventriculare schliessen, und das Blut somit durch die andere Oeffnung der Kammer (Ostium arteriosum) in die betreffende Schlagader getrieben wird. Die Valvulae semilunares sind, während die Kammer sich zusammenzieht, und das Blut in die Arterie treibt, geöffnet (an die Wand der Aorta oder der

Arteria pulmonalis angedrückt); hört die Zusammenziehung der Kammer auf, so sucht die Elasticität der Arterie einen Theil des Blutes wieder in die Kammer zurückzutreiben. Dieses Zurückstauen des Blutes schliesst die Valvulae semilunares, und versperrt der einmal aus dem Herzen getriebenen Blutsäule den Rücktritt in dasselbe. Das Klappenspiel des Herzens ist somit einer gewöhnlichen Pumpenventilation analog.

§. 319. Bau des Herzens.

Man unterscheidet am Herzen einen äusseren und inneren häutigen Ueberzug, und eine zwischen beiden liegende Muskelschicht, welche an der Kammern bedeutend stärker als an den Vorkammern, und an der linken Kammer stärker als an der rechten ist. Der äussere häutige Ueberzug gehört dem Herzbeutel an, und ist dessen innerer oder eingestülpter Ballen. Er ist dunn, glatt, durchscheinend, sehr reich an elastischen Fasern, und durch kurzen Zellstoff, welcher in den Sulcis gewöhnlich mehr weniger Fett enthält, so fest mit der Muskelschichte verwachsen, dass er nur schwer. und nie als Ganzes abgezogen werden kann. Stellenweise Verdickung dieses Zellstoffes erzeugt die sogenannten Sehnenflecke des Herzens. — Der innere Ueberzug (Endocardium) ist ein dunnes, mit Pflasterepithel verschenes, vorzugsweise aus elastischen Fasern bestehendes Häutchen, welches durch Faltung die Klappen, die Trabeculae carneae, die Musculi papilleres. und die Chordae tendineae überzieht. - Die Muskelschichte besteht aus quer gestreisten Muskelsasern, welche theils quer, theils longitudinal aber zugleich etwas spiral gewunden, um die Herzhöhle herumlaufen Dass sie von einer Herzhälste in die andere übergehen, ist an den Verhösen deutlich zu sehen. An den Kammern gilt dieses nur von den oberflächlichen Schichten, welche in Achtertouren um beide Ventrikel herunzugehen scheinen. Die Muskelfasern des Herzens sind um ein Drittel feiner als andere, haben ein äusserst feines, stellenweise sogar fehlendes Sarkolemma, und hängen netzförmig unter einander zusammen, was an den übrigen quergestreisten Muskeln nie beobachtet wird. Sie liegen sehr dicht aneinander gedräugt, wodurch sich die aussallende Härte des Herzsleisches erklärt. Die Muskelschichte mit dem Messer in einzelne Strata zu trennen. erlaubt der verfilzte Verlauf der Fasern nicht. — Die sich durchkreuzenden, spärlicheren Muskelbundel der Vorhöfe, lassen Maschen zwischen sich frei, in welchen der aussere und innere Ueberzug derselben mit einander in Berührung kommen.

Ein grosser Antheil der Muskelbundel der einen Hälfte des Herzens entspringt von einem fibrösen Gewebe, welches als vollständiger, oder aussen und innen durchbrochener Ring (Annulus fibro-cartilagineus gewöhnlich genannt, obwohl er nur faserige Structur besitzt), um jedes Ostium venosum herumgeht, in den Sulcus circularis cordis eingesenkt ist, die Muskelbundel der Vorkammer von jenen der Kammer trennt, und sich

so weit gegen das Lumen des Orificii venosi vordrängt, dass er dessen Rand vorzugsweise bildet, ja durch eine blattförmige Verlängerung die Grundlage der Valvula tricuspidalis und mitralis erzeugt, und diesen jenen Grad von Steifheit giebt, den sie als einfache Duplicaturen des dünnen Endocardium, für welche sie lange Zeit gehalten wurden, nie erreichen könnten. Als gemeinschaftlichen Ausgangspunkt dieser Ringe, oder ihrer vorderen und hinteren Bogensegmente, nimmt man den Umfang der Aortenmündung an, mit welchem sie fest zusammenhängen. Die harten weisslichen Kreise, an welchen die Basen der Valvula tricuspidalis et mitralis festsitzen, und die durch das Vordrängen der fibrösen Ringe entstehen, waren als Tendo cordis venosus s. Circulus callosus Halleri, schon lange bekannt. Genau wurden die Ringe erst durch C. Fr. Wolff untersucht, und als Ausgangspunkte (Punctum fixum) einer grossen Anzahl von Muskelbundeln des Herzens erkannt; - viele derselben lassen sich jedoch nicht bis zu diesen Ringen verfolgen. Krause nimmt auch um die Ostia arteriosa herum Faserringe (Tendines coronarii) an, deren blattformige Verlängerungen die Grundlage der Valvulae semilunares bilden.

Offen gestanden, ist man über den Verlauf der Muskelfasern des Herzens noch lange nicht im Klaren. Die Untersuchung dieses Verlaufes wird dadurch in hohem Grade erschwert, dass sich jedes Muskelbündel durch Spaltung in kleinere Züge theilt, welche nicht in derselben Ebene fortlaufen, sondern in die Tiese ablenken, sich durch benachbarte Bündel durchschieben, und mit ihnen durch Faseraustausch anastomosiren. Man kann nur im Allgemeinen sagen, dass jedes oberstächliche äussere Bündel, einmal ein oberstächliches inneres wird. — Die beste Anschauung von dem verworrenen Faserlause in der Herzwand erhält man durch Betrachtung der inneren Oberstäche der Vorkammern und Kammern, wo die Zwischenräume des Netzgestechtes grösser werden, die Bündel als Trabeculae carneas sreier hervortreten, und sich als Musculi papillares über die Wand hinaus verlängern. An den Einmündungsstellen der Körper- und Lungenvenen, so wie um die Fossa ovalis in der Scheidewand der Vorhöse, konnmen wahre Ringmuskeln vor.

Prof. Hauschka an der Josephakademie in Wien, machte neulich die interessante Beobachtung, dass im obersten Bezirke der Kammerscheidewand, an einer genau umschriebenen Stelle, die Muskelfasern sehlen, und die Endocardien beider Ventrikel zu einer dünnen, durchscheinenden, häutigen Platte verschmelzen, welche den schwächsten Theil der Kammerscheidewand bildet, an welcher es unter pathologischen Bedingungen selbst zum Durchbruch kommen kann. Die durchscheinende muskellose Stelle wurde als ein constantes Vorkommen erklärt, da sie sich an 300 untersuchten Herzen, mit geringen Variationen ihrer Ausdehnung, vorsand. (Wiener medicin. Wochenschrift, 1855, N. 9.)

§. 320. Specielle Beschreibung der einzelnen Abtheilungen des Herzens.

1. Rechte Vorkammer, Atrium dextrum.

Da die rechte Vorkammer durch den Zusammenfluss beider Hohlvenen entsteht, wird sie auch Sinus venarum cavarum genannt. Sie liegt, wegen

der Axendrehung des Herzens, mehr nach vorn als die linke, und hat — das rechte Herzohr abgerechnet — im ausgedehnten Zustande die Gestak eines irregulären Würfels mit abgerundeten Rändern. Die rechte (äussere) Wand des Würfels ist die kleinste, indem die vordere und hintere Wand, ohne Absatz, gebogen in einander übergehen. Die linke (innere) Wand ist das Septum atriorum, zeigt eine eistrmige Grube, Fossa ovalis, in welcher die innere Haut beider Vorhöse, wegen Fehlen der Muskelschichte, in Berührung kommt. Ein erhabener Wulst, Limbus foraminis ovalis s. Isthmus Vieussenii, durch starke Entwicklung ringsormiger Muskelsesta bedingt, umgiebt die Fossa ovalis. Die im Isthmus ausgespannte, aus den inneren Ueberzügen beider Vorhöse bestehende, häutige Wand, heisst Vovula foraminis ovalis.

In die innere Wand pflanzt sich die Vena cava inferior ein. Von der vorderen erhebt sich die Auricula dextra, welche sich als pyramidale, mit Kerben versehene Verlängerung der Vorkammer, vor der Wurzel der Aorta nach links herüberlegt. In der oberen Wand mündet die Vena cava superior. Die untere enthält das in die rechte Kammer führende Ostium venosum. Vom Annulus fibro-cartilagineus des Ostii venosi erheben sich die durch Zwischenräume getrennten, parallel aufsteigenden, und durch schiefe Zwischenbündel zusammenhängenden Kammmuskeln, Musei pectinati. — Besondere Merkwürdigkeiten der rechten Vorkammer sind:

- a) Die Valvula Thebesii. Da die rechte Vorkammer sämmtliches Venenblut zu sammeln hat, so muss die Kranzvene des Herzens, welche sid weder mit der oberen noch mit der unteren Hohlvene verbindet, sich istlirt in sie entleeren. Diese Einmündungsstelle liegt an der Zusammenkund der inneren und hinteren Wand. Sie wird durch eine halbmondsornige zuweilen gesensterte Klappe, Valvula Thebesii, deren concaver Rand gegen die Scheidewand beider Vorkammern gerichtet ist, ganz oder theilweise bedeckt.
- β) Die Valvula Eustachii. Sie ist im Embryo, wo ihre Wirksamkeit mehr in Anspruch genommen wird, krästiger entwickelt, und beim Erwachsenen nur als Rest einer sütalen Bildung bemerkenswerth. Ihre Gestalt ist sichelsürmig, ihr sreier Rand nach oben gerichtet, ihr Besestigungsrand erstreckt sich vom rechten Umsange der unteren Hohlvenenmundung man vorderen Schenkel des Isthmus Vieussenii empor. Sie schliesst deutliche Muskelsasern ein, und ist zuweilen durchlüchert.
- γ) Das Tuberculum Loveri ist ein hinter der Fovea ovalis, zwischen den Oessnungen beider Hohlvenen, vorspringender Wulst, gleichsam eine Einknickung der hinteren Wand des Vorhoses und des hinter der Fores ovalis liegenden Theiles des Septum atriorum, und dient wahrscheinlich dazu, die Blutströme beider Cavae zu verhindern, sich scheitelrecht zu tressen.
 - 2. Linke oder hintere Vorkammer, Atrium sinistrum.

 Die linke Vorkammer wird auch Sinus venarum pulmonalium pro-

nannt, und hat im Ganzen dieselbe cubische Gestalt, wie die rechte. Die obere Wand nimmt die vier Lungenvenen auf, an der linken Wand erhebt sich die Auricula sinistra, welche an ihrer Basis etwas eingeschnütt ist, und sich an die Wurzel der Lungenarterie legt. Die Musculi pectinati springen nicht vor, die Wand des Vorhofes ist somit glatt. Nur am vorderen Rande der Scheidewand (welche zwar etwas vertieft, aber ohne Isthmus Vieussenii ist) bemerkt man eine kleine, nach oben gerichtete Falte, welche ein Grübchen des Septum deckt, von welchem nicht selten eine kleine Communicationsöffnung zur rechten Vorkammer führt. Da die Fovea ovalis im Embryo eine Oeffnung ist (Foramen ovale), welche durch eine von unten nach oben sich erhebende Valvula verschlossen wird, so stellt die fragliche Falte den Rest des freien oberen Randes dieser Valvula, und die Oeffnung die nicht verschlossene Stelle des Foramen ovale dar.

3. Rechte oder vordere Kammer, Ventriculus dexter.

Sie hat im Ganzen eine pyramidale Gestalt, mit unterer Spitze und oberer Basis. Schneidet man das Herz quer durch, so ist der Durchschnitt der rechten Kammer ein Halbmond. Die concave Seite des Halbmondes entsteht durch das Septum ventriculorum, welches nicht eben, sondern gegen die rechte Kammer zu convex ist. Das Ostium venosum und arteriosum liegen an der Basis der Kammer. Ersteres ist oval, und die an seinem Umfange festsitzende Valvula tricuspidalis ragt mit ihren drei Zipsen weit in die Kammerhöhle herab. Die Klappenzipse werden in den vorderen, hinteren, und inneren eingetheilt. Der vordere ist der grösste. Es ist eine sehr weise getrossene Einrichtung, dass die Papillarmuskeln nicht den Spitzen der Klappen, sondern der Spitze des zwischen zwei Klappen besindlichen Winkeleinschnittes entsprechen, wodurch es möglich wird, dass ein Papillarmuskel seine Chordae tendineae zu zwei einander zugekehrten Klappenrändern schickt, und, nebst der Spannung der Klappen, auch auf ihren festeren Anschluss einwirkt. Die nicht an den Rand, sondern an die untere Fläche der Klappe tretenden Chordae spalten sich an ihrer Insertionsstelle dichotomisch oder mehrfach, und die Spaltungsästchen mehrerer Chordae verbinden sich zu einem Netzwerk, welches die Stärke der Klappe bedeutend vermehrt. Dass die Sehnensäden der Papillarmuskeln sich nicht blos am freien gekerbten Rande der Zipfe, sondern auch an ihrer unteren Fläche bis zur Anhestungsstelle der Klappe hinauf inseriren, ist ein sehr wichtiger mechanischer Umstand, der allein eine gleichsormige Spannung der Klappe, ohne Ausbauchung gegen die Vorkammer, möglich macht.

Das Ostium arteriosum liegt am linken Winkel der Kammerbasis, neben und vor dem Ostium venosum, und wird von diesem durch den vorderen Zipf der Valvula tricuspidalis getrennt. Man nennt jenen Winkel der Kammer, der durch das Ostium arteriosum in die Lungenschlagader führt, auch den Conus arteriosus (Wolff). — Die drei Valvulae semilunares werden in die vordere, rechte, und linke eingetheilt. Sie sind breiter als der Hemesser des Ostii arteriosi, und müssen deshalb, wenn sie während

dehnung der Kammer zuklappen, die Oeffnung um so verlässlicher schliessen. Jede Valvula semilunaris stellt eine gewöhnliche Wandtasche (wie sie an Kutschenschlägen angebracht werden) von geringer Tiefe vor, welche sich im gefüllten Zustande an die übrigen beiden anpresst, so dass die freien Ränder aller drei Klappen die Gestalt eines 🚫 darbieten. Die Noduli Arantii sind oft sehr klein, fehlen aber nie ganz. Man hat auch 2 und 4 Valculas semilunares im Ostium arteriosum getroffen.

4. Linke oder hintere Kammer, Ventriculus sinister.

Ihre Wand ist doppelt so stark, als die der rechten, ihr Lumen am Querschnitte des Herzens jedoch kein Halbmond, sondern ein Kreis (Insere und innere Wand convex). Das Ostium venosum ist ein wenig eager, als in der rechten Kammer, und die Valvula mitralis (quam mitrale episcopali non inepte contuleris, Vesal.) so gestellt, dass ihre Zipfe in den vorderen und hinteren eingetheilt werden können. Die freien Ränder und die der Kammer zugekehrten Flächen der Zipfe sind mit den Chordistendineis zweier Papillarmuskeln in Verbindung, welche an der vorderen und hinteren Kammerwand (nicht auf dem Septum) aufsitzen. Die Valvulae semilunares des Ostii arteriosi stehen so, dass man eine rechte, linke, und hintere unterscheidet. Sie sind, so wie die Valvula mitralis, dicker als die Klappen der rechten Kammer.

Der Schüler thut am besten, wenn er, um die genannten Gegenstär in der Leiche zu besichtigen, das Herz in seinen Verbindungen mit den gresen Gefässen lässt, und die Anatomie des Herzens zugleich mit der Topegraphie der Brusteingeweide studirt. Die häufig angewendeten Richtungs- wi Lagerungsbestimmungen (rechts, links, vorn, hinten) sind, wenn das exstirpirk Herz zum Studium benutzt wird, nicht so anschaulich, als wenn Alles ! natürlicher Lage verbleibt. Man öffnet den Herzbeutel, und trägt ihn seiner Umstülpungsstelle zu den grossen Gestssen ab, um Raum zu gewinne. und folgt in der Zergliederung des Herzens dem Wege, welchen das Bet durch das Herz nimmt, d. h. man beginnt mit der rechten Vorkammer, und endigt mit der linken Kammer. Die Schnitte werden an den Vorkammen an ihrer vorderen Wand gemacht, und gegen die Spitze der Kammern an rechten und linken Rande des Herzens hinabgeführt. Eine richtige Ansicht der bei der Topographie der Brusteingeweide erörterten Verhältnisse der grossen Gestasse, ist der beste Führer bei der Zergliederung des Herzens, und macht die Angabe besonderer praktischer Regeln überslüssig.

§. 321. Mechanismus der Herzpumpe.

Die Vorkammern und Kammern des Herzens nehmen während ihrer Erweiterung (Diastole) Blut auf, und treiben es während ihrer Zusammenziehung (Systole) wieder aus. Das Herz wirkt vorzugsweise durch die Zusammenziehung seiner Kammern auf die Bewegung der Blutmasse in der Arterien. Die Ausdehnung der Kammern ist ein passiver Zustand, und wird grösstentheils durch das von den Vorkammern eindringende Blut bedingt. Man pflegt das Herz somit nicht einer Druck- und Saugpunpe, sondern nur einer Druckpumpe zu vergleichen. Dass die Diastole des

Herzens kein activer Zustand sei, lässt sich schon daraus entnehmen, dass am Herzen kein einziges Muskelbündel existirt, welches durch seine Zusammenziehung Erweiterung des Herzens bedingen könnte. Es lässt sich aber nicht in Abrede stellen, dass das nach vollendeter Systole zur Ruhe zurückkehrende Herz, eine gleichzeitige Verlängerung aller seiner Muskelbündel erleidet, welche Verlängerung auf die Vergrösserung der Herzräume nicht ohne Einfluss sein kann, und somit die Saugbewegung des Herzens nicht gänzlich in Abrede gestellt werden kann.

Während der Diastole der Kammern, welche mit der Systole der Vorkammern auf dasselbe Zeitmoment fällt, füllt sich der Kammerraum mit Blut, welches durch die nächst folgende Systole in die Lungenarterie und die Aorta getrieben wird, und die elastischen Wände dieser Gefässe aus-Das rechte Herz nimmt nur Venenblut auf, und treibt es durch die Lungenarterie zur Lunge, wo es oxydirt wird, und, arteriell geworden, durch die vier Lungenvenen zur linken Vorkammer und Kammer gelangt, um sosort in die Aorta, und durch sie in alle Theile des Körpers getrieben zu werden. Das rechte Herz kann insofern auch Cor venosum oder pulmonale, das linke Cor arteriosum s. aorticum genannt werden. - Die rechte und linke Herzhälste sind (obwohl die Diastole und Systole derselben contemporan ist) in gewisser Hinsicht von einander unabhängig. Das Blut gelangt nicht unmittelbar, sondern auf einem langen Umwege, den es durch die Lungen macht, aus dem rechten Herzen in das linke. Der Mensch hat also eigentlich zwei Herzen, welche aber zu einem Eingeweide verschmolzen sind, weil sie sich aus Einem embryonalen Blutschlauche entwickeln. Die Lungenfunction, möchte ich sagen, ist zwischen die Function des rechten und linken Herzens eingeschaltet. Der Umstand, dass wenigstens die tieferen Muskelfasern beider Kammern nicht in einander übergehen, beurkundet zum Theil die functionelle Unabhängigkeit beider Herzen, deren anatomische Trennung durch den schwachen Einschnitt an der Spitze angedeutet wird.

Bei psianzenfressenden Wallfischen setzt sich dieser Einschnitt durch das Septum ventriculorum fort, wodurch ein tieser Spalt entsteht, und die rechte und linke Kammer frei werden. An einem männlichen Aëncephalus der Prager Sammlung ist ebenfalls das Herz bis zur Basis der Kammern gespalten. Von vollkommener Spaltung oder Halbirung des Herzens ist nur Ein Fall bekannt (Meckel, de duplicitate monstrosa. pag. 53).

Die Systole beider Vorkammern ist synchronisch, die der Kammern folgt nach einem kaum messbaren Intervall nach. Die Vorkammersystole verhält sich zur Kammersystole, wie in der Musik die Vorschlagnote zur Halt note. Auf die Kammersystole folgt nach einem längeren Intervalle die nächste Vorkammersystole, und der Wechsel der Bewegung ist überhaupt so eingerichtet, dass jede Höhle sich beim erwachsenen, gesunden Menschen, in Einer Minute 60-80 Mal zusammenzieht und erweitert. — Die Vorkammern werden, da die Einmündungsstellen der Venen durch keine Klappen

geschützt sind, durch ihre Systole einen Theil des aufgenommenen Blutes in die Venen zurückwerfen, die Kammern dagegen Alles, was sie enthalten, bis auf den letzten Tropfen in die Schlagadern treiben, da das Ostium venosum während der Systole durch den Klappenschluss den Rücktritt des Blutes in die Vorkammer verweigert. Damit die venösen Klappen nicht in die Vorkammer umschlagen, sind sie durch die Chordae tendineae an die Musculi papillares befestigt. Da sich das Herz während der Systole verkürzt, und die Chordae tendineae dadurch soweit erschlasst würden, dass, trotz ihrer Gegenwart, die Klappe in die Vorkammer gestaucht werden konnte, so sind die Chordae an die Papillarmuskeln gehestet, welche (wahrend das Herz sich von unten nach oben verkürzt) sich von oben nach unten zusammenziehen, und dadurch jenen Spannungsgrad der Chordes bedingen, der erforderlich ist, um die Klappen nicht überschlagen zu lassen. Während der Ventricularsystole sind die Chordae, wie die Leinen von Wind geschwellter Segel, straff angezogen; ihre Insertionspunkte an der Klappe werden somit sestgestellt sein, und nur jene Stücke der Klappe, welche zwischen den Anhestungen der Chordae sich besinden, werden durch den Druck der nach allen Seiten ausweichen wollenden Blutmasse der Kammer, in die Vorkammer sich ausbauchen. Wie nothwendig der genaue Verschluss der Ostia der Kammern für die Erhaltung der Gesundheit und des Lebens ist, beweist die sogenannte Insussicienz der Klappen, welche durch furchtbare Leiden zu einem sicheren Tode führt.

Ist der Inhalt der Kammer durch die Systole in die Arterien getrieben, und folgt die Diastole, so fängt sich die, durch die Elasticität der Arterien aus ihnen gegen die Kammer zurückgestaute Blutsäule, in den Taschesventilen der Ostia arteriosa, und wird durch sie so lange aufgehalten. bis die nächste Systole eine neue Welle in die Arterien treibt, durch deren Impuls die ganze Blutsäule der Arterien weiter geschoben wird. Der Stoss der neu ankommenden Blutwelle, der sich durch den ganzen Inhalt des Arteriensystems fortpflanzt, bedingt eine Erweiterung der elastischen Arterie, welche als Pulsschlag gefühlt wird. Der Puls ist somit ein Ausdruck der Stosskrast des Herzens, und wird in Theilen, deren Distanzunterschied vom Herzen ein bedeutender ist, nicht vollkommen isochronisch sein. (Man fühle mit der einen Hand den Puls der Arteria tibialis postica am inneren Knöchel, und mit der anderen jenen der Arteria maxillaris externs am Unterkieser, um sich von der Retardation des Pulses an weit entlegenen Körpertheilen zu überzeugen.)

Die Elasticität der Arterien ist ein wohlberechnetes Mittel, die Strömung des Blutes nicht stossweise (wie es bei nicht elastischen, starren Arterien sein müsste), sondern mit gleichmässiger Geschwindigkeit von statten gehen zu lassen. Die Elasticität der Arterienwände leistet hier genau dasselbe, wie der sogenannte Windfang bei den Feuerspritzen, welche, obwohl stossweise gepumpt wird, doch ihren Wasserstrahl mit gleichförmiger Geschwindigkeit herausfahren lassen. Jede Kammersystole erzeugt eine Erschütterung des Thorax, die man als sogenannten Herzschlag sieht und fühlt. Man nahm hier-

her an, dass die Herzspitze sich während der Systole hebt, und zwischen der 5. und 6. rechten Rippe an die Brustwand anschlägt. Die Ursachen dieses Hebens suchte man theils im Muskelbau des Herzens selbst, theils in einem Mouvement de bascule, welches die sich abwechselnd erweiternden und verengernden Herzräume, durch Verrückung ihres Schwerpunktes, bedingen. Beide Erklärungsarten genügen nicht. Gutbrod und Skoda haben den physikalischen Grundsatz des hydrostatischen Druckes auf die Erklärung des Herzschlages angewendet. (Siehe Jos. Heine, über die Mechanik der Herzbewegung etc. in Henle's und l'seusser's Zeitschrist. I. Bd. pag. 87.) - Eine neue Erklärung des Herzschlages hat Kiwisch gegeben (Prag. Vierteljahrsschrift, 1845), indem er auf den von allen früheren Theorien übersehenen Umstand aufmerksam machte, dass das Herz an die Thoraxwand nie anschlagen könne, weil es nie von ihr sich entsernt, sondern während der Systole und Diastole mit einem Theile seiner Fläche an der inneren Obersläche der Thoraxwand genau anliegt, etwa wie der volle und leere Magen immer in Contact mit der Bauchwand ist. Würde es sich je von der Thoraxwand entfernen, so müsste ein leerer Raum entstehen, der in geschlossenen Körperhöhlen niemals vorkommen kann. Der Impuls, den die Thoraxwand vom Herzen erhält, ist nur durch das momentane Schwellen der Muskelsubstanz des Herzens, während seiner Systole, bedingt. Allein hierauf lässt sich entgegnen, dass dieses Schwellen der Muskelsubstanz kein Dickerwerden des Herzens bedingt, da es bekannt ist, dass das Herz während der Systole nach allen Durchmessern kleiner wird. Vielleicht hat das während der Systole stattfindende Strecken des Aortenbogens, und das dadurch bedingte Anprallen des Herzens an die Thoraxwand einiges Gewicht bei der Erklärung dieser noch immer nicht genugend enträthselten Erscheinung. - Ueber den Klappenmechanismus siehe A. Retzius, in Müller's Archiv. 1843. pag. 14, und Baumgarten, ebendaselbst, pag. 463, so wie den Artikel Herz in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie. — Die durch das Spiel der Klappen entstehenden Herztöne, deren Werth für die Diagnose der Herzkrankheiten mit Recht so hoch angeschlagen wird, mögen, da sie sich zur Aufnahme in ein anatomisches Lehrbuch nicht eignen, durch den mündlichen Vortrag ihre Erörterung finden.

A. Retzius, über die Scheidewand des Herzens beim Menschen, mit Rücksicht auf das Tuberculum Loveri, in Mülter's Archiv. 1835.

§. 322. Herzbeutel.

Das Herz ist in einen häutigen Beutel, Pericardium (περὶ τὴν καρδίαν, um das Herz), eingeschlossen, welcher zwischen den beiden Pleurasäcken eingeschoben ist, und mit ihnen, so weit er sie berührt, innig verwachsen ist. Der Herzbeutel hat die Gestalt des Herzens, ist somit kegelförmig, kehrt aber seine Basis nach unten, wo sie mit dem Centrum
tendineum des Zwerchfells fest verwachsen ist, und seine stumpfe Spitze
nach oben. Er besteht aus einem äusseren, fibrösen, und einem
inneren, serösen Blatte. Beide Blätter sind untrennbar mit einander
verschmolzen. Das fibröse Blatt geht oben in die äussere Haut der grossen Blutgefässe über, welche vom oder zum Herzen laufen. Der Ort, wo
dieses geschieht, ist der concave Rand des Aortenbogens und die Theilungsstelle der Arteria pulmonalis. Das seröse Blatt geht nicht in die äussere

Haut dieser Blutgesässe über, sondern stülpt sich an ihnen nach ein- und abwärts, gleitet an ihnen zum Herzen herab, und überzieht dessen äussere Obersläche als ein dicht anliegender Ueberzug. Das seröse Blatt verhält sich somit zum Herzen, wie die Pleura zu der Lunge. Man wird deshalb, nach Erössnung des äusseren Ballens des Herzbeutels, auch ein Stück der grossen Gesässe in der Höhle des Pericardium eingeschlossen sinden. Da das Herz seinen Beutel nicht vollkommen aussullt, so wird der disponible, sreibleibende Raum, von einem serösen, gelblichen Fluidum, Liquor pericardii, eingenommen, dessen Menge sehr verschieden ist, — 1/2 Drachme bis 1/2 Unze. Die Annahme, dass der Liquor pericardii im Leben als Dunst existire, und erst nach dem Tode die Tropsensorm annehme, ist nicht zu billigen, da, schon nach den älteren Ersahrungen von Haller und Portal, auch im lebenden Thiere tropsbares Herzbeutelwasser vorkommt.

B. Arterien.

§. 323. Aorta und deren primitive Aeste.

Die Aorta (ἀείρω, erheben i. e. pulsiren) ist der unpaare Hauptstamm des ganzen Schlagadersystems. Aus dem linken Ventrikel des Herzens entsprungen, zeigt sie dicht über dem Ostium arteriosum eine aus drei, den Valvulis semilunaribus entsprechenden, flachen Ausbuchtungen (Sinus Valsalvae) gebildete Anschwellung, Bulbus aortae. Dieser Bulbus wird vom Ansange der Arteria pulmonalis, welche eine ahnliche Anschwellung bildet, bedeckt, indem die Aorta hinter der Lungenschlagader nach links und oben aussteigt, und zwischen die Lungenschlagader und die obere Hohlvene zu liegen kommt (Aorta ascendens), sich dann bogenförmig über den linken Bronchus, nach links und hinten, zum hinteren Cavum mediastini krummt (Arcus aortae), und nun in die absteigende Aorta übergebt (Aorta descendens). Die absteigende Aorta läust durch die Brusthöhle und Bauchhöhle, bis zum vierten Lendenwirbel herab, wo sie sich gabelformig in die beiden Arteriae iliacae communes theilt. So lange die absteigende Aorta sich in der Brusthöhle befindet (vom dritten bis zum zwölsten Brustwirbel), ist sie im hinteren Mittelfellraume eingeschlossen, liegt anfangs an der linken Seite, vor ihrem Eintritte in den Hiatus aorticus des Zwerchfells aber an der vorderen Seite der Wirbelsäule. In der Bauchhöhle steigt sie vor den Lendenwirbeln mit geringer Abweichung nach links herab.

a) Der aufsteigende Theil der Aorta, welcher im Cavum pericardii liegt, erzeugt die beiden Kranzarterien des Herzens. Beide Kranzarterienursprünge werden durch die während der Systole an die Arterienwand angedrückten Halbmondklappen nicht verschlossen, indem sie über den freien Rändern der letzteren liegen. Dass es so sei, lehrt der

Augenschein, und die allen verständigen Anatomen bekannte Thatsache, dass bei Injection des Aortenbogens von der Kammer aus, sich die Kranzarterien schon beim Beginne der Injection füllen.

- a) Die vordere oder rechte Kranzarterie, Arteria coronaria anterior s. dextra, läust im Sulcus circularis gegen den rechten Herzrand, und über diesen herum zur hinteren glatten Fläche des Herzens, wo ihre Fortsetzung im Sulcus longitudinalis posterior bis zur Spitze herab gelangt. Sie versorgt vorzugsweise das Atrium dextrum und den Ventriculus dexter.
- β) Die hintere oder linke Kranzarterie, Arteria coronaria posterior s. sinistra, geht im Sulcus circularis um den linken Herzrand herum, sendet anfangs in der vorderen Längenfurche einen Ast bis zur Spitze herab, welcher mit dem Ende der Arteria coronaria dextra anastomosirt, und verliert sich selbst an der hinteren platten Fläche des Herzens, wo sie im Sulcus circularis mit der dextra anastomosirt. Es finden sich somit zwei Hauptanastomosen der rechten und linken Kranzarterie, eine im Sulcus longitudinalis, die zweite im Sulcus circularis. Luschka hat Aestchen der Coronararterien bis in die Atrio-Ventricularklappen verfolgt. In den halbmondförmigen Klappen hat man noch keine Gefässe aufgefunden.

Dass feine Aestchen der Kranzarterien auch in die Herzklappen eintreten, ist für die Atrio-Ventricularklappen richtig. Für die Halbmondklappen dagegen entspringen die ernährenden Gefässe aus jenen der Aorta und Lungenschlagader. — Ueber das Verhältniss der Ursprünge der Kranzarterien zu den Halbmondklappen handelt ausführlich ein von mir geschriebener Artikel, im Decemberhest der Sitzungsberichte der kais. Akademie, Jahrgang 1854.

- b) Der Bogen der Aorta giebt an seiner oberen oder convexen Krümmung drei Gefässen den Ursprung: der Arteria anonyma, Arteria carotis, und subclavia sinistra.
 - a) Die Arteria anonyma steigt schräg vor der Luströhre und hinter der Vena anonyma sinistra nach rechts und oben, und spaltet sich hinter dem oberen Theile der Handhabe des Brustbeins in die Arteria subclavia und carotis dextra, wird deshalb auch Truncus brachio-cephalicus genannt. Die Arteria subclavia dextra krümmt sich, nachdem sie durch die obere Brustapertur getreten, zwischen Scalenus anticus et medius über die erste Rippe zur Achselhöhle, wo sie zur Arteria axillaris wird. Die Carotis dextra geht hinter der Articulatio sterno-clavicularis und dem Ursprunge des Musculus sterno-thyreoideus bis zum oberen Rande des Schildknorpels am Halse hinauf, wo sie in die rechte Carotis externa et interna zerfällt.
 - β) Die Carotis sinistra ist um die Länge der Arteria innominata länger als die rechte. Sie liegt, wegen schräger Richtung des Aortenbogens nach hinten, tiefer, und steigt mehr geradlinig am Halse hinauf als die rechte, welche, wegen ihres Ursprunges aus der hinter dem Ma-

nubrium sterni gelegenen Arteria anonyma, höher liegt, und deshab der Unterbindung zugänglicher ist.

- γ) Die Arteria subclavia sinistra wird gleichfalls länger sein und tiefer liegen, als die dextra, stimmt jedoch in allem Uebrigen mit der dextra überein.
- c) Der absteigende Theil der Aorta giebt in der Brusthöhle meistens paarige und schwache, in der Bauchhöhle auch sehr ansehnliche unpaarige Aeste ab, welche in den späteren Paragraphen, nach der Beschreibung der Kopf- und Armpulsadern, abgehandelt werden.

§. 324. Varietäten der aus dem Aortenbogen entspringenden Schlagadern.

Nicht immer ist das Verhältniss der aus dem Aortenbogen entspringenden Arterien das geschilderte. Es kommen zahlreiche Anomalien vor, welche weniger ihrer praktischen Bedeutsamkeit, als ihrer Uebereinstimmung mit thierischen Bildungen wegen, von Interesse sind. Diese Abweichungen lassen sich auf drei Typen reduciren: Verminderung, Vermehrung, und normale Zahl mit abnormer Verästlung der Aortenäste.

a) Verminderung.

Sie erscheint in drei Formen.

- a) Zwei Arteriae anonymae, deren jede in eine Carotis communis und Subclavia zerfällt. (Fledermäuse, einige Insectivoren.)
- β) Die Arteria carotis sinistra ist ein Zweig der Anonyma, welche somit in drei Aeste zerfällt. (Einige Affen, reissende Thiere, Beutler und Nager.) Diese Form kann auch mit Versetzung vorkommen (Zagorski, Tiedemann), wo der erste Ast des Aortenbogens die Arteria subclavia dextra, der zweite die Anonyma ist.
- y) Alle Aeste des Aortenbogens sind in einen Stamm verschmolzen, welcher erst später sich in die gewöhnlichen drei Aortenäste theilt. Dieser Fall, der bisher nur einmal von Klinz (Abhdl. der Josephin. Akad. Wien, 1787. 1. Bd.), und ein zweites Mal von mir, an einem Embryo mit Synophthalmie, beobachtet wurde, ist Regel bei den Einhufern und Wiederkäuern, deren Aorta, ohne einen Bogen zu bilden, sich in die auf- und absteigende Aorta theilt.

Am häusigsten sindet sich die Form β). — Der von Meckel angesuhrte Fall (Hdb. der menschl. Anat. 3. Bd. pag. 84.), wo zwei Anonymae vorkamen, deren eine beide Subclaviae, die andere die beiden Carotiden erzeugte, ist der seltenste.

b) Vermehrung.

Sie begreift folgende Spielarten:

a) Die Arteria vertebralis sinistra entspringt, wie beim Seehund, zwi-

schen Carotis und Subclavia sinistra. Sehr häufig zu beobachten. Der isolirte Ursprung der Carotis und Subclavia auf der linken Seite prädisponirt zur linkseitigen Astvermehrung.

- β) Eine überzählige unpaare Schilddrüsenarterie (Arteria thyreoidea ima s. Neubaueri) entspringt zwischen Anonyma und Carotis sinistra, und steigt auf dem vorderen Umfange der Trachea zur Schilddrüse empor. Sie kommt mit und ohne Mangel einer der beiden normalen unteren Schilddrüsenarterien vor, und ist in ersterem Falle stärker. Eine bezüglich des Luströhrenschnittes chirurgisch-wichtige Anomalie. Wurde bei keinem Säugethiere gesehen.
- γ) Eine Arteria mammaria interna oder thymica entspringt von der vorderen Wand des Aortenbogens.
- δ) Fehlen der Anonyma, und dadurch bedingter isolirter Ursprung der Subclavia und Carotis dextra aus dem Aortenbogen (Wallfischbildung). Im Falle δ können auch Versetzungen Platz greifen, worunter jene die merkwürdigste ist, wo die Subclavia dextra hinter der Subclavia sinistra entspringt, und um zur rechten Seite zu gelangen, zwischen Lust- und Speiseröhre, oder Speiseröhre und Wirbelsäule, nach rechts hinüberläust. Das Prager Museum besitzt 4 solche Fälle, in deren einem die Subclavia dextra selbst aus der absteigenden Aorta entspringt. Dass durch den anomalen Verlauf der rechten Subclavia, Compression der Speiseröhre, und dadurch die sogenannte Dysphagia lusoria entstünde, wäre nur bei aneurysmatischer Ausdehnung des Gesässes möglich. Dass diese Abweichung ohne Dysphagie bestehen kann, ist durch viele Beobachtungen constatirt.

Die so eben angeführten Abweichungen setzen eine Vermehrung auf vier Stämme. Vermehrung auf fünf, sind Combinationen derselben, mit oder ohne Versetzung. Vermehrungen auf sechs sind äusserst selten, entstehen durch Zerfallen der Anonyma, mit gleichzeitiger Isolirung beider Arteriae vertebrales (Tiedemann). — Da die Theilungsstelle der Carotis communis so hoch oben am Halse liegt, so werden es vorzugsweise die Aeste der Arteria subclavia sein, welche eine Vermehrung der Bogenäste der Aorta bedingen. Nur in einem von Malacarne beobachteten Falle entsprangen die Carotis externa et interna beider Seiten symmetrisch aus den beiden Schenkeln eines gespaltenen Aortenbogens, welche sich erst an der Wirbel säule zur einfachen Aorta vereinigen. (Ringförmiger Aortentypus der Amphibien.)

c) Normale Zahl mit abnormer Verästlung.

Sie äussert sich

- a) Als Verschmelzung beider Carotiden zu einer Anonyma, welche zwischen Subclavia dextra et sinistra entspringt, wie bei Elephas.
- β) Als Einbeziehung der Carotis sinistra in den Stamm der Anonyma, mit gleichzeitigem isolirten Ursprung der Vertebralis sinistra, oder einer Mammaria interna.

Nebst diesen Ursprungsabweichungen, kann der ganze Bogen der Aorta eine abnorme Richtung nehmen, und sich über den rechten, statt über den linken Bronchus krümmen, um entweder an der rechten Seite der Wirbelsäule zu bleiben (wie bei allgemeiner Versetzung der Eingeweide), oder noch in der Brusthöhle sich zur linken Seite hinüber zu begeben.

§. 325. Verästlung der Carotis externa.

Die Carotis communis theilt sich (nachdem sie nur in seltenen Fällen, und zwar nur auf der rechten Seite, eine Arteria thyreoidea superior, inferior, oder ima abgegeben) in gleicher Höhe mit dem oberen Schildknorpelrande in die Carotis externa et interna.

Die äussere Kopfschlagader, Carotis externa s. facialis, versorgt die Weichtheile des Kopfes, mit Ausschluss des Gehirns und Sehorgans. Sie liegt im Trigonum cervicale vor- und einwärts von der Carotis interna, wird vom Platysma myoides, dem hochliegenden Blatte der Fascia colli, und der Vena facialis communis bedeckt, steigt zwischen dem hinteren Bauche des Biventer maxillae und dem Musculus stylo-glossus längs des hinteren Randes des Unterkieferastes durch die Parotis empor, und theilt sich hinter dem Collum des Gelenkfortsatzes des Unterkiefers in ihre beiden Endäste: die oberstächliche Schläse- und innere Kieserarterie. Die Aeste, welche sie auf diesem Lause abgiebt, sind:

1. Die obere Schilddrüsenarterie, Arteria thyreoidea superior. Sie entspringt dicht über der Theilung der Carotis communis, geht, vom oberen Bauche des Musculus omo-hyoideus bedeckt, zum oberen Rande der Schilddrüse herab, und sendet (nebst Muskelästen zum Kopfnicker, Omo-, Sterno-, et Thyreo-hyoideus, Crico- et Sterno-thyreoideus), die Arteria laryngea durch die Membrana hyo-thyreoidea zu den Muskeln und der Schleimhaut des Kehlkopfes, und verliert sich zuletzt, nachdem ihre Endzweige eine Strecke weit an der Oberfläche der Schilddrüse geschlängelt herabliefen, im Parenchym derselben.

Nicht ganz selten hat es den Anschein, als ob die Arteria thyreoides superior aus dem Stamme der Carotis communis, dicht vor ihrer Theilung in die externa und interna, entstünde.

- 2. Die Zungenarterie, Arteria lingualis, stärker als die vorige, entspringt in gleicher Höhe mit dem Cornu magnum des Zungenbeins, wird in ihrem Laufe nach vorn und oben vom vorderen Bauch des Biventer und dem Musculus stylo-hyoideus bedeckt, und dringt zwischen Hyo-glossus und Constrictor pharyngis medius nach innen und oben geschlängelt in das Zungensleisch ein. Ihre Nebenäste sind:
 - α) Der Ramus hyoideus, welcher längs des oberen Zungenbeinrandes mit dem der anderen Seite anastomosirt. Fehlt zuweilen, und ist, wenn er vorkommt, von höchst unerheblicher Bedeutung.
 - β) Die schwache Arteria dorsalis linguae zur Schleimhaut der Zungenwurzel.

- γ) Die Arteria sublingualis, welche am Boden der Mundhöhle über dem Musculus mylo-hyoideus, und unter der Glandula sublingualis, nach vorn zieht, und mittelst einiger Zweige, welche den Musculus mylo-hyoideus durchbohren, mit der Arteria submentalis anastomosirt.
- d) Die Arteria ranina s. profunda linguae, welche, als Fortsetzung des Stammes der Arteria lingualis, und stark geschlängelt, neben dem Zungenbändchen in die Zunge eindringt, und an der Zungenspitze nicht bogenförmig (wie Krause und Theile anführen) in die der anderen Seite übergeht, sondern nur durch Capillaräste mit dieser sich verbindet. Mikroskopische Injectionen durch Eine Arteria ranina gemacht, füllen nie die Gefässe der anderen Zungenhälfte.

Wir beobachteten an einer Kindesleiche eine Arteria lingualis, welche am unteren Rande des vorderen Bauches des Biventer maxillas bis in die Nähe des Kinns verlief, dort den Mylo-hyoideus durchbohrte, und mit derselben Arterie der andern Seite (welche ebenso verlief), zwischen den beiden Genio-hyoidei, in den Genio-glossus eindrang.

- 3. Die äussere Kieferarterie, Arteria maxillaris externa, so stark wie die lingualis, zieht durch die Regio submaxillaris in einer Furche der Unterkiefer-Speicheldrüse nach vorn, krümmt sich am vorderen Rande der Insertion des Masseters zum Antlitz hinauf, und verläust in starken Schlangenkrümmungen, nach aussen vom Mundwinkel, zur Seite der Nase hinauf, auf welchem Wege sie vom Risorius Santorini, Zygomaticus major et minor bedeckt wird. Ihre bedeutenderen Nebenäste sind:
 - α) Die Arteria submentalis. Sie geht zwischen dem vorderen Bauch des Biventer und Mylo-hyoideus nach vorn, versorgt die Glandula submaxillaris und ihre Nachbarschaft, biegt sich zum Kinn binauf, wo sie mit den von anderen Stämmen hier anlangenden Schlagadern (Arteria mentalis, coronaria labii inferioris, und submentalis der anderen Seite) in Haut und Muskeln sich verliert.
 - β) Die Arteria palatina ascendens s. pharyngo-palatina, steigt neben dem Pharynx in die Höhe, versorgt den inneren Flügelmuskel, den weichen Gaumen und die Schleimhaut des Rachens in der Nähe der Rachenmündung der Tuba Bustachii.
 - γ) Die Arteria tonsillaris entspringt wie die frühere an der inneren Seite des Unterkieferwinkels, und verliert sich in der Seitenwand des Schlundkopfes und in der Mandel.
 - d) Muskeläste zu den Kaumuskeln und Antlitzmuskeln um die Mundspalte herum, worunter die Arteria coronaria labii superioris et inferioris besonders bemerkenswerth sind. Nur die obere verläuft im wulstigen Theile der Lippe, der Schleinhaut näher als dem Integument, gegen die Mittellinie. Die untere liegt weiter vom Lippenrand entfernt. In der Mittellinie anastomosiren beide mit ihren gleichnamigen Gegnern, und bilden dadurch einen Kranz um die Mundöffnung, welcher jedoch zu nicht vollständig ist, und aus dessen oberem Bogen die Arteri

mobilis nasi entspringt. Die übrigen Muskeläste, deren Grösse, Zahl und Ursprung sehr disserirt (Rami buccales, masseterici etc.) anastomosiren vielsach mit der Arteria infraorbitalis, transversa faciei, buccinetoria etc.

e) Die Arteria angularis ist die Fortsetzung des Stammes, geht hinter dem Nasensügel nach auswärts, und sührt diesen Namen, ihrer am inneren Augenwinkel stattsindenden Anastomose mit der Arteria ophthelmica wegen. Sie giebt zum Nasensügel die Ramos alares, und zum Nasensücken die Ramos dorsales nasi. Sehr ost anastomosiren die letteren, und nicht das Ende der Arteria angularis, mit der Arteria ophthalmica. An einem Präparate der hiesigen Sammlung kommt die Arteria angularis durch Anastomose der Transversa saciei mit der Ophthalmica zu Stande.

Die Arteria thyreoidea superior, lingualis, und maxillaris externa, enspringen sämmtlich aus der vorderen Peripherie der Carotis externa, weil die Verästlungsbezirke derselben vor ihrem Ursprunge liegen. Neben dem Ursprunge der Arteria maxillaris externa entsteht ganz regelmässig ein ansehnlicher Ramus muscularis pro Musculo sternocleidomastoideo, der am vorderen Rande des genannten Muskels eine Strecke weit herabsteigt, bevor er sich in ihn einsenkt.

Von der inneren Peripherie der Carotis externa entsteht:

4. Die aufsteigende Rachenarterie, Arteria pharyngea ascendens. Sie entspringt in gleicher Höhe mit der Arteria lingualis, und steigt an der Seitenwand des Pharynx hinauf, sendet gewöhnlich zwei Zweige zur hinteren Rachenwand, deren oberer bis zur Anhestung des Rachensackes an der Schädelbasis sich verbreitet, und einen kleinen, unbeständigen, zum Foramen jugulare aussteigenden Ast, welcher die hier austretenden Nerven versorgt, selbst in die Schädelhöhle eintritt, um als accessorische Arteris meningea posterior externa zu enden. Die Arteria palatina ascendens entspringt sehr ost aus ihr, jedoch nicht so häusig, dass dieser Ursprung als Norm angesehen werden könnte (Krause).

Die beiden folgenden Aeste, 5 und 6, entspringen von der hinteren Peripherie der Carotis externa.

- 5. Die Hinterhauptarterie, Arteria occipitalis, entspringt etwas über der Arteria maxillaris externa, wird vom hinteren Bauch des Biventer maxillae bedeckt, und geht unter der Incisura mastoidea nach hinten und oben zum Os occipitis, wo sie vom Musculus trachelo-mastoideus und Splenius capitis bedeckt wird, und zwischen letzterem Muskel und dem Cucullaris an die Oberstäche tritt, um zwischen Galea aponeurotica und Haut des Hinterkopses bis zum Scheitel hinauf sich zu verästeln. Sie giebt nur zwei besonders benannte Zweige ab:
 - a) Die Arteria meningea posterior externa, welche durch das Feramen mastoideum zur harten Hirnhaut geht. Fehlt sie, so ist die von der Arteria pharyngea ascendens abgegebene accessorische Schlagader der harten Hirnhaut stärker entwickelt.

β) Die absteigende Nackenarterie, Arteria cervicalis descendens, welche auch mehrfach vorkommt, und die Nackenmusculatur mit Blut versieht.

Wir sahen mehrmals die Arteria occipitalis an der Sutura mastoidea in die Diploë eindringen, und nach kurzem Verlauf daselbst, wieder zur Ober-fläche zurückkehren. Als Thierähnlichkeit nicht unbedeutsam (Edentaten, bei denen ich die Arteria diploëtica magna nachwies).

6. Die hintere Ohrarterie, Arteria auricularis posterior, welche am vorderen Rande des Processus mastoideus aufsteigt, und die feine Arteria stylo-mastoidea durch das Griffelwarzenloch in den Fallopi'schen Kanal absendet, aus welchem sie durch den Canaliculus chordae tympani in die Paukenhöhle tritt, um die Schleimhaut der hinteren Abtheilung derselben, so wie der Cellulae mastoideae, den Musculus stapedius und die Membrana tympani (mit einem hinter dem Manubrium mallei herablaufenden Zweigchen) zu versorgen. Hinter dem Ohre theilt sich die Arteria auricularis posterior in zwei Zweige, deren vorderer die Ohrmuschel, deren hinterer die Weichtheile hinter dem Ohre ernährt, und zuletzt mit den Nebenästen der Arteria occipitalis anastomosirt. Ich finde einen constanten Ast der Auricularis posterior, durch die ganze Länge der Incisura mastoidea verlaufen.

Die Arteria stylo-mastoidea geht in seltenen Fällen, deren ich zwei besitze, nicht durch das Griffelwarzenloch, sondern durch eine eigene Oeffnung der unteren Paukenhöhlenwand in das Cavum tympani, steigt über das Promontorium (in einen knöchernen Kanal oder Halbkanal eingeschlossen) zum Stapes empor, läust zwischen den Schenkeln desselben durch, und begiebt sich durch eine Oeffnung der oberen Wand zur harten Hirnhaut.

7. Wandelbare Muskelzweige, Rami pterygoidei, masseterici, und Drüsenäste für die Parotis.

Nach Abgabe dieser Aeste theilt sich die Carotis externa in ihre zwei Endäste 8. und 9.

- 8. Die oberflächliche Schläsenarterie, Arteria temporalis, ist der eine Endast der Carotis externa, steigt über die Wurzel des Jochsortsatzes zur Schläsegegend auf, liegt auf der Fascia temporalis, und zersällt früher oder später in zwei Zweige, den vorderen und hinteren. Der vordere bildet einen Bogen nach vorn und oben, versorgt die Haut der Schläse und Stirngegend, und anastomosirt mit der Arteria frontalis und den übrigen Schlagadern des Schädeldaches. Der hintere, schwächere, steigt mehr geradlinig zum Scheitel empor, und nimmt an der Bildung der Blutgesässnetze der Kopschwarte Antheil. Bei bejahrten Individuen sieht man den geschlängelten Verlauf der Arteria temporalis durch die Hautbedeckung hindurch. Die Nebenäste des Stammes der Arteria temporalis sind:
 - α) Die Arteria transversa faciei. Sie Ductus Stenonianus quer bis in die Gegen giebt Aeste in die Parotis, den Kau- v

palpebrarum, die Zygomatici und den Levator anguli oris, und anastomosirt mittelbar durch ihre Aeste mit der Arteria infraorbitalis, den Muskelästen der Arteria maxillaris externa, und der von der Arteria maxillaris interna stammenden Arteria buccinatoria. Sie ist zuweilen doppelt, zuweilen sehr schwach, kann aber so stark werden, dass sie die fehlenden Gesichtsverästlungen der Arteria maxillaris externa ersetzt.

- β) Die Arteria temporalis media durchbohrt die Fascia temporalis, um sich im Fleische des Musculus temporalis aufzulösen.
- γ) Zwei bis drei Arteriae auriculares anteriores inferiores, und die Arteria auricularis anterior superior zum äusseren Gehörgang, zur Ohrmuschel und deren Muskeln.
- d) Die Arteria zygomatico-orbitalis entspringt über dem Jochbogen und geht schief über die Fascia temporalis nach vorn und oben gegen den Margo supraorbitalis, wo sie mit der Stirn-, Thränen- und vorderen Schläsenarterie anastomosirt.
- 9. Die innere Kieferarterie, Arteria maxillaris interna. Sie ist der zweite Endast der Carotis externa, und bietet verwickeltere Verhältnisse, als die übrigen Zweige derselben, dar. Da sie zu allen Höhlen des Kopfes Aeste sendet, wird sie überhaupt tiefer liegen und schwerer darstellbar sein, als die übrigen Schlagadern des Schädels. Um den Stammbaum ihrer Verästlungen leichter zu überblicken, soll der Lauf der Arterie in drei Abschnitte gebracht werden. Der erste liegt an der inneren Seite des Processus condyloidens des Unterkiefers, der zweite zwischen den beiden Flügelmuskeln, der dritte in der Fossa pterygo-palatina.

Aus dem ersten Abschnitte entspringen:

- a) Die Arteria auricularis profunda für den ausseren Gehörgang.
- β) Die Arteria tympanica für die vordere Abtheilung der Trommelhöhle. Sie dringt durch die Fissura Glaseri ein.
- γ) Die Arteria alveolaris inferior steigt zwischen dem inneren Seitenbande des Unterkiefergelenkes, und dem Aste der Maxilla inferior, zur hinteren (inneren) Oeffnung des Unterkieferkanals herab, durchläust diesen, giebt den Wurzeln der Zähne haarseine Ramulos dentales, tritt durch das Kinnloch hervor, und anastomosirt durch ihre Endzweige mit der Arteria coronaria labii inferioris und submentalis. Vor ihrem Eintritte in den Unterkieferkanal giebt sie die im Sulcus mylo-hyoideus herablausende dünne Arteria mylo-hyoidea zum gleichnamigen Muskel.

Aus dem zweiten Abschnitte entstehen:

a) Die mittlere Arterie der harten Hirnhaut, Arteria meningea media s. spinosa. Sie steigt an der inneren Fläche des Musculus pterygoideus externus zum Foramen spinosum auf, giebt Aeste an diesen Muskel, so wie an den Tensor und Levator palati mollis, und betritt die Schädelhöhle, wo sie zuerst die Arteria petrosa in der Furche der oberen Fläche der Pyramide zur Apertura spuria canalis Fallenise sendet. Diese kleine und somit bedeutungslose Arterie theilt sich in zwei Zweigchen, deren eines in die Trommelhöhle gelangt, den Tensor tympani und die Schleimhaut des Cavi tympani ernährt, während das andere den Nervus facialis im Fallopi'schen Kanal begleitet, und nur durch Capillarnetze (nicht durch directe Anastomose) mit der Arteria stylo-mastoidea sich verbindet. Hierauf theilt sich die Arteria spinosa in einen vorderen grösseren, und hinteren kleineren Ast, welche in den Gefässfurchen des grossen Keilbeinslügels, des Scheitelbeins, und der Schuppe des Schläsebeins sich baumförmig verzweigen, die Dura mater, und die Diploë des Schädelgewölbes ernähren. Im hiesigen anatomischen Museum besinden sich zwei Injectionspräparate der Arteria meningea media von Kindesleichen, an welchen Aeste dieser Arterie durch die Stirnsontanelle, und durch die Sutura sagittalis in die weichen Schädeldecken übergehen.

Zuweilen existirt noch eine accessorische Arteria meningea media, als Ast der eben beschriebenen, welcher vor ihrem Eintritte in die Schädelhöhle entspringt, sich hinter dem Ramus tertius paris quinti verbirgt, diesen Nerv, die Eustachi'sche Trompete, und die Muskeln des weichen Gaumens versorgt, und durch das Foramen ovale in die Schädelhöhle kommt, wo er das Ganglion Gasseri und die nächste Partie der harten Hirnhaut mit Aesten betheilt.

- β) Muskeläste, welche mit den vom dritten Aste des Quintus entsprungenen Muskelnerven sich vergesellschaften. Für den Masseter der Ramus massetericus, welcher durch die Incisura semilunaris des Unterkieferastes zu seinem Bestimmungsorte gelangt; für den Buccinator der Ramus buccinatorius, zwischen Unterkieferast und Musculus buccinator zum Antlitz gehend, wo seine Aeste mit der Arteria infraorbitalis, transversa faciei, und den Muskelzweigen der Arteria maxillaris externa Netze bilden; für die beiden Flügelmuskel die Rami pterygoidei; für den Schläfemuskel die beiden Arteriae temporales profundae (anterior et posterior). Die vordere schickt durch den Canalis zygomaticus temporalis einen Ast in die Augenhöhle, der mit der Arteria lacrymalis anastomosirt.
- γ) Die obere Zahnarterie, Arteria alveolaris superior, deren Zweige durch die Löcher an der Tuberositas maxillae superioris zu den hinteren Zähnen und dem Zahnsleisch des Oberkiesers, und zu der Schleimhaut der Highmorshöhle eindringen.

Aus dem dritten Abschnitte bilden sich durch Zerfallen desselben:

α) Die Unteraugenhöhlenarterie, Arteria infraorbitalis. Sie verläuft so, wie ihr Name sagt, schickt penetrirende Zweigchen in die Augenhöhle zur Periorbita, zum Rectus und Obliquus inferior, abwärts laufende Aestchen zur Schleimhaut der Highmorshöhle und zu den vorderen Zähnen, zertheilt sich nach ihr schen Margo infraorbitalis und Obe in zweiter und dritter Linie mit den übrigen

- β) Die absteigende Gaumenarterie, Arteria palatina descendens s. pterygo-palatina. Sie giebt zuerst die Arteria vidiana ab, welche mit dem Nerven dieses Namens nach rückwärts geht, um in der oberen Partie des Pharynx zu enden, und mit der Arteria pharynges ascendens zu anastomosiren. Dann steigt sie durch die Canales palatini descendentes, in drei Aeste gespalten, herab, versieht den weichen Gaumen und die Mandel, und schickt ihren längsten und stärksten Ast, dem harten Gaumen entlang, bis zum Zahnsleisch (Arteria palatina anterior). Ein feiner Ast derselben dringt durch den Canalis incisious zum Boden der Nasenhöhle.
- γ) Die Nasenhöhlenarterie, Arteria spheno-palatina s. nasalis posterior. Sie kommt durch das Foramen spheno-palatinum in die Nasenhöhle, deren hintere Schleimhaut, sammt ihren Ausbuchtungen in die Sinus, sie mit Zweigen versieht. Einer derselben läust am Septum narium herab, und anastomosirt mit der Arteria palatina anterior und der Arteria septi, einem Aste der Coronaria labii superioris.

Der Stammbaum der Arteria maxillaris interna behauptet insosern eine gewisse Selbstständigkeit, als nicht leicht einer seiner Zweige von einer anderen Kopsschlagader entspringt, oder er selbst einen Ast abgibt, der nicht unter den angesührten steht. Die Abweichungen in Zahl und Ursprung der ihm angehörigen Aeste haben, ihrer tiesen Lage und Unzugänglichkeit wegen, kein besonderes chirurgisches Interesse. Die vielen Aehnlichkeiten, welche die Verzweigungen der Arteria maxillaris interna mit den Aesten des 2. und 3. Quintusastes haben, werden sich ihrem Studium als sehr förderlich bewähren.

F. Schlemm, de arteriarum, praesertim faciei anastomosibus. Berol., 1821.

4. — Ejusdem, arteriarum capitis superficialium icon nova. Berol., 1830. fol.

— Eine Reihe vortrefflicher Präparate über die Verästelungen der Carotis externa wird im Wiener anatomischen Museum aufbewahrt.

§. 326. Verästlung der Carotis interna.

Die Carotis interna geht anfangs auf der äusseren Seite der Carotis externa nach aufwärts, krümmt sich dann hinter ihr weg nach innen und oben, und wird von ihr durch den Musculus stylo-glossus und stylo-pharyngeus getrennt. Bevor sie in den Canalis caroticus eindringt, macht sie eine zweite Krümmung, deren Convexität nach innen sieht. Ihr Verlauf extra canalem caroticum ist somit umgekehrt S-förmig gekrümmt. Im Canalis caroticus macht sie die dritte, im Sinus cavernosus die vierte, und jenseits desselben, beim Uehergange zur Basis des Gehirns, die fünste Krümmung. Ihre wichtigeren Aeste sind:

a) Die Augenarterie, Arteria ophthalmica. Sie entspringt aus der convexen Vorderwand der fünsten Krümmung, geht mit dem Nervus opticus, an dessen äusserer unterer Seite sie liegt, durch das Foramen opticum in die Augenhöhle, schlägt sich hierauf über den Sehnerv nach innen, geht unter dem Musculus obliquus superior an der inneren Orbitalwand

nach vorn, und zerfällt unter der Rolle in die Arteria frontalis und dorsalis nasi. Auf dieser Wanderung erzeugt sie folgende Zweige:

- α) Die Arteria centralis retinae, welche in der Axe des Sehnerven zur Netzhaut verläuft.
- β) Die Arteria lacrymalis. Sie zieht an der äusseren Orbitalwand nach vorn, giebt eine oder zwei hintere Ciliararterien ab, sendet Zweige in den Canalis zygomaticus facialis und temporalis, welche mit der Arteria transversa faciei und temporalis profunda anterior anastomosiren, versorgt die Thränendrüsen, und theilt sich am äusseren Augenwinkel in eine Arteria palpebralis externa superior et inferior.
- γ) Muskeläste für den Bewegungsapparat des Bulbus. Ihre Zweigchen verlängern sich über die Insertionsstelle der Muskeln hinaus zur Conjunctiva bulbi. α , β und γ entspringen von der Arteria ophthalmica, während diese an der äusseren Seite des Sehnerven liegt.
- d) Die Arteriae ciliares posteriores longae et breves. Es sinden sich immer nur 2 longae, und 3-4 breves. Sie durchbohren die Sklerotica um die Eintrittsstelle des Sehnerven herum. Die longae gelangen an der äusseren und inneren Peripherie der Choroidea bis zur Iris; die breves verästeln sich nur im hinteren Abschnitt der Choroidea. Die Arteriae ciliares anteriores stammen nicht aus der Arteria ophthalmica, sondern aus deren Aesten, und meistens aus den Muskelästen. Ihre Zahl variirt von 6-10 und darüber. Eine Arteria ciliaris posterior longa durchbohrt, wie ich östers sah, das Ganglion ciliare.
- ε) Die Arteria supraorbitalis geht über dem Levator palpebrae superioris nach vorn, und durch das Foramen supraorbitale zur Stirn, um in Haut und Muskeln zu verschwinden. δ und ε entstehen, während die Arteria ophthalmica den Sehnerv kreuzt. Die folgenden, ζ—ι, nehmen ihren Ursprung jenseits der Kreuzung der Arteria ophthalmica mit dem Sehnerv.
- ζ) Die Arteria ethmoidalis anterior et posterior. Die anterior geht durch das gleichnamige Loch in die Schädelhöhle, giebt die Arteteria meningea anterior ab, dringt durch ein Loch der Siebplatte in die Nasenhöhle, verschickt ihre Zweige zu den vorderen Siebbeinzellen, dem Sinus frontalis, und der vorderen Abtheilung der Nasenhöhle (Arteria nasalis anterior). Die posterior ist viel kleiner, und geht durch das Foramen ethmoidale posterius einfach zu den hinteren Siebbeinzellen.
- η) Die Arteria palpebralis interna superior et inferior, welche am inneren Augenwinkel unter der Rolle entspringen, den Saccus lacrymalis, die Caruncula und die Conjunctiva palpebrarum mit feinen Zweigchen ausstatten, dann in die betreffende Palpebra eindringen, und zwischen dem Tarsusknorpel und dem Sphincter, höchet freien Lidrand, nach aussen laufen, um den von abgegebenen Arteriis palpebralibus externis

nen direct zu anastomosiren, wodurch der sogenannte Arcus tarseus superior et inferior zu Stande kommt.

- 3) Die Arteria frontalis schlägt sich um das innere Ende des Margo supraorbitalis zur Stirn empor, wo sie von den Muskeln bedeckt wird, diesen Aeste verleiht, und perforirende Reiser in die Stirnhaut schickt. Sie wird mit allen hier ankommenden Arterien (Arteria temporalis anterior, zygomatico-orbitalis, supraorbitalis) sich in Verbindung setzen.
- c) Die Arteria dorsalis nasi durchbohrt über dem Ligamentum palpebrale internum den Musculus orbicularis, und anastomosirt, neben dem Nasenrücken herabsteigend, mit dem Ende der Arteria maxillaris externa (angularis), oder mit einem Nasenrückenast derselben.
- b) Die Arteria communicans posterior zur tiefen Gehirnarterie, welche neben dem Infundibulum nach rückwärts läuft.
- c) Die Arteria choroidea für das Adergessecht der Seitenkammer. Sie geht am äusseren Rande des Pedunculus cerebri nach hinten, dann nach oben in das Unterhorn der Seitenkammer zum Plexus choroideus. Sie ist der schwächste Zweig der Carotis interna.
- d) Die Arteria corporis callosi, Balkenschlagader. Sie geht, mit jener der anderen Seite convergirend, nach vorn, verbindet sieh mit ihr durch einen Querast (Arteria communicans anterior), und steigt vor dem Balkenknie zur oberen Fläche des Corpus callosum hinauf, liegt aber nicht in der Stria longitudinalis Lancisii, sondern neben oder über ihr, oder an der inneren Seite der Hemisphären, zu deren Randwülsten sie ihre Zweige versendet.
- e) Die Arteria fossae Sylvii, die Fortsetzung der Carotis interno, folgt der Fossa Sylvii, und schickt ihre Zweige zum vorderen und unteren Gehirnlappen, zwischen welchen eben die Sylvi'sche Furche liegt.

Die Endäste der Carotis interna, als welche b, c, d und e angesehen werden können, sind, so viel ich gesehen habe, durchaus nicht symmetrisch gestellt, noch auf beiden Seiten an Umfang gleich. Oft stammt die rechte und linke Arteria corporis callosi aus Einer Carotis, wo dann die Arteria communicans anterior fehlt. Die Arteria communicans posterior fehlt zuweilen auf Einer Seite, und variirt an Grösse sehr aussallend. Ich sah selbst die Arteria fossae Sylvii auf der linken Seite nicht als Ast der Carotis interna, sondern der Arteria profunda cerebri. Das Gegentheil dieser Abnormität wird dadurch gegeben, wenn sich eine starke Arteria communicans posterior unmittelbar in die Arteria profunda cerebri verlängert, welche mit der Arteria basilaris (§. 327) gar nicht, oder durch einen dünnen Zweig zusammenhängt. Doppeltwerden der Arteria communicans anterior, oder Fehlen derselben, indem die beiden Balkenarterien zu einem unpaaren Stamm verschmelzen, ist nicht so selten.

§. 327. Verästlung der Schlüsselbeinarterie.

Die Schlüsselbeinarterie, Arteria subclavia, führt in der beschreibenden Anatomie (aber nicht in der topographischen, s. §. 328) diesen Namen nur von ihrem Ursprunge bis zur Austrittsstelle zwischen dem vorderen und mittleren Scalenus. Die rechte ist gewöhnlich etwas stärker als die linke. Der Verlauf beider ist nicht geradlinig, sondern bildet einen nach oben convexen Bogen über der ersten Rippe, welcher für die linke schärfer als für die rechte ist. Ueber der Articulatio sterno-clavicularis erzeugt sie folgende Aeste:

- a) Die Wirbelarterie, Arteria vertebralis, ihr stärkster Ast. Sie steigt eine kurze Strecke hinter der Carotis communis am ausseren Rande des Musculus longus colli herauf, begiebt sich durch das Loch im Ouerfortsatz des sechsten Halswirbels (nur selten schon des siebenten. Meckel, Bichat) in den Wirbelschlagaderkanal. Wegen querer Richtung des Schlagaderloches im Epistropheus, und wegen starker Entwicklung der Massae laterales des Atlas, kann die Richtung der Arteria vertebralis, vom zweiten Halswirbel an, keine senkrecht aufsteigende sein. Das Gefäss muss vielmehr, um durch das Foramen occipitale magnum in die Schädelhöhle einzudringen, vier Krümmungen machen: die erste im Querfortsatz des Epistropheus nach aussen, die zweite zwischen Querfortsatz des Atlas und Epistropheus nach oben, die dritte im Querfortsatz des Atlas nach oben und innen, die vierte zwischen dem hinteren Halbring des Atlas und der seitlichen Peripherie des Hinterhauptloches nach vor- und aufwärts. Die vierte Krümmung durchbohrt die Membrana obturatoria posterior und die harte Hirnhaut. Von ihrem Ursprunge bis zum Eintritte in die Schädelhöhle giebt die Arteria vertebralis folgende Zweige ab:
 - α) Ramos musculares, für die an den Wirbelquerfortsätzen entspringenden Muskeln.
 - β) Ramos spinales, welche in den Rückgratkanal durch die Foramina intervertebralia eindringen, die harte Haut der Medulla spinalis, den Bandapparat der Wirbelsäule ernähren, und das Rückenmark selbst mit vorderen und hinteren Aestchen umgreifen, welche mit den entgegengesetzten, so wie mit den nächst oberen und unteren derselben Seite anastomosiren.
 - γ) Die Arteria meningea posterior interna, welche zwischen Atlas und Foramen occipitale entspringt, mit dem Stamme der Arteria vertebralis in die Schädelhühle gelangt, und in der harten Hirnhaut der unteren Gruben des Hinterhauptbeins sich verbreitet.

In der Schädelhöhle verbindet sich die Arteria vertebralis vor der Medulla oblongata mit jener der anderen Seite zur unpaaren Grundschlagader, Arteria basilaris, welche zwischen dem Pons Varoli und dem Clivus des Os basilare, nach auf- und vorwärts geht, bis sie über den Pons hinaus ist, und in die beiden tiefen Gehirnarterien, Arteria profunda cerebri dextra et sinistra, zerfällt.

Vor der Vereinigung beider Wirbelarterien zur Arteria basilaris giebt jede ab:

- a) Eine vordere und hintere Rückenmarksarterie, Arteria spinalis anterior et posterior. Die vordere verbindet sich mit jener der anderen Seite zu einem einfachen Stämmchen, welches längs des Sulcus longitudinalis anterior der Medulla spinalis etwas geschlängek herabläuft, und mit den Ramis spinalibus, die durch die Foramins intervertebralia eintreten, einfache oder inselförmige Anastomosen bildet. Die hintere fliesst mit der anderseitigen nicht zu Einem Stämmchen zusammen, anastomosirt aber wohl durch vermittelnde Bogen mit ihr und den Ramis spinalibus.
- β) Die Arteria cerebelli inferior posterior, zu dem hinteren Abschnitt der unteren Gegend des kleinen Gehirns. Sie giebt Aeste zum Unterwurm, und zum Plexus choroideus des Ventriculus quartus.
- γ) Die Arteria cerebelli inferior anterior, zum vorderen Abschaft der unteren Kleinhirngegend, und der Flocke.

Aus der Arteria basilaris entspringen:

- a) Die Arteria auditiva interna, welche in den inneren Gebörgang eintritt, und ihre Zweigehen durch die grösseren Löcher der Macules cribrosae, und des Tractus spiralis, zu den häutigen Bläschen des Vorhofs, und zur Lamina spiralis schickt.
- β) Die Arteria cerebelli superior. Diese geht am vorderen Rande des Pons nach aussen, und neben der Eminentia quadrigemina zur oberen Fläche des kleinen Gehirns.
- γ) Die beiden Arteriae profundae cerebri (die Endäste der Arteria basilaris) senden kleine Zweige durch die Substantia perforata medis zum Plexus choroideus der dritten Hirnkammer, nehmen die Arterias communicantes von den inneren Carotiden auf, schlagen sich um die Pedunculi cerebri nach rück- und aufwärts, schicken Aeste durch den Querschlitz zum Plexus choroideus medius, und verbreiten ihre Endzweige an den hinteren Lappen des grossen Gehirns.

Die Wirbelarterie betritt nicht selten erst am 5. oder 4. Wirbel den Schlagaderkanal. Sie kommt auch doppelt, selbst dreifach vor, in welchem Falle ihre Wurzeln nicht durch dasselbe Querfortsatzloch eintreten. Gewöhslich vereinigen sich die vervielfältigten Wirbelarterien im Querfortsatzkanal zu einem einfachen Stamm. Beide Wirbelarterien sind nicht immer am Grösse einander gleich. Die Basilararterie bildet in seltenen Fällen durch Spaltung und Wiedervereinigung Inseln, wodurch ihre Uebereinstimmung mit den Arteriis spinalibus sich deutlich kundgiebt. J. Davy (Edinb. Med. and Surg. Journal. 1838. pag. 4.) entdeckte in der Basilararterie eine senkrechte, handartige Scheidewand, als Trennungsspur zwischen den verschmolzenen Wirbelarterien, und Uebergang zur Juxtaposition. Weber sah die Basilararterie durch ein Loch in der Sattellehne gehen.

Siehe meine Beobachtungen über Abnormitäten der Wirbel- und Buitarterie, in den med. Jahrb. Oesterr. 1842. Juli. pag. 217, und A. P. Wather, de vasis vertebralibus. Lips., 1730.

...

Durch die Verbindung beider Arteriae communicantes mit den tiesen Gehirnarterien wird die Carotis interna mit der Arteria vertebralis in eine für die gleichmässige Blutvertheilung im Gehirne höchst wichtige Anastomose gebracht, welche als Circulus arteriosus Willisii bezeichnet wird. Der Circulus Willisii ist, streng genommen, kein Kreis, sondern ein Polygon, und zwar ein Sechseck, wenn die beiden Arteriae corporis callosi zu Einem kurzen Stämmchen verschmelzen, — ein Siebeneck, wenn ihre Verbindung durch einen Querast (Arteria communicans anterior) bewerkstelligt wird. Der Willis'sche Aderring schliesst das Chiasma, das Tuber cinereum, und die Corpora mammillaria ein; er entspricht somit, der Lage nach, der Sella turcica.

b) Die innere Brustarterie, Arteria mammaria interna. Sie entspringt von der unteren Peripherie der Arteria subclavia, gegenüber der Arteria vertebralis, läust, mässig bogensurmig nach vorn und aussen gekrümmt, zur hinteren Fläche der vorderen Brustwand, wo sie hinter den Rippenknorpeln, und neben dem Seitenrande des Brustbeins, herabsteigt. Zwischen dem sechsten Rippenknorpel und dem Processus xiphoideus sternigeht sie in die Arteria epigastrica superior über.

Zweige derselben sind (nebst den unbedeutenden Arteriae mediastinicae, und der bronchialis anterior):

- α) Die dünne Arteria pericardiaco-phrenica, welche mit dem Nervus phrenicus an der Seitenwand des Herzbeutels zum Zwerchselle gelangt.
- β) Die Arteriae intercostales anteriores gehen in den sechs oberen Zwischenknorpelräumen nach aussen, anastomosiren mit den von der Brustaorta entspringenden, stärkeren und längeren, hinteren Zwischenrippenschlagadern. Sie schicken gleich nach ihrem Ursprunge Ramos perforantes zur Haut und den Muskeln der vorderen Thoraxwand. Im weiblichen Geschlechte sind die Rami perforantes des zweiten bis fünften Intercostalraums stärker als die übrigen, da sie Aeste (Arteriae mammariae externae) zur Brustdrüse abgeben. Oesters sind die Rami perforantes selbstständige Aeste der Mammaria interna.
- γ) Die Arteria musculo-phrenica verläust längs des Ursprunges der Pars costalis diaphragmatis herab, und giebt die Arterias intercostales anteriores sur die unteren Zwischenrippenräume ab.
- d) Die Arteria epigastrica superior dringt zwischen dem siebenten Rippenknorpel und dem Schwertfortsatz (selten durch ein Loch des letzteren) in die Substanz des geraden Bauchmuskels, wo sie bis zum Nabel herab gelangt, und mit der Arteria epigastrica inferior (aus der Arteria cruralis) und den übrigen Bauchmuskelarterien anastomesirt.

Ich sah sie östers mit der entgegengesetzten durch einen hinter dem Schwertsortsatz vorbeilausenden Verbindungsast anastomosiren. Feine Aestchen derselben lausen im Ligamentum suspensorium hepatis zur Leber.

Die Arteria mammaria interna entspringt abnormer Weise aus der Ano-

nyma, dem Aortenbogen, dem Truncus thyreo-cervicalis, ist auf beiden Seiten oder nur auf einer doppelt. Einen höchst merkwürdigen Fall und einzig in seiner Art besitze ich, wo die Arteria mammaria dextra im 4. Zwischenrippenraum den Thorax verlässt, und sich über den 5. Rippenknorpel wieder in ihn zurückbegiebt.

- c) Die Schilddrüsen-Nackenarterie, Truncus thyreo-cervicalis. Ein kurzer und dicker Stamm, welcher vor der Arteria vertebralis entspringt, und in folgende vier Aeste zerfällt:
 - a) Die untere Schilddrüsenschlagader, Arteria thyreoides inferior. Sie steigt am inneren Rande des Scalenus anticus bis zum fünsten Halswirbel empor, krümmt sich hinter der Carotis nach innen und unten, versieht die Lust- und Speiseröhre mit kleinen Zweigen, giebt einen starken Ast zum unteren, und einen zweiten zum Seitenrande der Schilddrüse, welche mit der Arteria thyreoidea superior derselben Seite, und der inferior der entgegengesetzten, anastomosiren, und lässt die Arteria laryngea inferior unter dem Constrictor pharyngis inferior zur hinteren Kehlkopswand gelangen.
 - β) Die aufsteigende Nacken- oder Halsarterie, Arteris cervicalis ascendens. Sie geht vor den Wirbelquerfortsätzen bis zum Schädel hinauf, versorgt die tiefen Hals- und Nackenmuskeln, und anstomosirt mit den Muskelästen der Arteria vertebralis, cervicalis descendens, und cervicalis profunda.
 - γ) Die oberflächliche Nackenarterie, Arteria cervicalis superficialis. Sie entspringt fast immer aus der Arteria cervicalis ascendens, läuft über dem oberen Rande des Schlüsselbeins nach aus- und
 rückwärts durch die Fossa supraclavicularis, ist hier nur durch das
 Platysma und das hochliegende Blatt der Fascia cervicalis bedeckt, geht
 dann unter den Musculus cucullaris, in welchem sie sich, so wie in
 den beiden Spleniis und Rhomboideis, auflöst.
 - d) Die quere Schulterblattarterie, Arteria transversa scapulae. Sie zieht hinter dem Schlüsselbein quer nach aussen, sendet
 den Ramus acromialis zur Schulterhöhe, geht durch die Incisura scapulae zur oberen Grätengrube, und hinter dem Collum scapulae zur
 unteren Grätengrube herab, und giebt allen Muskeln, mit denen sie in
 Berührung kommt, Zweige.
- d) Die Rippen-Nackenschlagader, Truncus costo-cervicalis-Ein kurzer, hinter dem Scalenus anticus außteigender Stamm, welcher sich in zwei Zweige theilt:
 - a) Die obere Zwischenrippenarterie, Arteria intercostalis suprema, welche vor dem Halse der ersten und zweiten Rippe herabsteigt, und die Arteria intercostalis posterior prima et secunda zum ersten und zweiten Zwischenrippenraum schickt.
 - β) Die tiefe Nackenarterie, Arteria cervicalis profunde, welche unter dem Querfortsatz des siebenten Halswirbels nach hinten, met

in den tiefen Nackenmuskeln nach aufwärts läuft, um in der dritten und vierten Schichte der Nackenmuskeln sich zu ramisiciren. (Anastomosen mit den übrigen Cervicalschlagadern.)

- e) Die quere Nackenarterie, Arteria transversa colli. Sie entspringt als ein stattliches Gefäss, entweder zwischen den Scaleni, oder jenseits derselben. Letzteres kommt häufiger vor. Sie geht parallel mit der
 Arteria transversa scapulae (über welcher sie in der Fossa supraclavicularis liegt) nach aussen, durch den Plexus brachialis durch, zum oberen
 Rande der Scapula, an dessen innerem (oberen) Winkel sie in zwei ungleiche Endzweige zerfällt:
 - a) Ramus supraspinatus (der schwächere Ast), zum Musculus supraspinatus, cucullaris, deltoideus, levator scapulae, und zum Acromion.
 - β) Arteria dorsalis scapulae (stärker), welche dem inneren Rande des Schulterblattes entlang, zwischen dem Rhomboideus und Serratus posticus superior, herabsteigt, und in den Muskeln des Schulterblattes und dem Serratus anticus major verschwindet. Sie anastomosirt mit den Dorsalasten der Zwischenrippenarterien.

Der Ursprung der Aeste d) und e), so wie ihre primären Zweigbildungen, haben einen so grossen Variationsspielraum, und sind als Muskelgesässe von so untergeordneter Wichtigkeit, dass ihre Auszählung übergangen werden kann.

§. 328. Verästlung der Achselarterie.

Die Arteria axillaris ist die Fortsetzung der Arteria subclavia. Von der Austrittsstelle zwischen den beiden Scaleni bis zum unteren Rande der Achselhöhle herab, führt sie diesen Namen. In der topographischen Anatomie wird das einen Zoll lange Anfangsstück der Arteria axillaris, welches sich vom äusseren Rande des Scalenus bis hinter das Schlüsselbein herab erstreckt, und in der Fossa supraclavicularis auf der ersten Rippe aufliegt, noch zur Arteria subclavia gerechnet, welche Ansicht darum in die beschreibende Anatomie nicht überging, weil dadurch die feste Grenze zwischen Ende der Subclavia und Anfang der Axillaris (der äussere Rand des Scalenus) aufgegeben wird.

Die Achselarterie begleitet den Plexus axillaris, unter welchem sie bei ihrem Austritte zwischen den Scaleni liegt, zur Achselhühle, wird von seinen Bündeln an drei Seiten umgeben, hat über sich das Schlüsselbein und den Musculus subclavius, vor sich und etwas nach innen die Vena axillaris, und wird vom Kopfe des Oberarms durch den Musculus subscapularis getrennt. Die Vena cephalica geht vor ihr weg zur Achselvene. Nach innen wird sie von der Haut und der Aponeurose bedeckt, kann leicht gefühlt, und gegen den Knochen angedrückt werden. Die beide Wurzeln des Nervus medianus umgreifen sie.

Nebst kleinen und unbeständigen Zweigehen zu dem Museutei

tus anticus major, subscapularis, coraco-brachialis, und den Lymphdrusen der Achsel, treibt sie folgende Aeste aus:

- a) Die Arteria thoracica suprema, einfach oder doppelt, dringt zwischen Suhclavius und Pectoralis minor zum grossen Brustmuskel, und bei Weibern bis zur Mamma vor.
- b) Die Arteria acromialis entspringt neben der vorigen, geht vor dem Pectoralis minor nach aussen, giebt dem Pectoralis major und Deltoides jedem einen ansehnlichen Zweig, verbirgt sich unter dem Clavicularursprung des Deltamuskels, geht gegen das Acromion hin, giebt der Capsula kumeri Zweigchen, und sendet mehrere Ramos acromiales zur oberen Fläche der Schulterhöhe, welche mit den Verästlungen des Ramus acromialis der Arteria transversa scapulae das Rete acromiale bilden.
- c) Die Arteria thoracica longa läust an der hinteren Wand der Achselhöhle herab, ausstomosirt mit den Aesten der Arteria thoracica suprems und subscapularis, verliert sich grösstentheils im Musculus serratus anticus major, und mit 2—3 Zweigen (Arteriae mammariae externae) im äusseren Abschnitte der Mamma.
- d) Die Arteria subscapularis steigt eine Weile am Musculus teres major herab, und theilt sich in zwei Aeste: α) Ramus thoracico-dorsalis, welcher parallel mit dem äusseren Schulterblattrande hinter der Arteris thoracica longa herabsteigt, und sich in den unteren Zacken des Serratus anticus major und den Rippenursprüngen des Latissimus dorsi verliert. β) Die Arteria circumflexa scapulae. Diese schlägt sich, zwischen dem unteren Rande des Musculus subscapularis und dem oberen des Teres major, um den vorderen Rand der Scapula, und geht zu den Muskeln in und an der Fossa infraspinata.
- e) Die Arteria circumstexa humeri anterior, welche vor dem Collum chirurgicum humeri, und
- f) die stärkere Arteria circumslexa posterior, welche hinter demselben dicht am Knochen herumläust, das Schultergelenk und die darüber wegziehenden Muskeln versieht, und mit der Circumslexa anterior anastomosirt.

§. 329. Verästlung der Armarterie.

Ist die Arteria axillaris zwischen den Sehnen des Pectoralis major und Latissimus dorsi hervorgekommen, so heisst sie Armarterie, Arteria brachialis, und steigt im Sulcus bicipitalis internus herab. Unter der Sehne des Pectoralis major hat sie den Nervus medianus an ihrer ausseren, den Nervus ulnaris an ihrer inneren Seite. Im Herabsteigen gegen den Ellbogenbug, geht der Mediannerv über ihre vordere Seite zu ihrer inneren, und entfernt sich in der Plica cubiti etwas von ihr, was der Nervus ulnaris schon hüher oben thun muss, da er zur hinteren Seite des Ellbogens zu gehen hat. Die beiden Venae brachiales liegen dicht an ihr. In der ganzen Länge des Sulcus bicipitalis wird sie nur durch Haut und

Fascie bedeckt; im Ellbogenbug dagegen versteckt sie sich unter der Aponeurose, welche die Sehne des Biceps zur Vagina antibrachii sendet.

Die Folge ihrer Aeste ist so variant, dass sie selbst an beiden Armen desselben Individuums nicht zusammenstimmen. Ausser 8-12 grösseren und kleineren, an unbestimmten Stellen entspringenden Muskelästen, verdienen nachstehende besondere Erwähnung:

- a) Die Arteria profunda brachii. Sie entspringt einen Zoll unter der Achselhöhle, geht mit dem Nervus radialis um den Oberarmknochen nach aussen herab, giebt dem Triceps Zweige, aus deren einem die Arteria nutriens humeri entspringt, und verläust hinter dem Ligamentum intermusculare externum (wo sie Arteria collateralis radialis genannt wird) herunter zum Ellbogen, wo sie sich in das die schwammigen Enden der Knochen umstrickende Rete articulare cubiti einsenkt.
- b) Die Arteria collateralis ulnaris superior entspringt nahe unter der Arteria profunda brachii, begleitet den Nervus ulnaris, giebt dem Musculus brachialis internus Zweige, und verliert sich, zwischen Condylus humeri internus und Olekranon, in das Rete articulare cubiti.
- c) Die Arteria collateralis ulnaris inferior entsteht drei Querfinger über dem Condylus internus, gegen welchen sie ihre Richtung einschlägt, die von ihm entspringenden Muskeln (obere Schichte derselben) versorgt, und im Rete cubiti ihr Ende findet.

Im Ellbogen liegt die Arteria brachialis auf dem unteren Ende des Musculus brachialis internus, an der inneren Seite der Sehne des Biceps, an der äusseren des Pronator teres, und theilt sich in der Höhe des Processus coronoideus ulnae in die beiden Schlagadern des Vorderarms: die Armspindel- und Ellbogenarterie.

A. Haller, diss. de arteria brachiali. Gott., 1745. 4.

9—10 Linien über ihrer Theilung sendet sie von ihrem inneren Rande eine kleine, aber constante Schlagader ab, welche unter dem aponeurotischen Fascikel der Bicepssehne zu der am Condylus internus humeri entspringenden Muskelmasse (Pronator teres, Palmaris longus, Radialis internus, und Flexor digitorum sublimis) zieht, und den Nervus medianus hiebei kreuzt. Gruber beschrieb sie als Arteria plicae cubiti superficialis. Sie ist darum interessant, weil sie in abnormer Entwicklung entweder eine Arteria mediana superficialis, oder Arteria ulnaris superficialis, darstellt. Siehe Gruber's Aufsatz in der Zeitschrift der ärztl. Gesellschaft. Wien, 1852. 12. Heft.

§. 330. Verästlung der Vorderarmarterien.

Die Armspindel- und die Ellbogenarterie Ma Verlause an der inneren Seite des Vorderarms, 1 Hohlhand zum hoch- und tiesliegenden 45 grössere Anzahl der Fingerarterien entsteht. Die Ellbogenarterie giebt beid nach ihrem Ursprunge die Zwischenknochenarterie ab, welche die Längenrichtung der beiden anderen Vorderarmschlagadern besitzt, aber nicht zum Handteller gelangt. Jedes dieser drei Gefässe sendet anfangs einen Ast zur Bildung des Rete cubiti ab, welcher, da die Theilungsstelle der Arteris brachialis unter dem Cubitus liegt, ein zurücklaufender sein wird. Im weiteren Verfolge entstehen blos Muskeläste aus ihnen, welche oberflächliche Endzweige zur Haut, und einen tiefen Zweig zur Markhöhle der Vorderarmknochen erzeugen.

- a) Die Armspindelarterie, Arteria radialis. Sie liegt anfangs zwischen Supinator longus und Pronator teres, weiter unten zwischen Supinstor longus und Flexor carpi radialis. An ihrer ausseren Seite befindet sich der Nervus radialis superficialis. An der Handwurzel angekommen, wendet sie sich zwischen dem Processus styloideus radii und dem Os scaphoideus auf den Rücken der Hand, wo die Sehnen des Abductor pollicis longus und Extensor brevis über sie wegziehen, und dringt zwischen den Bases der Ossa metacarpi des Daumens und des Zeigefingers wieder in die Hohlhand ein, wo sie mit dem tiefen Aste der Ellbogenarterie den tiefen Hohlhand bogen, Arcus volaris profundus, bildet. Sie gieht, von ihrem Ursprunge bis zum Uebertritt auf den Handrücken, folgende Aeste ab:
 - α) Die Arteria recurrens radialis, welche zwischen Supinator longus und brevis zum Condylus humeri externus, und sofort in das Rete cubiti gelangt.
 - β) Ramos musculares zu den Muskeln, zwischen welchen sie hinzieht.
 - γ) Den Ramus volaris superficialis, dessen Kaliber und Ursprung vielen Schwankungen unterliegt. Gewöhnlich hat er ½" Durchmesser, und entsteht in der Höhe der Insertion des Supinator longus, geht über den Daumenballen, nur von der Haut und der Fascia des Ballens bedeckt (weshalb man ihn, wenn er stärker entwickelt ist, leicht pulsiren sehen und fühlen kann), zur Hohlhand, und bildet unter der Aponeurosis palmaris, und auf den Sehnen der Fingerbeuger, durch Anastomose mit dem oberstächlichen Hohlhandaste der Arteria ulnaris, den Arcus volaris sublimis.

Auf dem Handrücken entstehen aus der Radialis:

α) Ein Ramus carpi dorsalis zum Rete carpi dorsale. β) Drei Rückenschlagadern, Arteriae digitales dorsales, für beide Seiten des Daumens und die Badialseite des Zeigesingers, welche gewöhnlich aus einem kurzen Stämmchen (Arteria interossea dorsalis prima) hervorkommen.

In die Hohlhand wieder eingetreten giebt sie, bevor sie mit der Arteria ulnaris bogenförmig zusammensliesst, die Arteria digitalis communis volaris prima ab, welche unter der Sehne des Flexor pollicis longus am Os metacarpi pollicis bis zu dessen Capitulum verläust, und nachdem in

die Arteria volaris indicis radialis abgegeben, sich in die Arteria volaris pollicis radialis et ulnaris theilt.

- b) Die Ellbogenarterie, Arteria ulnaris. Sie geht unter der ersten und zweiten Schichte der vom Condylus humeri internus entspringenden Muskeln zur Ulna, und an ihrer inneren Fläche, zwischen Ulnaris internus und den Fingerbeugern, zur Handwurzel herab, hat den Nervus ulnaris an ihrer inneren Seite, läust über dem queren Handwurzelband und an der Radialseite des Os pisiforme zur Hohlhand, wo sie sich in den oberflächlichen und tiefliegen den Endast spaltet. Der oberflächliche Ast bildet mit dem gleichen Aste der Arteria radialis den hochliegenden, der tiefliegende Ast auf dieselbe Weise den tiefliegenden Gefässbogen der Hohlhand. Ihre Zweige sind:
 - a) Die Arteria recurrens ulnaris, welche zwischen den vom Condylus humeri internus entspringenden Muskeln nach innen und oben zum Rete cubiti gelangt.
 - B) Rami musculares zu ihrem Muskelgeleite.
 - y) Die Arteria interossea antibrachii communis, welche gleich nach ihrem Abgange in die Interossea externa et interna zerfällt. Die externa (auch perforans superior) durchbohrt die Membrana interossea, sendet hierauf die Arteria recurrens interossea zum Rete cubiti, bleibt aber nicht auf der Aussensläche des Zwischenknochenbandes, sondern erhebt sich etwas von ihm, indem der Musculus abductor und extensor pollicis longus sich unter sie einschieben, theilt allen Aussenmuskeln des Vorderarms Aeste mit, und erschöpst sich dadurch so sehr, dass am Carpus nur ein unbedeutendes Gefäss übrig bleibt, welches in das Rete carpi dorsale übergeht. Die interna geht dicht am Zwischenknochenbande herab bis zum oberen Rande des Pronator quadratus, giebt den tiesen Muskeln Zweige, verbirgt sich unter dem Pronator quadratus, und geht, nachdem sie einen Ast zum Rete carpi volare abgegeben, durch das Ligamentum interosseum zur Aussenseite des Vorderarms, wo sie im Rete carpi dorsale untergeht (dieses Endstück heisst Arteria interossea perforans inferior). -
 - d) Der Ramus dorsalis, welcher zwei Querfinger über dem Carpus sich zum Handrücken krümmt, um an das Rete carpi dorsale zu treten.

Nun folgen bis zur Spaltung in den oberstächlichen und tiesliegenden Endast, ausser der Arteria volaris für die Ulnarseite des kleinen Fingers, keine nennenswerthen Zweige mehr.

Der oberflächliche Hohlhandbogen, Arcus volaris sublimis, dessen Convexität gegen die Finger gerichtet ist, liegt ½ Zoll unter dem Ligamentum carpi transversum, zwischen der Aponeurosis palmaris und den Beugesehnen der Finger. Er ist eigentlich eine unmittelbare Verlängerung des oberflächlichen Hohlhandastes der Arteria ulnaris, welcher in der Regel viel stärker ist, als der Ramus volaris superficialis der Arteria

radialis. Nur in jenen Ausnahmsfällen, wo letzterer an Umfang gewinnt, ist der Arcus volaris superficialis ein durchaus gleichweiter Gefässbogen. Aus seiner convexen Seite entspringen, nebst übergehenswerthen Zweigchen für die Haut und die kleinen Muskeln der Hohlhand, drei Arteriae digitales communes volares, die zweite, dritte und vierte, welche zwischen den Scheiden der Beugesehnen nach vorn laufen, wobei jede sich gebeförmig in zwei Zweige theilt, welche an den einander zugekehrten Flächen der vier Finger bis zur Spitze verlaufen. Die Ulnarseite des kleinen Fingers erhält ihre Arteria volaris aus dem tiefliegenden Endast der Arteria unaris, — die Radialseite des Zeigefingers und beide Seiten des Daumess aus der ersten Arteria digitalis communis volaris von der in die Hohlhand wieder eingetretenen Arteria radialis. Die Volararterien eines Fingers hängen an den Internodien häufig durch Queräste zusammen, und gehen an der Tastseite des Nagelgliedes bogenförmig in einander über.

Der tiefliegen de Hohlhandbogen, Arcus volaris profundus, ist dünner und weniger convex, als der sublimis, liegt auf den Bases ossium metacarpi, und gehört mehr der Arteria radialis als der ulnaris an. Er sendet die vier Arterias interosseas volares ab, welche den Interstitiis interosseis entsprechen, und die Ramos interosseos perforantes zum Handrücken schicken, wo sie in das Rete carpi dorsale übergehen. — Das Rete carpi dorsale giebt die zweite, dritte und vierte Arteria interossea dersalis ab (die erste stammt aus dem Handrückenstück der Arteria radialis). Jede interossea externa theilt sich zwischen je zwei Fingern in zwei Arteriae digitales dorsales, welche viel schwächer als die volares sind, und nur bis zum zweiten Gliede sich erstrecken.

Die Enden der Arteriae interosseae volares anastomosiren gewöhnlich mit der Spaltungsstelle der Arteriae digitales volares communes. Ist eine Arteria digitalis volaris communis schwach, so ist die mit ihr anastomosirende interossea volaris um so stärker, was am Zeige- und Mittelfinger gewöhnlich der Fall ist.

§. 331. Wichtige Abnormitäten des Ursprungs der Vorderarmarterien.

Sie verdienen ihrer chirurgischen Bedeutung wegen eine besondere Darstellung.

Die Aeste der Brachialarterie entspringen östers nicht im Ellboges, sondern hüher oben, selbst in der Achselhöhle. Der hohe Ursprung kann jede der langen Vorderarmarterien (radialis, ulnaris, und interossea) treffen, und ist häusiger an beiden Armen, als nur an einem zu beobachten. Meine Beobachtungen über das ungleich häusigere symmetrische Vorkommen des hohen Ursprunges, stimmen mit jenen von Monro und Meckel vollkommen überein (Krause behauptet das Gegentheil). Am häusigsten

entspringt die Arteria radialis höher als gewöhnlich, aber sehr selten schon in der Achselhöhle. Unter 24 Fällen von hoher Theilung, die ich aufgezeichnet habe, betreffen 18 die Arteria radialis. Diese Anordnung wurde sogar, nach einer Bemerkung von Wolff (Obs. med. chir. pag. 64), von Bidloo für die regelmässige gehalten, was übrigens nur für die Quadrumanen gilt. Penchienati hat sie unter 20 Armen dreimal, Meckel unter 12 Armen viermal beobachtet. Die hoch entsprungene Arteria radialis liegt meistens an der inneren Seite der Arteria brachialis, geht aber bald über sie weg zu ihrer äusseren. Sie bleibt eine Strecke weit unter der Fascia brachii, wird aber im weiteren Verlaufe hochliegend, geht über den aponeurotischen Schenkel der Bicepssehne, kreuzt sich mit den Hautvenen des Ellbogenbuges, und kann deshalb bei der Aderlässe leicht verletzt werden. Ihre oberflächliche Lage ist der Grund, warum sie die Arteria recurrens radialis in der Regel nicht abgiebt. (Diese entsteht vielmehr aus der Arteria ulnaris, oder seltener aus der Arteria interossea.)

Als Uebergang zum hohen Ursprung der Arteria radialis kann jener Fall angesehen werden, wo aus der Arteria brachialis ein überzähliger Ast (Vas aberrans) entspringt, der sich entweder weiter unten wieder in sie einmündet (erster Schritt zu den bei den Faulthieren vorkommenden Wundernetzen der Armschlagader), oder in die Arteria radialis (seltener in die ulnaris) übergeht. Es kommt auch vor, dass die hoch entsprungene Arteria radialis durch einen Verbindungsast mit der Brachialarterie im Ellbogen anastomosirt.

Ist die Arteria ulnaris das hoch entspringende Gefäss, so fällt ihr Ursprung, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, noch in das Gebiet der Achselhühle (Burns, Sandifort, Fleischmann, Meckel). Ich besitze nur einen Fall (rechter Arm eines Kindes), wo sie aus der Arteria profunda brachii entspringt. Die hoch entstandene Arteria ulnaris wird regelmässig am Vorderarm ein hochliegendes Gefäss, geht über die vom Condylus internus humeri entspringende Muskelmasse weg, und lagert sich erst unter dieser in die Furche zwischen Ulnaris internus und Flexor digitorum sublimis. Sie giebt nie die Arteria interossea ab. — Der hohe Ursprung der Arteria interossea kommt mit und ohne hohen Ursprung der übrigen Vorderarmarterien vor, und ist seltener als jener der Arteria radialis und ulnaris.

Auch die zuweilen vorkommende Vervielsältigung der Vorderarmarterien gehört hieher. Sie erscheint entweder als Duplicität einer normalen Schlagader, wie ich an der Arteria radialis sah, welche schon auf dem Supinator brevis sich in zwei Aeste theilte, die sich als Ramus volaris und dorsalis im weiteren Verlause herausstellten, oder es kommt eine neue Schlagader hinzu, welche aus der Arteria interossea, seltener aus der ulnaris entspringt, und an dem Nervus medianus zum Carpus herabläust, wo sie über oder unter dem Ligamentum transversum carpi in den Arcus volaris subsimis übergeht. Man könnte sie Arteria mediana nennen, obwohl sie nicht

immer am Nervus medianus herabsteigt. In Fällen, wo die Arteria radistis ungewöhnlich schwach ist, und nicht bis zur Hand gelangt, biegt sich de Arteria mediana oberhalb des Carpus rechtwinklig zur Speiche, und verläust als Arteria radialis weiter. Der Nervus medianus wird regelmang von einer seinen Arterie, die ein Ast der Ulnaris oder Interossea ist, begleitet. Die eben als Arteria mediana angesührte Anomalie ist sonach mein höherer Entwicklungsgrad eines normal vorkommenden seinen Gestass. Gruber nennt dieses Gestass: Arteria mediana profunda, da seinen §. 329 erwähnte Arteria plicae cubiti, bei abnormer Entwicklung, ein Arteria mediana superficialis darstellt.

Der hohe Ursprung und der oberstächliche Verlauf der Vorderarmarteis scheinen das Bestreben auszudrücken, die Arterien der oberen Extremität der Venen zu verähnlichen, indem die hoch entsprungene Arteria radialis der Vena cephalica, und die Arteria ulnaris der basilica entspricht. Bei Verwundungen, und bei gewissen Operationen in der Verlaufssphäre dieser Gesase, soll der Chirurg von ihrem möglichen Vorhandensein wohl unterrichte sein. — C. G. Ludwig, de variantibus arteriae brachialis ramis. Lip., 1767. 4. — F. Tiedemann, über die hohe Theilung der Armschlagader, im 6. Bask der Münchner Deukschristen, und dessen Supplementa ad tabulas arteriarus. 1846. — J. F. Meckel, im 2. Bande des deutschen Archivs sur Physiologic. — H. Meyer, über die Arteria mediana antibrachii und die Arteria articularis mediana cubiti, in Henle und Pseuser's Zeitschrist. 7. Bd. 2. Helt. — Gruber, loc. cit.

§. 332. Aeste der absteigenden Brustaorta.

Die Aorta thoracica descendens giebt viele, aber kleine Schlagden ab, und nimmt deshalb an Umfang nicht erheblicher Weise ab. Sie siel für die Organe des hinteren Mittelfellraumes und für die Brustwand bestimmt.

- a) Die Arteriae bronchiales posteriores. Sie treten zur hinteren Wast beider Luströhrenäste, und begleiten sie durch das Lungenparenchym. Gewöhnlich sinden sich zwei, zuweilen drei oder vier. Da die Aorta auf der linken Seite liegt, so wird die Arteria bronchialis dextra häusig nicht seihr, sondern aus der dritten Arteria intercostalis dextra entstehen. Zeweilen giebt die Aorta einen unpaaren Zweig ab, der sich in die rechten und linken Bronchialschlagadern theilt.
- b) 3-6 Arteriae oesophageae. Die letzte geht mit dem Oesophagus durch das Zwerchsell zum Magen, und anastomosirt mit der Arteria corenaria ventriculi sinistra.
 - c) Zahlreiche, aber seine Zweige (Arteriae mediastinicae) zu der Pleurs.
 b) und c) geben dünne Reiserchen zur hinteren Herzbeutelward (Arteriae pericardiacae posteriores).
- d) Die Arteriae intercostales. Da die Arteria subclavia durch des Truncus costo-cervicalis bereits die beiden oberen Spatia intercestalis bedachte, so werden für die Aorta nur die neun folgenden Zwischenzippat-

räume übrig bleiben. Da man aber die am unteren Rande der letzten Rippe verlausende Arterie (so wie den hier besindlichen Nerven), obwohl gegen alle Consequenz, noch als intercostal bezeichnet, so wird die Aorta zehn Paare Arteriae intercostales abgeben. Die linken werden, wegen linkseitiger Lage der Aorta, kürzer als die rechten sein, welche über die Wirbelsäule nach rechts umbiegen müssen. Sie entspringen meistens tiefer als der Intercostalraum liegt, zu welchem sie gehen, und treten unter spitzigen Winkeln von der hinteren Peripherie der Aorta nach aufwärts. Unter dem Rippenköpschen theilt sich jede in den Ramus dorsalis und intercostalis. Der Ramus dorsalis geht zwischen je zwei Querfortsätzen zur Rückenmusculatur, und schickt durch das Foramen intervertebrale einen Ast zur Medulla spinalis und deren Häuten, welcher sich wie die Rami spinales der Arteria vertebralis verhält. Der Ramus intercostalis läuft gegen den unteren Rand der darüber liegenden Rippe, und im Sulcus costae nach vorn. Er sendet zum oberen Rande der nächst unteren Rippe einen schwachen Ramus supracostalis, und anastomosirt nach vorn mit der Arteria intercostalis anterior von der Mammaria interna. Er giebt den Intercostalinuskeln, dem Pectoralis, Serratus anticus major, und den Rippenzacken der Bauchmuskeln Aeste; beim Weibe gehen von der dritten bis sechsten Arteria intercostalis stärkere Aeste für die Brustdrüse ab.

Abweichungen greisen insosern Platz, als mehrere Arteriae intercostales (2-3) aus einem gemeinschastlichen Stamme entspringen, welcher, wie die Arteria intercostalis suprema, vor den Rippenköpschen herabsteigt, und in jedem Intercostalraum einen Ast zurücklässt. Auch ist es nicht ungewöhnlich, dass eine starke Arteria intercostalis, nachdem sie schon eine Strecke am Rippensulcus verlief, sich zur nächst unteren, oder über zwei solgende Rippen schräg herabsenkt (bei Verwundungen und Paracentesis pectoris bedeutsam). Die letzte Arteria intercostalis könnte besser costo-lumbalis genannt, — und weil sie unter dem Rippenursprunge des Zwerchsells verläust, den Aesten der Bauchaorta als Arteria lumbalis prima zugezählt werden.

So lange eine Zwischenrippenarterie in ihrem Sulcus costalis verläust, ist sie durch dessen längeres äusseres Labium vor Verwundung hinlänglich gesichert, und nach vorn, wo der Sulcus verstreicht, ist ihr Kaliber so klein, dass ihre Trennung unmöglich ernste Gesahr bringen kann. Es sehlt noch viel zu sehr an authentischen Beobachtungen über wirkliche Verletzungen dieser Gesässe, und die vorgeschlagenen sinnreichen Methoden, ihnen zu begegnen, dürsten weniger bewährt, als versucht worden sein.

§. 333. Aeste der Bauchaorta.

Die Aorta abdominalis giebt, auf der kurzen Strecke vom zwölsten Brustwirbel bis zum vierten Lendenwirbel, unpaarige und paarige Aeste ab. Die drei unpaarigen entspringen aus ihrer vorderen Peripherie, und sind für die Verdauungsorgane, — die übrigen, seitwärts abtretenden, für die paarigen Harn- und Geschlechtswerkzeuge und für die Benehm

A. Unpaarige Aeste der Bauchaorta.

a) Die kurze Baucharterie, Arteria coeliaca. Dieser ½2—1 Zel lange, starke Gesässstamm entspringt noch zwischen den Schenkela des Zwerchsells, giebt dicht an seinem Ursprunge die beiden unteren Zwerdsellsarterien, Arteriae phrenicae inferiores, ab, welche auch zu einem kurzen Stämmchen verschmolzen sein können. Sie lausen (das Foramen provena cava und oesophageum umgreisend) nach aussen, oben und vorn, geben Ramos suprarenales zur Nebenniere, die rechte auch seine Zweigden aus dem Wege des Ligamentum suspensorium hepatis zur Leber, veräsch sich in der Pars lumbalis und costalis diaphragmatis, und anastomosira mit einander, so wie mit den Arteriae intercostales, lumbales und eenphageae.

An der rechten Seite der Cardia zerfällt der Stamm der Arteria culiaca in drei divergirende Zweige:

- a) Arteria coronaria ventriculi sinistra, linke obere Magenkranzarterie. Sie läust in der Curvatura superior des Magens wa links nach rechts, und sendet an dessen vordere und hintere Fläche ihre Zweige aus, welche mit der Arteria coronaria dextra, den Arteriis cornariis inferioribus, und den Vasis brevibus der Milzarterie anastomosira. Ihre ersten Aeste, welche die Cardia und das untere Ende der Speiseröhre umgreisen, heissen Arteriae oesophageae inferiores und cardiacae.
- β) Arteria hepatica, Leberarterie. Sie läust hinter der oberen Magencurvatur nach rechts, und hinter dem Pylorus zwischen die Blätter des Ligamentum hepato-duodenale. Sie schickt zum kleinen Magenbogen die mit der Arteria coronaria sinistra anastomosirende coronaria dezits, deren erster Nebenzweig als Arteria pylorica zum Pförtner geht. Nach einem zwei Zoll langen Verlauf zerfällt die Arteria hepatica in einen zufund absteigenden Ast von gleicher Stärke.

Der aussteigende ist der eigentlich für die Leber bestimmte Gefässast, Arteria hepatica propria, welcher wieder in zwei Zweige diregirt. Der Ramus dexter giebt der Gallenblase die kleine Arteria cystica, und senkt sich in der Porta hepatis in den rechten und die beiden kleinen Leberlappen ein. Der sinister geht zum linken Leberlappen.

Der absteigende Ast sindet im Magen und Zwölssingerdarm seint Auslösung, und heisst deshalb Arteria gastro-duodenalis. Er geht hinter dem Pylorus herab, und theilt sich ebenfalls in zwei Zweige:

- aa) Die Arteria pancreatico-duodenalis, welche um den Kopf des Pankreas herumgeht, diesen und den grösseren Theil des Intestinum duodenum ernährt.
- bb) Die Arteria gastro-epiploica dextra, welche an der grosses Magencurvatur von rechts nach links läuft (zwischen den Blättern des grossen Netzes), dem Magen außteigende, dem Netze absteigende Außt zuschickt, und mit der Arteria gastro-epiploica sinistra aus der arterie anastomosirt.
 - γ) Arteria splenica, Milzarterie. Der dickste Zweig de

Er zieht geschlängelt am oberen Rande des Pankreas nach links, giebt ihm Zweige, und betritt, von den Blättern des *Ligamentum gastro-lienale* eingeschlossen, den *Hilus lienis*. Er erzeugt, bevor er in die Milz eingeht:

- aa) Die Arteria gastro-epiploica sinistra, welche der dextra entgegenläuft, und sich wie diese verhält.
- bb) Die Vasa brevia s. Arteriae gastricae breves, 4—6, welche zum Fundus ventriculi treten, und eigentlich nur selbstständig gewordene Magenäste der Arteria gastro-epiploica sinistra darstellen.
- b) Die obere Darm- oder Gekrösarterie, Arteria mesenterica s. mesaraica superior. Sie ist etwas stärker als die coeliaca, unter welcher sie entspringt, geht hinter dem Pankreas und dem unteren Querstück des Duodenum zur Wurzel des Gekröses, in welchem sie einen mit seiner Convexität nach links und vorn sehenden Bogen beschreibt. Sie ernährt das untere Querstück des Duodenum, das ganze Jejunum, Ileum, Coecum, und das Colon ascendens et transversum, mit ungefähr zwanzig Aesten, welche grösstentheils aus dem convexen Rande ihres Bogens entstehen.
 - α) Die Arteria duodenalis inferior zum unteren Querstück des Zwölffingerdarms und zum Kopf des Pankreas.
 - β) Die Arteriae jejunales et ileae, 16 an der Zahl. Sie laufen zwischen den Blättern des Gekrüses zu den Darmstücken, deren Namen sie tragen. Jede derselben theilt sich auf diesem Wege in zwei Zweige, welche mit den Zweigen der nächsten bogenförmig anastomosiren. Aus diesem Bogen entspringen kleinere Aeste, die abermals zu kleineren Bogen sich verbinden, und aus diesen treten neuerdings bogenförmig anastomosirende Gefässe hervor, so dass drei Bogenkategorien auf einander folgen, welche an den längeren Arteriae ileae noch um eine oder zwei Bogenreihen vermehrt werden. Es zieht sich also durch das ganze Dünndarmgekröse ein aus bogenförmigen Anastomosen construirtes Netz hin, aus welchem endlich viele kurze Ramuli intestinales entspringen, welche das Darmrohr umgreifen, und seine Häute mit ihren Reisern versorgen. Die sechzehnte Darmarterie ist die Fortsetzung des Stammes der Arteria mesenterica superior.
 - γ) Die Arteria ileo-colica entspringt in der Mitte des concaven Randes des Bogens der Mesenterica superior, steigt im Mesocolon ascendens nach rechts und unten, und theilt sich in zwei Zweige. Der untere anastomosirt mit dem Ende der sechzehnten Darmarterie, der obere mit der Arteria colica dextra.
 - d) Die Arteria colica dextra geht zum Colon ascendens, und
 - e) die Arteria colica media zum Colon transversum.

... 0

e) Die untere Darm- oder Gekrösarterie, Arteria mesenterica inferior, entspringt einen Zoll über dem Ende des Aortenstammes, lagert sich zwischen den Blättern des Colon descendens, und theilt sich in zwei Zweige:

um Colon descendens.

- β) Die Arteria haemorrhoidalis superior zum oberen und mittleren Theil des Rectum. Die Arteriae colicae setzen die Bogenbildung der Dünndarmarterie fort, bilden aber nur eine einfache Reihe von grossen Arkaden mit mehreren kleineren.
 - B. Paarige Aeste der Bauchaorta.
- a) Die Nebennierenarterien, Arteriae suprarenales, gewöhnlich zwei Paare, nicht erheblich.
- b) Die Nierenarterien, Arteriae renales s. emulgentes, entspringen einen Zoll unter der Arteria mesenterica superior unter rechten Winkels (die rechte wegen tieferer Lage der rechten Niere unter einem mehr spitzgen Winkel). Sie geben kleine Zweige zum Nierenfett, zur Nebenniere, zum Nierenbecken und zum Harnleiter, und dringen hinter der Vena renalis in den Hilus renis.
- c) Die inneren Samenarterien, Arteriae spermaticae internee, entspringen nahe unter den Nierenschlagadern, unter sehr spitzigen Winkeln, lausen mit den Harnleitern zum Eingang des kleinen Beckens herab, gehen beim Manne vor den Vasis iliacis zum Leistenkanal, werden in den Samenstrang ausgenommen, und steigen bis zum Hoden herab, in dessen Parenchym sie untergehen. Beim Weibe, wo sie mehr geschlängelt verlaufen, dringen sie vom Seitenrande des Beckeneingangs in die breiten Mutterbänder ein, und begeben sich zum Eierstock, wo sie mit einem Aste der Arteria uterina, welcher längs der Tuba Fallopiae ebenfalls zum Eierstock gelangt, anastomosiren. In beiden Geschlechtern giebt sie seine Reiser zum Harnleiter, zum subserüsen Zellstoff des Bauchfells, und den Lymphdrüsen der Lenden.
- d) Die Lendenarterien, Arteriae lumbales. Es sinden sich nur vier Paare derselben. Wird die unter der letzten Rippe verlausende Arterie nicht als intercostalis ultima (Sümmerring, J. Weber), sondern als Arteria lumbalis prima gezählt (Haller, Sabatier, Theile), so müssten süns Lendenschlagaderpaare angenommen werden, welche aber nicht den süns Lendenwirbeln entsprechen, da der sünste Lendenwirbel unter der sunsten Arteria lumbalis liegt.

Die vier Lendenschlagaderpaare entspringen aus der hinteren Peripherie der Aorta, und wiederholen den Typus der Arteriae intercostales. Sie gehen hinter den Schenkeln des Zwerchfells, die unteren hinter dem Psoas major, nach aussen zu den Zwischenräumen je zweier Processus transversi (besser Processus costarii). Jede Lendenarterie theilt sich in zwei Zweige:

- a) Der Ramus posterior entspricht dem Ramus dorsalis einer Zwischenrippenarterie, sendet einen Ramus spinalis durch das Foramen intervertebrale zum Rückenmark und dessen Hüllen, und löst sich in den Rückenmuskeln auf.
- β) Der Ramus anterior durchbricht die Fascikeln des Quadratus lumborum, und verhält sich wie der Ramus intercostalis einer Zwischen-

rippenarterie. Er verliert sich in den breiten Bauchmuskeln. Alle vorderen Aeste einer Seite anastomosiren unter einander, und mit der Arteria epigastrica superior, die erste mit der intercostalis ultima, die letzte mit der Arteria ileo-lumbalis aus der Hypogastrica, und der circumflexa ilei aus der Cruralis.

Die Aorta abdominalis nimmt durch die Abgabe so vieler und grosser Aeste an Volumen bedeutend ab, und theilt sich vor dem vierten Lendenwirbel (oder etwas tieser) in die beiden Arteriae iliacae communes, welche gabelsormig unter einem spitzen Winkel (65° beim Manne, 75° beim Weibe) divergiren. Die zwischen beiden Arteriae iliacae communes liegende dunne Arteria sacralis media ist eigentlich die Fortsetzung der Aorta abdominalis, in deren verlängerter Richtung sie bis zum Steissbein herabläust. Die geringe Entwicklung der Vertebrae coccygeae des Menschen bedingt die Kleinheit der Arteria sacralis media. Bei Thieren mit langen Schweisen ist die Bedeutung der Arteria sacralis media als Fortsetzung der Bauchaorta nicht zu verkennen, und die beiden Arteriae iliacae communes treten in die untergeordnete Stellung seitlicher Aortenäste.

Die mittlere Arterie des Kreuzbeins, Arteria sacralis media. Sie giebt während ihres Lauses über die vordere Fläche des fünsten Lendenwirbels sehr oft rechts und links einen Ast ab, welcher sich wie eine Arteria lumbalis verhält, einen Ramus spinalis durch das letzte Foramen intervertebrale lumbale zum Rückenmark sendet, und mit einem vorderen und hinteren Aste endet. Ersterer zertheilt sich im Psoas und Iliacus internus, letzterer in den Rückenmuskeln. Im Herabsteigen giebt die Arteria sacralis media den Weichtheilen an der vorderen Kreuzbeinsläche unbedeutende Aestchen, und, der vierten Vertebra sacralis gegenüber, einen stärkeren Zweig zum Mastdarm.

Die beiden gemeinschaftlichen Huftarterien, Arteriae iliacae communes, gehen über den Seiten des fünsten Lendenwirbels nach einwärts vom Psoas major zur Symphysis sacro-iliaca, werden vom Ureter gekreuzt, und können, wegen der Abweichung der Aorta nach der linken Seite der Wirbelsäule, nicht gleich lang sein. Vor und über der Symphysis sacro-iliaca theilt sich jede in die Arteria hypogastrica und Arteria cruralis.

Die häusig zu beobachtenden Varietäten der Aortenäste haben wenig praktische Bedeutsamkeit, da in der Bauchhöhle, an jenen Stellen, wo diese Blutgesässe verlausen, nicht operirt wird. Die Arteriae phrenicae inseriores können sich vermehren (Haller), oder eine derselben sehlen, und durch die Arteria mammaria interna ersetzt werden. — Die Coeliaca zersällt nicht in drei Aeste (Tripus Hulleri), sondern in zwei, indem die Arteria coronaria sinistra ein Zweig der Lienalis oder Hepatica wird. Die Arteria hepatica ist ein frei gewordener Ast der Aorta, der Ramus dexter derselben wird von der Arteria mesenterica superior abgegeben (nach Haller 7mal unter 30 Fällen); — die Arteria splenica wird doppelt; die Arteria mesenterica superior ist ein Zweig der ungewöhnlich starken Coeliaca; die Arteria mesenterica inserior entspringt aus der Arteria iliaca communis sinistra (Petsche), oder sehlt gänzlich, indem die obere Gekrösarterie sie ersetzt (Fleisch-Lehrbuch der Anatomie. 5. Aust.

mann). - Die Nierenarterien werden doppelt bis funffach (Prager Museum). Bei tiefer Lage einer Niere entspringt die Arteria renalis aus der Iliaca conmunis, hypogastrica, selbst sacralis media (Hyrtl, über ein wahres Ren tertius, österr. med. Wochenschrift. 1841. N. 41.). Beide Nierenarterien haben einen Truncus communis (Portal). - Die Spermatica interna entsteht rechterseits östers aus der Renalis oder Suprarenalis dextra (wegen linkseitiger Lagerung der Aorta). Die Aorta abdominalis theilt sich schon unter dem Ursprunge der Renales (sehr selten), wodurch die Mesenterica inferior en Ast der linken Iliaca communis wird. Die Arteria iliaca communis destre fehlt (Cruveilhier), indem Hypogastrica und Cruralis ohne Truncus communis entspringen (Säugethiertypus). Die Sacralis media ist ein Zweig der Iliaca communis dextra (wegen linkseitiger Aortentheilung). Einen starken anastomotischen Ast zwischen Renalis und Iliaca communis dextra beobachtete ich an einem Neugeborenen, und eine Mesenterica media für das Colen transversum und descendens an einem Erwachsenen. An einem Aëncephalus mit angeborener Bauchdeckenspalte war die Arteria hepatica ein Zweig der Brustaorta (darum interessant, weil auch die Vena hepatica isolirt in das Atrium dextrum cordis mundet), und an einem Foetus mit Ectropium vesicae urinariae entsprang eine starke Arteria uro-cystica aus der Iliaca conmunis dextra.

§. 334. Verästlung der Beckenarterie.

Die Beckenarterie, Arteria hypogastrica s. iliaca interna, ist beim Erwachsenen kleiner, beim Embryo und Neugeborenen grösser, als die Arteria cruralis. Sie steigt vor der Symphysis sacro-iliaca in das kleine Becken herab, und theilt sich in einen kurzen Ramus posterior, und einen längeren Ramus anterior. Beide Aeste versorgen die Eingeweide des Beckens, das Gesäss, und die äusseren Geschlechtstheile.

- A. Ramus posterior. Er krümmt sich nach rückwärts gegen die Incisura ischiadica superior, und giebt ab:
- a) Die Arteria ileo-lumbalis, Hüft-Lendenarterie. Sie geht wie eine Arteria lumbalis, hinter dem Psoas major, nach oben und aussen, und theilt sich in einen Ramus iliacus, welcher quer nach aussen gehend den Musculus iliacus, seine Scheide, und durch einen constanten Ramulus nutriens das Darmbein versorgt, und einen aufsteigenden Ramus lumbalis, der sich im Psoas und den Lendenmuskeln verästelt, und zur Lendenarterie aus der Sacralis media in antagonistischer Beziehung steht, d. h. stark ist, wenn diese fehlt oder unbedeutend ausfällt, und umgekehrt. Der Ramus iliacus wird mit der Arteria circumflexa ilei, und der Ramus lumbalis mit der letzten Arteria lumbalis anastomosiren.
- b) Die Arteriae sacrales laterales, seitliche Kreuzbeinarterien. Es finden sich deren eine obere grössere, und untere kleinere, welche vor den Nervis sacralibus nach innen und unten laufen, mit der Arteria sacralis media und den Mastdarmarterien anastomosiren, und dem Musculus pyriformis, Levator ani, und Coccygeus Aeste abgeben. Stärkere Zweige derselben dringen durch die Foramina sacralia anteriora zur Cauda equina,

und Verlängerungen derselben durch die hinteren Kreuzbeinlöcher zu den Kreuzbeinursprüngen der langen Rückenmuskeln.

- c) Die Arteria glutaea superior, obere Gesässarterie. Sie ist die Fortsetzung des Ramus posterior, und geht über dem Musculus pyriformis, den Rand der Incisura ischiadica major umgreifend, aus der Beckenhöhle zum Gesäss, wo sie von den hinteren und oberen Bündeln des Musculus glutaeus magnus bedeckt wird. Sie spaltet sich hier anfangs in zwei, dann in vier und sechs Aeste, welche nach allen Richtungen divergiren (jedoch so, dass die zwei stärksten Aeste zwischen Glutaeus medius und minimus nach vorn und unten dringen), und in den Gesässmuskeln sich ramificiren. Ihre oberen Zweige werden mit den letzten Lendenarterien, ihre hinteren mit den hinteren Kreuzbeinarterien, ihre vorderen und unteren mit der Arteria ischiadica, circumflexa ilei, und den beiden Circumflexae femoris anastomosiren.
- B. Ramus anterior. Er verlängert sich beim Embryo zur Umbilicalarterie, welche alle übrigen Aeste der Hypogastrica an Stärke übertrifft, und an der Seite der Harnblase zur vorderen Bauchwand gelangt, an welcher sie zum Nabel, und durch diesen in den Nabelstrang, Funiculus umbilicalis, gelangt. Nach der Geburt obliterirt sie vom Nabel angefangen bis zur Ursprungsstelle des ersten grösseren Collateralastes im Becken (Arteria vesicalis), und existirt durch's ganze Leben als zellig-sehniger Strang Chorda arteriae umbilicalis. Schreitet die Obliteration nicht so weit vor, oder gedeiht sie nicht bis zum vollkommenen Verstreichen des Lumens, so wird ein Stück oder die ganze Arteria umbilicalis bis zum Nabel wegsam bleiben können. Zweige des Ramus anterior der Arteria hypogastrica sind:
- a) Die Arteria obturatoria, Verstopfungs- oder Hüftbeinlocharterie. Sie zieht am oberen Theile der Seitenwand des kleinen Beckens nach vorn, geht durch den Canalis obturatorius heraus, und theilt sich am oberen Rande des Obturator externus in einen Ramus anterior et posterior. Der Ramus anterior schaltet sich zwischen Adductor femoris brevis und longus ein, verästelt sich in ihnen, so wie in dem Pectineus und Gracilis, und anastomosirt mit der Arteria circumflexa femoris interna. Der Ramus posterior sendet einen Nebenzweig durch die Incisura acetabuli zum runden Bande und zum Caput femoris (Arteria acetabuli), geht zwischen Obturator externus und Quadratus femoris nach aussen, und löst sich in Muskelzweige für die kleinen Auswärtsroller auf, deren einige mit den Aesten der Arteria circumflexa externa anastomosiren.

Im Becken giebt sie dem Iliacus internus, Obturator internus und Levator ant kleine Reiser, und sendet vor ihrem Austritte den kleinen Ramus anastomoticus pubicus zur hinteren Schamftreenfff und mit der entgegengesetzten sich im Bogen und

Die noch in das Bereich

Jer

in operativer Hinsicht wichtige Versetzungsfall des Ursprunges auf die Scheskelarterie, oder einen Zweig derselben, verdient besondere Aufmerksamkeit.

Entspringt die Arteria obturatoria aus der Cruralis unter dem Poupartschen Bende, so fliesst ihr Ursprung gewöhnlich mit dem der Arteria cogastrica inferior zusammen, so dass beide Gefasse einen kurzen Truscu communis haben. Die Arteria obturatoria muss in diesem Falle wieder in das Becken zurücklausen, um durch das Foramen obturatum herausgehen m können. Sie steigt also an der vorderen Fläche der Vena couralis zur Lacuna rasorum cruralium empor, und krümmt sich um die hintere ober Fläche des Ramus horizontalis ossis pubis zum Canalis obturatorius berà. Ist ein Schenkelbruch vorhanden, so schlingt sie sich um seinen Hals heren. und kann bei der blutigen Erweiterung desselben im Fall einer Einklemnung bei jeder Richtung des Erweiterungsschnittes (nur der nach unten gehende nicht) verletzt werden. Nach den verschiedenen Nuancen, die der abnorm Ursprung der Arteria obturatoria darbieten kann, nach Verschiedenheit de Länge des Truncus communis, und dem dadurch bedingten Lagerungsverhältniss der Obturatoria, mehr an der ausseren oder inneren Seite des Schenkebruches, ist die Verletzungsmöglichkeit eine grössere oder geringere. Jedafalls ist das An- oder Durchschneiden des Gestasses ein Zufall, der die Opration auf gefahrdrohende Weise complicirt, und mit aller Vorsicht vermiede werden soll. Da man von dem Vorhandensein der Anomalie, von der Art mi dem Grade derselben, in vorhinein sich nicht unterrichten kann, so dark vom anatomischen Standpunkte aus das Lösen der Einklemmung des Schenkelbruches durch Incision des Ligamentum pubicum Cooperi nach unten (nach Verpillat's Methode) das sicherste sein. Bei jeder anderen Erweiterungrichtung wären wiederholte, seichte Einschnitte, einem einzigen tieseren vorzuziehen (Scarpa, Vidal). Trotz der Häusigkeit des abnormen Ursprungs der Arteria obtura oria, sind Verletzungen derselben beim Bruchschnitte dech seltene Vorkommnisse.

Nicht selten ist der Fall, wo eine schwache normale Arteria obturativis mit einer aus der Cruralarterie entsprungenen sich vor dem Eintritte in den Canalis obturatorius verbindet (Portal, Hesselbach, Munz).

Nach J. Cloquet's, an 250 Leichen vorgenommenen Erhebungen deses Gegenstandes, stellt sich folgendes Verhältniss dar:

Normaler Ursprung	160	{	87 73	Männer Weiber
Aus der Arteria epigastrica auf heiden Seiten	56	{	21 35	Männer Weiber
Aus der Arteria epigastrica auf einer Seite	28	{	15 13	Männer Weiber
Aus der Arteria cruralis	6	{	2 4	Männer Weiber
	250	_		

Das aus dieser Tabelle resultirende Verhältniss der Norm zur Anomalie — 3:1, welches grösser ist, als bei irgend einer anderen Versetzung eines Gestässursprunges, erklärt sich aus dem, was weiter unten (§. 335. a.), über die Anastomosen der Arteria epigastrica inserior mit der obturatoria angeführt wird.

b) Die Arteria glutaea inferior s. ischiadica, untere Gesässarterie, geht unter dem Musculus pyriformis mit dem Nervus ischiedus

aus der Beckenhöhle heraus. Sie ist schwächer als die Glutaea superior, und hat ihre Verästlungssphäre in den Auswärtsrollern, und den vom Sitzknorren entspringenden Beugern des Unterschenkels. Ihre Aeste anastomosiren mit denen der Glutaea superior, Obturatoria, und den beiden Circumflexae femoris. Sie wird von Theile als die Fortsetzung des Ramus anterior der Hypogastrica, erst zu Ende des Stammbaumes der Hypogastrica angeführt.

- c) Die Arteriae vesicales, Harnblasenarterien. Gewöhnlich finden sich zwei, eine superior und inferior. Die Superior, welche östers mehrfach wird, verästelt sich an der hinteren Wand und dem Scheitel der Harnblase bis in den Urachus, und kommt sehr häusig aus dem offenbleibenden Anfangsstück der Arteria umbilicalis. Die Inferior geht zum Blasengrund, betheilt die Vesiculae seminales und die Prostata, beim Weibe auch die Mutterscheide (Arteria vesico-vaginalis). Im männlichen Geschlechte giebt sie die Arteria vasis deferentis zum zurücklaufenden Samengefäss, welche an diesem bis in den Leistenkanal, ja selbst bis zum Nebenhoden gelangt, und mit den Nebenästen der Arteria spermatica interna anastomosirt. Diese Anastomosen sind der Grund, warum von der Unterbindung der Arteria spermatica interna (um Entartungen und Geschwülste des Hoden ohne Exstirpation, durch Ernährungsmangel zum Schwinden zu bringen) kein Erfolg zu erwarten steht.
- d) Die Arteria uterina, Gebärmutterarterie. Sie wird oft von der Arteria umbilicalis abgegeben, und von Einigen als deren Fortsetzung aufgeführt. Sie begiebt sich zum Collum uteri, und steigt am Seitenrande desselben (Insertionsstelle des Ligamentum latum) nach aufwärts bis zum Fundus. Ihr stark geschlängelter und öfters rankenförmig aufgedrehter Verlauf, welcher selbst in der letzten Schwangerschaftsperiode nicht verschwindet, zeichnet sie vor den übrigen Aesten der Arteria hypogastrica aus. Sie giebt dem Fornix vaginalis und der Pars vaginalis uteri Zweigchen, und versorgt die Gebärmuttersubstanz.

Ein Ast derselben geht mit dem Ligamentum uteri rotundum in den Leistenkanal, und verbindet sich daselbst mit einem Aste der Arteria epigastrica inserior. Da diese letztere mit der Arteria epigastrica superior (welche zur Brustdruse Aeste abgiebt) anastomosirt, so suchte man in der mittelbaren Verbindung der Arteria uterina mit der epigastrica superior, den Grund der Sympathie zwischen Uterus und Mammae. - Nach M. J. Weber geht von der Arteria uterina, bevor sie noch den Fundus uteri erreicht, ein 1" dicker Ast zwischen den Blättern des Ligamentum latum nach aussen, welcher Zweige zur Tuba sendet, und mit dem Ligamentum ovarii zum Eierstock geht, welchen er allein versorgen soll. Die weibliche Arteria spermatica interna ware somit bei der Ernährung des Eierstocks nicht betheiligt. Theile und Cruveilhier bestätigen dieses. Ich habe an Kindesleichen, deren feine Injectionen, anderer Zwecke wegen, von mir häufig vorgenommen werden, die Sache nachuntersucht, und jedesmal eine anastomotische Verbindung der Arteria spermatica interna mit dem Eierstockaste der Uterina gefunden, deren Durchmesser so gross war, dass mit Bestimmtheit nicht abzusehen war, welches Stück der Anastomose der einen oder der anderes Schlagader angehörte. Das Ovarium wird somit wohl von beiden Kanika sein Blut erhalten.

- e) Die Arteria pudenda communis, gemeinschaftliche Schamarterie. Sie geht wie die Arteria glutaea inferior durch das Forana ischiadicum majus unter dem Musculus pyriformis heraus, durch das Foranen ischiadicum minus aber wieder dahin zurück, und umgreist som die hintere Fläche des Ligamentum spinoso-sacrum. An der inneren Fläche des Sitzbeins steigt sie eine Strecke weit herab, krümmt sich aber bild nach vor- und aufwärts, und steigt in der Rinne zwischen dem Processufalciformis des Ligamentum tuberoso-sacrum, und dem aufsteigenden Stabeinast gegen den Schambogen empor, und theilt sich unter diesem, gleich hinter der Vereinigung beider Schwellkörper der Ruthe oder der Clitoris, in die Arteria profunda und dorsalis penis s. clitoridis. Diese Aeste sind:
 - a) Die Arteria haemorrhoidalis media, mittlere Mastdarmarterie. Ihr Ursprung fällt noch über den Austritt der Arteria pudmis aus der Beckenhöhle. Sie giebt dem Blasengrunde, der Prostata, der Scheide Nebenäste, und verzweigt sich vorzugsweise in der vorderen Wand des vom Peritoneum nicht mehr umkleideten Mastdarmendes, wo sie mit der Haemorrhoidalis superior et inferior anastomosirt.
 - β) 2-3 Arteriae haemorrhoidales inferiores, un tere Mastdarmarterien. Sie entspringen gleich am Eintritte der Pudenda in die Beckenhöhle, gehen schief nach innen und unten, und lösen sich in den Schliessmuskeln und der Haut des Afters auf. Sie sind beim Seitensteinschnitt der Verletzung ausgesetzt.
 - γ) Die Arteria perinei, Dammarterie, geht tiber dem Musculis transversus perinei nach vorn, durchbohrt die Fascia perinei, wodurd sie oberstächlich wird, convergirt mit der entgegengesetzten, ohne jedoch in die Raphe perinei zu gelangen, und verliert sich, in mehrere Zweize getheilt, an der hinteren Seite des Hodensacks (Arteriae scrotales posteriores), oder am hinteren Theile der grossen Schamlippen (Arteriae labiales posteriores). Sie giebt zu den Muskeln des Mittelsleisches Aest, von denen der hinterste der stärkste ist, und als Arteria transversa perinei beim Steinschnitte gestürchtet wird.
 - d) Die Arteria profunda penis s. clitoridis dringt, von innen ber, in den Anfangstheil des Schwellkörpers ihrer Seite ein, und verästell sich in ihm.
 - e) Die Arteria dorsalis penis s. clitoridis legt sich in die Furche am Rücken des Penis, und schliesst mit jener der anderen Seite die einfache Rückenvene des Gliedes ein. Sie verhält sich nicht blos als Hautgests, sondern versorgt auch das Gewebe der Eichel, und a mosirt durch penetrirende Zweige mit den Ramisscationen der profunda penis. Man hat sie zuweilen aus der Arteria el nach ihrem Austritte aus dem Becken, entspringen geseham.

Vor der Theilungsstelle in die beiden Arterien des Gliedes, oder aus einer derselben, entspringt die ½" dicke Arteria bulbo-urethralis für den Schwellkörper der Harnröhre.

Eine für das Gelingen des Steinschnittes höchst gestährliche Abweichung der Arteria pudenda communis ist jene, wo das Gests in seinem ganzen Verlause in der Beckenhöhle bleibt, und längs der Seite des Blasengrundes und der Vorsteherdrüse (oder durch die letztere) zum Gliede aussteigt (Burns, Tiedemann, Shaw. Letzterem starb ein Operirter unter den Händen durch Verblutung. Magaz. der ausl. Lit. der Heilkunde. Bd. XI. pag. 349.).

§. 335. Verästlung der Schenkelarterie.

- Die Schenkelarterie, Arteria cruralis, ist der längere, für den Schenkel und einen Theil der Bauchwand bestimmte Theilungsast der Ar-Sie geht an der inneren Seite des Psoas major, teria iliaca communis. von welchem sie durch die Fascia iliaca getrennt wird, zur Lacuna vasorum cruralium herab, hat die Vena cruralis nach innen neben sich, geht unter dem Poupart'schen Bande zur vorderen inneren Seite des Oberschenkels, und wird durch die Vagina vasorum cruralium umschlossen. geht durch die Fossa ileo-pectinea, und tiefer unten in der Furche zwischen Vastus internus und den Sehnen der Adductoren, bedeckt vom Sartorius, weiter herab, legt sich vor die Vena cruralis, durchbohrt die Sehne des grossen Zuziehers dicht am Schenkelknochen, und gelangt dadurch in die Kniekehle, in welcher sie vor der Vena cruralis und auf der Gelenkkapsel liegt. Endlich geht sie über den Musculus popliteus weg, in die Spalte zwischen den Ursprungsköpfen des Soleus, und theilt sich hier in die vordere und hintere Schienbeinarterie. Die grosse Länge der Arterie wird, zur leichteren Uebersicht ihrer Aeste, in drei besonders benannte Stücke getheilt, deren Grenzen der Austritt unter dem Poupart'schen Bande, und die Durchbrechung der Sehne des Zuziehers sind.
- A. Bauchstück, Arteria iliaca externa, vom Ursprung bis zum Austritte unter dem Ligamentum Poupartii. Man zählt nur zwei bedeutende Aeste desselben, welche einander fast gegenüber von der inneren und äusseren Peripherie des Gefässes, in gleicher Höhe mit dem Ligamentum Poupartii entspringen:
- a) Arteria epigastrica inferior, un tere Bauch deckenarterie. Sie läuft anfangs in der Länge eines halben Zolles nach innen, biegt sich rasch nach oben, um sich einwärts von der Bauchöffnung des Leistenkanals mit dem Vas deferens (oder dem Ligamentum uteri rotundum) zu kreuzen. Da ihre Richtung nicht vertical nach oben, sondern etwas schief nach innen geht, so erreicht sie bald den äusseren Rand des Rectus abdominis, und steigt auf dessen hinterer Fläche bis über den Nabel empor, wo sie der aus der Arteria mammaris hervorgegangenen Arteria epigastrica superior begegnet, und mit ih

α) Der Ramus A springt, wo sich

unbedeutend, entupart'sche Band umbiegt, und läust einwärts zur Schamsuge, hinter welcher er mit demselben Aste der anderen Seite bogensormig anastomosirt. Er giebt gleich
nach seinem Ursprunge einen Ast ab, Ramulus obturatorius, welcher
mit dem Ramus anastomoticus pubicus der Arteria obturatoria eine Verbindung eingeht. Es ist nicht zu verkennen, dass diese Anastomose
zwischen der Epigastrica und Obturatoria durch stärkere Entwicklung
zum abnormen Ursprung der Obturatoria aus der Epigastrica wird.

- β) Die Arteria spermatica externa entspringt vor oder hinter a), dringt in den Canalis inguinalis durch dessen hintere Wand ein, und steigt an der vorderen Fläche des Samenstranges bis zum Hoden herab. Sie vertheilt sich jedoch nicht im Hodenparenchym, sondern in den Scheidenhäuten und dem Cremaster, wird deshalb von A. Cooper ab Arteria cremasterica beschrieben. Im weiblichen Geschlechte ist sie unbedeutend, und für das Ligamentum uteri rotundum bestimmt.
- γ) Viele Rami musculares für den Rectus und die seitlichen breiten Bauchmuskeln. Sie anastomosiren mit den Lumbalarterien.
- b) Arteria circumflexa ilei, umschlungene Darmbeinarterie. Da sie der Arteria epigastrica gegenüber entspringt (in der Regel 1"—2" tieser als diese) und sich auch in den Bauchmuskeln verbreitet, wird sie auch als Arteria epigastrica inserior externa beschrieben. Sie lank unter der Vereinigungsstelle der Fascia iliaca mit dem hinteren Rande des Poupart'schen Bandes nach aus- und auswärts, gegen die Spina anterior superior des Darmbeins, und zieht längs der inneren Lesze der Cristo ossis ilei nach hinten. Sie giebt den vom Darmbeinskamm entspringenden Muskeln Aeste, und anastomosirt durch diese mit der Arteria ileo-lumbeis und epigastrica inferior.
- B. Schenkelstück, Arteria femoralis s. cruralis, von der Autrittsstelle unter dem Poupart'schen Bande bis zum Durchgange durch die Sehne des grossen Zuziehers. In der Fossa ileo-pectinea entspringen die meisten Aeste dieser Abtheilung der Schenkelarterie:
- a) Ramuli inguinales für das Fett, die Drüsen, und die Haut der Leistengegend.
- b) Arteria epigastrica superficialis s. abdominalis subcutanea Halleri. Sie durchbohrt das obere Horn des Processus falciformis der Fascia lata, steigt vor dem Arcus cruralis zur Regio hypogastrica hinauf, und verästek sich im Obliquus externus, und der Haut, bis zum Nabel hinauf.
- c) Arteriae pudendae externae, äussere Schamarterien. Gewöhnlich finden sich zwei, welche über die Vena cruralis weg, quer nach innen lausen. Die eine tritt durch die Fovea ovalis hervor, die andere geht unter der Portio pectinea sasciae latae weg, und durchbohrt sie, um zu den äusseren Genitalien zu kommen, in welchen sich beide als Hautarterien des Hodensacks oder der großen Schamlippen (Arteriae scretales et labiales anteriores) verästeln.
 - d) Arteria profunda femoris, tiefe Schenkelarterie. Sie et

- springt 1½"—2" unter dem Poupart'schen Bande, und ist so stark im Kaliber, dass sie der Fortsetzung der Arteria semoralis wenig nachgiebt. Ihrem Namen zusolge geht sie in die Tiese vor dem kleinen Trochanter, senkt sich zwischen Adductor longus und brevis ein, und durchbohrt zuletzt den Adductor magnus, nicht weit über dem Durchbruche der Arteria semoralis durch denselben Muskel. Die Aeste, welche sie erzeugt, lassen sich als Kranzarterien und durchbohrende Arterien rubriciren.
 - 1. Kranzarterien, Arteriae coronariae s. circumflexae femoris. Sie entspringen in der Regel aus dem Anfange der Profunda femoris, und zerfallen in eine innere und äussere.
 - a) Die Arteria circumslexa semoris internas. posterior geht, unter der Insertion des vereinigten Psoas und Iliacus am kleinen Trochanter, zur hinteren Fläche des Schenkelbeinhalses, giebt den an der inneren Seite des Oberschenkels gelegenen Muskeln ohne Ausnahme Zweige, versorgt die Gelenkkapsel mit einem Ramus articularis, und zerfällt in einen auf- und absteigenden Endast. Der aufsteigende geht zwischen dem Quadratus semoris und Obturator externus zur Fossa trochanterica, verästelt sich in den Auswärtsrollern, und anastomosirt mit der Arteria glutaea inferior und circumslexa externa. Der absteigende Endast geht zu den langen Muskeln an der hinteren Seite des Oberschenkels.
 - β) Die Arteria circumflexa femoris externa s. anterior entspringt etwas tieser als α), und ist zugleich stärker. Sie geht unter dem Rectus femoris nach aussen, schickt dem Extensor cruris quadriceps einen starken Ast zu, windet sich um das Collum femoris nach hinten herum, giebt allen tiesen Muskeln des Hüstgelenks Aeste, und anastomosirt in der Fossa trochanterica mit α).
 - 2. Durchbohrende Arterien, Arteriae perforantes, heissen jene Muskelzweige der Profunda femoris, welche, um zur hinteren Seite des Oberschenkels zu gerathen, die Adductores dicht am Knochen durchbohren. Der Verlauf des Hauptstammes der Arteria femoralis, und sein Verhältniss zur Sehne des Adductor magnus, giebt ein Vorbild dieser Durchbohrungen. Ihre Zahl steigt selten über drei.
 - a) Die Arteria perforans prima durchbricht, 1"-2" unter dem kleinen Trochanter, den Adductor magnus, und theilt sich in einen aufund absteigenden Ast. Der aufsteigende versorgt den unteren Theil des Glutaeus magnus und Quadratus femoris, und anastomosirt mit der Arteria glutaea inferior, und der Circumflexa femoris interna. Der absteigende giebt Aeste zu den Beugern des Unterschenkels, dem Adductor magnus, dem Schenkelknochen (die Arteria nutriens su und anastomosirt mit der Perforans secunda.
 - β) Die Arteria perforans secunda geht zwei Zell:
 Adductor magnus, betheilt den Vastus internus
 Zweigen, und anastomosirt mit a) und 45 11

- γ) Die Arteria perforans tertia ist die Fortsetzung der Profunds femoris, schickt die Arteria nutriens inferior ab, und wird mit β) und den Aesten der Arteria poplitea sich verbinden.
- e) 6-8 Rami musculares, deren Verbreitungsbezirk in den Muskels des Oberschenkels liegt. Einer derselben (Ramus musculo-articularis) steigt im Vastus internus bis zur Kniescheibe berab, und wird zur Bildung jenes Gefässnetzes verwendet, welches als Rete articulare genu von da Aesten der Arteria poplites zusammengesetzt wird.
- f) Arteria articulationis genu superficialis, ober flächliche Kniegelenkarterie. Sie entspringt öster vor als nach dem Durchtritte de Arteria semoralis durch die Sehne des Adductor magnus, und muss semit die Astsolge der Arteria semoralis schliessen. Entspringt sie mit e aus einem gemeinschastlichen Stamme, so heisst dieser Arteria anastometica magna. Sie steigt vor der Sehne des Adductor magnus, bedeckt un Sartorius, zum Condylus internus semoris herunter, und löst sich im kett articulare genu aus.
- C. Kniekehlenstück, Arteria poplitea, in der Tiese der Kniekelk vom Eintritte der Arteria semoralis in die Kniekehle, bis zur Spaltung is die Schlagadern des Unterschenkels. Sie erzeugt Muskel- und Gelenkatrien, welche selbst wieder Hautäste abgeben. Erstere versorgen die Inskeln, welche die Kniekehle begrenzen. Die sür die beiden Köpse des 6strocnemius abgehenden sind besonders stark, und werden als Arteria surales bezeichnet. Die Gelenkarterien bilden vorzugsweise das Retusticulare genu, welches die schwammigen Enden der im Kniegelenk zusinmenstossenden Knochen umgiebt, von der Personans secunda und tenia absteigende, und von den Schienbeinarterien aussteigende Verstärkungszweigerhält, und aus welchem zahlreiche, wieder genetzte Verzweigungen sür sie Gelenkkapsel, die Muskeln, die inneren Bänder und Knorpel des Kniegelenkund das Knochenmark hervorgehen. Man zählt zwei obere, zwei untere, und eine mittlere Kniegelenkarterie.
- a) Die beiden Arteriae articulares genu superiores umgreisen die Besen des ausseren und inneren Condylus semoris, und werden deshab ab grössere externa, und kleinere interna unterschieden.
- b) Die beiden Arteriae articulares genu inferiores verhalten sich, der Stärke nach, verkehrt wie die superiores. Die äussere geht am Rande der Cartilago lunata externa, die innere unter dem Condylus tibiae internu nach vorn.
- a) und b) liegen dicht am Knochen, und laufen weder über eine Schne noch über ein Band des Kniegelenks weg.
- c) Die Arteria articulationis genu media s. asygos ist sehr oft ein Ast der Arteria articularis superior externa, durchbohrt die hintere Kapedwand, und verliert sich in den Kreuzbändern und den als falsche Bander bekannten Falten der Synovialmembran.

Die von M. J. Weber (Handbuch der Anat. 2. Bd. pag. 207)

ria articularis capituli fibulae beschriebene Arterie entspringt unter 9 Extremitäten, die ich verglich, nur 3mal aus der Poplitea, 4mal aus der Tibialis antica, und 2mal aus der Tibialis postica. Sie versorgt vorzugsweise die Musculi peronei, und das Wadenheingelenk nur durch unbedeutende Aestchen.

Abweichungen der Schenkelarterie sind viel seltener als jene der Arteria brachialis. Chirurgisch wichtig ist jener Fall (Froriep's Notizen. Bd. 34. pag. 45), wo die Arteria cruratis als Profunda femoris endigte. Dagegen trat ein starker Ast der Arteria hypogastrica mit dem Nervus ischiadicus aus der Beckenhöhle, welcher in die Arteria poplitea überging. Da in der Regel die Arteria glutaea inferior dem Nervus ischiadicus einen langen dünnen Begleitungszweig mitgiebt, so ist dieser Fall wohl nur eine stärkere Entwicklung desselben, und als Thierähnlichkeit (Vögel) interessant. Der Zagorskische Fall betrifft einen Ast der Arteria cruralis, welcher mit der Vena saphena major bis zum Sprunggelenk herabstieg, und mit der vorderen und hinteren Arteria tibialis anastomosirte (Mém. de l'Académie de Petersbourg. 1809. Tom. 1. pag. 386).

Die Arteria profunda semoris entspringt in seltenen Fällen höher als gewöhnlich (nach Tiedemann häufiger bei Weibern und Personen von kleiner Statur). Man hat sie auch schon aus dem Beckenstücke der Arteria cruralis entspringen gesehen (Otto, Burns, Tiedemann). In diesem Falle giebt sie immer einige Aeste ab, welche sonst aus der Arteria cruralis entspringen. Tieser Ursprung der Profunda bedingt gewöhnlich eine Versetzung der Arteria circumstexa externa (oder auch beider) auf die Arteria cruralis. Portal sah den hohen Abgang der Profunda semoris mit hoher Theilung der Arteria brachialis vergesellschastet (Anat. méd. T. III. pag. 239). Die eigentlichen Theilungsäste der Poplitea (vordere und hintere Schienbeinarterie) rücken nie an die Arteria cruralis heraus. Für die vordere Schienbeinarterie ist der Grund leicht einzusehen. Sie müsste über die Streckseite des Knies weglausen, was gegen die allgemeinen Gesetze des Schlagaderverlauses wäre. Doppelte Crurales sind höchst selten.

§. 336. Verästlungen der Arterien des Unterschenkels und des Fusses.

Die Arteria poplitea theilt sich, zwei Zoll unter dem Kniegelenke, in die vordere und hintere Schienbeinarterie.

a) Vordere Schienbeinarterie, Arteria tibialis antica. Sie geht zwischen den oberen Enden beider Unterschenkelknochen an die Vorderfläche des Zwischenknochenbandes, wo sie mit dem Nervus tibialis anticus zwischen Musculus tibialis anticus und Extensor digitorum communis longus (weiter unten zwischen Musculus tibialis anticus und Extensor hallucis) zum Sprunggelenk herabgleitet. Sie liegt hier dicht auf dem Kapselbande auf, und zieht durch das mittlere Fach des Kreuzbandes zum Fussrücken, wo sie Arteria dorsalis pedis s. pediatus Zwischen den Sehnen des Extensor hallucis longus de Interstitium intermetatarseum auf, und um als Arteria plantaris profunda del stica im starken Bogen zu wanten.

Von ihrem Ursprunge bis zum Fussrücken sendet sie folgesde Aeste ab:

- a) Zwei zurücklausende Schienbeinarterien, Arteriae recurrentes tibiales, zum Rete articulare genu; eine vor, die andere nach geschehenem Durchgang zur vorderen Seite des Zwischenknochenbandes.
- β) 10 20 Muskeläste von geringem Kaliber für die Muskeln an der vorderen Seite des Unterschenkels.
- γ) Zwei vordere Knöchelarterien, Arteriae malleolares enteriores, eine äussere stärkere, und innere schwächere. Beide ungreisen die Malleoli, auf deren Periost sie liegen, und verlieren sich in den Weichtheilen, welche das Sprunggelenk decken. Sie bilden mit den hinteren Knöchelarterien und den Fusswurzelschlagadern, besonders bei jungen Individuen, die Retia malleolaria.

Am Fussrücken giebt sie ab:

- a) Die äusseren und inneren Fusswurzelarterien, Arteriae tarseae externae et internae. Die inneren (2-4) sind schwach, die äusseren zerfallen in eine hintere $\alpha\alpha$) und vordere $\beta\beta$).
 - αα) Die hintere äussere Arteria tarsea entspringt am Collum oder Caput tali, läust dicht auf dem Os calcanei et cuboideum nach aussen, verbindet sich mit der Arteria malleolaris anterior externs und mit der vorderen äusseren Arteria tarsea bogensörmig, und ernährt alle Weichtheile an der äusseren Gegend des Fussrückens.
 - ββ) Die vordere äussere Arteria tarsea (wird auch Arteris metatarsea genannt) entsteht am Rücken des Os scaphoideum, oder auf den Keilbeinen, geht schief nach vorn zum äusseren Fussrand, und bildet durch ihre Anastomose mit der hinteren äusseren Arteris tarsea den Arcus tarseus s. dorsalis pedis. Aus dem Arcus tarseus entspringen drei Arteriae interosseae s. metatarseae dorsales, welche im zweiten, dritten und vierten Interstitium der Metatarsusknochen nach vorn laufen, und sich in zwei Zweige theilen, welche als Arteriae digitales pedis dorsales die einander zugekehrten Flächen der 2., 3., 4., und 5. Zehe versehen. Für die äussere Seite der 5. Zehe entspringt die Arteria digitalis dorsalis externa aus dem Arcus tarseus als äusserster und letzter Ast desselben.

Für das erste Interstitium interosseum entspringt die Arteris interossea dorsalis aus dem Stamme der Arteria dorsalis pedis, bevor sie in die Planta eindringt. Sie versorgt nicht nur die zugewendeten Seiten der ersten und zweiten Zehe, sondern auch die innere Seite der ersten, theilt sich also in drei Arteriae digitales dorsales, während die übrigen Arteriae interosseae dorsales nur in zwei Nebeszweige zerfallen.

Nach Abgabe dieser Aeste dringt die Arteria dorsalis pedis zwiechen den Bases des ersten und zweiten Metatarsusknochens in die Planta, we sie

mit dem Ende der Arteria tibialis postica (Arteria plantaris externà) zum tiesen Plattsussbogen sich verbindet.

b) Hintere Schienbeinarterie, Arteria tibialis postica. Sie ist die Fortsetzung der Arteria poplitea, und läust mit dem Nervus tibialis posticus, welcher an ihrer äusseren Seite liegt, auf dem Musculus tibialis posticus und Flexor digitorum longus, bedeckt vom tiesen Blatte der Fascia surae, herab. Am unteren Drittel des Unterschenkels liegt sie (weil der Ursprung des Musculus soleus nicht so weit herabreicht) oberstächlicher zwischen Malleolus internus und Tendo Achillis. Unterhalb des Malleolus internus wird sie vom Ligamentum laciniatum bedeckt, und krümmt sich um die innere Fläche des Calcaneus nach vorn und unten, betritt über dem Abductor hallucis die Planta, und zersällt in zwei Endäste — Arteria plantaris externa et interna. Ihr grüsster Zweig ist die Arteria peronea, Wadenbeinarterie.

Diese entspringt 1½-2 Zoll unter dem Ursprunge der Arteria tibialis postica, läust mit ihr sast parallel an der hinteren Fläche des Wadenbeins herab, giebt allen Muskeln der tiesen Wadenschicht Zweige, auch eine Arteria nutriens zur Fibula, und theilt sich oberhalb des äusseren Knöchels in die Arteria peronea anterior et posterior. Die anterior durchbohrt das Ligamentum interosseum, und contribuirt mit ihren Aestchen zur Bildung des Rete malleolare externum. Die posterior geht hinter dem Malleolus externus zur äusseren Seite des Calcaneus herab, wo sie ebenfalls dem Rete malleolare externum Zweigchen mittheilt, und sich in den Weichtbeilen des äusseren Fussrandes, den Bändern und Muskeln der Sohle auslöst.

Die übrigen Aeste der Tibialis postica sind:

- a) Die Arteria nutriens tibiae.
- β) Rami musculares, 10-15.
- y) Die Arteriae malleolares posteriores, eine externa und interna, welche mit den anterioribus in den Retia malleolaria anastomosiren.
- d) Rami calcanei interni, welche die Haut der Ferse, die Tarsalgelenke, und die Ursprünge der kleinen Muskeln des Plattfusses mit Blut versehen, und mit den Verzweigungen der Arteria peronea posterior das Rete calcanei bilden.

Endaste der Arteria tibialis postica im Plattfuss:

- a) Arteria plantaris interna. Dieses Gesas verläust parallel mit dem inneren Eussrande, aber 1" von ihm abgelegen, nach vorn. Es gehen aus ihm Rami superficiales und profundi ab, welche die Haut und die Musculatur an der inneren Seite des Plattsusses versorgen. Das vordere Ende des Gesasses geht nicht selten in die Arteria dersalis interna hallucis über.
- β) Arteria plantaris externa. Sie entspricht de externa am Fussrücken, geht über dem Flexor be aussen, schaltet sich zwischen Flexor brande i quadrata ein, wo sie blos durch die Face

erzeugt auf diesem Laufe kleine Zweige für die Haut und Muskeln des äusseren Fussrandes, und sendet zur äusseren Seite der kleinen Zehe die Arteria digitalis plantaris externa. Hierauf krummt sie sich bogenformie in der Tiese der Fusssohle nach innen, um mit der Arteria dorsalis pedis im ersten Interstitium interesseum zu anastomosiren, wodurch der Arcus plantaris zu Stande kommt. Dieser liegt auf den Bases der Mettarsusknochen, und giebt die vier Arteriae interosseae plantares ab, welche, wie am Dorsum pedis, von innen nach aussen abgezählt werden. Sie geben perforirende Aeste zwischen den Bases ossium metatarsi nach aufwärts zum Fussrücken, wo sie mit den Arteriae interosseae dorsales ansstomosiren. Jede Arteria interossea plantaris entspricht einem Interstitium interosseum, und theilt sich an dessen vorderem Ende gabelformig in zwei Arteriae digitales pedis plantares, welche für die einander zugewandten Seiten je zweier Zehen bestimmt sind. Die Arteria interesse plantaris prima wird sich in drei Zweige theilen müssen, damit auch die innere Seite der grossen Zehe eine Arteria digitalis plantaris interns erhielte. Das übrige Verhalten der Zehenarterien ist den Fingerschlegadern analog.

Varietäten der Arterien des Unterschenkels.

Der Ursprung der Arteria tibialis antica rückt höher an die Poplita (Ramsay, J. Weber, Theile), aber nie über die Durchbohrungsstellt der Sehne des Adductor magnus. Ihre Stärke steht mit jener der Arteris tibialis posterior im verkehrten Verhältnisse, sie wird somit den Arcus plantaris entweder allein, oder gar nicht bilden. Sie fehlt vollkommen, und wird durch Zweige der Arteria tibialis postica und peronea vertreten. Dieselle Spielarten bietet auch die Arteria tibialis postica dar. In einem Falle, wie sie sehr schwach war, verband sie sich mit der hinteren Arteria peronea, um die zu den Plattfussverästlungen nöthige Stärke zu gewinnen. Ein in Sinus tarsi eingeschlossener starker Verbindungszweig zwischen der Arteria tarsea externa posterior und der Tibialis postica wurde von mir beobachtet.

Die Varietäten der Arteria peronea betressen ihre hohe oder niedere Theilung, und ihre wechselnde Stärke, als eines Ausgleichungsgestässes für sehlende Zweige der Tibialis antica und postica.

C. Venen.

§. 337. Allgemeine Schilderung der Zusammensetzung der oberen Hohlvene.

Die obere Hohlvene, Vena cava superior, ist der obere Hauptstamm des venösen Systems, welcher in der Brusthöhle, rechts von der außsteigenden Aorta liegt, und, vor den grossen Gefässen der rechten Lunge herabsteigend, in der rechten Herzvorkammer mündet. Der obere, hinter dem ersten und zweiten Rippenknorpel liegende Theil des Gefässes, wird von der Thymus (oder deren Zellgewebslager) bedeckt, der untere ist im I beutel eingeschlossen, dessen inneres umgeschlagenes Blatt ihn als

Die Vena cava superior wird hinter dem ersten Rippenknorpel durch den Zusammensluss zweier Venen gebildet (Venae innominatae s. anonymae), und nimmt im Herabsteigen an ihrer hinteren Wand die unpaare Blutader des Brustkastens (Vena azygos) aus.

Die Venae innominatae führen das Blut vom Kopf, Hals, und von den oberen Extremitäten, — die Vena azygos aus den Wänden des Thorax zurück.

Jede der beiden Venae innominatae wird durch den Zusammenfluss dreier Venen gebildet: 1. Vena jugularis communis, 2. Vena jugularis externa, und 3. Vena subclavia. Diese Venen vereinigen sich hinter der Articulatio sterno-clavicularis. Die Vena anonyma dextra steigt vor der Arteria anonyma senkrecht herab, ist kürzer und weiter als die sinistra, welche fast horizontal hinter dem Manubrium sterni, und vor den grossen Aesten des Aortenbogens, nach rechts herübergeht. Bald nach der Vereinigung der drei genannten Venen nimmt der Stamm der Vena anonyma dextra und sinistra noch 1. die tiesen Venen des Halses (Venae vertebrales et thyreoideae inferiores), 2. einige Venen des Brustkastens (Venae mammariae internae et intercostales superiores), und 3. die aus dem vorderen Mittelsellraume aussteigenden Venae thymicae, pericardiacae, phrenicae superiores, und mediastinicae anteriores aus.

Die Vena jugularis communis erstreckt sich von der Bildungsstätte der Vena anonyma bis in das Trigonum cervicale superius hinauf, bildet, entsprechend dem Zwischenraume der beiden Ursprungsköpse des Kopfnickers, eine besonders auf der rechten Seite anschnliche Erweiterung (Bulbus venae jugularis communis), liegt an der äusseren Seite der Carotis communis, nimmt sehr ost die Vena thyreoidea superior (mit der Vena laryngea) und media auf, und wird in gleicher Höhe mit der Theilungsstelle der Carotis communis durch die Vereinigung der Vena jugularis cerebralis und der Vena facialis communis gebildet.

Alle bisher angeführten, in das System der oberen Hohlvene einmündenden Blutadern sind klappenlos, mit Ausnahme der Vena jugularis communis, welche unterhalb des Bulbus eine einfache oder doppelte Klappe besitzt, deren Varietäten Gruber (Abhandlungen aus der med. chir. Anatomie. Berlin, 1847. pag. 31) beschreibt.

Es folgt in den nächsten Paragraphen die Beschreibung der wichtigeren Zweige der Venae anonymae, von den entlegeneren angefangen, oder dem Blutlaufe entsprechend.

Nicht sehr selten kommen, wegen fehlender Vereinigung der Venae anonymae, zwei obere Hohlvenen (und dafür keine eigentlichen Anonymae) vor. Die linke Hohlvene krümmt sich in diesem Falle um die linke Herzvorkammer zur unteren Wand der rechten (Säugethier- und Amphibienähnlichkeit). Die hieher gehörigen Beobachtungen an hel. Anat. pag. 347) und E. H. Weber (Hildebrand and helle kung in die Vena anonyma, eine Erweite hei angestrengter Respiration am 1

Letth, Spi

§. 338. Innere Drosselvene und Blutleiter der harten Hirnhaut.

Die innere Drosselvene, Vena jugularis interna s. cerebralis, sammelt das Blut aus dem Gehirn, dessen häutigen Hüllen, und zum Theil aus der Diploë der Schädelknochen. Sie tritt aus dem Foramen jugulare, in welchem sie eine der Fossa jugularis entsprechende Anschwellung (Bulbus venae jugularis) bildet, hervor, und nimmt, während sie an der Seitenwand des Pharynx bis zu ihrer Vereinigung mit der Vena facialis communis herabsteigt, die aus dem Plexus venosus pharyngeus stammenden Venas pharyngeas, und eine schwache Vena lingualis auf. Im Foramen jugulare hängt sie mit dem queren Blutleiter der harten Hirnhaut, und durch diesen mit allen übrigen Blutleitern zusammen.

Blutleiter (Sinus durae matris) sind mit Venenblut gefüllte Räume zwischen den Blättern der harten Hirnhaut, welche die Stelle der Venen vertreten, und an ihrer inneren Oberfläche mit einer Fortsetzung der inneren Haut der Drosselvene ausgekleidet werden, so dass sie als deren Fortsetzungen angesehen werden können. Die Sache lässt sich auch so ausdrücken, dass die Drosselvene, nachdem sie in die Schädelhöhle eingetreten, ihre äussere und mittlere Haut verliert, nur die innere behält, und der Abgang der ersteren durch die Lamellen der harten Hirnhaut ersetzt wird. Die Blutleiter besitzen keine Klappen, sind theils paarig, theils unpaar, und communiciren alle unter einander. Der grösste unpaare Sinus liegt vor der Protuberantia occipitalis interna, zwischen den Blättern des Tentorü eerebelli. Da er mit den anderen Blutleitern direct oder indirect zusammenhängt, wird er Confluens sinuum s. Torcular Herophili genannt.

- 1. Der quere Blutleiter, Sinus transversus. Er ist paarig, beginnt im Confluens sinuum, läust am hinteren Rande des Tentorium quer nach aussen, und krümmt sich, in seinem ganzen Verlause dicht am Knochen anliegend, über den Warzenwinkel des Scheitelbeins, die Pars mastoidea des Schläsebeins, und die Pars condyloidea des Hinterhauptbeins (in den sür ihn bereit gehaltenen Furchen) zum Foramen jugulare herab, wo er in den Bulbus venae jugularis übergeht. Zwei Emissaria Santorini (das eine durch das Foramen mastoideum, das andere durch das Foramen condyloideum posterius) sühren aus ihm zu den oberstächlichen Schädelvenen.
- 2. Der obere Sichelblutleiter, Sinus falcisormis s. longitudinalis superior. Er liegt im oberen Rande des Sichelsortsatzes der harten
 Hirnhaut, erweitert sich von vor- nach rückwärts, hängt am Foramen coecum mit den Venen der Nasenhöhle zusammen, und geht nach hinten und
 unten in den Constuens sinuum, häusig auch in den rechten Sinus transversus, über. Emissaria Santorini gehen von ihm durch die Foramins
 parietalia zu den äusseren Schädelvenen.
 - 3. Der untere Sichelblutleiter, Sinus longitudinalis inferior,

verläust im unteren scharfen Rande der Sichel, und geht in den solgenden über.

- 4. Der gerade Blutleiter, Sinus rectus s. perpendicularis, liegt in der Uebergangsstelle der Hirnsichel in das Zelt des kleinen Gehirns, steigt schräg herab, und entleert sich in den Confluens sinuum. 2., 3., und 4. sind unpaar.
- 5. Der Zellblutleiter, Sinus cavernosus, ist paarig, liegt an der Seite der Sella turcica, erhält seinen Namen von den sehnigen, durchkreuzten Fäden, welche seine äussere und innere Wand verbinden, und schliesst die Carotis interna nebst ihrem sympathischen Geslecht, so wie den Nervus abducens ein. Nach vorn und aussen längs des hinteren Randes des kleinen Keilbeinstügels, verläust eine Verlängerung desselben als Sinus alae parvae (Breschet).

Beide Zellblutleiter hängen durch zwei Verbindungskanäle zusammen, welche vor und hinter der *Hypophysis cerebri* durch die *Sella turcica* verlausen. Sie sind bogenförmig gekrümmt, und werden zusammen als *Sinus circularis Ridlei* erwähnt.

- 6. Der obere Felsenblutleiter, Sinus petrosus superior, entspringt aus dem Sinus cavernosus, und zieht am oberen Rande der Felsenbeinpyramide bis zum Eintritte des Sinus transversus in die Fossa sigmoidea des Schläsebeins.
- 7. Der untere Felsenblutleiter, Sinus petrosus inferior, liegt zwischen dem Clivus und der Pyramide, und geht aus dem Sinus cavernosus zum Bulbus venae jugularis; nach Theile häusiger zur Vena jugularis interna unterhalb dem Foramen jugulare. 6 und 7 sind ebenfalls paarig.
- 8. Die vorderen Hinterhauptblutleiter, Sinus occipitales anteriores, sind Venenräume auf der Pars basilaris des Hinterhauptbeins, welche mit dem Sinus transversus, petrosus inferior, und den Plexibus venosis spinalibus im Wirbelkanal zusammenhängen.
- 9. Der hintere Hinterhauptblutleiter, Sinus occipitalis posterior, liegt im Processus falciformis minor, und verbindet die Plexus spinales mit dem Ende des rechten Sinus transversus (oder beider, wenn er sich gabelformig theilt).

Die Blutleiter sammeln das Blut a) aus den Venen des Gehirns, und b) seiner Häute, c) aus der Diploë der Schädelknochen, und d) theilweise aus den mit dem *Cavum cranii* in Verbindung stehenden Sinnesorganen.

- a) Die Gehirnvenen, Venae cerebrales, tauchen zwischen den Randwülsten auf, oder treten durch die natürlichen Zugänge der Gehirnkammern zur Oberstäche.
 - a) Die Venae cerebrales superiores (aus den beiden Hemisphären) entleeren sich in den Sinus longitudinalis superior. Ich habe nie Balkenvenen zum Sinus longitudinalis inferior treten gesehen.
 - β) Die Vena cerebri magna, welche durch das Foramen Monroi aus Lehrbuch der Anatomic. 5. Aufl.

dem Seitenventrikel (wo sie durch die Vereinigung der Vena corporis striati, und der Vena choroidea gebildet wird) in die Tela choroidea der dritten Kammer, und aus dieser durch den Querschlitz zum Sinus perpendicularis geht. Vereinigt sie sich mit der neben ihr liegenden Vene der anderen Seite zu einem gemeinschaftlichen Stamm, so heisst dieser Vena magna Galeni. Bevor sie sich in den Sinus perpendicularis entleert, nimmt sie die von den Organen der Gehirnbasis entspringende, und sich um den Pedunculus cerebri nach oben schlagende Vena basilaris Rosenthalii auf. (Rosenthal, de intimis cerebri venis, im 12. Bande der Acta acad. Leop. Carol.)

- γ) Die Venas cerebrales inferiores, von der unteren Fläche des grossen Gehirnes abgehend, entleeren sich in den nächsten Sinus, die vorderen in den Sinus cavernosus, die mittleren in den Sinus petrosus superior, die hinteren in den Sinus transversus. Aus dem Chiasma, Tuber cinereum, dem Gehirnanhang, dem Trichter, und der Substantia perforata media, gehen die kleinen Venen zum Sinus circularis Ridlei. Die grösste Vena cerebralis inferior ist die Vena fossae Sylvii. Sie geht zum Zellblutleiter, oder zum Sinus alae parvae.
- d) Die Venae cerebelli superiores entleeren sich in den Sinus perpendicularis, und
- e) Die Venae cerebelli inferiores (vom Pons Varoli, der Medulla oblongata, und der unteren Fläche des kleinen Gehirns kommend) in den Sinus petrosus inferior, transversus, und occipitalis.
- b) Die Hirnhautvenen, Venas meningeas, werden sich in die ihnen zunächst liegenden Blutleiter entleeren. Die meistens doppelte Vens meningea media geht entweder in den Sinus cavernosus, oder verlässt die Schädelhöhle durch das Foramen spinosum (auch ovale), um sich in den Plexus maxillaris internus zu ergiessen.
- c) Die Venae diploëticae stellen, wie die Sinus durae matris, bles aus der inneren Venenhaut gebildete, und in die Knochenkanäle der Diploë eingeschlossene Venen dar. Sie entleeren sich theils in die Sinus durae matris, theils in die äusseren Schädelvenen. Breschet, dem die Wissenschaft ihre genauere Kenntniss verdankt, unterscheidet:
 - a) Eine Vena diploëtica frontalis, welche im Stirnbein sich verzweigt, und ihren Stamm durch ein Löchelchen an der Incisura supraorbitalis zur gleichgenannten Vene treten lässt.
 - β) Eine Vena diploëtica temporalis anterior et posterior. Die anterior mündet durch eine Oeffnung in der äusseren Fläche des grossen Keilbeinssigels in die Vena temporalis profunda, oder sie entleert sich in den Sinus alae parvae. Die posterior gehört dem Scheitelbein an. Sie mündet am Angulus mastoideus in den Sinus transversus, oder in eine äussere Schädelvene.

In der Wurzel des Jochfortsatzes kommt ein anomales Foramen vor, welches an einem Kopfe unserer Sammlung fast 3" Durchmesser hat. Es führt in die Diploë des Schläseknochens, und communicirt durch einen schräg-aussteigenden Kanal mit dem Sulcus meningeus der Schuppe. Wahrscheinlich lässt es eine Vena diploëtica, welche zugleich Emissarium ist, austreten. Bei vielen Säugethieren existirt es als Norm, und wird von den Zootomen als Meatus temporalis bezeichnet.

γ) Eine Vena diploëtica occipitalis, welche in der Gegend der Lines

semicircularis inferior in die Hinterhauptvene, oder nach innen in den Sinus occipitalis posterior übergeht.

- G. Breschet, im 13. Bande der Acta acad. Leop. Carol.
- d) Von den Sinnesvenen sind die Venae auditivae internae, welche durch den Meatus auditorius internus und den Aquaeductus vestibuli, auch durch die Fissura petroso-squamosa sich entwickeln, sehr unbedeutend, und die zum vorderen Ende des Sinus longitudinalis superior tretenden Venae nasales, wo möglich noch unansehnlicher (nach Theile nur bei Kindern nachweisbar).

Die Vena ophthalmica dagegen ist ein stattliches Gestss, und stimmt mit den Verästlungen der Arteria ophthalmica im Wesentlichen ganz überein, was bei den Gehirnvenen (mit Ausnahme der Vena fossae Sylvii) nicht der Fall ist. Sie beginnt am inneren Augenwinkel, wo sie mit der vorderen Gesichtsvene anastomosirt, zieht an der inneren Augenhühlenwand nach hinten, geht aber nicht durch das Foramen opticum, sondern durch die Fissura orbitalis superior in die Schädelhöhle, und entleert sich in den Sinus cavernosus.

Die Venen, welche die Vena ophthalmica ausnimmt, sind:

- a) Die Vena frontalis. Sie geht nach meinen Beobachtungen ebenso oft in die Vena facialis anterior über.
 - β) Die Vena sacci lacrymalis.
 - y) Die Venae musculares der Augenmuskeln.
- d) Die Venae ciliares, Blendungsvenen. Sie zerfallen, wie die Arterien, in vordere und hintere, und letztere wieder in lange und kurze. Die hinteren kurzen Venae ciliares, deren 4 vorkommen, entwickeln sich aus vielen (15—20) strahlenförmig und etwas gebogen convergirenden, grösseren Choroidealvenen (Wirbelvenen, Venae vorticosae), welche an der äusseren Fläche der Choroidea zu grösseren Stämmchen zusammentreten, welche die Sklerotica hinter ihrem grössten Kreise durchbohren, und sich entweder in Muskelvenen oder (die innere in der Regel) in den Stamm der Vena opkthalmica entleeren.
 - e) Die Vena glandulae lacrymalis.
 - ζ) Die Vena centralis retinae.
- η) Die Vena ophthalmica inferior. Sie wird durch einige untere Augenmuskelvenen, Blendungsvenen, und einen Verbindungszweig mit der Vena infraorbitalis gebildet, und entleert sich entweder in die Augenvene, oder auch selbstständig in den Sinus cavernosus.
 - J. G. Walter, de venis oculi. Berol., 1778. 4. Brücke, loc. cit.

§. 339. Gemeinschaftliche Gesichtsvene.

Die gemeinschaftliche Gesichtsvene, Vena facialis communis, bildet einen ½"—1" langen Stamm, der, von der Verbindungsstelle mit der Vena jugularis interna angefangen, durch das Trigonum cervicale su perius schräge nach oben zum Angulus maxillae inferior verläußt. diesem Wege nimmt sie die Vena thyreoidea superior auf, wen sich nicht in die Vena jugularis communis entleert (zuw

b) Die Vena temporalis media liegt unter der Fascia temporalis, kommt aus den Venennetzen der Stirne, und geht oberhalb des Arcus zygomaticus nach rückwärts, durchbohrt endlich die Fascia temporalis, und verbindet sich mit a) zum eigentlichen Anfang der Vena facialis posterior.

Ich habe diese Vene, welche der gleichnamigen Arterie, und zugleich der Arteria zygomatico-orbitalis entspricht, nie einfach, sondern immer als Plexus gesehen, welcher mit den tiefen Temporalvenen, und durch perforirende Aeste mit den subcutanen Venengeslechten des Antlitzes in Verbindung steht.

- c) Die Venae auriculares anteriores, worunter eine profunda.
- d) Die Venae transversae faciei, welche vor und hinter dem Masseter mit den Geslechten der inneren Kieservene Verbindungen haben.
 - e) Die Venae parotideae.
- f) Die Vena maxillaris interna. Sie ist kurz, meistens doppelt, und entwickelt sich aus einem reichen Venengeslecht, welches die Tiese der Fossa temporalis aussüllt, und sich zwischen die beiden Flügelmuskeln hineinschiebt. Dieses Gestecht Plexus pterygoideus vereinigt alle, den Aesten der Arteria maxillaris interna analoge Venen, und steht auf die oben angegebene Weise mit den Verzweigungen der Vena facialis anterior in Rapport.

Da nun, wie aus dem gegebenen Schema erhellt, die vordere und hintere Gesichtsvene keine Venen ausnehmen, welche der Arteria occipitalis und auricularis posterior entsprechen, so müssen diese einen besonderen Venenstamm bilden — die Vena jugularis externa. An mehreren gut injicirten Köpsen finde ich von der Vena facialis posterior einen Ramus anastomoticus, unter dem Ohre weg, zu den Venennetzen des Hinterhauptes verlausen — eine Andeutung zur Elidirung der Vena jugularis externa. Umgekehrt wird zuweilen das Stromgebiet der Vena jugularis externa bedeutend dadurch vergrössert, dass die Vena sacialis anterior ganz und gar in sie übergeht. Dieser Fall ist gar nicht selten, und von Einigen sogar zur Norm erhoben (Cruveilhier).

§. 340. Oberstächliche und tiese Halsvenen.

Sie entleeren sich in das Endstück der Vena subclavia, oder in den Anfangstheil der Venae anonymae. Die oberflächlichen Halsvenen werden von der Haut des Halses und dem Platysma myoides bedeckt.

a) Die aussere Drosselvene, Vena jugularis externa, entsteht aus der Vereinigung der Venae occipitales und auriculares posteriores hinter dem Ohre, und erhält durch das Emissarium des Warzenloches auch Blut aus dem Sinus transversus. Sie steigt senkrecht über den Kopfnicker herab, und geht in der Fossa supraclavicularis, unter dem hinteren Rande des Sterno-cleido-mastoideus, in die Tiefe zum Stamme der Vena subclavia, oder entleert sich weiter nach innen in den Vereinigungswinkel der Vena subclavia und Vena jugularis communis. Sie nimmt auf:

b) Die mittlere Drosselvene, Vena jugularis anterior s. medians colli. Diese ist ein durch den Zusammensluss mehrerer Hautvenen der Unterkinngegend gebildeter Hautvenenstamm, der mit der Vena jugularis externa oder facialis anterior Verbindungen eingeht, und, vom Zungenbein angesangen, vertical zur Fossa jugularis herabsteigt, wo er mit dem der anderen Seite durch ein Bogengesäss anastomosirt, hierauf unter dem Ursprung des Kopsnickers nach aussen ablenkt, und mit der Vena jugularis externa sich verbindet, oder in die Vena subclavia einmundet. Sie variirt so häusig, dass ihre Beschreibung eigentlich in einer Auszählung von vielen Spielarten besteht, deren untergeordnete Wichtigkeit sie hier übergehen lässt.

Die tiesen Halsvenen begreisen alle unter dem hochliegenden Blatte der Fascia colli gelegenen Blutadern. Da die Vena pharyngea, lingualis, und thyreoidea superior bereits erwähnt wurden, so erübrigen nur noch die Vena vertebralis und Vena thyreoidea inferior.

a) Die Wirbelvene, Vena vertebralis, liegt im Kanal der Querfortsätze der Halswirbel, und sammelt das Blut aus dem Wirbelkanal, und den tiesen Nackenvenen. Sie begleitet die Arteria vertebralis, geht aber nicht mit ihr in die Schädelhöhle, und bildet auch keine Krümmungen an den oberen beiden Halswirbeln. Ihr Ende entleert sich in die Vena anonyme.

Ihr Verhältniss zu den Venen der Wirbelsäule ist folgendes. Es finden sich in der ganzen Länge der Wirbelsäule dicht geslochtene Venennetze -Plexus spinales - welche als aussere auf den Wirbelbogen aufliegen, und als innere im Wirbelkanal, zwischen den Knochen und der harten Hirnhaut, eingeschaltet sind. Die inneren zerfallen wieder in vordere und hintere, welche durch Verbindungszweige zusammenhängen, so dass um den Sack der harten Hirnhaut herum ebenso viele ringförmige Venenanastomosen als Ruckenmarksnerven vorkommen. Diese Venengeslechte tragen ganz den Charakter der Sinus durae matris, und hängen mit den vorderen und hinteren Hinterhauptblutleitern zusammen. Sie nehmen die starken, aber dünnhäutigen Venen der Wirbelkörper, des Rückenmarkes, und seiner Häute auf, und schicken durch die Foramina intervertebralia Abzugskanäle zu den benachbarten Muskelvenen. Am Halse vereinigen sich diese mit den in Gesellschaft der Ruckenmarksnerven aus dem Canalis vertebralis austretenden Venen zur Vena vertebralis, welche, bevor sie sich in die Vena anonyma entleert, die den ausseren Venennetzen der Wirbelsäule angehörige Vena cervicalis profunda aufnimmt. Der von Krause noch zu den Blutleitern des Schädels gerechnete Sinus circularis foraminis magni ist, dieser Darstellung zusolge, die erste ringsormige Anastomose der vorderen und hinteren Plexus spinales interni.

- G. Breschet, essai sur les veines du rachis. Paris, 1819. 4.
- b) Die untere Schilddrüsenvene, Vena thyreoidea inferior. Sie entspringt aus dem Isthmus und den Seitenlappen der Schilddrüse, und entleert sich, nachdem sie auch aus dem Pharynx, Larynx, und Oesophagus Zweige aufgenommen, in die Vena anonyma. Ist eine Vena thyreoidea ima s. impar vorhanden, so steigt sie an der Vordersläche der Luströhre herab, und entleert sich in der Mitte der Vena anonyma sinistra, welche, wie bekannt, vor der Luströhre quer nach rechts läust.

b) Die Vena temporalis media liegt unter der Fascia temporalis, kommt aus den Venennetzen der Stirne, und geht oberhalb des Arcus zygomaticus nach rückwärts, durchbohrt endlich die Fascia temporalis, und verbindet sich mit a) zum eigentlichen Anfang der Vena facialis posterior.

Ich habe diese Vene, welche der gleichnamigen Arterie, und zugleich der Arteria zygomatico-orbitalis entspricht, nie einfach, sondern immer als Plexus gesehen, welcher mit den tiefen Temporalvenen, und durch perforirende Aeste mit den subcutanen Venengeslechten des Antlitzes in Verbindung steht.

- c) Die Venae auriculares anteriores, worunter eine profunda.
- d) Die Venae transversae faciei, welche vor und hinter dem Masseter mit den Geslechten der inneren Kieservene Verbindungen haben.
 - e) Die Venae parotideae.
- f) Die Vena maxillaris interna. Sie ist kurz, meistens doppelt, und entwickelt sich aus einem reichen Venengeflecht, welches die Tiese der Fossa temporalis ausfüllt, und sich zwischen die beiden Flügelmuskeln hineinschiebt. Dieses Gestecht Plexus pterygoideus vereinigt alle, den Aesten der Arteria maxillaris interna analoge Venen, und steht auf die oben angegebene Weise mit den Verzweigungen der Vena facialis anterior in Rapport.

Da nun, wie aus dem gegebenen Schema erhellt, die vordere und hintere Gesichtsvene keine Venen aufnehmen, welche der Arteria occipitalis und auricularis posterior entsprechen, so müssen diese einen besonderen Venenstamm bilden — die Vena jugularis externa. An mehreren gut injicirten Köpfen finde ich von der Vena facialis posterior einen Ramus anastomoticus, unter dem Ohre weg, zu den Venennetzen des Hinterhauptes verlaufen — eine Andeutung zur Elidirung der Vena jugularis externa. Umgekehrt wird zuweilen das Stromgebiet der Vena jugularis externa bedeutend dadurch vergrössert, dass die Vena facialis anterior ganz und gar in sie übergeht. Dieser Fall ist gar nicht selten, und von Einigen sogar zur Norm erhoben (Cruveilhier).

§. 340. Oberflächliche und tiefe Halsvenen.

Sie entleeren sich in das Endstück der Vena subclavia, oder in den Anfangstheil der Venae anonymae. Die oberflächlichen Halsvenen werden von der Haut des Halses und dem Platysma myoides bedeckt.

a) Die aussere Drosselvene, Vena jugularis externa, entsteht aus der Vereinigung der Venae occipitales und auriculares posteriores hinter dem Ohre, und erhält durch des Emissarium des Warzenloches auch Blut aus dem Sinus transversus. Sie steigt senkrecht über den Kopfnicker herab, und auhn in der Fesse supraclavicularis, unter dem hinteren Runds die und innen in den Vereinigungswinkel der Fesse supraclavicularis. Sie nimmt auf:

b) Die mittlere Drosselvene, Vena jugularis anterior s. medians colli. Diese ist ein durch den Zusammensluss mehrerer Hautvenen der Unterkinngegend gebildeter Hautvenenstamm, der mit der Vena jugularis externa oder facialis anterior Verbindungen eingeht, und, vom Zungenbein angesangen, vertical zur Fossa jugularis herabsteigt, wo er mit dem der anderen Seite durch ein Bogengesäss anastomosirt, hierauf unter dem Ursprung des Kopsnickers nach aussen ablenkt, und mit der Vena jugularis externa sich verbindet, oder in die Vena subclavia einmundet. Sie variirt so häusig, dass ihre Beschreibung eigentlich in einer Auszählung von vielen Spielarten besteht, deren untergeordnete Wichtigkeit sie hier übergehen lässt.

Die tiesen Halsvenen begreisen alle unter dem hochliegenden Blatte der Fascia colli gelegenen Blutadern. Da die Vena pharyngea, lingualis, und thyreoidea superior bereits erwähnt wurden, so erübrigen nur noch die Vena vertebralis und Vena thyreoidea inferior.

a) Die Wirbelvene, Vena vertebralis, liegt im Kanal der Quesortsätze der Halswirbel, und sammelt das Blut aus dem Wirbelkanal, und den tiesen Nackenvenen. Sie begleitet die Arteria vertebralis, geht aber nicht mit ihr in die Schädelhöhle, und bildet auch keine Krümmungen an den oberen beiden Halswirbeln. Ihr Ende entleert sich in die Vena anonym

Ihr Verhältniss zu den Venen der Wirbelsäule ist folgendes. Es finda sich in der ganzen Länge der Wirbelsäule dicht gestochtene Venennetze -Plexus spinales - welche als aussere auf den Wirbelbogen ausliegen, mi als innere im Wirbelkanal, zwischen den Knochen und der harten Hiraket, eingeschaltet sind. Die inneren zerfallen wieder in vordere und hintere welche durch Verbindungszweige zusammenhängen, so dass um den Sack in harten Hirnhaut herum ebenso viele ringförmige Venenanastomosen als Ruckermarksnerven vorkommen. Diese Venengeslechte tragen ganz den Charakter der Sinus durae matris, und hängen mit den vorderen und hinteren Hinterhauptblutleitern zusammen. Sie nehmen die starken, aber dunnhautigen Venen der Wirbelkörper, des Rückenmarkes, und seiner Häute auf, und schicken durch die Foramina intervertebralia Abzugskanäle zu den benachbarten Muskelvenen. Am Halse vereinigen sich diese mit den in Gesellschaft der Ruckenmarksnerven aus dem Canalis vertebralis austretenden Venen zur Vena vertebralis, welche, bevor sie sich in die Vena anonyma entleert, die den ausseren Venennetzen der Wirbelsäule angehörige Vena cervicalis profunda ausnimmt. Der von Krause noch zu den Blutleitern des Schädels gerechnete Sinus circularis foraminis magni ist, dieser Darstellung zufolge, die erste ringformige Anastomose der vorderen und hinteren Plexus spinales interni.

- G. Breschet, essai sur les veines du rachis. Paris, 1819. 4.
- b) Die untere Schilddrüsenvene, Vena thyreoidea inferior. Sie entspringt aus dem Isthmus und den Seitenlappen der Schilddrüse, und entleert sich, nachdem sie auch aus dem Pharynx, Larynx, und Ocsophegus Zweige aufgenommen, in die Vena anonyma. Ist eine Vena thyreoiden ima s. impar vorhanden, so steigt sie an der Vordersläche der Lanherab, und entleert sich in der Mitte der Vena anonyma sinistratie wie bekannt, vor der Luströhre quer nach rechts läust.

§. 341. Venen der oberen Extremität.

Die Schlusselbeinvene, Vena subclavia, ist der Hauptstamm für die Venen des Arms und der Schulter. Sie liegt vor dem Scalenus anticus, über der ersten Rippe, und hinter dem Ursprung des Kopfnickers. Als unmittelbare Fortsetzung der Vena axillaris hat sie keinen festgestellten Anfang, weshalb der obere Theil der Achselvene häufig als Vena subclavia benannt wird. Sie nimmt folgende klappenreiche Zweige auf:

A. Die tiefliegenden Armvenen, Venae profundae brachii. Sie haben genau den Verlauf der Arteria brachialis und ihrer Zweige, sind jedoch nicht einfach, sondern für jede Arterie doppelt. Sie beginnen in der Hand als Venae digitales volares, welche in einen hoch- und tiesliegenden Arcus venosus übergehen, aus welchem die doppelten Venae radiales und ulnares hervorgehen, welche sich im Ellbogen zu den beiden Venis brachialibus, der externa et interna, vereinigen. Die Vena brachialis interna ist stärker, als die externa, und nimmt oberhalb der Mitte des Oberarms die Vena basilica auf. Die Aeste, welche beide Venae brachiales aufnehmen, folgen in derselben Ordnung, wie die Zweige, welche die Arteria brachialis abgab. In der Achselhöhle vereinigen sich die beiden Venae brachiales, welche in ihrem ganzen Lause durch Queräste in Verbindung standen, zur einfachen Vena axillaris, welche am inneren und vorderen Umfange der Arteria axillaris aufsteigt, und unter dem Schlüsselbein (nachdem sie die Vena cephalica aufgenommen) in die Vena subclavia übergeht.

Selten wird das ganze System der tiesliegenden Venen sammt der Vena subclavia doppelt (Morgagni, Krause). Ich sah von den beiden Venis subclaviis eine vor, — die andere hinter dem Scalenus anticus in die Brusthöhle lausen.

- B. Die hochliegenden oder Hautvenen des Arms, Venae subcutaneae brachii. Sie liegen zwischen Haut und Fascia, unter dem Panniculus adiposus, der sie bei fettleibigen Personen (wo sie übrigens noch klein zu sein pslegen) einhüllt, und nur, wo er schwach ist, wie am Handrücken, durch die Haut durchscheinen lässt. Sie anastomosiren in ihren Ramisicationen mehr weniger mit einander, und regelmässig mit den tiefliegenden Armvenen. Sie beginnen aus einem Venennetze des Handrückens, Rete venosum manus dorsale, in welches sich die geslechtartigen Venae digitorum dorsales entleeren.
- a) Vena cephalica s. subcutanea radialis. Sie sammelt ihre Wurzeln vorzugsweise aus den Hautvenen des Daumens und seines Ballens, steigt an der Radialseite des Vorderarms zum Ellbogenbug auf, wo sie zwischen der Sehne des Biceps, und unge des Supinator longus, in den Sulcus bieigitalis.

 The property of the property

Nicht ganz selten trifft es sich, dass sie über das Schlüsselbein zur Fossa supraclavicularis aufsteigt, wo sie sich in die Vena jugularis communis oder subclavia entleert.

- b) Vena basilica s. subcutanea ulnaris. Sie führt am Handrücken und dem unteren Drittel des Vorderarms den Namen Vena salvatella, stegt an der Ulnarseite der inneren Vorderarmfläche zum Ellbogenbug und zum Sulcus bicipitalis internus auf, durchbohrt die Fascia brachii, um beilänfig in der Mitte des Oberarms sich in die Vena brachialis interna zu ergiessen.
- c) Vena mediana. Sie erscheint unter doppelter Form: 1. als Verbindungsast der Cephalica und Basilica im Ellbogenbug, welcher schrige über die Aponeurose der Bicepssehne hinübergeht, oder 2. als lange Hartvene der inneren Vorderarmseite, welche sich etwas unter der Plica cubi in zwei Zweige theilt, deren einer als Vena mediana cephalica in die Vena cephalica, der andere als Vena mediana basilica in die Vena basilica medet. Die Vena mediana basilica ist in der Mehrzahl der Fälle voluminier als die Vena mediana cephalica, und wird deshalb vorzugsweise für is Aderlässe gewählt.

Die Vena mediana steht regelmässig mit einer tiesen Vena rediktioner brachialis durch einen Ramus anastomoticus in Communicate durch welchen, wenn die tiesliegenden Venen bei Muskelbewegung gestellt werden, ihr Blut in die hochliegenden Venen abgeleitet wird. Dahlässt sich der schwache Strom des Blutes bei einem Aderlasse durch bewegung mit den Fingern verstärken.

§. 342. Venen des Brustkastens.

Nebst den sich in die Venae anonymae entleerenden Venis mammeriis internis, thymicis, pericardiacis, mediastinicis, und intercostalibus mpremis, existirt für die Venen der Thoraxwände ein eigenes Sammelsysten, die unpaare Blutader, Vena azygos. Sie beginnt in der Bauchbobk auf der rechten Seite der Wirbelsäule, aus der Vena lumbalis prime, suprarenalis, renalis, oder aus dem Stamme der Vena cava inferior selbet, geht zwischen dem inneren und mittleren Zwerchsellschenkel in die Brusthöhle, liegt im hinteren Mediastinum an der rechten Seite des Ductus theracicus, steigt bis zum dritten Brustwirbel empor, und krummt sich von hier an über den rechten Bronchus nach vorn, um in die hintere Wand der Vena cava descendens einzumunden. Sie nimmt das Blut auf, welches durch die Aeste der Aorta thoracica descendens, der Luftrohre, Speiseröhre, und den Brustwänden zugesührt wurde. Ihr Hauptstamm ist klappenlos. Auf der linken Seite entspricht ihr die halbunpaare Vene. Vena hemiazygos, welche, wie die azygos, entsteht, aber nur bi achten oder neunten Brustwirbel aufsteigt, dann aber hinter d nach rechts geht, um sich mit der azygos zu verbinden. Da, die

Ablenkens wegen, die oberen Venae intercostales sinistrae sich nicht mehr in sie entleeren könnten, so vereinigen sie sich gewöhnlich zu einem gemeinschaftlichen Stamm (Vena hemiazygos superior), welcher vor den Köpfen der linken oberen Rippen herabsteigt, um sich in die Hemiazygos, vor ihrem Uebertritte nach rechts, einzumünden.

Zuweilen bleibt die Hemiazygos auf ihrer Seite, und steigt bis zur linken Vena anonyma auf. Abnormitäten im Ursprunge und Verlause der Vena azygos und hemiazygos sind etwas sehr Gewöhnliches. Man sieht sie sogar aus der Vena iliaca communis entspringen, und alle Lendenvenen sammeln. Ihre Verbindung mit den Aesten der Cava inserior macht es möglich, dass bei Compression oder Obliteration des Stammes der Hohlvene, das Blut desselben, mittelst der Azygos in die obere Hohlvene geschasst werden kann. Die Varietäten siehe an den betressenden Stellen bei E. H. Weber, Meckel, Theile, und C. G. Stark, comment. anat. physiol. de venae azygos natura, vi et munere. Lips., 1835. 4.

§. 343. Untere Hohlvene.

Die untere Hohlvene, Vena cava inferior, wird hinter und unter der Theilungsstelle der Aorta abdominalis, auf der vorderen Fläche des fünsten Lendenwirbels durch den Zusammensluss der rechten und linken Hüstvene (Vena iliaca communis) gebildet. Von hier steigt sie auf der rechten Seite der Lendenwirbelsäule zum hinteren stumpsen Leberrande empor, lagert sich in dessen Sulcus pro vena cava, und dringt durch das Foramen pro vena cava des Zwerchsells in den Herzbeutel, wo sie sich in die untere Wand der rechten Herzvorkammer einmündet. Sie ist wie die beiden Venae iliacae communes klappenlos.

Jede Vena iliaca communis entsteht durch den Zusammensluss einer Vena cruralis und hypogastrica. Da die Theilungsstelle der Aorta abdominalis der Bildungsstelle der Vena cava inferior nicht genau entspricht, sondern letztere etwas tieser fällt, und zugleich etwas auf die rechte Seite der Wirbelsäule rückt, so werden sich die Arteriae iliacas communes zu den Venis iliacis communibus verhalten, wie ein umgekehrtes W. Die linke Vena iliaca communis wird begreislicher Weise länger als die rechte sein müssen, da sie über die Mittellinie des sünsten Lendenwirbels weg, nach rechts zu ziehen hat. Sie wird deshalb die doppelte Vena sacralis media, welche in der Medianlinie der vorderen Kreuzbeinsläche heraussteigt, ausnehmen.

Im Laufe durch die Bauchhöhle nimmt die Cava inferior folgende Aeste auf:

a) Die Lendenvenen, Venae lumbales, folgen dem Vorbilde der Lendenarterien, hängen aber von beiden Seiten durch geslechtartig vervielfältigte Venenstämme zusammen (Plexus venosus lumbalis). Die oberen (oder alle) setzen, durch Abgabe von Seitenästen, einen hinter dem Psoas meier geradlinig aus nen, der durch Theilnahme

der Vena iliaca communis, und der Plexus venosi sacrales selbst, bis in die Beckenhöhle herabreichen kann, und nach oben in die Vena asyses und hemiazygos übergeht. Er wird als Vena lumbalis ascendens von den übrigen Lendenvenen unterschieden.

- b) Die inneren Samenvenen, Venae spermaticae internae, eatwickeln sich aus dem klappenreichen Venengeslecht des Samenstranges (Plexus pampiniformis), welches sich vom Hoden bis in den Leistenkanlerstreckt, und allmälig sich zu vier, dann zwei, und zuletzt zu einen einsachen Blutgesäss reducirt, welches rechterseits in den Stamm der Cava inferior, linkerseits in die Vena renalis sinistra eintritt. Bein Weibe ist der Plexus pampiniformis des Eierstockes kleiner, und gewöhnlich klappenlos.
- c) Die Nierenvenen, Venae renales s. emulgentes, entstehen im Hilus renalis, aus dem Zusammensluss von vier oder sünf Parenchymvenen der Niere. Die rechte mündet etwas tieser, als die linke, und steigt schrig auf, um an den Stamm der Cava zu kommen, die linke geht in der Regel quer über die Aorta (unter der Arteria mesenterica superior) herüber, und mündet höher als die rechte in die Cava ein.

Durch Vervielfältigung können die einfachen Nierenvenen bis auf 5 av wachsen. Ist die linke Nierenvene doppelt, so geht häufig die eine vor, & andere hinter der Aorta vorbei nach rechts. Selbst die einfache Nierenven der linken Seite wird ziemlich oft hinter der Aorta verlaufend gesehen, selb. Bell hat diese Anomalie als den Grund der häufigen Degeneration & linken Niere angenommen.

- d) Die Nebennierenvenen, Venae suprarenales. Sie sind (we bei allen Blutdrüsen) im Verhältnisse der Grösse der Nebenniere sehr estwickelt. Die linke geht in der Regel zur linken Nierenvene.
- e) Die Lebervenen, Venae hepaticae, entleeren sich in die Cass inferior, während diese in der Fossa pro vena cava aufsteigt. Oessa man die Cava an dieser Stelle, so kann man 2—3 größere, und mehren kleinere Insertionslumina der Lebervenen zählen. Sehr selten münden die zu einem gemeinschaftlichen Stamm vereinigten Lebervenen in das Atrius cordis dextrum (Rothe).
- f) Die Zwerchfellsvenen, Venae diophragmaticae s. phrenics. Sie sind die einzigen Zweige der Cava inferior, welche die mit ihnen gleichen Schritt haltenden Arterienramissicationen paarig begleiten.

Die untere Hohlvene führt somit alles Blut, welches durch die Aeste der Bauchaorta den Wänden und den Eingeweiden der Bauchhöhle zugeschicht wurde, zum Herzen zurück. Nur sindet der Umstand statt, dass die der Arteria coeliaca, mesenterica superior et inferior entsprechenden Venen, nicht direct zur Hohlvene treten, sondern sich zum Pfortaderstamme vereinigen, wächer sich in der Leber nach Art einer Arterie ramificirt, und ein Cartasssystem bildet, aus welchem sich die ersten Anstange der Leber vorbilden. Die Lebervenen führen somit nicht blos Leberblut, auf Magen-, Milz- und Darmblut zur Cava inferior.

Im Embryo nimmt die untere Hohlvene noch die Nabelvene auf, welche aus dem Mutterkuchen arterielles Blut zum Embryo führt, im unteren Rande des Aufhängebandes der Leber zur Fossa longitudinalis sinistra gelangt, und sich in zwei Zweige theilt, deren einer sich mit dem linken Aste der Pfortader verbindet, während der andere als Ductus venosus Arantii zur Lebervene oder unmittelbar zur Cava ascendens tritt.

Nach Burow (Müller's Archiv. 1838. pag. 44) nimmt die Nabelvene, spät nach ihrem Eintritte in die Bauchhöhle, einen feinen einfachen Ramus anastomoticus von beiden Bauchdeckenvenen auf, zu welchem sich ein anderer aus den Gebärmutter- und Scheidengeflechten entsprungener, längs der Harnblase und dem Urachus heraufkommender Ast gesellt. Die Entdeckung ist, des beständigen Vorkommens der Bauchvene (Allantoisvene) bei den Amphibien wegen, interessant.

Die Anomalien der unteren Hohlvene betreffen mehr ihre Aeste als ihren Stamm. Die von Stark, Otto, Gurlt, und mir beschriebenen Fälle constatiren das mögliche Fehlen der Cava inferior, wo nur der Stamm der Lebervenen durch das Zwerchfell zum Herzen ging, alle übrigen sonst zur Cava inferior tretenden Venen aber von der ungemein entwickelten Azygos aufgenommen wurden. Versetzung der Cava inferior auf die linke Seite der Wirbelsäule (ohne gleichzeitige Versetzung der Eingeweide) beobachtete Harrison (Surg. Anat. of the Arteries. Vol. 2. pag. 22). Die Venae iliacae communes können sich auch erst höher ohen vereinigen (Pohl). Ich habe sie beide parallel aufsteigen, und jede derselben eine Nierenvene aufnehmen gesehen. Sömmerring sah die Vena azygos sich in die Cava inferior (innerhalb des Herzbeutels) entleeren. Einmundung der Cava inferior in den linken Vorhof (King, Lemaire) bedingt Cyanose.

§. 344. Venen des Beckens.

Der gemeinschaftliche Stamm der Venen des Beckens und der unteren Extremität ist die Hüftvene, Vena iliaca communis. Sie wird vor dem oberen Rande der Symphysis sacro-iliaca durch die Vena hypogastrica s. iliaca interna, und durch die Vena cruralis s. iliaca externa zusammengesetzt.

Die Vena hypogastrica kommt, vor der Symphysis sacro-iliaca und dem Musculus pyriformis, aus der kleinen Beckenhöhle herauf, wo sie durch die, den Aesten der Arteria hypogastrica analogen, grösstentheils klappenlosen Venen gebildet wird. Die doppelten Venae glutaeae superiores et inferiores, ileo-lumbales, und obturatoriae, begleiten die gleichnamigen Arterien. Die Venae sacrales laterales bilden mit den mittleren Kreuzbeinvenen den Plewus sacralis anterior, welcher theils in die Vena hypogastrica, theils in die Vena lumbalis ascendens übergeht. Die äusserst zahlreichen Venen des Mastdarms, der Harnblase und der Geschlechtstheile, bilden durch Veru

- a) Der *Plexus haemorrhoidalis*, Mastdarmgeflecht. Er gebört nicht der Beckenvene allein an, sondern hängt durch die *Vena haemorrhoi*dalis interna mit dem Pfortadersystem zusammen.
- b) Der *Plexus vesicalis*, Harnblasengeflecht, umgiebt den Grund der Harnblase, und hängt mit dem *Plexus haemorrhoidalis* und pudendelis zusammen.
- c) Der Plexus pudendalis, Schamgeslecht, umgiebt bei Männern den Hals der Harnblase und der Prostata, empsängt sein Blut aus diesen Organen, so wie den Samenbläschen, und nimmt die Venas profundas penis (welche aus den Venengeslechten der Schwellkörper abstammen) und die grosse Vena dorsalis penis aus. Letztere entsteht hinter der Corens glandis aus zwei die Eichelbasis umgreisenden Venen, zieht zwischen den beiden Arteriae penis dorsales gegen die Wurzel der Ruthe, durchbohrt das Ligamentum pubo-prostaticum medium, und theilt sich in zwei Zweige, welche oberhalb der Seitenlappen der Prostata in den Plexus pudendalis übergehen. Mit Recht nannte Santorini das Schamgeslecht Labyrinthus venosus. Beim Weibe ist es unansehnlich, und hängt mit dem Plexus vaginalis zusammen.
- d) Der Plexus utero-vaginalis, Scheiden-Gebärmuttergeflecht, umstrickt die Wände der Vagina, und dehnt sich an den Seiten der Gebärmutter, längs der Anhestung des breiten Mutterbandes, bis zum Fundus uteri aus. Er hängt mit allen übrigen Venengeslechten der Beckenhöhle zusammen, und entleert sich durch die kurzen, aber starken Venae uterinae in die Vena hypogastrica.

§. 345. Venen der unteren Extremität.

Sie bilden den Hauptstamm der Vena cruralis s. iliaca externa, welcher, so wie die Schenkelarterie, in ein Bauch-, Schenkel- und Kniekehlenstück eingetheilt wird. Da die Bildungsstelle der Vena cava inferior von der Theilungsstelle der Aorta nach rechts abweicht, beide Venae iliacae externae aber unter dem Poupart'schen Bande an der inneren Seite ihrer Arterien liegen, so muss die rechte Vena iliaca externa hinter der Arteria iliaca externa nach auf- und auswärts laufen, während die linke an der inneren Seite ihrer Arterie bleibt. Vom Poupart'schen Bande abwärts, sind Stamm und Aeste der Schenkelvene mit Klappen versehen.

Die Schenkelvene bleibt bis unter die Kniekehle, wo sie durch die tiesliegenden Venen des Unterschenkels zusammengesetzt wird, einfach, und solgt dem Stamme der Arteria cruralis, an deren inneren Seite sie, bis über die Fossa ileo – pectinea hinaus, liegt. Ueber dem Durchgang durch die Sehne des Adductor magnus verbirgt sie sich hinter der Arteria cruralis, und bleibt bis unter die Kniekehle hinter ihr. Uebereinstimmend mit der oberen Extremität zerfallen die Venen der unteren in hoch – und tiesliegende. Die tiesliegenden begleiten die Arterien, und sind ser

den Unterschenkel doppelt: zwei Venas tibiales posticas, zwei anticas, zwei peroneas. Die Venas peroneas sind in der Regel stärker als die Venas tibiales posticas. Die hochliegenden oder Hautvenen der unteren Extremität beginnen aus einem auf dem Fussrücken subcutan gelegenen Venennetz, Rets pedis dorsale, welches die Zehenvenen aufnimmt, und zwei starke Hautvenen — die grosse und kleine Rosenvene — aus sich hervorgehen lässt.

a) Die grosse Rosenvene, Vena saphena magna s. interna, geht vom inneren Theile des Rete dorsals ab, sammelt verzugsweise die Blutadern der grossen Zehe, des inneren Fussrandes, und der Sohlenhaut, geht vor dem inneren Knöchel am Unterschenkel herauf, und über den Condylus femoris internus zum Oberschenkel, wo sie durch die Fovea ovalis zur Schenkelvene tritt. Sie nimmt in ihrem ganzen Laufe Hautvenen von der inneren und zum Theil hinteren Fläche der unteren Extremität auf, und erhält, vor ihrem Eintritte in die Fovea ovalis, noch die Venae pudendae externae, epigastricae superficiales, und inguinales.

Zuweilen nimmt sie die Vena saphena minor auf, — theilt sich, um sich wieder zu einem einsachen Stamm zu sammeln, — wird in ihrem ganzen Verlause doppelt, oder senkt sich schon tieser, als durch die Fovea ovalis, zur Vena cruralis ein. Ihre bei Frauen, welche mehrmals geboren haben, häusig vorkommenden Erweiterungen (Varices) sind der Grund ihres trivialen Namens: Frauenader.

b) Die kleine Rosenvene, Vena saphena minor s. posterior, geht vom äusseren Fussrande aus, steigt hinter dem äusseren Knöchel, anfangs neben der Achillessehne, und, wo diese aufhört, zwischen den beiden Köpten des Gastrocnemius, zur Kniekehle hinauf, durchbohrt die Fascia poplitea, und entleert sich in das obere Stück der Vena poplitea.

lhre Varietäten sind nicht selten, aber unerheblich. Merkwürdig ist ihr in der Kniekehle stattfindendes Zerfallen in zwei Zweige, deren einer zur Vena poplitea geht, der andere am Nervus ischiadicus nach aufwärts läust, um mit der Vena glutaea inferior zu anastomosiren.

§. 346. Pfortader.

Die Pfortader, Vena portae, ist ein nur durch die Capillargesasse der Leber mit dem Stromgebiet der unteren Hohlvene zusammenhängendes Venensystem, welches, mittelst vieler Aeste, das Blut aus den Verdauungsorganen (mit Abzug der Leber) zurücksührt, und in einen Hauptstamm: Truncus venae portae, leitet, welcher in die Leberpsorte aussteigt, und sich neuerdings in Zweige theilt, welche durch for das Capillargesässnetz der Leberacini übergehen.

enthaltene Blut stammt somit aus den unpassen (mit Ausnahme der Arteria hepatics). Die

zusammentretenden Venen des Verdauungsorgans mögen dessen Wurzeln, seine Aeste im Leberparenchym dessen Verzweigung heissen. Beide sind klappenlos. Die Wurzeln der Pfortader entsprechen nicht genan den Verhältnissen der Arterien, d. h. sie treten auf andere Weise zu größeseren Venen zusammen, als die Arterien sich verästelten. Sie sind:

- a) Die Vena gastrics superior. Sie läuft in der Curvatura ventriculi minor von links nach rechts zum Pfortaderstamm, und nimmt das Bhit aus dem oberen Theile der Magenwände, von der Cardia bis zum Pylorus, und vom oberen Querstück des Duodenum auf.
- b) Die Vena mesenterica magna s. superior liegt in der Wurzel des Gekrüses an der rechten Seite der Arteria mesenterica superior. Sie correspondirt mit den Aesten der oberen Gekrüsarterie, und des Rams pancreatico-duodenalis der Arteria hepatica. In den ersten drei embrynischen Lebensmonaten erhält sie auch die, bei blindgeborenen Raubthieren um die Geburtszeit noch doppelt vorhandene, Vena omphalo-mesaraica aus dem Nabelstrange.
- c) Die Vena mesenterica inferior, den Zweigen der gleichnamigen Arterie analog. Sie entleert sich in b) oder d).
- d) Die Vena splenica liegt am oberen Rande des Pankreas, uni stimmt in ihrer Zusammensetzung mit der Astfolge der Arteria splenics überein.
- b) und d) vereinigen sich hinter dem Kopfe des Pankreas zum einstachen Truncus venae portae, welcher erst etwas später die Vena gastries, und kurz vor seiner Theilung in der Leberpforte, die Vena cystis (Gallenblasenvene) aufnimmt.

Die Verzweigungen des Truncus venae portae geben aus einem recten und linken primären Spaltungsaste desselben hervor, und stecken in Leberparenchym, wo sie zuletzt mit den Endzweigehen der Arteria heptica das Capillarsystem der Acini bilden.

Das Pfortadersystem ist nicht vollkommen unabhängig von den Verzweigungen der unteren Hohlader. Nebst den älteren Beobachtungen von Stahl und Walter, liegen hierüber die von Retzius (Tiedemann u. Trecirans, Zeitschrist sur Physiol. Bd. 5. Hest 1. 1833.) gemachten Ersahrungen über constante Anastomosen der Venas mesentericae mit den Aesten der unteren Hohlvene vor, welche von mir (Oesterr. med. Jahrb. 27. Bd. 1838.) bestätigt wurden. Ich besitze ein Präparat, wo die hinteren Scheiden- und Gebärmuttergeslechte von der Vena mesenterica aus injicirt wurden, und ein zweites, wo die Vena colica sinistra eine Harnleitervene ausnimmt. In der Klasse der Fische ist es constante Thatsache, dass sich Bauchdecken- und Eierstockvenen in die Wurzeln der Pfortader entleeren; auch sinden sich bei nackten Amphibien seine directe Anastomosen der zusührenden Nierenvene (Vena Jacobsonii) mit der Kloakenvene.

Man hat auch den Stamm der Pfortader nicht zur Leber, sondern zur Cava inferior (Azygos) treten gesehen (Abernethy, Lawrence), oder zum Atrium cordis dextrum (Mende). — Menière (Archiv. gén. de méd. Awil 1826. pag. 381) berichtet über einen fingerdicken Communicationsarun zur

schen der Vena iliaca dextra und dem Pfortaderstamme, welcher hinter der Linea alba emporatiog. Serres (Archiv. gén. de méd. Decembre, 1823.) beschrieb einen ähnlichen Befund. Da nach Burow's Beobachtungen die Vena epigastrica inferior (aus der Vena iliaca dextra) mit der Umbilicalvene (welche zur Pfortader geht) anastomosirt, so liegt die Vermuthung nahe, dass es sich in diesen beiden Fällen nur um eine Ausdehnung dieser normalen Anastomose handle. Herholdt fand (bei einer Missgeburt) alle Zweige der fehlenden Cava inferior zur Pfortader gehen.

D. Lymphgefässe oder Saugadern.

§. 347. Hauptstamm des Lymphgefässsystems.

Der Hauptstamm des Lymphgesässsystems ist der 1"—1½" dicke Milchbrustgang, Ductus theracicus s. Pecquetianus. Er entspringt an der vorderen Fläche des zweiten Lendenwirbels, rechts und hinter der Aorta, durch die Vereinigung dreier kurzer und weiter Lymphgesässstämme (Radices ductus theracici). Der rechte und linke (Trunci lymphatici lumbales) entwickeln sich aus den Glandulis lumbalibus, welche die Lymphe aus den Gesässen des Beckens, der unteren Extremitäten, der Geschlechtsorgane, und eines grossen Theils der Bauchwand aufnehmen. Der mittlere (Truncus lymphaticus intestinalis) wird in der Wurzel des Gekröses durch den Confluxus der Chylusgesässe des Verdauungskanals erzeugt. Dieser mittlere Stamm, und zuweilen noch der Ansang des Ductus theracicus, zeigen sehr oft eine besonders im injiciten Zustande sehr geräumige, oblonge Ausdehnung — Cisterna chyli, s. Receptaculum chyli, s. Saccus lacteus.

Der Milchbrustgang geht durch den Hiatus aorticus in den hinteren Mittelfellraum, liegt, in einem Fettlager eingehüllt, zwischen Aorta und Vena azygos, steigt bis zum vierten Brustwirbel empor, wendet sich nun hinter der Speiseröhre nach links, und geht auf dem linken langen Halsmuskel bis zum siebenten Halswirbel hinauf, biegt sich hierauf bogenförmig nach aussen und vorn, und mündet in den Vereinigungswinkel der Vena subclavia und jugularis communis sinistra. Er nimmt auf diesem Wege nur die Saugadern der linken Brust-, Hals- und Kopshässe, so wie jene der linken oberen Extremität auf. Die Saugadern der linken Brusthässe (und ihrer Eingeweide) entleeren sich in ihn an verschiedenen Stellen, ohne einen gemeinschastlichen Stamm zu bilden; — die des Halses und Kopses bilden den Truncus jugularis sinister; — die der oberen Extremität den Truncus subclavius sinister.

Die Saugadern der rechten oberen Körperhälste verbinden sich zu einem etwa ½ Zoll langen Hauptstamm (Ductus thoracicus dexter s. minor), welcher seine Lymphe in den Bildungswinkel der rechten Vena anonyma ergiesst.

Warum der Ductus thoracicus von seinem Ursprung bis zu seiner Einmündung einen so grossen Umweg macht, erklärt sich folgendermassen. Das Bauchstück des Ductus thoracicus steht unter dem Druck der Bauchpresse, welcher grösser als der Respirationsdruck in der Brusthöhle ist. Letzterer fehlt am Halse. Die Bewegung des Chylus im Ductus theracicus wird gegen jene Stelle, welche am wenigsten gedrückt wird, gerichtet sein, und die Ueberführung des Chylus in das Blut somit erst am Halse die zweckmässigste Stelle finden.

Beide Ductus thoracici sind mit zahlreichen Klappenpaaren versehen, welche im oberen Theile des Ductus thoracicus major kleiner werden, und weiter auseinanderstehen, als im unteren.

Es ist nichts Ungewühnliches, dass der Ductus thoracicus Inseln, oder selbst in seinem Stamm eingeschobene Geslechte bildet (Theile). Sandifort, Walter, Sömmerring und Otto sahen ihn, seiner ganzen Linge nach, in zwei Aeste getheilt, welche sich erst vor der Einsenkung in die Anonyma vereinigten. Cruikshank sand ihn sogar dreisach. Er kam sich auch in die Vena azygos münden (Albin, Wutzer), oder in die rechte Anonyma (Fleischmann). Alle diese Abnormitäten haben wenig praktischen Werth, da der Ductus thoracicus nur an seiner Insertionsstelle in das Bereich chirurgischer Operationen sallen könnte.

§. 348. Saugadern des Kopfes und Halses.

Die Saugadern des Kopfes und Halses lassen sich in verschieder Bezirke eintheilen, deren jeder seine bestimmten Sammeldrüsen hat. Diese Drüsen liegen in Gruppen zu 2 — 6, und darüber, entweder oberflächlich oder tief. Die aus ihnen hervorkommenden Vasa efferentis gehen als Vasa inferentia zu den nächst unteren Drüsen, und zuletzt in ein, an und um der Vena jugularis communis gelegenes Lymphgefässgeslecht (Plexus jugularis) über, dessen meist einfaches Vas efferens zum rechten oder linken Ductus thoracicus tritt. Die leicht aufzusindenden Drüsengruppen sind:

- a) Die Glandulae auriculares anteriores et posteriores. Erstere liegen auf der Parotis, vor dem Meatus auditorius externus, letztere hinter dem Ohre auf der Insertion des Kopfnickers. Sie nehmen die Saugadem von den äusseren Weichtheilen des Schädels auf.
- b) Die Glandulae faciales profundae, 6-8, liegen in der Fossa sphenomaxillaris, und an der Seitenwand des Schlundkopfes. Sie sammeln die Lymphgefässe aus der Augenhühle, Nasenhühle, dem Schlundkopfe, der Keil-Oberkiefergrube, und nach Arnold aus einem Antheil der Saugadern des Gehirns, welche durch das Foramen spinosum und ovale aus der Schädelhühle kommen.
- c) Die Glandulae submaxillares. Sie liegen ziemlich zahlreich (und bei scrophulösen Individuen leicht fühlbar), längs des unteren Randes des Unterkiefers, und werden vom hochliegenden Blatte der Fascis cervisalis

bedeckt. Die Saugadern, welche ihnen zuströmen, kommen zum Theil im Gefolge der Vena facialis anterior, zum Theil vor ihr über den Kieferrand herab, und entwickeln sich aus allen Weichtheilen des Antlitzes. Die Saugadern des Bodens der Mundhöhle und der Zunge treten von innen her, ohne über den Kieferrand herabzugleiten, in diese Drüsen ein.

Die austretenden Gesässe der Drüsen a), b) und c) entleeren sich in:

d) die Glandulae cervicales superficiales, welche am oberen Seitentheile des Halses vor und auf dem Kopfnicker liegen, und nebstbei oberflächliche vordere und hintere Halssaugadern aufnehmen, welche gewöhnlich schon durch andere Lymphdrüsen durchgewandert waren.

Es liegen nämlich sehr gewöhnlich vor den Musculi sterno-hyoidei in der Mitte des Halses, und seltener auch auf dem Musculus cucultaris im Nacken, kleine Sammeldrüsen für die oberstächlichen Saugadern des Halses.

e) Die Glandulae jugulares superiores liegen im Trigonum cervicale, um die Vena jugularis interna. Sie sind die ersten Vereinigungsdrüsen für die durch das Foramen jugulare aus der Schädelhöhle austretenden Lymphgesässe des Gehirns, und nehmen auch vom Schlundkopse, der Zunge, dem Kehlkopse, und der Schilddrüse Zweige auf.

Die Existenz der Lymphgesässe im Gehirn (nicht in der harten Hirnhaut) wurde von Arnold durch Injectionen nachgewiesen. In der Pia mater unterscheidet er drei auf einander gelagerte Lymphgesässnetze, deren Zwischenräume so eng sind, dass sie kaum eine Nadelspitze ausnehmen. Sie folgen dem Strome der Venen, und senken sich zwischen die Gyri ein. Die Saugadern der Kammern des Gehirns vereinigen sich zu einem, mit der Vena magna Galeni nach aussen kommenden Hauptstamm.

F. Arnold, von den Saugadern des Hirns, in dessen Bemerkungen über den Bau des Hirns und Rückenmarks. Zürich, 1838. 8.

Die Vasa efferentia von d) und e) ziehen längs der Vena jugularis communis herab, und entleeren sich in:

f) die Glandulae jugulares inferiores s. supraclaviculares. Sie sind in das laxe Zellgewebe der Fossa supraclavicularis eingesenkt, und nehmen somit alle bisher angeführten Kopf- und Halssaugadern, und nebstbei die unteren Vasa lymphatica der Schilddrüse, des Kehl- und Schlundkopfes, der tiefen Halsmuskeln, und die mit den Vertebralgefässen aus dem hinteren Theile der Schädelhöhle und dem Canalis spinalis hervorkommenden Saugadern auf. Da die Zahl dieser Drüsen sehr bedeutend ist (15—20), und die sie unter einander verbindenden Vasa in- et efferentia sich netzartig verstricken, so entsteht dadurch der sogenannte Plexus lymphaticus jugularis, der (wenn man die Glandulae jugulares superiores noch zu ihm zählt) sich bis unter das Drosseladerloch ausdehnt.

Die Vasa efferentia dieses Plexus jugularis fliessen zu einem kurzen, aber weiten Stamme zusammen, welcher in den Ductus theracicus (und auf der linken Seite in dessen Stellvertreter) üben

§. 349. Saugadern der oberen Extremität und der Brustwand.

Die Lymphgesasse einer oberen Extremität, und der Brusthässte dieser Seite, haben ihren Sammelplatz in dem Plexus lymphaticus axillaris, der aus 8—12 Lymphdrüsen (Glandulae axillares), und deren netzartigen Verbindungsgesassen besteht. Die Glandulae axillares liegen in dem lockeren Umhüllungszellgewebe der grossen Blutgesasse der Achsel. Es sinden sich jedoch auch einzelne am unteren Rande des grossen Brustmuskels, und in dem Spalt zwischen Pectoralis major und Deltoides. Die Lymphgesasszüge, welche diesem Vereinigungspunkte zueilen, gehören dem Arme, der Brust, und der Schulter an.

- a) Lymphgefässe des Armes. Sie verlaufen theils extra, theils intra fasciam, und werden, wie die Venen, in hochliegen de und tiefliegen de abgetheilt.
 - a) Die hochliegenden stammen reichlich von der Volar- und Dorsalseite der Finger. Erstere steigen an der Innenseite des Vorderarms, letztere anfangs an der Aussenseite, dann aber über den Ulnarrand des Vorderarms umbiegend, ebenfalls an dessen innerer Fläche zum Ellbogenbug empor. Hier treten einige durch 1—2 Lymphdrüsen (Glandulae cubitales), welche vor dem Condylus internus an der Vena besilica liegen, alle aber strömen zur Achselhöhle hin, um sich in die Glandulae axillares einzusenken. Einige von ihnen gelangen auf demselben Wege, wie die Vena cephalica, zur Achselhöhle.
 - β) Die tiefliegenden anastomosiren nur am Carpus und in der Plica cubiti mit den hochliegenden, und folgen genau der Richtung der tiefliegenden Armvenen. Sie sind soviel das Ansehen der Injectionspräparate lehrt weit weniger zahlreich als die oberflächlichen, passiren aber 2—5 Glandulas cubitales profundas und 1—2 brachiales profundas, welche constant vorkommen, während die Glandula antibrachii nur ausnahmsweise existirt.
- b) Lymphgefässe der Brust. Ihr Bezirk erstreckt sich vom Schlüsselbein bis zum Nabel herab.
 - a) Die oberflächlichen treten theils durch den Spalt zwischen Deltoides und Pectoralis major (in welchem das erste vorgeschobene Drüsenbündel des Plexus axillaris liegt) in die Tiefe, theils laufen sie dem unteren Rande des Pectoralis major entlang (wo ebenfalls vereinzelte Drüsen vorkommen) zur Achselhöhle. Die von der Regio epigastrica heraufkommenden Lymphgefässe passiren gewöhnlich eine kleine, zwischen Nabel und Herzgrube gelegene Glandula epigastrica.
 - β) Die tiefliegenden folgen den Vasis thoracicis, und nehmen die Saugadern der Mamma, und, durch Anastomose mit den Vasis lymphaticis intercostalibus, Verbindungszweige mit den inneren Brustsaugadern auf.
 - c) Lymphgefässe der Schulter. Sie gehören der Nacken-, Rücken-

und Lendengegend an. Die hochliegenden schwingen sich um den Rand des breiten Rückenmuskels herum, die tiesen halten am Verlause der Schulteräste der Arteria axillaris. Ueberdies hängt der obere Theil des Plexus axillaris mit dem Plexus jugularis durch Anastomosen zusammen, und vereinigt seine dicken kurzen Vasa efferentia zu einem einsachen Truncus lymphaticus subclavius, welcher in den Milchbrustgang seiner Seite inosculirt.

§. 350. Saugadern der Brusthöhle.

Die Lymphgestasse der Brusthöhle lassen sich übersichtlich in vier Rubriken ordnen: die Zwischenrippensaugadern, die Mittelfell-, die inneren Brust-, und die Lungensaugadern.

- a) Die Zwischenrippensaugadern verlaufen mit den Vasis intercostalibus. Sie entwickeln sich aus der seitlichen Brust- und Bauchwand, dem Zwerchfelle, der Pleura, den Rückenmuskeln, und der Wirbelsäule, durchsetzen die Glandulae intercostales, deren 16—20 auf jeder Seite vorkommen, und hängen mit den folgenden zusammen.
- b) Die Mittelsellsaugadern entspringen aus der hinteren Herzbeutelwand, dem Oesophagus, und den Wänden des hinteren Mediastinum, passiren 8—12 Glandulas mediastini posteriores, und entleeren sich rechts in den Ductus thoracicus, links dagegen in die Glandulas bronchiales.
- c) Die inneren Brustsaugadern entsprechen den Vasis mammariis internis. Sie entstehen in der Regio epigastrica aus der Bauchwand, nehmen die im Ligamentum suspensorium hepatis aufsteigenden oberstächlichen Lebersaugadern auf, durchlaufen 6—8 Glandulas sternales, und hängen mit den hinter dem Sternum gelegenen Lymphdrüsen des vorderen Mittelfellraumes zusammen. Letztere, 10—14 an der Zahl, liegen theils auf dem Herzbeutel, theils auf den grossen Gestssen über demselben, und nehmen die Saugadern des Pericardium, der Thymus, und die an der Aorta und Arteria pulmonalis aufsteigenden Saugadern des Herzens auf. Die inneren Brustsaugadern bilden durch zahlreiche Verkettungen den Plexus mammarius internus, welcher in der oberen Brustapertur in den rechten und linken Ductus thoracicus einmündet.
- d) Die Lungensaugadern zerfallen in oberflächliche und tiefe, welche an der Lungenwurzel sich vereinigen, die Glandulas bronchiales durchsetzen, und links in den Ductus thoracicus gehen, rechts aber mit den hinteren Mittelfellsaugadern den Truncus broncho-mediastinicus bilden, welcher in den rechten kleinen Brustgang einmundet.

Die Glandulae bronchiales, deren einige schon im Lungenparenchym vorkommen, haben im kindlichen Alter das Aussehen gewöhnlicher Lymphdrüsen, werden aber bei Erwachsenen — unabhängig von Alter, Krankheit oder Lebensart — grau, selbst schwarz pigmentirt. Ihre Zahl beläust sich beiderseits auf 20—30. Sie sind sehr häusig Sitz von tuberculöser Insiltration, und werden bei alten Leuten ost im Zustande vollkommener Verkalkung (nicht Verknöcherung) angetrossen.

§. 351. Saugadern der unteren Extremitäten und des Beckens.

Das Stelldichein aller Lymphgesässe einer unteren Extremität sind die Leistendrüsen in der Fossa ileo-pectinea — Glandulas inguinales. Sie zerfallen in hochliegende und tiesliegende, welche durch den Processus falcisormis der Fascia lata getrennt sind, aber durch zahlreiche Verbindungsgänge zum Plexus inguinalis vereinigt werden. Die oberslächlichen Leistendrüsen, 7—13 an der Zahl, erstrecken sich vom Ligamentum Poupartii bis zur Fovea ovalis herab, wo sie die Vena saphena magna umgeben. Die tiesen, 2—7, liegen auf den Schenkelgesässen bis zum Septum crurale hinaus.

Die Lymphgesässe, welche die Leistendrüsen aufsuchen, sind:

- a) Die Lymphgestsse des Schenkels. Sie sind theils ausserhalb, theils innerhalb der Fascia lata untergebracht, also hoch- oder tiestiegend.
 - a) Die hochliegenden gehen vom Fussrücken und von der Fusssohle herauf. Erstere folgen dem Laufe der Vena saphena majer, sind sehr zahlreich, und vergesellschaften sich mit einer Partie der aus der Sohle kommenden, und über den Condylus internus femoris zur inneren Seite des Oberschenkels aufsteigenden Saugadern, um endlich in die hochliegenden Leistendrüsen überzugehen. Letztere laufen unter der Haut der Wade herauf, und theilen sich in zwei Züge, deren einer sich in die tiefen Glandulas popliteas entleert, während der andere den eben angegebenen Verlauf zu den Leistendrüsen einschlägt.
 - β) Die tiefliegenden verlassen die Blutgesässbahn nicht, und werden, wie diese, eingetheilt und benannt. In der Kniekehle dringen sie durch 1-4 Glandulae popliteae profundae.
- b) Die Lymphgestsse der Regio hypogastrica und lumbalis steigen schief über das Ligamentum Poupartii zu den obersten Leistendrüsen herab.
- c) Die Lymphgesasse der ausseren Genitalien sind es, welche den Ansteckungsstoff von den Geschlechtstheilen auf die Leistendrüsen verschleppen, und dadurch die primären Bubonen (Leistenbeulen) veranlassen. Die Lymphgesasse des Penis (oder der Clitoris) treten zuerst in das Fettlager des Mons Veneris, und beugen von hier zu den oberstächlichen Leistendrüsen um. Die des Hodensacks und der grossen Schamlippen gehen mit den Vasis pudendis externis quer nach aussen zu denselben Drüsen.

Die aussührenden Saugaderstämme der Leistendrüsen, deren einige schon die Dicke einer Rabenseder erreichen, gehen mit den Vasis cruralibus durch die Lacuna vasorum cruralium in die grosse Beckenhöhle. Einige derselben durchbohren auch das Septum crurale, und krümmen sich über den horizontalen Schambeinast in die kleine Beckenhöhle hinab. Die an den grossen Blutgesässen sortlausenden Saugadern nehmen die benachbarten Saugadern von der vorderen und den Seitenwänden der Bauchhöhle aus, durchwandern mehrere (6—8) Lymphdrüsen, und bilden durch ihre Verkettung den Plexus iliacus externus, welcher gegen die

Lendengegend hinzieht, und sich in die Glandulas lumbales inferiores entleert.

Der Plexus iliacus externus nimmt während dieses Lauses den Plexus hypogastricus und sacralis medius aus.

Der Plexus hypogastricus zieht sich an den Verästlungen der Arteria hypogastrica hin, und bezieht seine contribuirenden Saugadern aus allen jenen Theilen, zu welchen die Arteria hypogastrica ihre Zweige versandte.

Der Plexus sacralis medius dehnt sich vom Promontorium zum Mastdarmende herab, und nimmt seine Saugadern aus der hinteren Beckenwand, dem Canalis sacralis, und dem Mastdarme auf.

§. 352. Saugadern der Bauchhöhle.

Es wurde oben bemerkt, dass der Ductus thoracicus durch den Zusammensluss dreier kurzer und weiter Lymphgesässstämme (den beiden Trunci lymphatici lumbales, und dem einsachen Truncus lymphaticus intestinalis) gebildet werde. Diese Lymphstämme sind nun die Vasa efferentia von eben so vielen drüsenreichen Lymphgesässgeslechten, welche als doppelter Plexus lumbalis, und einsacher Plexus coeliacus beschrieben werden.

- a) Der paarige Plexus lumbalis nimmt die Lymphgesässe jener Organe auf, welche von den paarigen Aortenästen Blut erhielten. Sie liegen beide, wie ihr Name sagt, vor dem Quadratus lumborum, Psoas major, und der Lendenwirbelsäule, hängen durch Verbindungskanäle, welche über und unter der Aorta weglausen, zusammen, und schliessen 20—30 Glandulas lumbales ein, welche in superiores et inferiores zerfallen. Jeder Plexus lumbalis nimmt den Plexus iliacus externus, und durch diesen den Plexus hypogastricus und sacralis medius aus, und versammelt noch überdiess solgende schwächere Lymphgesässzüge:
 - a) Die Samensaugadern, welche vom Hoden und seinen Hüllen, oder von dem Eierstocke abstammen, und mit den Vasis spermaticis internis zur Lendengegend gelangen. Im weiblichen Geschlechte nehmen sie noch die Saugadern des Fundus uteri und der Tuba Fallopiana auf.
 - β) Die Nieren- und Nebennierensaugadern.
 - γ) Die Lendensaugadern von der seitlichen Bauchwand.
 - d) Auf der linken Seite die Saugadern der Flexura sigmoidea und des Rectum.
 - b) Der unpaare Plexus coeliacus ist von den beiden Plexus lumbales nicht scharf getrennt. Er umgiebt die Aorta und die beiden ersten unpaaren Aeste derselben, so wie die Pfortader, erstreckt sich bis hinter den Kopf des Pankreas, und hat ungefähr 16—20 Lymphdrüsen, Glandulae coeliacae, eingeschaltet, welche von folgenden Organen Lymphgefässe aufnehmen.

- a) Magen. Die Lymphgesasse des Magens bilden drei Gestechte, in welchen kleine Drüschen vorkommen: 1. das linke, welches vom Fundus ventriculi zum Milzgeslechte geht; 2. das obere, welches in der Curvatura ventriculi minor liegt, und zwischen den Blättern des kleinen Netzes nach rechts sich erstreckt, und meistens mit dem Lebergeslechte sich verbindet; 3. das untere an der Curvatura major besindliche, holt seine Saugadern aus dem Magen und dem grossen Netze, und geht hinter dem Pylorus in die oberen Glandulae coeliacae ein.
- B) Dünndarm. Die Saugadern des Dünndarms heissen vorzugsweise Milch- oder Chylusgefasse, Vasa lactea s. chylifera, weil sie während der Dünndarmverdauung durch den absorbirten Chylus das Ansehen bekommen, als wären sie mit Milch injicirt. Sie verlaufen zwischen den Platten des Gekröses, und durchbrechen eine dreisache Reihe von Drüsen — Glandulae mesaraicae. Die erste, dem Darme nächste Reihe, enthält nur kleine, und ziemlich weit von einander abstehende Gekrösdrüsen; die der zweiten Reihe werden grösser, und rücken näher zusammen; die der dritten liegen schon in der Wurzel des Gekröses, am Stamme der Arteria mesenterica superior. Im Ganzen schwankt die Zahl der Lymphdrusen des Mesenterium zwischen 130-150 (Theile). Die Vasa efferentia der ersten und zweiten Reihe, werden also Vasa inferentia der zweiten und dritten Reihe sein. Die Vasa efferentia der dritten werden theils Vasa inferentia für die Glandulae coeliacae, theils gehen sie, ohne Zwischenkunst einer Drüse, in den Truncus lymphaticus intestinalis, und somit in den Anfang des Ductus thoracicus über.

Die Lymphgesasse des Dünndarms nehmen im Darme selbst ihren Ursprung, theils aus den Zotten der Schleimhaut, theils aus dichten Saugadernetzen unter dem *Involucrum peritoneale*.

- γ) Dickdarm. Die Saugadern des Dickdarms verhalten sich ähnlich jenen des Dünndarms, nur sind die Drüsen, durch welche sie verlaufen, kleiner, weniger zahlreich, und nur in 1-2 Reihen gestellt. Da sich die Saugadern der Flexura sigmoidea und des Mastdarms zum linken Plexus lumbalis begeben, so werden nur die der übrigen Dickdarmabtheilungen zwischen den Platten ihrer betreffenden Gekröse zum Plexus coeliacus, oder zur dritten Reihe der Glandulae mesaraicae gelangen.
- d) Milz- und Bauchspeicheldrüse. Die Lymphgesässe dieser Organe folgen dem Zuge der Vena splenica von links nach rechts, und entleeren sich in die oberen Glandulae coeliacae.
- e) Leber. Ihre Saugadern zerfallen, wie bei allen parenchymatösen Organen, in oberflächliche und tiefe. Die tiefen treten aus der Porta hervor, durchlausen mehrere Glandulae hepaticae, verbinden sich mit dem oberen Magengeslecht, und treten mit ihm in die Glandulae coeliacae ein. Die oberflächlichen verhalten sich an der concaven Fläche der Leber anders, als an der convexen. An der convexen Fläche treten sie, nachdem sie sehr reiche Netze bildeten, in das Ligamentum

suspensorium hepatis ein, gelangen dadurch zum Zwerchfell, und treten hinter dem Schwertknorpel in das vordere Mediastinum, wo sie sich mit den Plexibus mammariis internis und mediastinicis anterioribus verbinden. Nicht alle Saugadern der convexen Fläche nehmen diesen Verlauf. Viele vom linken Leberlappen verbinden sich vielmehr, nachdem sie durch den linken Flügel des Ligamentum alare hepatis nach links verliefen, mit dem oberen Magen- oder Milzgeflechte. Einige Saugadern des rechten Lappens durchbohren am hinteren Leberrande das Zwerchfell, und suchen die Glandulas mediastinicas posteriores auf, so dass die Leberlymphe die verschiedensten und ganz divergente Abzugsbahnen einschlägt. Die oberflächlichen Saugadern der unteren concaven Leberfläche gehen sämmtlich zur Pforte, verbinden sich mit den tiefen, und finden mit diesen den Weg zu den Glandulae coeliacae.

§. 353. Literatur des gesammten Gefässsystems.

Vollständige Beschreibungen des ganzen Gefässsystems enthalten die zweiten Auflagen von Sömmerring's und Hildebrandt's Anatomien, und die Gefässlehren von C. A. Mayer, A. Walter, und M. Langenbeck. Die besten Abbildungen finden sich in den Kupferwerken von Langenbeck, Münz, Quain, Wilson, und Bierkovski, (Abbildungen der Puls-, Blut- und Saugadern. Berlin, 1825. fol.). Die Leichtigkeit, mit welcher Präparate injiciter Gefässe an jeder gut eingerichteten anatomischen Anstalt zu haben sind, macht das Studium der Gefässlehre an Tafeln überflüssig.

Herz.

- R. Lower, tractatus de corde. Edit. sept. Lugd. Bat., 1740. 8. (Tuberculum Loveri.)
- A. C. Thebesius, diss. de circulo sanguinis in corde. Lugd. Bat., 1708. 4. (Valvula Thebesii.)
- R. Vieussens, traité de la structure du coeur. Toulouse, 1715. 4. (Isthmus Vieussenii.)
- J. B. Morgagni, adversaria anat. Patav., 1706 1719. 4. Adv. 1. 2. V. (Noduli Morgagni.)
- J. Reid und H. Searle "Heart" in Todd's Cyclopaedia. Vol. II.
- J. Müller, in der medicin. Vereinszeitung. 1834. N. 29. (Dimensionen und Capacität des Herzens.)

Herz, in R. Wagner's Handworterbuch der Physiologie.

- C. Ludwig, über Bau und Bewegungen der Herzventrikel, in Henle und Pseusser's Zeitschrift. VII. Bd. 2. Heft.
- M. Hoffa und C. Ludwig, einige neue Versuche über Herzbewegung, ebend. 9. Bd. 1. Heft.
- Luschka, das Endocardium etc. in Virchow's Archiv. IV. pag. 171.

Arterien.

- F. Ticdemann, tabulae arteriarum. Carlsruhe, 1822. fol.
- R. Harrison, Surgical Anatom Dublin, 1839. 4. edit. (mit vielen guten praktischen III)

- R. Froriep, chirurg. Anat. der Ligaturstellen. Weimar, 1830. fol.
- R. Quain, the Anatomy and Operative Surgery of the Arteries. London, 1838.

 8. Plates in fol.
- N. Pirogoff, chirurg. Anat. der Arterienstämme und der Fascien, mit 40 lith. Tafeln in fol. Dorpat, 1839.
- R. Siebold, über den anomalen Ursprung und Verlauf der in chirurgischer Beziehung wichtigen Schlagaderstämme. Würzburg, 1837. 8.
- Sehr gelungen, und durch Correctheit ausgezeichnet, ist R. Froriep's Icon arteriarum, Weimar, 1850, auf Einer Tafel das gesammte Arteriensystem in das Skelet eingetragen, in Lebensgrösse darstellend.

Varietäten der Arterien.

Nebst den pathologischen Anatomien von Meckel, Otto, Cruveilhier, und den kleineren Abhandlungen von Loder, Pohl, Schön etc., welche bei Krause (pag. 970) nachzusehen sind, gehört vorzugsweise hieher:

- F. Tiedemann, Supplementa ad tabulas arteriarum. Heidelb., 1846. Fol. max. Herberg, über die Ein- und Austrittspunkte der Blutgesässe an der Schädeloberstäche, in Walther und Ammon's Journal. IV. Bd. pag. 418.
- Schlobig, observationes de varia arteriae obturatoriae origine et decursu. Lips., 1844.
- Patruban, Gefässanomalien. Prager Vierteljahrschrift. 17. Bd. pag. 29. (Aortenbogen über den rechten Bronchus gehend. Vas aberrans aus der Arteria brachialis. Hoher Ursprung der Ulnaris.)
- Demarquay, sur les anomalies de l'artère sousclavière. Comptes rendus. Tom. 27. N. 5.
- Struthers, On a Peculiarity of the Humerus and Humeral Artery. Monthly Journ. New Series. XXVIII. pag. 265.
- W. Gruber, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. Petersburg, 1852. (Schätzbare Angaben über numerische Verhältnisse der Varietäten.)

Venen.

Ueber das gesammte Venensystem exisirt nur Ein Hauptwerk:

G. Breschet, recherches anat. physiol. et pathol. sur le système veineux. Paris. 1829. fol.

Ueber die Sinus durae matris handelt Morgagni in dessen Adversariis anat. VI. und Vicq-d'Azyr, recherches sur la structure du cerveau, in den Mém. de l'acad. des sciences. 1781 und 1783. Ueber die Emissaria siehe D. Santorini, observ. anat. cap. III., und J. T. Walter, de emissariis Santorini. Francos. ad Viadr., 1757. 4. Ueber Venenanomalien siehe die vollständige Literatur bei Krause, pag. 973. — Für die Entwicklungsgeschichte interessant ist J. Marshall's Abhandlung: On the Development of the great anterior Veins in Man and Mammalia, in den Phil. Transactions, 1850. Part. I.

Pfortader.

- A. F. Walther, de vena portae exercitationes anatomicae. Lips., 1739-1740.
- A. Murray, delineatio sciagraphica venae portae. Upsal., 1796. 4.
- K. Hönlein, descriptio anat. systematis venae portae in homine et quibusdan animalibus. Mogunt., 1808. fol.

Ueber Anomalien der Venen und Sinus durae matris handelt aussuhrlich und mit kritischen Bemerkungen:

C. H. Hallett, General Remarks on Anomalies of Venous System. Med. Times. Nov. N. 423.

Lymphgefässe.

- C. A. Asellius, de lactibus s. lacteis venis etc. Mediol., 1627. 4.
- J. Pecquet, experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum et vasa lactea deteguntur. Paris, 1651. 4.
- A. Monro et J. F. Meckel, opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lips., 1760. 8.
- W. Crwikshank, the Anatomy of the absorbings Vessels, deutsch von C. F. Ludwig. Leipzig, 1794. 4.
- E. A. Lauth, sur les vaisseaux lymphatiques. Strasb., 1824. 4.
- V. Fohmann, mém. sur les vaisseaux lymphat. de la peau, etc. Liège, 1833. 4.
- G. Breschet, le système lymphatique, considéré sous le rapport anat. physiol. et pathol. Paris, 1836. 8.

Ueber einzelne Abtheilungen des Lymphgesässsystems handeln:

- A. Haller, resp. Bussmann, observationes de ductu thoracico. Gött., 1741.
- B. S. Albin, tabula vasis chyliferi cum vena azyga. L. B., 1757. fol.
- F. J. Hunauld, observ. sur les vaisseaux lymph. dans le poumon de l'homme, in Mém. de l'acad. de Paris. 1734.
- J. G. Haase, de vasis cutis et intestinorum absorbentibus, etc. Lips., 1786. fol.
- S. Th. Sömmerring, de trunco vertebrali vasorum absorbentium; in Comment. soc. reg. Gotting. Vol. XIII.

Patruban, Einmundung eines Lymphaderstammes in die Vena anonyma sinistra.

Müller's Archiv. 1845. pag. 15.

Svitzer, Beobachtung einer Theilung des Ductus thor. ibid. pag. 21.

Nuhn, Verbindung von Saugadern mit Venen. Müller's Archiv. 1848.

Jarjavay, sur les vaisseaux lymphatiques du poumon. Arch. gén. de méd. Tom. XIII.

Eine Reihe von Versuchen über die bewegende Krast der Lymphe enthält der Aussatz von F. Noll: über den Lymphstrom und die wesentlichen Bestandtheile der Lymphdrüsen, in Henle und Pfeusser's Zeitschrist. 9. Bd. 1. Hest.

Ueber die Thätigkeiten der einzelnen Abschnitte des Gesässsystems handeln die schon ost genannten physiologischen Lehrbücher, und Bergmann's Artikel "Kreislaus" im Handwörterbuche der Physiologie.

In praktischer Beziehung vermindert sich die Wichtigkeit der Blutgefässe mit der Abnahme ihrer Grösse, und die umständliche Beschreibung
jener Gefässzweige, deren Verwundung nicht gefahrbringend, und deren
Unterbindung nicht nothwendig ist, erscheint dem praktischen Arzte als
eine nutzlose Genauigkeit. — Das capillare Gefässsystem ist insofern wichtig, als die Structur seiner Wandungen den Austritt des Blutplasma in die
umgebenden Gewebe vermittelt. Die Formen der Capillargefässnetze haben
hiebei nur untergeordnete Wir

t ihre minutiöse Behandlung so leicht in eine gein

lichen Fragen der Gegenwart keinen Werth hat. Die mikroskopische Untersuchung des Capillargesässgewebes ist sur die Physiologie viel wichtiger als die Form der Netze und die Länge ihrer Maschen, welche von der Gestaltung der einsachsten Gewebelemente eines Organs abhängen. Ich habe mich lange genug mit der Technik der Injectionen beschästigt, um einzusehen. dass, mit Ausnahme weniger Fälle, die mikroskopische Untersuchung nicht injicirter Gesässe viel ergebnissreicher als jene der injicirten ist, und jeder Physiolog, welchen die Capitel der Ernährung und Absonderung beschästigen, wird derselben Meinung sein.

Bei Wilhelm Braumüller, k. k. Hosbuchbändler in Wien, sind erschienen:

PATHOLOGISCHE ANATOMIE,

MIT VORZÜGLICHER BERÜCKSICHTIGUNG DER BEDÜRFNISSE DES ARZTES UND GERICHTSANATOMEN.

Dr. JOSEF ENGEL,

Professor an der K. K. med. chir. Josefsakademie zu Wien. 2. Cheile.

1956. Preis fl. 8. 40 kr. — 6, Rthlr.

COMPENDIUM DER PATHOLOGISCHEN ANATOMIE

Z 0 Z

Dr. R. HESCHL.

Professor der Anatomie an der Universität zu Krakau.

1855. fl. 3. 30 kr. 2 Rthlr. 10 Ngr.

COMPENDIUM DER CHIRURGISCHEN OPERATIONSLEHRE

KON

Dr. W. LINHART,

Professor an der k. Universität zu Würzburg.

Mit 315 Holzschnitten. 1856. 6 fl. - 4 Rthlr.

COMPENDIUM DER AUGENHEILKUNDE

von

Dr. IGNAZ MEYR,

Docenten der Augenheilkunde und Assistenten der Augenalinik an der Universität zu Wien.

1552. 3 fl. — 2 Rthlr.

DIAGNOSTIK DER GEISTESKRANKHEITEN

F Č R

ÄRZTE UND RICHTER

K O Y

Dr. JOHANN SPIELMANN,

GEW. SECENDARARZTE DES ALLGEMEINEN KRANKENHAUGES DUP

HAMPTALT 20 PRAG.

1855. fl. 4. 36-



	•	
•		

LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

 the date last stam	l en below.
	}
1	
1	

E23 H Hyrtl, J. Lehrbuch d H999 Anatomie des Menschei 1857 13929

1	NAME	DATE DUE
1 11 11		
	- 1	
-		
inne ume		

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F.
		NF .
-		
-		
	100	
	- 388	
	500	No. of Concession, Name of Street, or other Party of Street, or other

